

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Rok 1960

EGZ. NR

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna Polski za rok 1960

W roku 1960 notuje się znaczną poprawę sytuacji epidemiologicznej w kraju. Bardzo poważne osiągnięcia zanotowano w zwalczaniu nagminnego porażenia dziecięcego, następnie błonicy oraz schorzeń infekcyjnych szerzących się drogą jelitową.

Notowane w latach ubiegłych niepokojące narastanie liczby przypadków zakaźnego zapalenia wątroby zostało zahamowane. Biorąc pod uwagę, że rok 1960 jest końcowym rokiem pięcioletnia w niniejszej sytuacji przedstawiamy sytuację epidemiologiczną omawianego roku na tle poprzedzającego okresu lat 4 (1956—1960).

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny i dury rzekome

Rejestrujemy w roku 1960 najniższą zapadalność dotąd notowaną w Polsce.

Dur brzuszny

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	4 797	17,0
1957	5 171	18,3
1958	4 633	16,0
1959	4 254	14,5
1960	3 464	11,7

Obserwujemy więc stopniowe i dość znaczne obniżanie się wskaźnika zapadalności na przestrzeni ostatnich kilku lat. W roku 1960 zaszczepiono na terenie kraju przeciwko durowi brzuszemu 10 717 929 osób.

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku w latach 1957—1960

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem %
1957	2,9	35,7	25,0	28,6	7,8	100
1958	3,0	39,7	22,7	26,7	7,9	100
1959	3,5	39,4	23,2	26,6	7,3	100
1960	3,6	39,3	23,2	26,3	7,6	100

Z największych ognisk epidemicznych duru brzuszego notowanych w roku 1960 należy wymienić:

1) Woj. Kieleckie, pow. Szydłowiec — luty — marzec — 86 zachorowań. W toku dochodzenia epidemiologicznego wykryto nosicielkę o zgodnym z przypadkami zachorowań typie fagowym (F4).

2) M. st. Warszawa, dzielnica Wawer — luży — marzec — 34 zachorowania. W toku dochodzenia epidemiologicznego wykryto nosicielkę (ekspedientkę sklepową) o typie fagowym E_{1a}.

3) Woj. Krakowskie, pow. Żywiec — czerwiec — 15 zachorowań. Przyczyną zachorowań były wadliwe urządzenia wodno-kanalizacyjne.

4) Woj.: Gdańskie, pow. Starogard — sierpień — 35 zachorowań. Przypuszczalne źródło zakażenia — mleko.

2. Dury rzekome

Stwierdza się nieznaczne obniżenie wskaźnika zapadalności. W roku sprawozdawczym notowano głównie zachorowania sporadyczne.

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

R o k	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	619	2,2
1967	713	2,5
1958	750	2,6
1959	448	1,5
1960	422	1,4

W roku 1960 uległa znacznej poprawie rejestracja i nadzór nad nosicielami pałeczek Salmonella typhi i paratyphi A. B. C.

Na dzień 31. XII. 1960 r. było zarejestrowanych 3 932 stałych nosicieli. Z 2 342 typowanych w 1960 r. nosicieli Salmonella typhi najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
E _{1a}	429	18,3
F ₁	357	15,2
A	255	10,9
D ₁	170	7,2
C ₁	125	5,3
E _{1b}	91	3,9

Z 2 560 ognisk epidemicznych S. typhi w roku 1960 występowały najczęściej następujące typy:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba ognisk	%
E _{1a}	536	20,9
F ₁	363	14,2
A	223	8,7
D ₁	209	8,2
C ₁	133	5,2
E _{1b}	131	5,1

3. Czerwonka

W roku 1960 notuje się w stosunku do roku 1959 zmniejszenie liczby rejestrowanych przypadków:

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	6 932	25,4
1957	7 784	27,6
1958	6 632	22,9
1959	7 552	26,0
1960	5 970	20,2

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku w latach 1957—1960

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem %
1957	17,6	14,9	14,9	39,3	13,3	100
1958	13,3	14,6	15,5	43,2	13,4	100
1959	13,1	13,1	15,6	43,4	14,8	100
1960	13,6	15,5	14,3	42,7	13,9	100

Czerwonka w Polsce w latach 1956—1960 wg czynnika etiologicznego

Rok	Sh. Flexneri		Sh. Sonnei		Sh. Shigae-Schmitzi		Inne	
	l. zach.	%	l. zach.	%	l. zach.	%	l. zach.	%
1956	1 240	72,1	283	16,4	43	2,5	155	9,0
1957	1 687	66,5	751	29,6	7	0,3	91	3,6
1958	1 524	68,9	621	28,1	31	1,4	36	1,6
1959	2 542	70,5	1 013	28,0	25	0,7	31	0,8
1960	2 618	74,9	837	23,9	18	0,5	26	0,7

Powyższa tabela obejmuje typy pałeczek Shigella występujące w Polsce według danych ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne — form. E. II-12.

Podobnie jak w latach poprzednich rejestracja czerwonki odbiega daleko in minus od faktycznej liczby zachorowań.

Zgłaszane są w większości przypadki hospitalizowane o etiologii nie budzącej wątpliwości.

**Umieralność* na czerwonkę w Polsce na 100 000 ludności
w latach 1956—1960**

1956	1957	1958	1959	1960
0,26	0,27	0,16	0,39**	0,16**

4. Biegunki u dzieci do lat 2-ch

Wiarygodność rejestracji biegunek u dzieci do lat 2 należy rozpatrywać z dużymi zastrzeżeniami, ze względu na stosunkowo niedostateczną zgłaszalność. W rzeczywistości zachorownia na biegunki w Polsce znacznie przekraczają liczby, które tu przedstawiono.

**Zachorowania i zapadalność na biegunki do lat 2
w latach 1956—1960**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 (w grupie wieku od 0—2 lat)
1956	45 851	2 115,3
1957	47 896	2 213,1
1958	38 592	1 764,7
1959	42 491	2 084,6
1960	26 576	1 293,5

5. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba ognisk zarejestrowanych w 1960 roku wynosi 114 — o łącznej liczbie zachorowań 3 343 osób.

W stosunku do roku 1959 liczba ognisk zwiększyła się o jedno, natomiast liczba chorych o 244.

W roku 1960 ognisk spowodowanych czynnikami bakteryjnymi ustalonymi zanotowano 67 — 2359 chorych, nie ustalonymi 41 — 946 chorych, grzybami 6 — 38 chorych.

Udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych w 1960 r. przedstawia się następująco:

Produkty żywnościowe	Liczba ognisk		% ognisk	% zachorowań		Salmonella		Gronkowie		Cl. perfringus		Cl. Botulizismus		Inne drobnoustroje		Czynnik nie ustalony	
	Liczba zachorowań			L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.		
Mięso i przetwory	59	1908	54,6	57,7	19	529	14	523	—	—	1	5	12	431	13	420	
Przetwory mleczne	10	442	9,3	13,4	—	—	9	423	—	—	—	—	—	—	1	19	
Inne produkty	39	955	35,1	28,9	—	—	9	335	—	—	—	—	3	113	27	507	
R a z e m	108	3305	100,0	100,0	19	529	32	1281	—	—	1	5	15	544	41	946	

6. Włośnica

W roku 1960 notuje się znacznie zwiększoną liczbę rejestrowanych zachorowań w stosunku do lat ubiegłych.

1956	1957	1958	1959	1960
407	649	342	1129	2258

W roku 1960 zanotowano 3 duże ogniska włośnicy. W województwie Poznańskim (pow. Poznań) w miesiącach czerwiec-lipiec 835 zachorowań. W województwie Katowickim w maju 441 zachorowań (pow. Zabrze) i w województwie Gdańskim w miesiącu lutym 139 zachorowań (pow. Kościerzyna).

7. Zakaźne zapalenie wątroby

W pierwszej połowie 1960 r. notowano dalsze gwałtowne narastanie zachorowań, co przy ograniczonej możliwości hospitalizacji i leczenia szpitalnego stanowiło poważny problem epidemiologiczny.

Od września 1960 r. nastąpiło załamanie się krzywej epidemiologicznej w porównaniu z 1959 r. i tendencja ta utrzymała się do końca roku sprawozdawczego w wyniku czego zakończyliśmy rok prawie identyczną liczbą przypadków jak w roku poprzedzającym.

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	25 528	90,4
1957	26 348	93,3
1958	43 724	151,4
1959	75 438	260,1
1960	76 193	258,4

Zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku w latach 1957—1960

Rok	0—2	3—6	7—13	14—17	18—24	25—39	40—49	50—59	60 i więcej	Zapad. krajowa
1957	36,5	184,9	174,0	94,6	95,6	77,6	49,5	48,6	40,1	93,3
1958	58,7	380,4	362,3	152,4	132,9	97,6	56,8	62,0	50,4	151,4
1959	90,5	690,8	702,8	294,9	200,3	144,6	72,6	82,5	70,4	260,1
1960	84,4	603,8	575,2	290,7	217,8	129,5	143,1	93,4	73,1	258,4

**Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku
w latach 1957—1960**

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem ‰
1957	3,0	45,7	17,5	24,7	9,1	100
1958	2,9	56,7	15,5	18,2	6,7	100
1959	2,6	61,7	14,9	15,3	5,5	100
1960	2,5	58,3	15,5	17,2	6,5	100

Z powyższej tabeli widać, że nasilenie epidemiczne w ostatnich 3 latach miało miejsce głównie w grupach wiekowych dziecięcych i młodzieżowych.

**Odsetek hospitalizacji chorych na zakaźne zapalenie wątroby
w Polsce w latach 1956—1960**

1956	1957	1958	1959	1960
83,9	88,4	81,4	78,4	85,1

W roku 1960 w akcji zapobiegawczej przeciwko zakaźnemu zapaleniu wątroby użyto o 62,2% więcej gamma globuliny w stosunku do roku poprzedzającego.

8. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

**Zachorowania i zapadalność
w latach 1956—1960**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	2 441	8,8
1957	1 163	4,1
1958	6 090	21,1
1959	1 112	3,8
1960	301	1,0

**Liczba bezwzględna przypadków na poliomyelitis w grupach
wieku w roku 1960**

Rok	0—3	4—7	8—14	i więcej 15	Razem
1960	166	62	28	45	301

**Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku
w latach 1956—1960**

Rok	0—3	4—7	8—14	15 i więcej	Razem ‰
1956	68,1	20,4	5,9	5,6	100
1957	65,1	16,5	11,1	7,3	100
1958	61,9	25,7	7,2	5,2	100
1959	59,6	20,6	11,9	7,9	100
1960	55,0	20,8	9,4	14,8	100

Sezonowość kwartalami w latach 1956—1960

Rok	I	II	III	IV	Razem
1956	222	263	1186	770	2441
1957	185	184	555	239	1163
1958	123	360	3549	2058	6090
1959	271	146	483	212	1112
1960	113	79	60	49	301

Jak wynika z podanych liczb, w 1960 roku nastąpiło całkowite zatarcie się klasycznej krzywej sezonowej występującej w III kwartale. W roku 1960 notuje się z kwartału na kwartał zmniejszanie liczby zgłoszonych zachorowań. Jest to cecha charakterystyczna występująca jedynie w tych krajach, które szczepiły w latach 1959—1960 masowo szczepionką doustną.

Szczepienia ochronne przeciwko poliomyelitisi

Do maja 1960 roku została zakończona akcja masowego szczepienia przeciwko poliomyelitisi szczepionką doustną Koprowskiego; typem I CHAT i typem III Fox. Szczepieniami objęto dzieci w wieku od 6 miesięcy do 15 lat.

Szczepionką typu I zaszczepiono — 7 239 000 dzieci, tj. 80,9‰ wszystkich dzieci w tej grupie wieku.

Szczepionką typu III zaszczepiono — 6 818 500, tj. 76‰ wszystkich dzieci w tej grupie wieku.

Szczepionką typu III wirusa zaszczepiono 92,4‰ dzieci, które uprzednio otrzymały szczepionkę typu I.

Od 15 września 1960 r. szczepiono rutynowo dzieci roczników najmłodszych nie objętych szczepieniami masowymi prowadzonymi w roku 1959/1960. Wśród tej grupy dzieci zaszczepiono do końca roku 1960

typem wirusa I — 276 007 dzieci.

typem wirusa III — 274 670 dzieci.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Grypa

Liczba zachorowań i zapadalność w Polsce w latach
1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	89 119	322,0
1957	3 101 166	10 983,8
1958	145 640	504,2
1959	1 969 234	6 790,5
1960	230 425	781,6

Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności w latach 1956—1960

Rok	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1956	414,5	299,4	142,8	416,8
1957	4 243,3	2 612,4	319,0	38 056,8
1958	806,5	416,8	139,9	704,4
1959	22 790,7	3 228,7	222,1	933,8
1960	982,3	734,8	280,4	1 136,3

2. Błonica

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100.000 ludności
1956	23 053	83,0
1957	15 861	56,2
1958	11 090	38,4
1959	10 175	35,1
1960	6 380	21,6

W roku 1960 notuje się dalszy spadek zachorowań na błonicę zaznaczony we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania.

Umieralność*) z powodu błonicy na 100 000 ludności
w latach 1956—1960

1956	1957	1958	1959	1960
3,8	2,9	1,7	1,6**	1,0**

W roku 1960 otrzymało szczepienia podstawowe (3 wstrzyknięcia) — 953 826 dzieci. W tym zaszczepiono szczepionką:
 anatoksyna błonicza — 351 108 dzieci
 błonica-tężec-krztusiec — 277 791 dzieci
 błonica-tężec — 324 927 dzieci.

Ponadto zaszczepiono powtórnie w 4 i 7 roku życia 799 783 dzieci, w tym szczepionką:

anatoksyna błonicza	— 452 051
błonica-tężec-krztusiec	— 12 077
błonica-tężec	— 335 655

3. Płonica

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	44 880	162,0
1957	49 904	176,7
1958	63 599	220,2
1959	71 788	247,5
1960	50 842	172,5

W roku 1960 notuje się znaczny spadek liczby zarejestrowanych przypadków.

Umieralność*) z powodu płonicy na 100 000 ludności w latach 1956—1960

1956	1957	1958	1959	1960
0,25	0,26	0,29	0,40**	0,17**

4. Odra

Zachorowania i zapadalność na odrę w Polsce w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	80 789	292,0
1957	93 782	332,1
1958	73 368	254,2
1959	115 433	398,0
1960	84 531	286,7

5 Krztusiec

Zachorowania i zapadalność w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	67 547	244,0
1957	68 153	241,5
1958	70 633	244,5
1959	70 195	242,0
1960	95 968	325,5

W roku 1960 notuje się znaczny wzrost liczby zarejestrowanych przypadków.

Umieralność*) z powodu krztuśca na 100 000 ludności
w latach 1956—1960

1956	1957	1958	1959	1960
2,29	2,65	1,59	1,28**	1,03**

III. Inne schorzenia

1. Wścieklizna

W roku 1960 zarejestrowano 4 przypadki wścieklizny.

1. Województwo Lubelskie (pow. Łuków) 1 zachorowanie (10 lat). Pokąsanie przez wściekłego psa.

2. Województwo Koszalińskie (pow. Koszalin) 1 zachorowanie. Pokąsanie przez wściekłego kota.

3. Województwo Wrocławskie (pow. Wałbrzych) 1 zachorowanie (28 lat). Zwierzę nieznanne.

4. Województwo Bydgoskie (pow. Grudziądz) 1 zachorowanie (13 lat). Pokąsanie przez wściekłego lisa.

2. Wąglik

W roku 1960 zarejestrowano 10 zachorowań, w tym po 3 zachorowania w województwach: Lubelskim i Białostockim. W województwach: Zielonogórskim, Poznańskim, Warszawskim i Rzeszowskim zanotowano po 1 zachorowaniu.

3. Tężec

Zachorowania i zapadalność
w latach 1956—1960

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1956	403	1,43
1957	354	1,24
1958	369	1,28
1959	382	1,32
1960	304	1,03

*) Zgony o przyczynie stwierdzonej i nie stwierdzonej przez lekarza.
Dane GUS.

***) Dane tymczasowe.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Btonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzyszec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas	
						Salmonelozy	Inne																	040
POLSKA	1959	4254	448	7552	42491	141	764	4982	1128	75438	1112	10175	71788	115433	70195	44858	1138	1969234	273	13	1	55	382	2121
	1960	3464	422	5970	26576	202	1213	5325	2258	76193	301	6380	50842	84531	95968	60301	883	230425	265	13	4	54	304	1766
M. st. Warszawa	143	38	518	1119	—	76	410	21	3633	25	107	4749	5516	6699	6424	98	13285	25	4	—	2	1	112	
Warszawskie	430	21	314	2483	12	49	147	112	4279	28	277	2664	3808	5370	1868	13	4117	25	1	—	3	12	90	
Bydgoskie	204	36	545	1660	50	61	202	37	3859	19	153	3299	5497	7180	1264	33	7275	2	1	1	2	9	138	
M. Poznań	22	—	103	536	—	15	34	17	1934	4	90	973	2986	3167	1279	2	2427	—	—	—	—	4	25	
Poznańskie	146	14	287	849	72	88	209	1122	6063	8	201	2724	4896	4822	1744	57	12280	1	1	—	13	10	87	
M. Łódź	97	28	240	1475	1	21	914	36	2363	10	263	3355	4732	3329	2391	2	112840	10	3	—	—	6	167	
Łódzkie	236	41	163	1003	—	66	143	7	4061	8	341	1616	2106	3272	2102	34	7440	4	1	—	3	11	80	
Kieleckie	441	18	26	1664	5	116	338	25	2527	19	731	1448	3896	2878	2879	82	5175	19	—	—	—	26	62	
Lubelskie	157	34	186	476	1	7	204	60	3432	18	405	875	1635	3027	1185	19	2064	65	—	1	—	20	57	
Białostockie	100	35	385	1595	—	125	10	24	1912	6	124	905	1264	2010	1156	46	1136	20	1	—	—	7	65	
Olsztyńskie	152	8	339	1350	6	20	307	3	1940	14	31	1881	1295	3128	1467	45	2284	14	—	—	3	9	64	
Gdańskie	221	14	655	2729	1	120	601	151	3787	9	61	3585	5581	9632	5929	14	6826	13	—	—	3	5	109	
Koszalińskie	51	3	155	1404	2	76	39	3	1894	5	150	1034	1592	2801	1426	40	2186	2	—	1	2	2	31	
Szczecińskie	61	4	318	564	8	10	377	—	2238	6	178	1545	4513	3389	1484	12	1812	5	—	—	6	11	25	
Zielonogórskie	80	22	330	887	2	3	82	16	2086	22	76	1154	3667	4425	1763	23	5768	12	—	—	2	7	30	
M. Wrocław	19	3	87	962	2	15	178	—	1734	6	58	1174	2490	2155	1892	9	2213	5	—	—	—	1	89	
Wrocławskie	179	6	317	1221	11	65	482	24	5360	24	1090	4061	6793	5548	5166	99	6108	13	1	1	9	30	162	
Opolskie	104	2	48	616	18	59	183	—	2911	19	313	1598	3272	2335	1815	73	4404	3	—	—	4	18	56	
Katowickie	215	53	539	2605	10	39	205	600	10939	17	939	7822	12961	11991	11598	57	23221	10	—	—	1	6	164	
M. Kraków	37	16	245	199	—	3	99	—	1308	2	148	1321	1603	2933	2833	7	4418	4	—	—	—	3	40	
Krakowskie	201	8	143	496	1	178	111	—	4618	14	382	1903	2285	2266	1611	41	1059	8	—	—	—	53	60	
Rzeszowskie	168	18	27	683	—	1	50	—	3315	18	262	1156	2143	3611	1025	77	2087	5	—	—	1	53	53	

Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- ciące nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	14,5	11,7	1,5	1,4	26,0	20,2	3,8	1,0
M. st. Warszawa	17,5	12,9	3,1	3,4	62,9	46,8	8,3	2,3
Warszawskie	22,7	18,3	1,5	0,9	13,6	13,3	6,8	1,2
Bydgoskie	26,0	12,0	1,3	2,1	22,4	32,0	3,4	1,1
M. Poznań	6,1	5,5	0,2	—	49,2	25,9	3,6	1,0
Poznańskie	8,7	7,3	0,4	0,7	20,0	14,3	1,9	0,4
M. Łódź	22,8	13,8	4,0	4,0	54,9	34,2	1,1	1,4
Łódzkie	15,4	14,5	0,8	2,5	24,3	10,0	3,4	0,5
Kieleckie	20,0	23,7	2,3	1,0	6,0	1,4	2,2	1,0
Lubelskie	9,9	8,7	1,7	1,9	10,7	10,3	5,5	1,0
Białostockie	19,9	9,1	4,4	3,2	45,4	34,9	1,1	0,5
Olsztyńskie	19,8	17,3	1,1	0,9	63,3	38,6	4,2	1,6
Gdańskie	20,7	18,3	0,8	1,1	69,9	54,2	2,9	0,7
Koszalińskie	11,5	7,4	0,6	0,4	29,2	22,6	2,2	0,7
Szczecińskie	11,7	8,1	1,4	0,5	50,0	42,5	3,2	0,8
Zielonogórskie	8,9	10,4	1,3	2,8	61,0	42,8	7,3	2,7
M. Wrocław	15,4	4,4	1,0	0,7	29,8	20,3	2,2	1,4
Wrocławskie	14,9	10,1	0,6	0,3	23,1	17,9	3,2	1,3
Opolskie	7,8	11,3	0,3	0,2	5,3	5,2	5,7	2,1
Katowickie	8,6	6,6	1,7	1,6	17,2	16,6	2,5	0,5
M. Kraków	16,5	7,8	6,3	3,4	63,1	51,6	6,9	0,4
Krakowskie	9,1	9,8	1,3	0,4	9,1	6,9	3,8	0,7
Rzeszówskie	10,0	10,4	1,0	1,1	2,0	1,7	4,4	1,1

Zapadalność na 100 000 ludności.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
35,1	21,6	247,5	172,5	242,0	325,5	260,1	258,4
19,1	9,7	583,7	429,0	573,7	605,1	389,1	328,2
19,9	11,8	114,9	113,2	134,2	228,1	184,2	181,8
16,1	9,0	295,5	193,6	337,0	421,4	293,1	226,5
15,8	22,6	529,1	244,4	576,8	795,7	474,7	485,6
17,4	10,0	250,3	135,4	194,0	239,7	274,5	301,2
69,7	37,5	741,8	477,9	327,9	474,2	391,7	336,6
36,2	21,0	107,0	99,6	148,0	201,7	233,1	250,3
57,0	39,3	93,3	77,9	186,0	154,8	139,1	135,9
43,8	22,4	65,6	48,3	122,6	167,2	195,7	189,6
21,7	11,2	134,8	82,1	179,8	182,4	123,3	173,5
10,9	3,5	231,2	214,2	180,0	356,3	206,0	220,9
10,2	5,0	380,9	296,8	484,8	797,3	273,3	313,5
22,7	21,7	210,1	150,5	314,2	406,2	256,7	275,7
41,6	23,8	248,2	206,5	494,5	453,0	271,8	299,2
21,3	9,9	249,9	149,9	290,0	574,7	303,2	270,9
34,9	13,5	359,5	273,6	408,3	502,3	556,8	404,1
80,0	61,6	293,2	229,7	217,3	313,8	337,1	303,2
58,2	34,1	301,3	174,1	168,3	254,3	345,9	317,1
53,1	28,9	396,3	240,4	287,9	368,6	346,0	336,3
49,0	31,1	482,0	278,1	420,4	617,5	298,3	275,4
24,8	18,6	141,3	93,9	100,2	110,1	197,8	224,4
25,0	16,2	62,9	71,4	100,5	223,2	138,3	204,9

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1960	Rok 1959	Mediana 1956—1959
Dur brzuszny — 040	3 464	4 254	4 715
Dury rzekome ABC — 041	422	448	666
Czerwonka — 045	5 970	7 552	7 242
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	26 576	42 491	44 171
Botulismus — 049	202	141	174
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	1 213	764	848
	inne — 049	5 325	3 852
Włośnica — 128	2 258	1 129	528
Zakaźne zap. wątr. — 092	76 193	75 438	35 036
Porażenie dziec. nagm. — 080	301	1 112	1 702
Błonica — 055	6 380	10 175	13 475
Płonica — 050	50 842	71 788	56 751
Odra — 085	84 531	115 433	87 285
Krzusiec — 056	95 968	70 195	69 174
Zap. przyusz. nagm. — 089	60 301	44 858	34 783
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	883	1 138	1 365
Grypa 480 — 483	230 425	1 969 234	1 057 437
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	265	273	328
Zimnica 110—117	13	13	28
Wścieklizna — 094	4	1	1
Choroba Banga — 044	54	55	81
Tężec — 061	304	382	375
Róża — 052	1 766	2 121	2 103

CDW Cieszyn 1375/61 260 S-24


Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA

DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15

TELEFON: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

STYCZEŃ 1960

EGZ. NR 200

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w styczniu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r.ub. zanotowano zmniejszenie liczby zachorowań o 87 przypadków, co wyraża się obniżeniem wskaźnika zapadalności z 13,3-I/1959 do 9,8-I/1960. Spadek liczby zachorowań zanotowano we wszystkich województwach z wyjątkiem: m.st. Warszawy, m. Poznania, m. Krakowa, Kieleckiego, Zielonogórskiego i Rzeszowskiego.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowały województwa: Kieleckie—20,6; Rzeszowskie—17,5; Białostockie—16,2; Warszawskie—14,7 i Gdańskie—12,9. W stosunku do grudnia 1959 r. wskaźnik zapadalności utrzymuje się na tym samym poziomie (10,0—XII/1959; 9,8—I/1960). W okresie sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

2. Dury rzekome

W styczniu zanotowano 19 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notujemy wzrost zapadalności w porównaniu ze styczniem 1959 r. z 11,6—I/1959 do 15,1—I/1960. Znaczny wzrost wskaźnika zanotowano w następujących województwach:

Województwo (miasto)	I/1959	I/1960
M.st. Warszawa	20,6	41,1
M. Wrocław	5,7	20,1
Białostockie	14,0	38,8
Gdańskie	30,9	46,8
Zielonogórskie	10,9	23,5
Wrocławskie	6,8	18,5

Nie notujemy różnic w zapadalności krajowej w porównaniu z grudniem 1959 r.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W styczniu zanotowano 49 zachorowań. Liczba zachorowań według grup wieku w tym miesiącu przedstawiała się następująco:

Wiek	L. zach.	%
0 — 5	33	67,3
5 — 10	7	14,3
powyżej 10	9	18,4
Razem	49	100

W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. zapadalność obniżyła się z 6,2 do 2,0. Tylko m. Łódź i m. Poznań wykazują wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1959 r. Wyższą zapadalność od zapadalności krajowej zanotowano w następujących województwach: m.st. Warszawa—4,3; m. Poznań 9,0; m. Łódź—6,8; m. Wrocław—2,9; Kieleckie—2,6; Olsztyńskie—4,1; Gdańskie—3,0 i Zielonogórskie—4,7.

W styczniu w m. Krakowie i woj. Koszalińskim nie zanotowano zachorowań.

W stosunku do grudnia ub.r. krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł z 1,7 do 2,0.

5. Zatrucia pokarmowe

W styczniu zanotowano 5 ognisk zatruc pokarmowych (po 2 ogniska w woj. Wrocławskim i Gdańskim oraz 1 ognisko w woj. Opolskim). Łączna liczba zatruc w ogniskach wyniosła 226 osób.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Zapadalność wzrosła z 288,6—I/1959 do 367,3—I/1960. Wszystkie województwa wykazują wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1959 r. z wyjątkiem Bydgoskiego (435,4—I/1959; 308,5—I/1960) i Lubelskiego (277,1—I/1959; 222,4—I/1960).

W porównaniu z grudniem ub.r. notujemy spadek zapadalności z 390,1—XII/1959 do 367,3—I/1960. Natomiast województwa: Lubelskie, Białostockie, Olsztyńskie, Zielonogórskie, Krakowskie i Rzeszowskie wykazują wzrost do poprzedzającego miesiąca.

Z ogólnej liczby zachorowań (9.048) hospitalizowano 76,3% chorych.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notujemy w dalszym ciągu spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., jak również z grudniem 1959 r. (styczeń 1959—44,2; grudzień 1959—30,3; styczeń 1960—26,8).

Spadek zapadalności wykazują wszystkie województwa w porównaniu ze styczniem 1959 r.

2. Płonica

Obserwujemy nieznaczny spadek wskaźnika zapadalności z 237,3—I/1959 do 233,0—I/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w: m.st. Warszawie, m. Poznaniu, m. Łodzi, m. Wrocławiu, m. Krakowie, woj. Bydgoskim, Olsztyńskim, Gdańskim, Katowickim.

3. Krztusiec

Zapadalność obniżyła się z 329,3—I/1959 do 239,8—I/1960. Z wyjątkiem województw: Warszawskiego, Olsztyńskiego i Opolskiego, pozostałe województwa wykazują spadek zapadalności.

ZACHOROWANIA IOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyszczyki nagnienne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózgowo-rdzeni. nagnienne Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1959	329	29	287	1425	4	9	162	101	7108	154	1088	5844	13646	8113	6979	82	18787	23	-	-	4	18	168
	1960	242	19	371	1225	7	27	255	81	9048	49	660	5738	7008	5906	3934	62	15654	24	1	-	2	12	181
M. st. Warszawa	10	2	38	45	-	2	15	2	461	4	16	525	430	640	440	6	45	1	-	-	-	-	-	4
Warszawskie	29	1	8	83	-	-	6	-	432	2	25	244	312	321	211	3	296	2	-	-	-	-	-	14
Bydgoskie	14	4	21	63	2	2	6	20	440	3	14	460	534	501	161	2	426	-	-	-	-	2	-	10
M. Poznań	3	-	9	23	-	3	1	-	223	3	6	133	130	183	87	-	90	-	-	-	-	-	-	3
Poznańskie	18	-	21	26	1	14	6	8	780	3	25	305	578	304	105	3	420	-	-	-	-	-	-	12
M. Łódź	3	-	20	106	-	-	46	16	287	4	17	481	116	129	94	-	8736	2	-	-	-	-	1	18
Łódzkie	12	-	13	37	-	-	5	-	541	1	55	180	211	105	85	1	262	1	-	-	-	-	-	6
Kieleckie	32	1	3	73	-	-	1	1	305	4	77	195	197	157	173	4	267	-	-	-	-	-	-	4
Lubelskie	7	1	7	2	-	-	5	21	338	2	41	79	78	148	45	2	105	3	-	-	-	-	-	4
Białostockie	15	1	36	70	-	2	-	5	229	1	10	99	25	129	49	4	80	2	-	-	-	-	-	5
Olsztyńskie	4	1	20	44	-	-	3	-	223	3	2	224	85	218	83	8	143	4	-	-	1	-	-	2
Gdańskie	13	-	47	189	-	1	34	-	453	3	7	479	465	459	396	1	606	3	-	-	-	-	-	10
Koszalińskie	7	2	12	75	-	-	1	-	224	-	13	111	249	111	116	8	153	-	-	-	-	-	1	5
Szczecińskie	3	-	19	27	-	-	8	-	215	1	14	147	290	323	96	4	79	1	-	-	1	1	-	7
Zielonogórskie	5	-	15	44	-	-	-	-	298	3	11	138	492	267	104	1	255	2	-	-	-	-	-	1
M. Wrocław	1	-	7	67	-	-	6	-	253	1	6	124	607	139	130	-	109	-	-	-	-	-	-	13
Wrocławskie	11	1	27	56	1	1	7	8	675	2	112	365	691	320	409	5	420	2	1	-	-	-	1	19
Opolskie	4	-	4	27	1	-	67	-	390	1	32	138	278	156	88	5	386	-	-	-	-	-	-	5
Katowickie	7	4	24	122	2	1	30	-	1284	6	116	864	729	936	723	-	2057	1	-	-	-	-	-	28
M. Kraków	2	-	12	7	-	-	6	-	140	-	13	143	119	120	164	-	443	-	-	-	-	-	-	2
Krakowskie	18	1	7	12	-	1	2	-	570	1	30	189	86	155	74	2	103	-	-	-	-	3	-	6
Rzeszowskie	24	-	1	27	-	-	-	-	287	1	18	115	306	85	101	7	173	-	-	-	-	3	-	3

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓR (HOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040		041		045		080	
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	13,3	9,8	1,2	0,8	11,6	15,1	6,2	2,0
M. st. Warszawa	9,7	10,8	1,1	2,2	26,0	41,1	14,1	4,3
Warszawskie	24,9	14,7	0,5	0,5	7,1	4,1	12,2	1,0
Bydgoskie	12,6	9,8	1,4	2,8	14,0	14,7	6,3	2,1
M. Poznań	3,0	9,0	—	—	30,0	27,0	6,0	9,0
Poznańskie	10,7	10,7	1,2	—	12,4	12,4	7,1	1,8
M. Łódź	30,4	5,1	—	—	37,2	33,8	—	6,8
Łódzkie	11,6	8,7	2,2	—	5,1	9,4	1,4	0,7
Kieleckie	18,1	20,6	3,9	0,6	—	1,9	3,9	2,6
Lubelskie	15,8	4,6	0,6	0,6	3,3	4,6	7,9	1,3
Białostockie	16,2	16,2	3,2	1,1	14,0	38,8	2,1	1,1
Olsztyńskie	15,0	5,4	2,7	1,3	39,5	27,2	12,2	4,1
Gdańskie	12,9	12,9	1,0	—	30,9	46,8	3,0	3,0
Koszalińskie	22,7	12,2	—	3,5	19,2	20,9	8,7	—
Szczecińskie	21,1	4,9	3,2	—	34,1	30,9	8,1	1,6
Zielonogórskie	—	7,8	—	—	10,9	23,5	10,9	4,7
M. Wrocław	11,5	2,9	—	—	5,7	20,1	2,9	2,9
Wrocławskie	17,1	7,5	—	0,7	6,8	18,5	8,2	1,4
Opolskie	5,2	5,2	—	—	4,0	5,2	13,0	1,3
Katowickie	5,6	2,6	0,7	1,5	4,8	8,9	1,8	2,2
M. Kraków	—	5,1	5,1	—	38,3	30,6	5,1	—
Krakowskie	13,3	10,4	0,6	0,6	4,1	4,1	5,8	0,6
Rzeszowskie	8,7	17,5	—	—	1,4	0,7	2,2	0,7

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
44,2	26,8	237,3	233,0	329,3	239,8	288,6	367,3
34,6	17,3	607,1	568,1	875,5	692,6	332,2	498,9
32,0	12,7	89,4	123,9	151,3	163,0	210,8	219,4
16,2	9,8	193,5	322,5	361,8	351,3	435,4	308,5
27,0	18,0	612,7	399,5	627,7	549,6	465,5	669,8
23,1	14,8	254,3	180,8	267,4	180,2	264,4	462,5
82,9	28,7	678,3	813,6	438,1	218,2	382,3	485,5
43,4	39,8	94,8	130,3	218,7	76,0	256,3	391,7
75,5	49,7	91,7	125,9	284,7	101,3	185,9	196,9
37,5	27,0	45,4	52,0	165,2	97,1	277,1	222,4
29,1	10,8	179,0	106,7	169,3	139,1	134,8	246,9
17,7	2,7	175,8	305,2	174,4	297,1	268,1	303,9
12,0	7,0	405,7	477,5	790,5	457,6	315,0	451,6
26,3	22,7	195,4	193,6	347,1	193,6	259,9	390,7
69,9	22,8	248,8	239,0	640,7	525,3	274,8	349,6
32,9	17,2	140,9	216,1	482,2	418,0	322,5	466,6
97,6	17,2	399,2	356,1	861,5	399,2	603,0	726,5
134,2	76,7	295,0	249,8	305,3	219,0	390,2	462,0
46,9	41,7	264,7	179,9	199,5	203,4	388,6	508,5
52,6	43,0	377,8	320,4	391,2	347,1	359,3	476,1
53,6	33,2	518,5	365,2	748,3	306,5	237,5	357,6
27,3	17,4	190,5	109,8	97,6	90,0	219,5	331,0
23,3	13,1	55,4	83,8	132,7	62,0	142,1	209,2

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Styczeń 1960 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Styczeń 1960	Styczeń 1959	Mediana 1956-1959
Dur brzuszny — 040	242	329	381
Dury rzekome ABC — 041	19	29	25
Czerwonka — 045	371	287	323
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.225	1.425	1.506
Botulismus — 049	7	4	5
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	27	9	18
	inne — 049	255	162
Włośnica — 128	81	101	68
Zakaźne zap. wątr. — 092	9.048	7.108	2.891
Porażenie dziec. nagm. 080	49	154	82
Błonica — 055	660	1.088	1.494
Płonica — 050	5.738	5.844	4.584
Odra — 085	7.008	13.646	9.652
Krztusiec — 056	5.906	8.113	6.767
Zap. przyusz. nagm. — 089	3.934	6.979	3.102
Zap. opon mózg. rdzen. nagm. 057	62	82	91
Grypa 480 — 483	15.654	18.787	15.603
Dur wysypkowy 100 — 102	24	23	32
Zimnica 110 — 117	1	—	3
Wścieklizna — 094	—	—	—
Choroba Banga — 044	2	4	7
Tężec — 061	12	18	12
Róża — 052	181	168	183

Druk PIR „Reklama“ zam. 116 nakł. 260 C-37

Złecenie Ministerstwa Zdrowia — Departament Sanitarno - Epidemiologiczny
PZWL 1960 (Symbol 54 ME 19)

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15
TELEFON: 313-441 w. 294

1 egz do Kulis



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

LUTY 1960

EGZ. NR 108

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w lutym 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z lutym 1959 r. utrzymuje się na jednakowym poziomie 11,6—II/1959 do 11,5—II/1960. Wzrost zapadalności notujemy w m.st. Warszawie, woj. Kieleckim, Lubelskim, Koszalińskim i Katowickim.

W porównaniu ze styczniem 1960 r. wskaźnik wzrósł z 9,8—I/1960 do 11,5—II/1960. W miesiącu sprawozdawczym na terenie woj. Kieleckiego pow. Szydłowiec zanotowano ognisko epidemiczne, które objęło 42 zachorowania. W toku dochodzenia epidemiologicznego wykryto nosicielkę o zgodnym typie fagowym (F4) z przypadkami zachorowań głównie u dzieci w pierwszym rzucie. W m.st. Warszawie notujemy nasilenie zachorowań w dzielnicy Wawer, które objęło 17 przypadków. W toku dochodzenia wykryto nosicielkę ekspedientkę sklepową o typie fagowym E 1a, której ujawnienie pozwoliło na ustalenie źródła zachorowań w 71 przypadkach duru brzuszno-powięzanych z poprzednim miejscem jej pracy.

2. Dury rzekome

W lutym zanotowano 14 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wskaźnik zapadalności wzrósł z 12,7—II/1959 do 15,6—II/1960. Znaczny wzrost wskaźnika zanotowano w woj. Białostockim, Katowickim i m. Krakowie. W porównaniu ze styczniem 1960 nie notujemy różnic w zapadalności krajowej.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W lutym 1960 r. zanotowano 31 zachorowań. Liczba zachorowań według grup wieku w tym miesiącu przedstawiała się następująco:

Wiek	L. zach.	%
0 — 5	25	80,6
5 — 10	1	3,2
powyżej 10	5	16,2
Razem	31	100

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zapadalność obniżyła się z 2,4—II/1959 do 1,2—II/1960. Województwo Krakowskie, Poznańskie, Białostockie, m. Kraków i m. Poznań wykazują wzrost wskaźnika zapadalności. W lutym nie zanotowano zachorowań w m. Łodzi, w m. Wrocławiu, Łódzkiem, Kieleckim i Koszalińskim.

5. Zatrucia pokarmowe

W lutym zanotowano 3 ogniska zatruc pokarmowych.

- 1) Opole – Jankowice – 60 zachorowań po spożyciu gulaszu – wyhodowano gronkowce Enterotoksyczne.
- 2) Woj. Katowickie – 15 zachorowań po spożyciu obiadu w stołówce.
- 3) Woj. Wrocławskie – 27 zachorowań w internacie.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W dalszym ciągu notujemy wzrost wskaźnika zapadalności z 245,8–II/1959 do 328,7–II/1960. Wszystkie województwa wykazują wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z lutym 1959 r. z wyjątkiem Bydgoskiego, Lubelskiego i m. Wrocławia.

W porównaniu ze styczniem 1960 r. zapadalność obniżyła się z 367,1–I/1960 do 328,7–II/1960. Z ogólnej liczby zachorowań (8097) hospitalizowano 77,1%.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notujemy w dalszym ciągu spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r.ub., jak również ze styczniem 1960 r.: luty 1959–39,5; styczeń 1960–26,8; luty 1960–25,6. Z wyjątkiem woj. Koszalińskiego wszystkie województwa notują obniżenie wskaźnika zapadalności.

2. Płonica

Obserwujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do lutego 1959 r. (207,8–II/1959 – 214,1–II/1960). Najwyższe wskaźniki wykazują: m. Łódź–742,6; m.st. Warszawa – 596,3.

3. Krztusiec

Zapadalność wzrosła z 244,6–II/1959 do 252,7–II/1960). Na terenie 13 województw notuje się wzrost zapadalności.

UWAGA: W biuletynie styczniowym 1960 należy wnieść poprawkę skreślając w tabeli „zachorowania na choroby zakaźne” 4 przypadki choroby Heinego-Medina w woj. Kieleckim, które należy umieścić w rubryce zapalenie opon mózgowo rdzeniowych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziecięce, nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyszyszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nagminne Meningitis epidemica	Grupa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Bągla Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061
POLSKA 1959	284	16	314	1101	10	22	226	77	6054	60	973	5098	13671	6025	7049	95	468903	33	1	-	1	7	173
POLSKA 1960	283	14	384	1027	19	3	169	213	8097	31	630	5274	6910	6224	5719	63	25061	36	1	-	3	8	152
M. st. Warszawa	23	-	34	45	-	-	11	2	350	1	13	551	384	545	530	4	128	2	-	-	-	-	8
Warszawskie	31	-	17	62	-	-	5	14	429	4	36	252	306	313	204	-	368	2	-	-	-	-	5
Bydgoskie	13	-	27	40	7	-	5	7	406	1	6	391	559	583	194	4	758	-	-	-	-	-	13
M. Poznań	1	-	3	22	-	-	1	-	152	1	2	92	226	255	131	2	362	-	-	-	-	-	4
Poznańskie	3	2	15	31	6	-	15	-	696	2	25	243	444	345	206	9	1480	10	-	-	-	1	3
M. Łódź	8	-	23	85	1	-	60	10	294	-	28	439	141	159	153	-	10023	-	-	-	-	1	25
Łódzkie	9	-	14	50	-	2	3	4	469	-	37	169	234	151	224	3	800	1	1	-	-	1	7
Kieleckie	65	2	2	43	-	-	2	11	307	-	65	153	121	183	242	8	684	1	-	-	-	-	6
Lubelskie	26	-	8	6	-	-	6	8	272	2	44	69	87	105	68	3	181	5	-	-	-	-	1
Białostockie	4	1	33	40	1	1	-	5	200	1	12	66	233	140	54	1	139	4	-	-	-	1	4
Olsztyńskie	12	1	28	43	-	-	1	-	239	2	3	233	63	221	138	2	252	2	-	-	-	-	4
Gdańskie	17	1	45	142	-	-	34	139	403	1	10	349	676	662	672	1	972	4	-	-	-	-	7
Koszalińskie	7	-	8	39	-	-	-	-	188	-	17	94	173	183	134	-	168	-	-	-	-	-	3
Szczecińskie	4	-	23	30	-	-	4	-	225	1	15	164	300	254	163	-	254	-	-	-	2	-	-
Zielonogórskie	5	-	21	74	-	-	1	-	235	2	12	148	487	349	177	1	578	3	-	-	1	-	6
M. Wrocław	-	-	-	41	1	-	1	-	155	-	5	115	357	133	152	2	458	-	-	-	-	-	9
Wrocławskie	7	2	22	63	-	-	8	13	625	1	98	429	528	287	709	6	654	-	-	-	-	-	14
Opolskie	3	-	2	38	3	-	-	-	355	1	35	155	223	159	124	1	807	-	-	-	-	1	5
Katowickie	20	1	29	90	-	-	9	-	1170	4	98	773	832	793	846	3	4289	1	-	-	-	1	15
M. Kraków	3	-	16	12	-	-	2	-	137	1	10	132	137	148	282	2	1332	-	-	-	-	-	5
Krakowskie	12	-	14	16	-	-	-	-	535	5	29	151	70	146	145	8	139	1	-	-	-	1	6
Rzeszowskie	10	4	-	15	-	-	1	-	255	1	30	106	329	110	171	3	235	-	-	-	-	1	2

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	11,6	11,5	0,6	0,6	12,7	15,6	2,4	1,2
M. st. Warszawa	11,9	24,9	1,1	—	34,6	36,8	4,3	1,1
Warszawskie	19,3	15,7	0,5	—	6,1	8,6	2,5	2,0
Bydgoskie	15,4	9,1	—	—	12,6	18,9	2,8	0,7
M. Poznań	3,0	3,0	—	—	15,0	9,0	—	3,0
Poznańskie	7,7	1,8	—	1,2	14,2	8,9	0,6	1,2
M. Łódź	15,2	13,5	1,7	—	45,7	38,9	1,7	—
Łódzkie	10,9	6,5	—	—	13,0	10,1	2,2	—
Kieleckie	21,3	41,9	1,3	1,3	0,6	1,3	2,9	—
Lubelskie	5,3	17,1	—	—	3,9	5,3	4,6	1,3
Białostockie	15,1	4,3	—	1,1	16,2	35,6	—	1,1
Olsztyńskie	25,9	16,3	2,7	1,4	35,4	38,1	5,4	2,7
Gdańskie	23,9	16,9	—	1,0	37,9	44,9	2,0	1,0
Koszalińskie	8,7	12,2	—	—	17,4	13,9	1,7	—
Szczecińskie	4,9	6,5	1,6	—	24,4	37,4	6,5	1,6
Zielonogórskie	7,8	7,8	—	—	17,2	32,9	3,1	3,1
M. Wrocław	20,1	—	2,9	—	8,6	—	2,9	—
Wrocławskie	13,0	4,8	1,4	1,4	8,9	15,0	3,4	0,7
Opolskie	5,2	3,9	—	—	2,6	2,6	6,5	1,3
Katowickie	3,3	7,4	0,4	0,4	5,6	10,7	1,1	1,5
M. Kraków	10,2	7,7	—	—	17,9	40,9	—	2,5
Krakowskie	5,8	7,0	1,7	—	8,7	8,1	1,7	2,9
Rzeszowskie	8,7	7,3	0,7	2,9	0,7	—	0,7	0,7

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Luty 1959-1960 r.

HOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
39,5	25,6	207,8	214,1	244,6	252,7	245,8	328,7
21,6	14,1	648,2	596,3	585,5	589,8	304,1	378,8
27,4	18,3	99,5	128,0	112,2	159,0	202,6	217,9
11,2	4,2	225,1	274,2	302,2	408,8	340,1	284,7
12,0	6,0	468,6	276,3	516,6	765,9	396,5	456,5
26,1	14,8	187,3	144,1	202,8	204,5	222,9	412,6
104,9	47,4	527,8	742,6	395,8	269,0	279,1	497,3
42,0	26,8	76,0	122,4	186,1	109,3	231,0	339,6
70,3	41,9	69,1	98,8	213,0	118,1	168,5	198,2
51,3	28,9	36,2	45,4	173,7	69,1	208,6	179,0
33,4	12,9	181,1	71,2	181,1	150,9	152,0	215,6
13,6	4,1	104,9	317,5	166,4	301,1	233,0	325,7
15,9	10,0	385,8	347,9	525,4	659,9	308,0	401,7
12,2	29,6	230,2	164,0	322,7	319,2	219,8	327,9
30,9	24,4	229,3	266,7	403,3	413,0	247,2	365,9
26,1	18,8	145,6	231,7	346,0	546,4	248,9	367,9
20,1	14,3	393,4	330,2	525,5	381,9	473,8	445,1
98,6	67,1	250,5	293,6	241,6	196,4	297,7	427,8
50,8	45,6	220,3	202,1	135,6	207,3	310,3	462,9
48,6	36,3	301,1	286,6	271,8	294,0	320,7	433,8
33,2	25,5	411,2	337,1	401,0	378,0	229,9	349,9
29,6	16,8	137,6	87,7	52,3	84,8	178,3	310,7
31,3	21,9	51,0	77,3	102,8	80,2	117,4	185,9

Luty 1960 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Luty 1960	Luty 1959	Mediana 1956-1959	Zestawienie kumulacyjne I-II.1960	Zestawienie kumulacyjne I-II.1959
Dur brzuszny — 040	283	284	347	525	613
Dury rzekome ABC — 041	14	16	28	33	45
Czerwonka — 045	384	314	407	755	601
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.027	1.101	1.346	2.252	2.526
Botulismus — 049	19	10	7	26	14
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042 inne — 049	3	22	20	30	31
	169	226	207	424	388
Włośnica — 128	213	77	81	294	178
Zakaźne zap. wątr. — 092	8.097	6.054	2.540	17.145	13.162
Porażenie dziec. nagm. 080	31	60	65	80	214
Błonica — 055	630	973	1.400	1.290	2.061
Płonica — 050	5.274	5.098	4.326	11.012	10.942
Odra — 085	6.910	13.671	9.944	13 918	27.317
Krzusiec — 056	6.224	6.025	5.195	12.130	14.138
Zap. przyusz. nagm. — 089	5.719	7.049	4.188	9.653	14.028
Zap. opon mózg. rdzen. nagm. 057	63	95	109	125	177
Grypa 480 — 483	25.061	468.903	14.959	40.715	487.690
Dur wysypkowy 100 — 102	36	33	32	60	56
Zimnica 110 — 117	1	1	3	2	1
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—
Choroba Banga — 044	3	1	4	5	5
Tęzec — 061	8	7	10	20	25
Róża — 052	152	173	164	333	341

Druk PUR „Reklama” zam. 193 nakł. 260 C-31

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia — Departament Sanitarno - Epidemiologiczny
PZWL 1960 (Symbol 54 ME 19)

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15
TELEFON: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

MARZEC 1960

EGZ. NR

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w marcu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności wzrósł z 9,5 — III/1959 do 11,9 — III/1960. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ubiegłego wykazują następujące województwa:

Województwo	III. 1959	III. 1960
M. st. Warszawa	15,1	32,4
Kieleckie	16,1	43,9
Szczecińskie	1,6	17,9
Białostockie	6,5	11,9
Zielonogórskie	6,3	12,5
Opolskie	6,5	18,2
Polska	9,5	11,9

Wzrost wskaźnika zapadalności był spowodowany kilkoma ogniskami o nasileniu epidemicznym. Na terenie woj. Kieleckiego pow. Szydłowiec zanotowano dalsze 44 zachorowania. W woj. Szczecińskim pow. Wolin — 10 zachorowań i w m. st. Warszawie — dzielnica Wawer — 17 zachorowań. W toku dochodzenia wykryto nosicielkę w sklepie spożywczym, która była przyczyną szeregu zachorowań również i w ubiegłym miesiącu.

W porównaniu z lutym br. wskaźnik zapadalności utrzymuje się na tym samym poziomie (11,5—II/1960; 11,9 — III/1960).

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 13 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 14,4 — III/1959 do 20,5 — III/1960. W województwach: Łódzkim, Kieleckim i m. Wrocławiu notujemy obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

W stosunku do lutego 1960 r. wskaźnik wzrósł z 15,6 — II/1960 do 20,5 — III/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W marcu zanotowano 41 zachorowań. W woj. Opolskim w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności wzrósł z 1,3 — III/1959 do 13,0 — III/1960.

Liczba zachorowań według grup wieku w miesiącu sprawozdawczym przedstawiała się następująco:

Wiek	l. zach.	%
0— 5 lat	30	73,1
6—10	4	9,8
pow. 11 „	7	17,1
R a z e m	41	100,0

W porównaniu z marcem 1959 wskaźnik zapadalności obniżył się z 2,3 do 1,7.

W następujących województwach notowano zapadalność wyższą od zapadalności krajowej: Katowickie — 2,6; Warszawskie — 2,5; Bydgoskie — 2,1; Lubelskie — 2,0; m. Łódź — 3,4; m. Poznań — 3,0; m. Wrocław — 2,9. Nie zanotowano zachorowań w województwach: Łódzkim, Kieleckim, Gdańskim, Koszalińskim, Szczecińskim, Wrocławskim i m. Krakowie.

5. Zatrucia pokarmowe

W okresie sprawozdawczym zanotowano 7 ognisk zatruc pokarmowych o łącznej liczbie 146 zachorowań. W większości przypadków zachorowania wystąpiły po spożyciu przetworów mięsnych (5 ognisk).

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. liczba zachorowań zwiększyła się o 2703 przypadki, co wyraża się wzrostem wskaźnika zapadalności ze 185,0 do 294,7. Wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego (176,4 — III/1959; — 168,5 — III/1960) notują wzrost wskaźnika zapadalności. Z ogólnej liczby zarejestrowanych zachorowań hospitalizowano 83,4% chorych.

W porównaniu z lutym 1960 wskaźnik obniżył się z 328,7 — II/1960 do 294,7 — III/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W dalszym ciągu notujemy spadek zapadalności z 41,4 — III/1959 do 29,3 — III/1960. Wskaźnik zapadalności obniżył się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania. W porównaniu z miesiącem lutym br. zapadalność krajowa wzrosła z 25,6 do 29,3.

2. Płonica

Notujemy wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub., jak również z lutym br. (marzec 1959 — 189,8; luty 1960 — 214,1; marzec 1960 — 234,3). Najwyższą zapadalność zanotowały: m. Łódź, m. Warszawa, m. Poznań, m. Kraków i Olsztyńskie.

3. Krztusiec

Zapadalność wzrosła z 204,6 — III/1959 do 268,6 — III/1960. Wszystkie województwa z wyjątkiem Łódzkiego, Kieleckiego i Lubelskiego notują wzrost wskaźnika. W miesiącu marcu notujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z lutym 1960 (252,7 — II/1960, 268,6 — III/1960).

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziecięc. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	
	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
POLSKA	1959	8	355	1193	10	18	137	38	4556	57	
	1960	294	13	506	1373	16	6	205	171	7259	41
M. st. Warszawa	30	4	56	73	—	—	11	1	281	1	
Warszawskie	28	—	21	76	—	—	6	16	394	5	
Bydgoskie	16	1	31	81	4	—	9	—	395	3	
M. Poznań	—	—	18	31	—	—	1	1	146	1	
Poznańskie	3	1	24	51	8	3	7	—	585	1	
M. Łódź	4	—	17	117	—	—	41	4	222	2	
Łódzkie	14	—	9	49	—	—	5	—	394	—	
Kieleckie	68	—	2	84	—	—	7	1	248	—	
Lubelskie	12	1	13	8	1	—	8	2	256	3	
Białostockie	11	2	36	58	—	2	—	1	209	1	
Olsztyńskie	11	—	34	42	—	—	2	—	202	1	
Gdańskie	15	1	62	188	—	—	26	—	454	—	
Koszalińskie	5	—	11	73	—	—	—	—	235	—	
Szczecińskie	11	—	30	41	—	1	16	—	217	—	
Zielonogórskie	8	—	20	59	—	—	4	—	199	1	
M. Wrocław	—	1	5	50	1	—	5	—	142	1	
Wrocławskie	15	—	37	85	—	—	11	—	536	—	
Opolskie	14	—	6	37	—	—	30	—	360	10	
Katowickie	7	—	40	123	2	—	3	145	1021	7	
M. Kraków	2	—	21	—	—	—	4	—	98	—	
Krakowskie	10	—	13	26	—	—	1	—	408	3	
Rzeszowskie	10	2	—	21	—	—	8	—	257	1	

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Łonica-Scarlatina	Odża-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózgz. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
1020	4503	11823	5039	5638	106	1163810	16	3	—	7	6	136
723	5772	8125	6616	8100	78	30541	22	—	—	4	11	155
16	632	577	593	700	5	102	3	—	—	1	—	10
38	264	268	357	332	2	395	1	—	—	—	—	12
11	378	382	625	215	1	1669	—	—	—	1	—	16
9	146	401	267	163	—	567	—	—	—	—	—	3
14	227	562	374	252	5	5587	—	—	—	1	—	9
21	423	262	262	312	—	9826	—	—	—	—	—	7
48	244	143	135	224	4	1060	—	—	—	—	—	8
95	158	152	131	279	9	665	—	—	—	—	1	4
39	72	80	136	192	3	302	10	—	—	—	—	3
18	76	220	187	41	1	165	3	—	—	—	2	7
1	277	66	186	194	2	229	1	—	—	—	—	2
4	326	705	714	1034	2	1137	1	—	—	—	2	7
13	134	250	155	227	1	392	—	—	—	—	—	7
18	192	404	242	192	2	293	—	—	—	—	—	3
10	119	531	275	182	1	2157	1	—	—	—	—	3
4	123	280	179	198	—	307	—	—	—	—	—	8
100	458	614	281	895	14	1124	—	—	—	1	1	12
42	156	316	124	204	10	567	—	—	—	—	1	6
137	907	1290	907	1448	8	2316	1	—	—	—	—	20
14	150	157	175	430	1	1359	—	—	—	—	—	5
49	198	149	122	227	5	88	—	—	—	—	3	2
22	112	316	189	159	2	234	1	—	—	—	1	1

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterier acuta	
	040		041		045		080	
	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
NR nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040		041		045		080	
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	9,5	11,9	0,3	0,5	14,4	20,5	2,3	1,7
M. st. Warszawa	15,1	32,4	1,1	4,3	30,3	60,6	4,3	1,1
Warszawskie	21,3	14,2	1,0	—	4,1	10,7	5,6	2,5
Bydgoskie	11,9	11,2	—	0,7	8,4	21,7	2,1	2,1
M. Poznań	6,0	—	—	—	9,0	54,1	—	3,0
Poznańskie	7,7	1,8	—	0,6	12,4	14,2	0,6	0,6
M. Łódź	20,3	6,8	—	—	25,4	28,7	—	3,4
Łódzkie	8,0	10,1	—	—	31,1	6,5	2,9	—
Kieleckie	16,1	43,9	—	—	3,2	1,3	3,2	—
Lubelskie	5,9	7,9	—	0,6	3,9	8,5	4,6	2,0
Białostockie	6,5	11,9	2,1	2,1	19,4	38,8	—	1,1
Olsztyńskie	16,3	15,0	—	—	42,2	46,3	1,4	1,4
Gdańskie	13,9	14,9	—	1,0	55,8	61,8	1,0	—
Koszalińskie	3,5	8,7	—	—	10,5	19,2	3,5	—
Szczecińskie	1,6	17,9	1,6	—	16,3	48,8	1,6	—
Zielonogórskie	6,3	12,5	—	—	21,9	31,3	1,6	1,6
M. Wrocław	2,9	—	—	2,9	20,1	14,3	5,7	2,9
Wrocławskie	6,8	10,3	—	—	20,5	25,3	3,4	—
Opolskie	6,5	18,2	—	—	—	7,8	1,3	13,0
Katowickie	6,7	2,6	0,7	—	7,8	14,8	0,4	2,6
M. Kraków	10,2	5,1	—	—	33,2	53,6	—	—
Krakowskie	3,5	5,8	—	—	4,6	7,5	2,9	1,7
Rzeszowskie	4,4	7,3	—	1,4	—	—	1,4	0,7

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
41,4	29,3	182,8	234,3	204,6	268,6	185,0	294,7
19,5	17,3	567,1	683,9	479,4	641,7	216,4	304,1
20,3	19,3	68,0	134,1	83,3	181,3	146,3	200,1
10,5	7,7	188,6	265,0	267,8	438,2	222,3	277,1
21,0	27,0	480,6	438,5	555,7	802,0	306,4	438,5
23,7	8,3	144,1	134,6	186,8	221,7	166,6	346,8
103,2	35,5	500,7	715,5	378,9	443,2	262,2	375,5
34,0	34,7	62,3	176,7	144,1	97,7	135,4	285,3
83,3	61,3	63,9	102,0	222,7	84,6	114,2	160,1
39,5	25,7	52,0	47,4	91,5	89,5	176,4	168,5
28,0	19,4	143,4	81,9	148,8	201,6	83,0	225,3
23,2	1,4	144,5	377,5	128,1	253,5	192,1	275,3
16,9	4,0	312,0	325,0	426,7	711,8	213,3	452,6
27,9	22,7	136,0	233,7	212,8	270,4	218,0	409,9
52,3	29,3	193,5	312,2	362,6	393,5	209,8	352,9
23,5	15,6	173,8	186,3	238,0	430,6	184,7	311,6
43,1	11,5	292,9	353,2	493,9	514,0	373,3	407,8
86,4	68,4	228,6	313,5	165,0	192,3	204,0	366,9
71,7	54,8	191,7	203,4	126,5	161,7	264,7	469,4
67,5	50,6	288,5	336,3	237,7	336,3	260,3	378,6
53,6	35,7	403,5	383,1	278,4	446,9	224,7	250,3
31,9	28,4	116,2	115,0	55,7	70,8	137,6	237,0
18,9	16,0	40,8	81,6	94,8	137,8	86,7	187,3

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Marzec 1960	Marzec 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1959
Dur brzuszny — 040	294	234	289	819	847
Dury rzekome ABC — 041	13	8	30	46	53
Czerwonka — 045	506	355	526	1.261	956
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.373	1.193	1.457	3.625	3.719
Botulismus — 049	16	10	9	42	24
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	6	18	18	36	49
	inne — 049	205	137	207	525
Włośnica — 128	171	38	51	465	216
Zakaźne zap. wątr. — 092	7.259	4.556	2.415	24.404	17.718
Porażenie dziec. nagm. — 080	41	57	50	117	271
Błonica — 055	723	1.020	1.312	2.013	3.081
Płonica — 050	5.772	4.503	4.029	16.784	15.445
Odra — 085	8.125	11.823	8.943	22.043	39.140
Krztusiec — 056	6.616	5.039	4.585	18.746	19.177
Zap. przyusz. nagm. — 089	8.100	5.638	4.351	17.753	19.666
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	78	106	122	207	283
Grypa 480 — 483	30.541	1.163.810	145.591	71.256	1.651.500
Dur wysypkowy 100 — 102	22	16	30	82	72
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill					
Zimnica 110—117	—	3	2	2	4
Wścieklizna 094	—	—	—	—	—
Choroba Banga — 044	4	7	8	8	12
Tężec — 061	11	6	15	31	31
Róża — 052	155	136	166	488	477

CDW Cieszyn 1088/60 260 Wz-15/

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15
TELEFON: 313-441 w. 294

5 11 1960
3016 Epid



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

KWIECIEŃ 1960

EGZ. NR **236**

Sytuacja epidemiologiczna w kwietniu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 8,5 — IV/1959 do 7,3 — IV/1960 r. Zmniejszenie liczby rejestrowanych zachorowań notowano we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Kieleckiego, Szczecińskiego, Zielonogórskiego, Opolskiego i m. Poznania.

Najwyższy wskaźnik zapadalności notowany jest w woj. Kieleckim (23,9 — IV/1960) jako wynik dalszych zachorowań z sygnalizowanego poprzednio ogniska epidemicznego z powiecie Szydłowiec.

W stosunku do marca 1960 r. wskaźnik zapadalności obniżył się z 11,9 — III/1960 do 7,3 — IV/1960.

2. Dury rzekome

W kwietniu zanotowano 12 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z kwietniem 1959 r. notujemy nieznaczny spadek zapadalności (17,3 — IV/1959 do 16,8 — IV/1960). Najwyższe wskaźniki notowano w m. st. Warszawie, m. Krakowie i województwach: Gdańskim, Białostockim i Zielonogórskim. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik zapadalności obniżył się z 20,5 — III/1960 do 16,8 — IV/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W kwietniu zanotowano 38 zachorowań. Liczba zachorowań wg grup wieku w tym miesiącu przedstawiała się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	26	68,4
6—10 „	8	21,1
powyżej 11 „	4	10,5
Razem	38	100,0

W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zapadalność obniżyła się z 1,9 — IV/1959 do 1,5 — IV/1960 r. W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w woj. Poznańskim, Łódzkim, Olsztyńskim, Gdańskim, Koszalińskim, Wrocławskim, m. Poznaniu, m. Wrocławiu i m. Krakowie.

Wyższą zapadalność od zapadalności krajowej zanotowały następujące województwa: m. st. Warszawa — 4,3; m. Łódź — 1,7; Warszawskie — 2,5; Bydgoskie — 2,8; Lubelskie — 2,6; Białostockie — 2,1; Szczecińskie — 3,2; Zielonogórskie — 4,7 i Rzeszowskie — 5,1.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 1,7 — III/1960 do 1,5 — IV/1960.

5. Zatrucia pokarmowe

W kwietniu zanotowano 7 ognisk masowych zatruc pokarmowych. 5 ognisk zanotowano w zakładach służby zdrowia o łącznej liczbie chorych 271. Ogniska były wywołane głównie przez spożycie produktów mięsnych.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Notujemy dalszy wzrost wskaźnika zapadalności (147,7 — IV/1959, 186,9 — IV/1960). Wszystkie województwa z wyjątkiem m. Wrocławia wykazują wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z kwietniem 1959 r. Najwyższe wskaźniki zanotowały: m. st. Warszawa — 214,3; m. Łódź — 236,8; m. Wrocław — 272,8; woj. Gdańskie — 254,2; Szczecińskie — 211,4; Wrocławskie — 228,6; Opolskie — 268,6 i Katowickie — 270,7.

W porównaniu z marcem 1960 r. notujemy sezonowy spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 294,7 — III/1960 do 186,9 — IV/1960 r.

Z ogólnej liczby zachorowań (4604) hospitalizowano 88% chorych.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notujemy w dalszym ciągu spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., jak również w porównaniu z miesiącem poprzedzającym (38,6 — IV/1959; 29,3 — III/1960; 23,1 — IV/1960). W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w woj. Olsztyńskim. W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wszystkie województwa wykazują spadek zapadalności.

2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z kwietniem 1959 r. ze 194,8 — IV/1959 do 152,2 — IV/1960. Wyższą zapadalność od zapadalności krajowej notujemy na terenie 11 województw.

W porównaniu z marcem b. r. wskaźnik obniżył się z 234,3 — III/1960 do 152,2 — IV/1960.

3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności z 229,1 — IV/1959 do 239,0 — IV/1960 r.

W porównaniu z marcem 1960 wskaźnik zapadalności obniżył się z 268,6 — III/1960 do 239,0 — IV/1960.

III. Inne schorzenia

1. Tularemia

Na terenie województwa Szczecińskiego zanotowano w kwietniu 1960 r. trzy ogniska epidemiczne tularemii, które objęły ogółem 9 przypadków. W toku dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że źródłem zakażenia były padłe zające spożyte przez chorych.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	
						Salmonelozy	Inne				
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
POLSKA	1959	209	18	427	1594	7	72	328	365	3639	48
	1960	179	12	415	1229	6	26	252	39	4604	38
M. st. Warszawa	1	2	30	40	—	—	8	1	198	4	
Warszawskie	15	—	19	100	—	—	18	2	271	5	
Bydgoskie	4	3	30	51	3	13	7	5	263	4	
M. Poznań	2	—	6	11	—	—	—	—	89	—	
Poznańskie	1	—	29	52	1	—	7	2	337	—	
M. Łódź	5	—	9	104	—	—	42	2	140	1	
Łódzkie	16	—	13	46	—	9	15	—	243	—	
Kieleckie	37	—	4	87	—	—	2	—	171	2	
Lubelskie	9	1	16	5	—	—	7	16	177	4	
Białostockie	8	—	35	51	—	1	—	—	92	2	
Olsztyńskie	9	1	24	87	—	—	3	—	112	—	
Gdańskie	10	1	42	154	—	—	26	—	255	—	
Koszalińskie	2	—	16	86	—	—	—	—	105	—	
Szczecińskie	6	—	18	31	—	2	11	—	130	2	
Zielonogórskie	7	—	25	34	1	—	14	—	125	3	
M. Wrocław	—	—	10	49	—	1	3	—	95	—	
Wrocławskie	15	—	38	69	—	—	52	—	334	—	
Opolskie	7	—	3	30	—	—	11	—	206	1	
Katowickie	17	4	20	98	—	—	2	11	730	1	
M. Kraków	—	—	18	5	—	—	8	—	66	—	
Krakowskie	4	—	9	16	1	—	10	—	275	2	
Rzeszowskie	4	—	1	23	—	—	6	—	190	7	

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
952	4798	11808	5644	4448	121	211777	20	—	—	3	30	159
568	3749	7133	5886	6110	91	27690	18	1	1	8	15	142
11	428	637	501	563	1	43	2	—	—	—	—	10
24	182	246	297	147	2	423	2	—	—	1	1	4
17	246	493	465	121	7	1166	—	—	—	—	—	7
4	70	372	221	107	—	201	—	—	—	—	—	2
13	178	351	276	108	7	1745	—	—	—	2	—	5
32	243	250	236	210	—	16674	3	1	—	—	—	15
27	147	86	132	163	2	1559	—	—	—	1	—	6
69	108	198	144	270	15	579	2	—	—	—	2	4
29	61	84	115	138	1	102	4	—	—	—	—	15
14	48	74	129	51	3	93	2	—	—	—	—	5
—	157	63	113	127	5	166	—	—	—	—	—	2
5	249	419	728	793	—	543	1	—	—	1	—	8
6	65	102	80	96	2	422	—	—	—	1	—	2
19	112	633	225	192	1	255	—	—	—	—	1	2
9	64	307	277	125	2	964	—	—	—	—	—	3
7	70	165	144	231	2	169	—	—	—	—	—	8
80	340	498	309	534	11	541	1	—	1	—	1	13
24	100	336	107	145	7	285	—	—	—	2	1	4
104	631	1241	811	1333	6	1054	—	—	—	—	—	13
12	80	138	230	361	—	431	—	—	—	—	—	3
37	80	211	107	192	11	77	1	—	—	—	7	5
25	90	229	239	103	6	198	—	—	—	—	2	6

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	8,5	7,3	0,7	0,5	17,3	16,8	1,9	1,5
M. st. Warszawa	10,8	1,1	3,2	2,2	37,9	32,5	3,2	4,3
Warszawskie	10,7	7,6	1,5	—	7,6	9,6	4,6	2,5
Bydgoskie	11,2	2,8	—	2,1	20,3	21,0	3,5	2,8
M. Poznań	—	6,0	—	—	18,0	18,0	—	—
Poznańskie	3,0	0,6	—	—	10,7	17,2	0,6	—
M. Łódź	11,8	8,4	—	—	22,0	15,2	—	1,7
Łódzkie	13,7	11,6	—	—	9,4	9,4	0,7	—
Kieleckie	7,1	23,9	1,3	—	0,6	2,6	1,3	1,3
Lubelskie	5,3	5,9	0,6	0,6	11,8	10,5	2,0	2,6
Białostockie	9,7	8,6	—	—	48,5	37,7	—	2,1
Olsztyńskie	12,3	12,3	—	1,4	54,5	32,7	2,7	—
Gdańskie	12,9	10,0	—	1,0	46,8	41,9	2,0	—
Koszalińskie	3,5	3,5	—	—	22,7	27,9	1,7	—
Szczecińskie	1,6	9,7	—	—	26,0	29,3	8,1	3,2
Zielonogórskie	1,6	10,9	—	—	29,7	39,4	3,1	4,7
M. Wrocław	14,3	—	—	—	5,7	28,7	—	—
Wrocławskie	10,9	10,3	1,4	—	26,7	26,0	1,4	—
Opolskie	6,5	9,1	1,3	—	2,6	3,9	5,2	1,3
Katowickie	8,1	6,3	1,8	1,5	6,7	7,4	0,4	0,4
M. Kraków	2,5	—	—	—	48,5	46,0	5,1	—
Krakowskie	9,3	2,3	—	—	9,3	5,2	—	1,2
Rzeszowskie	8,7	2,9	0,7	—	2,2	0,7	2,2	5,1

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
38,6	23,1	194,8	152,2	229,1	239,0	147,7	186,9
16,2	11,9	496,7	463,2	649,3	542,2	190,5	214,3
28,4	12,2	90,4	92,4	122,4	150,8	109,2	137,6
18,2	11,9	174,6	172,5	323,5	326,0	159,2	184,4
18,0	12,0	453,5	210,2	853,0	663,8	237,3	267,3
16,0	7,7	161,9	105,5	206,3	163,6	138,1	199,8
76,1	54,1	556,5	411,0	385,7	399,2	135,3	236,8
36,2	19,5	50,7	106,4	202,0	95,6	126,7	175,9
54,9	44,5	58,7	69,7	176,9	92,9	91,0	110,4
59,2	19,1	40,1	40,1	124,4	75,7	116,5	116,5
19,4	15,1	130,5	51,7	119,7	139,1	83,0	99,2
19,1	—	166,2	213,9	89,9	154,0	144,4	152,6
11,0	5,0	323,0	248,2	410,7	725,7	214,3	254,2
15,7	10,5	167,4	113,4	235,5	139,5	127,3	183,1
48,8	30,9	263,4	182,1	398,4	365,9	138,2	211,4
20,3	14,1	176,9	100,2	314,7	433,7	131,5	195,7
48,8	20,1	264,2	201,0	338,9	413,5	307,3	272,8
93,1	54,8	253,9	232,7	201,9	211,5	156,7	228,6
56,1	31,3	177,3	130,4	133,0	139,5	245,1	268,6
60,4	38,6	364,9	234,0	255,5	300,7	238,4	270,7
46,0	30,6	401,0	204,3	360,1	587,4	140,5	168,6
27,9	21,5	108,6	46,5	65,6	62,1	99,9	159,7
23,3	18,2	52,5	65,6	81,6	174,2	74,3	138,5

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Kwie- cień 1960	Kwie- cień 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1959
Dur brzuszny — 040	179	209	267	998	1.056
Dury rzekome ABC — 041	12	18	30	58	71
Czerwonka — 045	415	427	517	1.676	1.333
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.229	1.594	1.631	4.854	5.313
Botulismus — 049	6	7	8	48	31
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	26	72	51	62	121
	inne — 049	252	328	223	881
Włośnica — 128	39	365	45	504	581
Zakaźne zap. wątr. — 092	4.604	3.639	2.091	29.008	21.357
Porażenie dziec. nagm. — 080	38	48	49	155	319
Błonica — 055	568	952	1.136	2.581	4.033
Płonica — 050	3.749	4.798	3.724	20.533	20.243
Odra — 085	7.133	11.808	8.252	29.176	50.948
Krzusiec — 056	5.886	5.644	4.458	24.632	24.821
Zap. przyusz. nagm. — 089	6.110	4.448	3.442	23.863	24.114
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	91	121	123	298	404
Grypa 480 — 483	27.690	211,777	92.630	98.946	1.863.277
Dur wysypkowy sporadyczny — 100	18	20	25	100	92
Choroba Brillla — 102					
Zimnica 110—117	1	—	2	3	4
Wścieklizna 094	1	—	—	1	—
Choroba Banga — 044	8	3	5	16	15
Tężec — 061	15	30	20	46	61
Róża — 052	142	159	176	630	636

CDW Cieszyn 1154/60 260 egz. C-23

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294

3323 126 LIT 1960
Kopie
Województwa
Województwa



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

MAJ 1960

EGZ. NR

139

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w maju 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Nie notujemy różnic w zapadalności krajowej w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. (9,1 — V/1959; 9,1 — V/1960). W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w m. Poznaniu i m. Wrocławiu. Znaczne zmniejszenie liczby zachorowań w porównaniu z majem 1959 zanotowano w m. st. Warszawie, woj. Łódzkim, Białostockim i Rzeszowskim.

W stosunku do miesiąca poprzedzającego wskaźnik zapadalności wzrósł z 7,3 — IV/1960 do 9,1 — V/1960.

2. Duży rzekome

W maju zanotowano 21 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z majem 1959 notujemy wzrost wskaźnika zapadalności z 20,7 — V/1959 do 22,9 — V/1960.

Najwyższe wskaźniki zapadalności notowano w m. Krakowie — 61,3; woj. Gdańskim — 61,8 i Bydgoskim — 59,6. W m. Bydgoszczy zanotowano ognisko epidemiczne (58 przypadków) o nie ustalonym źródle zakażenia. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik wzrósł z 16,8 — IV/1960 do 22,9 — V/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W maju zanotowano 26 zachorowań. Liczba zachorowań według grup wieku w tym miesiącu przedstawiała się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	22	84,7
6—10 „	3	11,5
powyżej 11 „	1	3,8
Razem	26	100

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zapadalność obniżyła się z 1,7 — V/1959 do 1,0 — V/1960. W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w m. Poznaniu, m. Krakowie, woj.: Poznańskim, Białostockim, Gdańskim, Szczecińskim, Zielonogórskim, Opolskim i Krakowskim. Najwyższą zapadalność notowano w woj. Wrocławskim — 3,4; Koszalińskim — 3,5 i Kieleckim — 3,2.

W stosunku do kwietnia br. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 1,5 — IV/1960 do 1,0 — V/1960.

5. Zatrucia pokarmowe

W maju zanotowano 11 masowych ognisk zatruc pokarmowych o łącznej liczbie 609 chorych. Ogniska zostały wywołane głównie przez spożycie zakażonych produktów mięsnych oraz lodów

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W dalszym ciągu notujemy wzrost wskaźnika zapadalności ze 121,1 — V/1959 do 190,9 — V/1960.

Wszystkie województwa z wyjątkiem m. st. Warszawy i m. Wrocławia wykazują wzrost zapadalności w porównaniu z majem 1959. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 351,4; m. Wrocławiu — 275,7; woj. Wrocławskim — 274,5; Szczecińskim — 261,8 i Zielonogórskim — 259,9.

W porównaniu z kwietniem 1960 notujemy nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności ze 186,9 — IV/1960 do 190,9 — V/1960.

Z ogólnej liczby zgłoszonych zachorowań (4703) hospitalizowano 90,7% chorych.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 31,8 — V/1959 do 23,7 — V/1960. Wzrost wskaźnika w stosunku do maja 1959 notują:

m. Poznań	24,0	— V/1959	—	33,0	— V/1960
m. Wrocław	17,2	— V/1959	—	23,0	— V/1960
woj. Kieleckie	36,1	— V/1959	—	40,7	— V/1960
woj. Zielonogórskie	7,8	— V/1959	—	10,9	— V/1960

W porównaniu z kwietniem 1960 zapadalność utrzymuje się na tym samym poziomie (23,1 — IV/1960; 23,7 — V/1960).

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z majem 1959 obniżył się ze 190,0 — V/1959 do 156,5 — V/1960. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik utrzymuje się prawie na jednakowym poziomie — 152,2 — IV/1960; 156,5 — V/1960.

3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notujemy wzrost wskaźnika zapadalności z 214,3 — V/1959 do 301,2 — V/1960. W porównaniu z kwietniem 1960 wskaźnik wzrósł z 239,0 — IV/1960 do 301,2 — V/1960. Najwyższy wskaźnik zapadalności wykazuje woj. Gdańskie — 926,1 oraz m. Kraków — 804,5.

III. Inne schorzenia

1. Wścieklizna

W woj. Bydgoskim, pow. Grudziądz zanotowano 1 przypadek wścieklizny u chłopca 14-letniego pokąsanego przez wściekłego lisa.

1. Tularemia

W woj. Szczecińskim, pow. Goleniów zanotowano 5 nowych przypadków tularemii. W dalszym ciągu źródłem zakażenia były padłe zające.

3. Włośnica

W woj. Katowickim, pow. Zabrze w dniach od 13. III. do 7. V. br. zanotowano ognisko włośnicy, które objęło 645 przypadków z tego hospitalizowano 290 osób. Jako przyczynę zatrucia podaje się spożycie kiełbasy surowej.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	
						Salmonelozy	Inne				
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
POLSKA	1959	224	25	509	2.182	24	254	277	34	2.982	41
	1960	225	21	564	1.742	23	95	491	559	4.703	26
	M. st. Warszawa	2	1	38	48	—	1	54	2	160	1
Warszawskie	28	1	23	103	—	3	3	22	296	3	
Bydgoskie	20	—	85	124	4	24	13	3	218	1	
M. Poznań	—	—	5	30	—	1	—	—	117	—	
Poznańskie	15	—	37	50	11	33	7	—	389	—	
M. Łódź	8	—	19	137	—	3	147	—	147	1	
Łódzkie	8	1	18	55	—	2	11	—	262	1	
Kieleckie	19	1	4	102	—	—	3	2	176	5	
Lubelskie	12	7	15	8	—	—	23	4	205	2	
Białostockie	9	—	32	79	—	—	—	10	83	—	
Olsztyńskie	11	—	36	95	—	5	3	—	110	2	
Gdańskie	16	—	62	204	—	9	14	—	232	—	
Koszalińskie	3	—	17	108	—	1	10	—	109	2	
Szczecińskie	5	—	27	37	5	—	49	—	161	—	
Zielonogórskie	7	5	24	67	—	—	2	—	166	—	
M. Wrocław	—	—	7	75	—	1	3	—	96	1	
Wrocławskie	12	1	39	90	3	11	122	1	401	5	
Opolskie	13	1	5	54	—	—	8	—	188	—	
Katowickie	15	1	26	196	—	1	8	515	653	1	
M. Kraków	5	1	24	6	—	—	9	—	71	—	
Krakowskie	12	—	17	31	—	—	2	—	300	—	
Rzeszowskie	5	1	4	43	—	—	—	—	163	1	

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Łonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Bągla Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
784	4679	12295	5278	3055	111	16.050	22	—	—	9	36	145
583	3854	8658	7420	5769	68	18.295	20	1	1	6	25	122
16	303	803	491	499	2	29	3	—	—	—	—	9
27	185	277	456	167	1	409	1	1	—	—	—	3
13	271	521	664	125	3	433	—	—	1	—	1	7
11	54	474	257	125	—	52	—	—	—	—	1	1
14	187	477	368	136	7	553	—	—	—	2	—	5
39	259	455	330	302	—	11.537	—	—	—	—	—	11
33	105	101	261	145	2	1.186	—	—	—	—	1	6
63	132	280	209	190	6	905	3	—	—	—	1	4
44	67	172	127	110	2	72	7	—	—	—	2	6
9	65	106	141	31	3	79	1	—	—	—	1	3
2	141	69	166	165	3	155	—	—	—	—	2	15
9	171	563	929	733	—	289	—	—	—	—	1	13
10	50	131	108	77	3	139	—	—	—	—	—	2
16	111	736	228	129	2	115	—	—	—	2	2	1
7	92	314	381	205	3	226	—	—	—	—	—	—
8	89	144	157	196	1	132	—	—	—	—	1	3
94	380	775	378	502	11	458	1	—	—	2	2	9
24	130	451	167	154	6	220	2	—	—	—	—	2
74	741	1288	904	1186	4	940	1	—	—	—	1	11
16	84	162	315	359	1	121	—	—	—	—	—	5
32	137	173	130	157	2	53	—	—	—	—	4	3
22	100	186	253	76	6	192	1	—	—	—	5	3

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	9,1	9,1	1,0	0,8	20,7	22,9	1,7	1,0
M. st. Warszawa	13,0	2,2	—	1,1	48,7	41,1	3,2	1,1
Warszawskie	13,2	14,2	—	0,5	6,1	11,7	2,0	1,5
Bydgoskie	14,0	14,0	1,4	—	25,9	59,6	—	0,7
M. Poznań	9,0	—	—	—	9,0	15,0	3,0	—
Poznańskie	7,1	8,9	—	—	19,6	21,9	1,2	—
M. Łódź	16,9	13,5	—	—	44,0	32,1	—	1,7
Łódzkie	10,9	5,8	0,7	0,7	18,8	13,1	0,7	0,7
Kieleckie	8,4	12,3	3,9	0,6	0,6	2,6	—	3,2
Lubelskie	3,3	7,9	1,3	4,6	15,1	9,9	3,3	1,3
Białostockie	15,1	9,7	2,1	—	21,6	34,5	1,1	—
Olsztyńskie	16,3	15,0	—	—	65,4	49,0	—	2,7
Gdańskie	14,9	15,9	—	—	67,8	61,8	3,0	—
Koszalińskie	3,5	5,2	—	—	20,9	29,6	—	3,5
Szczecińskie	8,1	8,1	—	—	22,8	43,9	—	—
Zielonogórskie	6,3	10,9	1,3	7,8	100,2	37,6	6,2	—
M. Wrocław	8,6	—	—	—	5,7	20,1	—	2,9
Wrocławskie	9,6	8,2	0,7	0,7	23,9	26,7	2,0	3,4
Opolskie	5,2	16,9	1,3	1,3	3,9	6,5	6,5	—
Katowickie	5,9	5,6	1,1	0,4	5,6	9,6	1,1	0,4
M. Kraków	7,7	12,8	5,1	2,5	38,3	61,3	2,5	—
Krakowskie	5,2	7,0	0,6	—	2,9	9,9	1,2	—
Rzeszowskie	5,1	3,6	—	0,7	1,4	2,9	2,2	0,7

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
31,8	23,7	190,0	156,5	214,3	301,2	121,1	190,9
21,6	17,3	528,1	327,9	446,9	531,4	191,5	173,1
19,8	13,7	84,8	94,0	119,3	321,6	100,0	150,3
11,2	9,1	211,8	190,0	350,6	465,6	136,7	152,9
24,0	33,0	429,5	162,2	892,1	771,9	171,2	351,4
15,4	8,3	144,1	110,9	182,6	218,2	108,5	230,6
71,0	66,0	536,2	438,1	275,7	558,2	177,6	248,7
26,1	23,9	52,1	76,0	126,7	189,0	107,2	189,7
36,1	40,7	51,6	85,2	118,8	134,9	67,1	113,6
36,2	28,9	51,3	44,1	110,6	93,6	93,4	134,9
12,9	9,7	100,3	70,1	160,5	152,0	57,1	89,5
10,9	2,7	155,3	192,1	132,2	226,2	92,7	149,9
12,0	9,0	300,1	170,5	388,8	926,1	132,6	231,3
17,4	17,4	207,6	87,2	251,2	188,4	125,6	190,1
40,6	26,0	161,0	180,5	401,7	370,8	113,8	261,8
7,8	10,9	211,4	144,0	234,8	596,5	150,3	259,9
17,2	23,0	301,5	255,6	324,5	450,8	275,7	275,7
70,5	64,3	241,6	260,1	198,5	258,7	148,3	274,5
39,1	31,3	220,3	169,5	110,8	217,7	146,0	245,1
56,7	27,4	347,1	274,8	274,4	335,2	175,0	242,1
66,4	40,9	357,6	214,5	242,2	804,5	127,7	181,3
31,9	18,6	99,9	79,6	100,5	75,5	91,2	174,2
29,9	16,0	38,6	72,9	89,7	184,4	56,9	118,8

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Maj 1960	Maj 1959	Mediana 1956;1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1959
Dur brzuszny — 040	225	224	290	1.223	1.280
Dury rzekome ABC — 041	21	25	39	79	96
Czerwonka — 045	564	509	727	2.240	1.892
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.742	2.182	2.584	6.596	7.495
Botulismus — 049	23	24	24	71	55
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	95	254	72	157	375
	inne — 049	491	277	262	1.372
Włośnica — 128	559	34	38	1.063	615
Zakaźne zap. wątr. — 092	4.703	2.982	1.927	33.711	24.339
Porażenie dziec. nagm. — 080	26	41	77	181	360
Błonica — 055	583	784	1.080	3.164	4.817
Płonica — 050	3.854	4.679	3.607	24.387	24.922
Odra — 085	8.658	12.295	9.432	37.834	63.243
Krzusiec — 056	7.420	5.278	4.940	32.052	30.099
Zap. przyusz. nagm. — 089	5.769	3.055	2.683	29.632	27.169
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	68	111	139	366	515
Grypa 480 — 483	18.295	16.050	11.323	117.241	1.879.327
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100—102	20	22	26	120	144
Zimnica 110—117	1	—	—	4	4
Wścieklizna 094	1	—	—	2	—
Choroba Banga — 044	6	9	10	22	24
Tężec — 061	25	36	30	71	97
Róża — 052	122	145	164	752	781

CDW Cieszyn 1327/60 260 egz. C-24

Zlecenie Ministestwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

CZERWIEC 1960

EGZ. NR 157

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w czerwcu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z czerwcem 1959 r. notujemy nieznaczny spadek wskaźnika zapadalności z 9,7 — VI/1959 ~~do~~ 9,3 — VI/1960. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w następujących województwach: Krakowskim, Szczecińskim, Opolskim, Rzeszowskim, Katowickim i Bydgoskim. W woj. Krakowskim zanotowano jedno niewielkie ognisko epidemiczne duru brzuszego w osiedlu fabrycznym w Sporyszu, pow. Żywiec. Przyczyną zachorowań były wadliwe urządzenia wodno-kanalizacyjne.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik zapadalności utrzymuje się prawie na jednakowym poziomie (9,1 — V/1960; 9,3 — VI/1960).

2. Dury rzekome

W okresie sprawozdawczym zanotowano 41 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności obniżył się z 27,1 do 26,3. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Wrocławiu — 66,0; m. Krakowie — 61,3; Białostockim — 67,9; Bydgoskim — 64,5; Gdańskim — 58,8 i Olsztyńskim — 55,9.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym b. r. wskaźnik zapadalności wzrósł z 22,9 — V/1960 do 26,3 — VI/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W czerwcu zanotowano 13 zachorowań. Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 2,3 — VI/1959 do 0,5 — VI/1960. Na terenie 7 województw zanotowano sporadyczne przypadki poliomyelitis.

Liczba zachorowań według grup wieku przedstawiała się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	8	61,5
6—10 „	3	23,1
powyżej 11 „	2	15,4
Razem	13	100,0

W porównaniu z miesiącem ubiegłym wskaźnik obniżył się z 1,0 do 0,5.

5. Zatrucia pokarmowe

W czerwcu zanotowano 22 masowe ogniska zatruc pokarmowych o łącznej liczbie 617 chorych. Ogniska zostały wywołane głównie przez spożycie produktów mięsnych i lodów.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł ze 131,3 — VI/1959 do 173,1 — VI/1960. Wszystkie województwa z wyjątkiem m. st. Warszawy i woj. Bydgoskiego notują wzrost wskaźnika w stosunku do analogicznego okresu r. ub.

Najwyższe wskaźniki notowano: w m. Wrocławiu — 258,4; m. Poznaniu — 252,3; m. Łodzi — 213,1 woj. Katowickim — 264,4; Gdańskim — 237,3; Opolskim — 230,8; Koszalińskim — 225,0 i Wrocławskim — 212,2.

W porównaniu z majem 1960 r. notujemy sezonowy spadek wskaźnika krajowego ze 190,9 — V/1960 do 173,1 — VI/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Liczba zachorowań zmniejszyła się o 261 w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. co wyraża się obniżeniem wskaźnika zapadalności z 31,9 — VI/1959 do 21,3 — VI/1960. W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w woj. Zielonogórskim. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z czerwcem 1959 r. zanotowano w woj. Wrocławskim i m. Poznaniu.

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności obniżył z 218,7 — VI/1959 do 136,6 — VI/1960. Znaczny spadek zapadalności zanotowano w województwach: m. st. Warszawie, m. Poznaniu, m. Łodzi, Koszalińskim i Zielonogórskim.

W porównaniu z ub. miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się ze 156,5 — V/1960 do 136,6 — VI/1960.

3. Krztusiec

Wskaźnik zapadalności wzrósł z 231,2 — VI/1959 do 356,3 — VI/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 1198,4; m. Krakowie — 916,9; woj. Gdańskim — 956,0 i Zielonogórskim — 584,0.

Errata

W biuletynie z m. lutego w pozycji dotyczącej woj. Poznańskiego należy skreślić 10 przypadków choroby Brilla w tabeli „Zachorowania na choroby zakaźne”. Ogólna liczba przypadków w tym miesiącu ulegnie zmianie z 36 na 26.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta
						Salmonelozy	Inne			
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080
POLSKA 1959	240	38	668	3.535	18	73	406	80	3.234	57
1960	230	41	647	2.890	47	211	728	582	4.265	13
M. st. Warszawa	4	1	44	160	—	2	9	5	172	1
Warszawskie	28	1	43	250	2	4	46	5	242	1
Bydgoskie	11	—	92	286	11	9	25	—	209	—
M. Poznań	1	—	3	80	—	1	3	5	84	—
Poznańskie	9	2	15	117	15	14	17	557	311	—
M. Łódź	3	—	36	119	—	1	99	—	126	—
Łódzkie	11	9	19	142	—	18	18	—	191	—
Kieleckie	12	3	4	114	—	49	217	1	130	2
Lubelskie	8	5	13	16	—	2	32	4	200	—
Białostockie	6	12	63	173	—	4	—	—	142	—
Olsztyńskie	9	—	41	132	5	1	11	—	101	—
Gdańskie	9	—	59	268	—	10	38	5	238	1
Koszalińskie	3	—	13	143	1	—	—	—	129	—
Szczecińskie	8	—	31	54	2	—	33	—	117	—
Zielonogórskie	3	1	31	102	1	—	4	—	106	—
M. Wrocław	1	—	23	116	—	6	29	—	90	1
Wrocławskie	13	—	30	95	4	9	91	—	310	6
Opolskie	8	—	4	71	4	—	2	—	177	1
Katowickie	17	3	41	306	2	12	49	—	713	—
M. Kraków	6	1	24	29	—	2	3	—	66	—
Krakowskie	46	1	13	61	—	67	2	—	267	—
Rzeszowskie	14	2	5	56	—	—	—	—	144	—

* Liczby bezwzględne

Bionica-Diphtheria	Pionica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózgz. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
785	5388	13252	5696	2573	106	6138	21	—	—	6	41	168
524	3364	7565	8775	4731	85	7537	21	—	—	7	25	141
9	271	767	387	397	9	14	1	—	—	1	—	12
19	207	653	544	148	—	283	2	—	—	2	1	5
17	189	340	987	77	5	121	—	—	—	—	—	11
6	53	569	399	114	—	20	—	—	—	—	—	1
14	162	330	391	97	5	170	—	—	—	2	1	9
16	206	437	332	230	—	5034	—	—	—	—	2	8
37	117	131	254	139	1	134	—	—	—	—	2	10
36	104	348	212	360	9	251	1	—	—	—	5	6
37	86	240	202	111	2	35	7	—	—	—	2	3
13	56	89	174	79	5	35	1	—	—	—	—	4
3	117	57	214	86	6	81	2	—	—	—	1	6
4	185	285	959	394	1	116	1	—	—	—	1	5
8	51	160	231	80	4	33	—	—	—	—	—	3
19	66	358	257	66	1	41	—	—	—	—	1	—
—	47	311	373	178	3	108	—	—	—	1	1	3
7	75	89	152	187	—	55	1	—	—	—	—	4
96	341	546	451	341	9	242	1	—	—	—	—	17
29	108	401	260	131	7	81	—	—	—	—	1	4
81	629	1233	1003	1095	5	606	—	—	—	1	—	10
16	87	150	359	223	1	13	1	—	—	—	—	5
36	132	207	217	107	3	24	1	—	—	—	3	4
21	75	164	417	91	9	40	2	—	—	—	4	11

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dyr brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	9,7	9,3	1,5	1,7	27,1	26,3	2,3	0,5
M. st. Warszawa	20,5	4,3	9,7	1,1	56,3	47,6	2,2	1,1
Warszawskie	14,7	14,2	1,5	0,5	8,1	21,8	1,0	0,5
Bydgoskie	7,0	7,7	—	—	29,4	64,5	—	—
M. Poznań	6,0	3,0	—	—	48,0	9,0	3,0	—
Poznańskie	8,3	5,3	0,6	1,2	14,8	8,9	0,6	—
M. Łódź	22,0	5,1	—	—	52,4	60,9	3,4	—
Łódzkie	9,4	8,0	2,2	6,5	15,9	13,7	1,4	—
Kieleckie	13,5	7,7	3,2	1,9	1,9	2,6	1,9	1,3
Lubelskie	5,3	5,3	0,6	3,3	17,1	8,5	2,0	—
Białostockie	8,6	6,5	7,5	12,9	35,6	67,9	—	—
Olsztyńskie	19,1	12,3	—	—	89,9	55,9	1,4	—
Gdańskie	12,9	9,0	1,1	—	65,8	58,8	6,0	1,1
Koszalińskie	7,0	5,2	—	—	31,4	22,7	—	—
Szczecińskie	1,6	13,0	—	—	78,0	50,4	1,6	—
Zielonogórskie	4,7	4,7	—	1,6	67,3	48,5	10,9	—
M. Wrocław	2,9	2,9	—	—	8,6	66,0	—	2,9
Wrocławskie	16,4	8,9	0,7	—	35,6	20,5	4,1	4,1
Opolskie	6,5	10,4	—	—	7,8	5,2	6,5	1,3
Katowickie	4,4	6,3	1,5	1,1	20,8	15,2	0,7	—
M. Kraków	15,3	15,3	2,5	2,5	71,5	61,3	10,2	—
Krakowskie	4,6	26,7	1,2	0,6	7,5	7,5	4,1	—
Rzeszowskie	8,7	10,2	—	1,4	2,2	3,6	1,4	—

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
31,9	21,3	218,7	136,6	231,2	356,3	131,3	173,1
21,6	9,7	617,9	293,3	560,6	418,8	195,9	186,3
16,8	9,6	96,5	105,1	118,3	276,3	89,4	122,9
16,1	11,9	254,5	132,5	332,4	692,1	152,2	146,5
15,0	18,0	585,7	159,2	708,8	1198,4	165,2	252,3
19,0	8,3	215,2	96,0	184,4	231,8	110,3	184,4
71,0	27,0	565,0	348,5	292,6	561,6	201,3	213,1
33,3	26,8	44,2	84,7	151,3	183,9	102,8	138,3
51,6	23,2	71,0	67,1	154,3	136,8	72,3	83,9
31,6	24,3	57,2	56,6	102,7	132,9	106,6	131,6
22,6	14,0	90,6	60,4	191,9	187,6	50,7	153,1
4,1	4,1	184,0	159,4	126,7	291,6	114,5	137,6
10,0	4,0	285,1	184,4	449,6	956,0	111,6	237,3
29,6	13,5	259,9	88,9	327,9	402,9	143,0	225,0
34,1	30,9	161,0	107,3	491,1	417,9	110,6	190,3
23,5	—	264,6	73,6	277,1	584,0	122,1	166,0
34,5	20,1	341,7	215,4	275,7	436,6	226,9	258,4
60,9	65,7	239,0	233,4	188,4	308,7	166,3	212,2
37,8	37,8	264,7	140,8	135,6	239,0	177,3	230,8
39,7	30,0	374,1	233,2	264,7	371,9	229,9	264,4
53,6	40,9	416,3	222,2	610,4	916,9	81,7	168,6
38,9	20,9	155,1	76,7	92,9	126,0	97,6	155,1
32,1	15,3	59,8	54,7	123,2	304,0	96,2	105,0

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Czerwiec 1960	Czerwiec 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VI/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VI/1959
Dur brzuszny — 040	230	240	319	1.453	1.520
Dury rzekome ABC — 041	41	38	47	120	134
Czerwonka — 045	647	668	750	2.887	2.560
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	2.890	3.535	4.252	9.486	11.030
Botulismus — 049	47	18	33	118	73
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	211	73	114	368	448
	inne — 049	728	406	390	2.100
Włośnica — 128	582	80	25	1.645	695
Zakaźne zap. wątr. — 092	4.265	3.234'	1.707	37.976	27.573
Porażenie dziec. nagm. — 080	13	57	104	194	417
Błonica — 055	524	785	969	3.688	5.602
Płonica — 050	3.364	5.388	3.614	27.751	30.310
Odra — 085	7.565	13.252	9.249	45.399	76.495
Krztusiec — 056	8.775	5.696	5.864	40.827	35.795
Zap. przyusz. nagm. — 089	4.731	2.573	2.227	34.363	29.742
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	85	106	128	451	621
Grypa 480 — 483	7.537	6.138	5.358	124.778	1.885.465
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100—102	21	21	27	131	135
Zimnica 110—117	—	—	4	4	4
Wścieklizna 094	—	—	—	2	—
Choroba Banga — 044	7	6	7	29	30
Teżec — 061	25	41	41	96	138
Róża — 052	141	168	171	893	949

CDW Cieszyn 1416/60 260 Wz 15/486

Zlecenie Ministestwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

LIPIEC 1960

EGZ. NR

67

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna za lipiec 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. D u r b r z u s z n y

W porównaniu z lipcem 1959 r. notujemy spadek zapadalności z 14,4 — VII/1959 do 10,0 — VII/1960. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w województwach: Olsztyńskim, Szczecińskim, Opolskim, Katowickim i Rzeszowskim, w m. Poznaniu i m. Wrocławiu.

Ognisk epidemicznych w miesiącu sprawozdawczym nie notowano. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym notuje się tylko nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności z 9,3 — VI/1960 do 10,0 — VII/1960.

2. D u r y r z e k o m e

W okresie sprawozdawczym zanotowano 95 zachorowań w większości sporadycznych. Niewielkie ogniska obserwowano w woj. Bydgoskim i Łódzkim liczące po kilkanaście przypadków.

3. C z e r w o n k a

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności obniżył się z 27,0 — VII/1959 do 20,5 — VII/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano: w m. Krakowie — 66,4 i m. Waszawie — 42,2 oraz województwach: Szczecińskim — 94,3; Gdańskim — 69,8 i Zielonogórskim — 34,4.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym br. wskaźnik zapadalności obniżył się z 26,3 — VI/1960 do 20,5 — VII/1960.

4. P o r a ż e n i e d z i e c i ę c e n a g m i n n e

W lipcu zanotowano 14 zachorowań. Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem w ub. r. z 5,2 — VII/1959 do 0,6 — VII/1960. Na terenie 13 województw nie zanotowano w ogóle zachorowań na poliomyelitis.

Liczba zachorowań wg grup wieku przedstawiała się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	7	50,0
6—10	3	21,4
powyżej 11 „	4	28,6
Razem	14	100

5. Z a t r u c i a p o k a r m o w e

W okresie sprawozdawczym zanotowano 24 ogniska zatruc pokarmowych, które objęły 691 osób. Mięso i przetwory mięsne spowodowały 14 ognisk, lody — 2, grzyby — 1, ciastka — 1, inne — 6.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W lipcu 1960 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem r. ub. wskaźnik zapadalności nieznacznie się obniżył (158,2 — VII/1959 do 151,1 — VII/1960). Jedynie 9 województw notuje wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. Najwyższą zapadalność notowano w m. Poznaniu — 261,3; m. Łodzi — 194,5; woj. Katowickim — 218,8 i woj. Gdańskim — 198,4.

W porównaniu z czerwcem 1960 r. notujemy spadek wskaźnika zapadalności ze 173,1 — VI/1960 do 151,1 — VII/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notujemy znaczne obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. (27,5 — VII/1959 do 15,5 — VII/1960).

W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w woj. Gdańskim.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu w lipcem 1959 r. zanotowano w woj. Wrocławskim i Koszalińskim.

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z lipcem 1959 r. obniżył się ze 190,5 — VII/1959 do 104,3 — VII/1960.

Obniżenie wskaźnika notowane jest we wszystkich województwach. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wskaźnik obniżył się ze 136,6 — VI/1960 do 104,3 — VII/1960.

3. Krztusiec

Wskaźnik zapadalności wzrósł z 260,8 — VII/1959 do 372,4 — VII/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu 1012,2, m. Łodzi 654,6, m. Krakowie 712,6; woj. Gdańskim 1115,5 i Zielonogórskim 602,8.

ZACHOROWANIA N CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	
	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
POLSKA	1959	355	61	665	6839	16	72	653	375	3896	129
	1960	247	95	505	2974	24	347	732	358	3723	14
M. st. Warszawa	7	7	39	175	—	2	130	2	158	3	
Warszawskie	28	8	29	321	4	7	19	—	207	—	
Bydgoskie	17	21	48	230	9	4	24	—	175	1	
M. Poznań	3	—	3	62	—	3	1	7	78	—	
Poznańskie	10	1	13	96	4	—	21	339	317	—	
M. Łódź	5	11	17	111	—	8	59	1	115	—	
Łódzkie	13	17	13	145	—	7	12	2	204	—	
Kieleckie	17	2	1	171	—	51	34	7	115	1	
Lubelskie	10	—	18	65	—	2	8	—	183	—	
Białostockie	4	2	28	219	—	19	—	—	93	—	
Olsztyńskie	10	—	25	179	—	5	12	—	80	1	
Gdańskie	15	1	70	261	—	43	151	—	199	—	
Koszalińskie	—	—	9	118	1	59	5	—	92	—	
Szczecińskie	4	3	58	56	—	2	53	—	109	—	
Zielonogórskie	2	3	22	104	—	—	12	—	106	2	
M. Wrocław	3	—	7	63	—	—	40	—	69	1	
Wrocławskie	14	—	21	106	1	33	104	—	270	3	
Opolskie	9	1	7	48	1	1	7	—	131	—	
Katowickie	24	8	37	246	4	2	14	—	590	—	
M. Kraków	6	6	26	31	—	—	7	—	54	1	
Krakowskie	15	—	11	90	—	99	7	—	251	—	
Rzeszowskie	31	4	3	77	—	—	12	—	127	1	

* Liczby bezwzględne

Bionica-Diphtheria	Pionica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
677	4692	9004	6423	1829	106	3546	21	1	—	6	57	134
382	2569	5358	9173	2793	65	5727	17	—	—	4	42	107
5	179	491	423	249	11	13	1	—	—	—	—	5
12	130	295	510	88	1	187	3	—	—	—	4	6
5	182	178	699	36	2	46	—	—	—	1	1	9
4	31	196	337	61	—	2	—	—	—	—	—	2
9	141	257	486	91	4	87	—	—	—	1	1	8
13	117	307	387	130	—	4159	1	—	—	—	—	5
28	81	159	380	111	7	73	—	—	—	—	—	3
29	77	322	252	134	1	64	1	—	—	—	4	2
40	54	108	272	45	1	36	1	—	—	—	5	1
7	66	70	125	74	3	20	3	—	—	—	1	8
3	105	84	282	48	2	46	—	—	—	—	1	5
—	185	391	1119	357	2	160	—	—	—	—	1	8
13	68	124	213	69	2	26	—	—	—	—	—	1
7	32	241	303	66	—	37	—	—	—	—	—	1
5	45	191	385	65	1	55	—	—	—	—	2	1
3	55	81	185	76	—	24	1	—	—	—	—	9
87	293	370	511	180	5	105	2	—	—	1	7	10
17	86	247	187	88	4	92	—	—	—	—	—	6
35	388	797	1186	579	3	397	2	—	—	—	1	8
13	42	156	279	119	—	51	—	—	—	—	1	1
30	150	122	220	65	3	17	1	—	—	—	5	4
17	62	171	432	62	13	30	1	—	—	1	8	4

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	14,4	10,0	2,5	3,8	27,0	20,5	5,2	0,6
M. st. Warszawa	15,1	7,6	1,1	7,6	61,7	42,2	15,1	3,2
Warszawskie	25,1	16,0	4,0	4,6	15,4	16,5	9,7	—
Bydgoskie	22,4	11,9	2,1	14,7	27,3	33,6	0,7	0,7
M. Poznań	6,0	9,0	—	—	54,1	9,0	9,0	—
Poznańskie	7,1	5,9	0,6	0,6	26,1	7,7	1,8	—
M. Łódź	22,0	8,4	3,4	18,6	59,2	27,8	—	—
Łódzkie	15,2	9,4	0,7	12,3	21,7	9,4	4,3	—
Kieleckie	18,1	11,0	1,9	1,3	0,6	0,6	1,9	0,6
Lubelskie	13,2	6,6	5,3	—	4,6	11,8	10,5	—
Białostockie	30,2	4,3	8,6	2,1	33,4	30,2	1,1	—
Ólsztyńskie	12,3	13,6	—	—	35,4	34,1	5,4	1,4
Gdańskie	14,9	14,9	1,0	1,0	69,8	69,8	1,0	—
Koszalińskie	19,2	—	—	—	41,9	15,7	—	—
Szczecińskie	4,9	6,5	—	4,9	94,3	94,3	1,6	—
Zielonogórskie	15,6	3,1	1,6	4,7	31,3	34,4	14,1	3,1
M. Wrocław	5,7	8,6	—	—	11,5	20,1	5,7	2,9
Wrocławskie	14,4	9,6	1,4	—	32,2	14,4	2,0	2,0
Opolskie	9,1	11,7	—	1,3	6,5	9,1	2,6	—
Katowickie	7,0	8,9	5,6	3,0	22,2	13,7	5,9	—
M. Kraków	35,7	15,3	2,5	15,3	56,2	66,4	7,7	2,6
Krakowskie	9,3	8,7	0,6	—	20,9	6,4	8,1	—
Rzeszowskie	10,2	22,6	4,4	2,9	2,9	2,2	7,3	0,7

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
27,5	15,5	190,5	104,3	260,8	372,4	158,2	151,1
13,0	5,4	310,6	193,7	493,5	457,8	209,9	171,0
16,0	6,8	109,6	74,2	174,1	291,1	162,1	118,2
14,0	3,5	175,3	127,6	326,7	490,1	177,4	122,7
15,0	12,0	339,4	93,1	669,8	1012,2	261,3	261,3
16,6	5,3	230,6	83,6	215,8	288,1	183,2	187,9
59,2	22,0	341,7	197,9	304,5	654,6	181,0	194,5
26,8	20,3	77,5	58,6	169,4	275,1	131,8	147,7
43,9	18,7	71,0	49,7	162,0	162,7	78,1	74,2
42,8	26,3	36,2	35,5	157,3	179,0	133,6	120,4
9,7	7,5	97,0	71,2	294,3	134,8	67,8	100,3
4,1	4,1	219,4	143,1	160,8	384,3	141,7	109,0
4,0	—	338,9	184,4	567,2	115,5	148,5	198,4
10,5	22,7	160,5	118,6	399,4	371,5	129,1	160,5
35,8	11,4	183,8	52,0	567,5	492,7	208,1	177,2
20,3	7,8	198,8	70,4	238,0	602,8	189,4	166,0
37,3	8,6	221,9	157,9	301,5	531,3	226,9	198,1
51,3	59,5	329,9	200,5	243,0	349,8	221,1	184,8
22,2	22,2	191,7	112,1	198,2	243,8	217,7	170,8
47,1	13,0	338,5	143,9	281,4	439,8	209,9	218,8
38,3	33,2	291,1	107,3	480,1	712,6	120,0	137,9
18,6	17,4	155,1	87,1	146,4	127,8	120,8	145,8
31,3	12,4	46,6	45,2	148,7	314,9	94,0	92,6

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Lipiec 1960 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Lipiec 1960	Lipiec 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VII/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VII/1959
Dur brzuszny — 040	247	355	439	1.700	1.875
Dury rzekome ABC — 041	95	61	102	215	195
Czerwonka — 045	505	665	779	3.392	3.225
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	2.974	6.839	7.063	12.460	17.869
Botulismus — 049	24	16	19	142	89
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy } inne — 049	347	72	238	715	520
	732	653	531	2.832	2.189
Włośnica — 128	358	375	5	2.003	1.070
Zakaźne zap. wątr. — 092	3.723	3.896	1.864	41.699	31.469
Porażenie dziec. nagm. — 080	14	129	244	208	546
Błonica — 055	382	677	1.107	4.070	6.279
Płonica — 050	2.569	4.692	3.553	30.320	35.002
Odra — 085	5.358	9.004	6.705	50.757	85.499
Krztusiec — 056	9.173	6.423	6.527	50.000	42.218
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.793	1.829	1.556	37.156	31.571
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	65	106	130	516	727
Grypa 480 — 483	5.727	3.546	3.296	130.505	1.889.011
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	17	21	33	148	156
Zimnica 110—117	—	1	2	4	5
Wścieklizna 094	—	—	—	2	—
Choroba Banga — 044	4	6	6	33	36
Tężec — 061	42	57	55	138	195
Róża — 052	107	134	161	1.000	1.083

CDW Cieszyn 1631/60 260 egz. Wz-15/560

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN EPIDEMIOLOGICZNY

Sierpień 1960

EGZ. NR

159

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w sierpniu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z sierpniem 1959 r. notujemy spadek zapadalności z 20,6 — VIII/1959 do 15,3 — VIII/1960 r. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w województwach: Łódzkim, Olsztyńskim, Gdańskim, Koszalińskim, Krakowskim i Rzeszowskim.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 10,0 — VII/1960 do 15,3 — VIII/1960 r.

Na terenie woj. Gdańskiego w pow. Starogardzkim zanotowano 35 przypadków duru brzusznoego zlokalizowanych na terenie kilku wsi. Pierwsze przypadki wykryto wśród rodziny pracownika mleczarni we wsi Barłożno.

2. Dury rzekome

W okresie sprawozdawczym zanotowano 60 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności obniżył się z 49,5 — VIII/1959 do 27,4 — VIII/1960.

Obniżenie wskaźnika zapadalności notowano we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Warszawskiego, Bydgoskiego i Katowickiego. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym br. wskaźnik zapadalności wzrósł z 20,5 — VII/1960 do 27,4 — VIII/1960. W miesiącu sprawozdawczym zanotowano ognisko epidemiczne w Dziecięcym Sanatorium Ortopedycznym w woj. Zielonogórskim, pow. Świebodzin. W toku dochodzenia epidemiologicznego u 45 osób wyhodowano szczepię sh. Flexneri. Zakażenie dzieci w sanatorium prawdopodobnie nastąpiło przez nosicielkę, którą była jedna z salowych.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W sierpniu zanotowano 21 zachorowań. Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z 7,7 — VIII/1959 do 0,8 — VIII/1960 r. Na terenie 12 województw nie zanotowano w ogóle zachorowań na poliomyelitis.

Liczba zachorowań wg grup wieku przedstawiała się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	9	42,9
6—10 „	8	38,1
powyżej 11 „	4	19,0
Razem	21	100

5. Zatrucia pokarmowe

W okresie sprawozdawczym zanotowano 12 ognisk zatruc pokarmowych, które objęły 166 osób. Mięso i przetwory mięsne spowodowały 3 ogniska, grzyby — 1, ciastka — 1, inne — 7 ognisk.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W sierpniu 1960 r. wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym miesiącem r. ub. utrzymał się prawie na identycznej wysokości (187,2 — VIII/1959 — 187,8 — VIII/1960). Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym miesiącem r. ub. notujemy na terenie 11 województw o charakterze przeważnie rolniczym.

Najwyższą zapadalność notowano w m. Poznaniu — 309,4; m. Łodzi — 284,2; woj. Kozalińskim — 268,1; Szczecińskim — 261,8; Gdańskim — 250,2 i Katowickim — 261,8.

W porównaniu z lipcem 1960 r. notujemy wzrost wskaźnika zapadalności ze 151,1 — VII/1960 do 187,8 — VIII/1960 r.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notujemy dalsze obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. (26,7 — VIII/1959 do 17,3 — VIII/1960). W miesiącu sprawozdawczym nie zanotowano zachorowań w woj. Olsztyńskim.

W porównaniu z sierpniem 1959 r. wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w m. Poznaniu, woj. Gdańskim, Krakowskim i Rzeszowskim.

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z sierpniem 1959 r. obniżył się ze 168,9 — VIII/1959 do 107,9 — VIII/1960. Obniżenie wskaźnika nastąpiło we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Warszawskiego.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem br. notujemy nieznaczny wzrost wskaźnika (104,3 — VII/1960 do 107,9 — VIII/1960).

3. Krztusiec

Notujemy znaczny wzrost wskaźnika w porównaniu z sierpniem 1959 r. (257,2 — VIII/1959 do 445,9 — VIII/1960). Najwyższe wskaźniki zanotowano: w woj. Gdańskim 1300,9; m. Poznaniu 970,2; m. Krakowie — 827,5. W porównaniu z ubiegłym miesiącem br. również notuje się znaczny wzrost wskaźnika zapadalności (372,4 — VII/1960 — 445,9 — VIII/1960).

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŹNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyszniczy nagminne parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -różen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonelozy	Inne																
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA 1959	507	82	1219	10.814	10	61	1532	3	4610	191	658	4161	3576	6335	1067	113	3494	27	3	—	6	62	153
POLSKA 1960	377	60	674	4.352	11	136	646	24	4627	21	426	2659	2649	10983	1827	104	4873	34	2	—	4	51	127
M. st. Warszawa	16	9	50	215	—	1	35	1	210	3	4	168	188	577	148	16	14	2	—	—	—	—	8
Warszawskie	45	4	31	527	3	—	15	19	268	2	14	130	145	645	73	1	181	3	—	—	—	1	5
Bydgoskie	28	—	76	320	—	4	36	—	231	—	10	165	73	751	29	4	64	1	1	—	—	2	16
M. Poznań	2	—	16	93	—	4	3	1	103	—	7	48	72	323	35	—	5	—	—	—	—	1	1
Poznańskie	12	2	26	129	5	8	64	—	328	—	13	167	193	608	47	1	89	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	15	7	31	260	—	4	110	1	168	—	20	122	167	353	99	—	3350	2	1	—	—	—	18
Łódzkie	32	4	14	167	—	3	26	—	243	—	22	92	56	427	74	5	54	—	—	—	1	5	2
Kieleckie	23	—	3	276	—	7	4	2	114	3	48	55	244	288	69	4	101	4	—	—	—	5	5
Lubelskie	16	7	24	138	—	2	10	—	212	3	30	47	63	374	37	1	55	10	—	—	—	4	4
Białostockie	13	4	22	285	—	38	—	—	128	—	5	46	41	168	33	11	21	—	—	—	—	1	7
Olsztyńskie	29	1	30	231	—	8	37	—	107	—	—	99	49	375	64	4	43	2	—	—	—	1	7
Gdańskie	35	2	64	347	—	44	83	—	251	—	4	233	129	1305	178	2	139	—	—	—	1	—	4
Koszalińskie	12	1	10	149	—	4	11	—	154	—	8	52	53	313	46	3	22	1	—	—	—	1	1
Szczecińskie	2	—	56	69	1	3	136	—	161	—	13	80	132	407	43	1	29	—	—	—	1	3	4
Zielonogórskie	6	3	56	121	—	—	12	—	137	2	6	105	121	415	64	5	64	2	—	—	—	2	4
M. Wrocław	4	1	12	109	—	—	13	—	79	1	3	70	53	206	78	—	25	1	—	—	—	—	1
Wrocławskie	17	1	21	146	—	3	15	—	309	3	79	253	257	701	128	10	133	1	—	—	1	9	15
Opolskie	5	1	3	102	2	—	4	—	155	2	24	104	111	276	52	14	65	1	—	—	—	2	5
Katowickie	24	10	80	401	—	3	6	—	706	1	4	425	351	1314	371	3	329	2	—	—	—	—	10
M. Kraków	2	1	30	20	—	—	14	—	89	—	30	34	55	324	83	—	19	1	—	—	—	1	2
Krakowskie	22	—	15	124	—	—	5	—	297	1	30	130	51	281	45	7	39	1	—	—	—	6	4
Rzeszowskie	17	2	4	123	—	—	7	—	177	—	52	34	45	552	31	12	32	—	—	—	—	7	2

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka. Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	20,6	15,3	3,3	2,4	49,5	27,4	7,7	0,8
M. st. Warszawa	31,4	17,3	4,3	9,7	109,0	54,1	21,6	3,2
Warszawskie	23,4	22,8	2,0	2,0	14,2	15,7	15,7	1,0
Bydgoskie	45,6	19,6	7,0	—	42,1	53,3	5,6	—
M. Poznań	9,0	6,0	—	—	108,1	48,0	6,0	—
Poznańskie	9,5	7,1	0,6	1,2	33,2	15,4	1,2	—
M. Łódź	44,0	25,4	—	11,8	128,6	52,4	8,4	—
Łódzkie	18,1	23,2	0,7	2,9	55,7	10,1	8,0	—
Kieleckie	32,9	14,8	5,2	—	2,6	1,9	3,9	1,9
Lubelskie	11,2	10,5	5,3	4,6	17,1	15,8	11,8	2,0
Białostockie	18,3	14,0	8,6	4,3	73,3	23,7	3,2	—
Olsztyńskie	28,6	39,5	0,4	0,4	96,7	40,9	6,8	—
Gdańskie	27,9	34,9	2,0	2,0	119,6	63,8	6,0	—
Koszalińskie	13,9	20,9	1,7	1,7	48,7	17,4	—	—
Szczecińskie	16,3	3,2	4,9	—	100,8	91,1	1,6	—
Zielonogórskie	15,6	9,4	4,7	4,7	228,6	87,7	9,4	3,1
M. Wrocław	14,3	11,5	2,9	2,9	83,3	34,5	—	2,9
Wrocławskie	24,6	11,6	—	0,7	26,7	14,4	2,7	2,0
Opolskie	10,4	6,5	—	1,3	7,8	3,9	3,9	2,6
Katowickie	16,7	8,9	3,3	3,7	27,4	29,7	6,7	0,4
M. Kraków	25,5	5,1	25,5	2,5	173,7	76,6	15,3	—
Krakowskie	9,9	12,8	3,5	—	16,8	8,7	11,0	0,6
Rzeszowskie	10,2	12,4	1,4	1,4	4,4	2,9	12,4	—

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
26,7	17,3	168,9	107,9	257,2	445,9	187,2	187,8
14,1	4,3	257,6	181,8	417,7	624,4	258,6	227,3
10,1	7,1	60,4	66,0	156,9	327,6	133,4	136,1
11,2	7,0	134,6	115,7	406,7	526,6	194,9	162,0
9,0	21,0	261,3	144,2	474,6	970,2	321,4	309,4
18,4	7,7	169,0	99,0	169,0	360,5	229,4	194,5
49,0	33,8	416,1	206,4	384,0	597,1	299,4	284,2
31,9	15,9	88,3	66,6	145,5	309,2	161,5	175,9
58,7	31,0	83,3	35,5	238,2	185,9	85,2	73,6
24,3	19,7	46,7	30,9	111,2	246,1	116,5	139,5
10,8	5,4	102,4	49,6	235,0	181,1	62,5	138,0
2,7	—	174,4	134,9	258,9	511,0	134,9	145,8
3,0	4,0	232,3	232,3	448,6	1300,9	205,4	250,2
19,2	13,9	139,5	90,7	502,3	546,0	218,0	268,6
37,8	21,1	172,4	130,1	487,9	661,9	294,3	261,8
17,2	9,4	205,1	164,4	277,1	649,8	230,1	214,5
14,3	8,6	218,4	211,0	347,5	591,6	267,1	226,9
67,1	54,1	244,4	173,2	215,6	479,8	274,5	211,5
31,3	31,3	279,0	135,6	217,7	359,9	252,9	202,1
44,5	19,3	336,7	157,4	300,7	487,2	246,2	261,8
46,0	10,2	212,0	86,8	344,8	827,5	143,0	227,3
13,9	17,4	121,4	75,5	174,8	163,2	146,4	172,5
18,9	21,9	37,9	24,8	129,8	402,4	110,1	129,0

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Sierpień 1960	Sierpień 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1959
Dur brzuszny — 040	377	507	507	2.077	2.382
Dury rzekome ABC — 041	60	82	86	275	277
Czerwonka — 045	674	1.219	1.000	4.066	4.444
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	4.352	10.814	8.839	16.812	28.683
Botulismus — 049	11	10	21	153	99
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	136	61	85	851	581
	inne — 049	646	1.532	464	3.478
Włośnica — 128	24	3	8	2.027	1.073
Zakaźne zap. wątr. — 092	4.627	4.610	2.214	46.326	36.079
Porażenie dziec. nagm. — 080	21	191	311	229	737
Błonica — 055	426	658	877	4.496	6.937
Płonica — 050	2.659	4.161	3.799	32.979	39.163
Odra — 085	2.649	3.576	3.275	53.406	89.075
Krzusiec — 056	10.983	6.335	6.386	60.983	48.553
Zap. przyusz. nagm. — 089	1.827	1.067	1.060	38.983	32.638
Zapalenie opon mózgz.-rdzen. nagminne — 057	104	113	136	620	840
Grypa 480 — 483	4.873	3.494	2.937	135.378	1.892.505
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	34	27	27	182	183
Zimnica 110—117	2	3	3	6	8
Wścieklizna 094	—	—	—	2	—
Choroba Banga — 044	4	6	9	37	42
Tężec — 061	51	62	63	189	257
Róża — 052	127	153	162	1.127	1.236

CDW Cieszyn 1832/60 260 W-15

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Wrzesień 1960

EGZ. NR. 123

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna we wrześniu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notujemy znaczne obniżenie wskaźnika zapadalności z 33,5 — IX/1959 do 18,7 — IX/1960. Wskaźnik zapadalności w porównaniu z wrześniem 1959 obniżył się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Poznańskiego. W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z sierpniem 1960 r. notujemy wzrost wskaźnika zapadalności z 15,3 — VIII/1960 do 18,7 — IX/1960.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 59 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Wskaźnik zapadalności obniżył się z 51,9 — IX/1959 do 23,3 — IX/1960. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje woj. Lubelskie, Zielonogórskie i Rzeszowskie.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik obniżył się z 27,4 do 23,3.

4. Porażenie dziecięce nagminne

We wrześniu zanotowano 21 zachorowań. Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 6,6 — IX/1959 do 0,8 — IX/1960. Na terenie 10 województw nie zanotowano zachorowań.

Liczba zachorowań według grup wieku przedstawia się następująco:

Grupy wieku	L. zach.	Procent
0— 5 lat	11	52,4
6—10	7	33,3
powyżej 11 „	3	14,3
Razem	21	100,0

W porównaniu z sierpniem 1960 r. wskaźnik zapadalności utrzymuje się na tym samym poziomie (0,8 — VIII/1960 r.; 0,8 — IX/1960).

5. Zatrucia pokarmowe

We wrześniu zanotowano 5 ognisk zatruc pokarmowych o łącznej liczbie 70 chorych. W woj. Lubelskim zatrucie grzybami spowodowało 3 zgony.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Notujemy znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem ub. r. z 331,2 — IX/1959 do 239,9 — IX/1960. Wszystkie województwa notują spadek zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z wyjątkiem woj. Rzeszowskiego.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 585,7; m. Wrocławiu — 425,0; m. Warszawie — 372,3; m. Krakowie — 360,1 i woj. Wrocławskim — 301,2.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym rb. notujemy sezonowy wzrost wskaźnika ze 187,8 — VIII/1959 do 239,9 — IX/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Zapadalność obniżyła się z 30,1 — IX/1959 do 16,0 — IX/1960 r. Wszystkie województwa z wyjątkiem Rzeszowskiego notują spadek wskaźnika zapadalności. W woj. Olsztyńskim zapadalność utrzymuje się na poziomie r. ub. Najwyższy spadek zapadalności zanotowano w m. Warszawie, m. Wrocławiu, woj. Zielonogórskim, Koszalińskim i Białostockim.

W porównaniu z sierpniem br notujemy nieznaczny spadek wskaźnika zapadalności z 17,3 — VIII/1960 do 16,0 — IX/1960.

2. Płonica

We wrześniu 1960 r. wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z 278,6 do 140,9. Tylko woj. Lubelskie notuje wzrost zapadalności z 50,7 — IX/1959 do 53,3 — IX/1960.

3. Krztusiec

Wskaźnik zapadalności wzrósł z 225,6 — IX/1959 do 381,8 — IX/1960. Najwyższe wskaźniki notowano przeważnie w północnych województwach Polski oraz miastach wydzielonych.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik obniżył się z 445,9 — VIII/1960 do 381,8 — IX/1960.

III. Inne schorzenia

i. Wścieklizna

W miesiącu wrześniu zanotowano 2 przypadki wścieklizny: 1. woj. Lubelskie, pow. Łuków, 2. woj. Koszalińskie, pow. Koszalin.

Errata

W biuletynie za m-c sierpień 1960 r. w tabeli „Zachorowania na choroby zakaźne” w rubryce błonica —055 winno być: woj. Katowickie — 52; m. Kraków — 4; woj. Krakowskie — 30 i woj. Rzeszowskie — 30.

ZACHOROWANIA NA

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta
						Salmonelozy	Inne			
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	043	128	092	080
POLSKA 1959	825	74	1279	6493	10	44	353	6	8158	163
1960	460	59	575	3800	13	183	519	4	5909	21
M. st. Warszawa	25	3	64	125	—	59	31	1	344	2
Warszawskie	55	5	30	449	4	—	9	2	335	1
Bydgoskie	28	3	50	234	—	2	19	—	287	—
M. Poznań	3	—	6	94	—	1	2	—	195	—
Poznańskie	26	3	21	102	7	4	15	—	441	—
M. Łódź	12	7	21	150	—	5	112	1	177	2
Łódzkie	31	6	8	112	—	1	16	—	293	3
Kieleckie	57	1	2	264	—	—	8	—	202	4
Lubelskie	24	8	32	131	—	—	83	—	320	—
Białostockie	17	7	30	304	—	28	10	—	139	—
Olsztyńskie	10	1	35	158	—	1	14	—	139	2
Gdańskie	34	4	45	333	1	22	61	—	282	1
Koszalińskie	—	—	18	171	—	12	4	—	130	1
Szczecińskie	5	—	15	65	—	1	21	—	165	—
Zielonogórskie	11	2	57	138	—	—	22	—	150	1
M. Wrocław	5	—	5	132	—	—	28	—	148	—
Wrocławskie	36	—	25	157	—	1	25	—	440	1
Opolskie	12	—	8	81	1	42	8	—	201	—
Katowickie	23	6	68	391	—	2	9	—	730	—
M. Kraków	4	2	21	26	—	1	2	—	141	—
Krakowskie	20	1	8	52	—	—	13	—	336	1
Rzeszowskie	22	—	6	131	—	1	7	—	314	2

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Łonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
741	6862	2884	5556	1438	81	9058	25	3	—	3	51	179
395	3471	2345	9404	1961	75	9838	20	4	2	2	37	149
2	288	125	544	202	19	29	3	3	—	—	—	11
20	192	123	419	56	1	196	1	—	—	—	—	10
16	246	120	731	41	2	168	—	—	—	—	2	12
2	64	43	257	42	—	32	—	—	—	—	1	2
17	221	179	458	68	8	147	—	1	—	1	3	9
15	183	76	287	81	—	6540	1	—	—	—	—	17
14	90	63	368	108	2	162	—	—	—	—	1	5
41	71	117	310	53	9	212	1	—	—	—	3	6
30	81	36	288	40	—	118	5	—	1	—	3	6
8	100	25	220	76	4	74	1	—	—	—	1	7
4	133	61	311	45	4	81	1	—	—	1	1	5
2	235	172	874	184	1	238	1	—	—	—	1	17
5	65	45	377	10	3	78	—	—	1	—	—	2
5	105	78	331	77	—	70	—	—	—	—	1	2
1	80	87	461	62	—	160	1	—	—	—	—	2
1	92	49	228	86	1	62	1	—	—	—	—	6
69	250	310	680	151	4	277	1	—	—	—	5	7
27	172	135	211	92	6	156	—	—	—	—	3	5
64	532	335	1208	365	5	800	1	—	—	—	—	6
10	61	35	289	64	1	35	1	—	—	—	—	1
19	151	89	237	35	2	57	1	—	—	—	7	4
23	59	42	315	23	3	146	—	—	—	—	5	7

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	33,5	18,7	3,0	2,4	51,9	23,3	6,6	0,8
M. st. Warszawa	44,4	27,0	7,6	3,2	125,5	69,3	13,0	2,2
Warszawskie	47,2	27,9	1,0	2,5	18,8	15,2	11,2	0,5
Bydgoskie	96,1	19,9	2,1	2,1	37,9	35,1	8,4	—
M. Poznań	12,0	9,0	3,0	—	123,1	18,0	6,0	—
Poznańskie	14,2	15,4	0,6	1,8	39,1	12,4	3,0	—
M. Łódź	33,8	20,3	6,8	11,8	89,6	35,5	—	3,4
Łódzkie	30,4	22,4	2,9	4,3	65,2	5,8	10,9	2,2
Kieleckie	37,4	36,8	2,6	0,6	1,3	1,3	3,9	2,6
Lubelskie	24,3	15,8	4,6	5,3	13,2	21,0	11,8	—
Białostockie	51,7	18,3	4,3	7,5	110,0	32,3	3,2	—
Olsztyńskie	38,1	13,6	4,1	1,4	130,8	47,7	6,8	2,7
Gdańskie	50,8	33,9	3,0	4,0	109,6	44,9	4,0	1,0
Koszalińskie	24,4	—	3,5	—	34,9	31,4	1,7	1,7
Szczecińskie	26,0	8,1	3,2	—	61,8	24,4	4,9	—
Zielonogórskie	20,3	17,2	4,7	3,1	84,5	89,2	7,8	1,6
M. Wrocław	37,3	14,3	—	—	143,6	14,3	—	—
Wrocławskie	26,7	24,6	—	—	44,5	17,1	3,4	0,7
Opolskie	18,2	15,6	—	—	10,4	10,4	5,2	—
Katowickie	20,4	8,5	1,8	2,2	59,7	25,2	5,6	—
M. Kraków	53,6	10,2	15,3	5,1	143,0	53,6	20,4	—
Krakowskie	18,0	11,6	4,1	0,6	15,7	4,6	5,2	0,6
Rzeszowskie	17,5	16,0	4,4	—	2,9	4,4	6,6	1,4

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
30,1	16,0	278,6	140,9	225,6	381,8	331,2	239,9
15,1	2,2	561,7	311,7	535,7	588,7	585,5	372,3
13,2	10,1	119,9	97,5	137,6	212,8	221,4	170,1
17,5	11,2	366,0	172,5	295,9	512,6	354,1	201,2
9,0	6,0	546,6	192,2	447,5	771,9	759,9	585,7
12,4	10,1	361,7	131,0	189,7	271,5	364,0	261,5
37,2	25,4	754,4	309,6	309,6	485,5	615,7	299,4
36,9	10,1	117,3	65,2	128,2	266,5	341,8	212,2
49,7	26,5	97,5	45,8	184,6	200,1	148,5	130,4
39,5	19,7	50,7	53,3	132,9	189,5	220,5	210,6
32,3	8,6	153,1	107,8	187,6	237,2	162,8	149,9
5,4	5,4	293,0	181,2	175,8	423,8	203,0	189,4
6,0	2,0	375,8	234,3	416,7	871,3	291,1	281,1
33,1	8,7	207,6	113,4	303,5	657,6	312,2	226,7
29,3	8,1	243,9	170,5	443,9	538,3	367,5	268,3
18,8	1,6	400,8	125,2	286,5	721,8	474,4	234,8
20,1	2,9	537,0	264,2	353,2	654,7	953,4	425,0
54,8	47,2	287,5	171,1	195,8	465,5	397,0	301,2
74,3	35,2	422,5	224,3	178,6	275,1	388,6	262,1
47,8	23,7	459,8	197,3	252,1	447,9	405,3	270,7
46,0	25,5	587,4	155,8	464,8	738,1	434,2	360,1
23,2	11,0	113,8	87,7	107,4	137,6	234,1	195,1
16,0	16,8	73,6	43,0	78,0	229,6	169,1	228,9

Wrzesień 1960 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	wrzesień 1960	wrzesień 1959	Mediana 1956-1959	Zestawienie kumu- lacyjne I—IX/1960	Zestawienie kumu- lacyjne I—IX/1959
Dur brzuszny — 040	460	825	533	2.537	3.207
Dury rzekome ABC — 041	59	74	76	334	351
Czerwonka — 045	575	1.279	657	4.641	5.723
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	3.800	6.493	6.374	20.612	35.176
Botulismus — 049	13	10	9	166	109
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	183	44	45	1.034	625
	inne — 049	519	353	331	4.074
Włośnica — 128	4	6	16	2.031	1.079
Zakaźne zap. wątr. — 092	5.909	8.158	3.444	52.235	44.237
Porażenie dziec. nagm. — 080	21	163	321	250	900
Błonica — 055	395	741	998	4.891	7.678
Płonica — 050	3.471	6.862	5.618	36.450	46.025
Odra — 085	2.345	2.884	2.679	55.751	91.959
Krztusiec — 056	9.404	5.556	5.854	70.387	54.109
Zap. przyusz. nagm. — 089	1.961	1.438	1.248	40.944	34.076
Zapalenie opon mózgo.-rdzen. nagminne — 057	75	81	97	695	921
Grypa 480 — 483	9.838	9.058	7.853	145.216	1.901.563
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	20	25	24	202	208
Zimnica 110—117	4	3	1	10	11
Wścieklizna 094	2	—	—	4	—
Choroba Banga — 044	2	3	7	39	45
Tężec — 061	37	51	51	226	308
Róża — 052	149	179	179	1.276	1.415

CDW Cieszyn 1927/60 260 Wz-15

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Październik 1960

214

EGZ. NR

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w październiku 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W październiku br. notujemy znaczne obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z 20,0 — X/1959 do 14,2 — X/1960 r.

Bardzo znaczny spadek wskaźnika zanotowano w województwach: Białostockim, Szczecińskim, Bydgoskim i m. Wrocławiu.

W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z wrześniem 1960 r. wskaźnik zapadalności obniżył się z 18,7 — IX/1960 do 14,2 — X/1960.

2. Dury rzekome

W okresie sprawozdawczym zanotowano 40 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notujemy spadek zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z 31,7 — X/1959 do 16,3 — X/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. st. Warszawie — 68,2; m. Krakowie — 38,3; m. Poznaniu — 33,0 i woj. Olsztyńskim — 38,1. W porównaniu z wrześniem br. wskaźnik obniżył się z 23,3 — IX/1960 do 16,3 — X/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W październiku zanotowano 16 zachorowań sporadycznych. Wskaźnik zapadalności obniżył się z 4,5 — X/1959 do 0,6 — X/1960. Na terenie 9 województw nie notowano zachorowań. Liczba zachorowań według grup wieku przedstawia się następująco.

Grupy wieku	L. zach.
0— 5 lat	10
6—10 „	3
powyżej 10 „	3
Razem	16

W porównaniu z wrześniem br. wskaźnik zapadalności obniżył się z 0,8 — IX/1960 do 0,6 — X/1960.

5. Zatrucia pokarmowe

W październiku zanotowano 7 ognisk zatruc pokarmowych, które objęły 168 chorych, w tym 3 zgony w woj. Lubelskim spowodowane na skutek spożycia grzybów trujących.

Jedno ognisko zanotowano w zakładzie służby zdrowia — 60 chorych; 3 ogniska w zakładach dziecięcych i młodzieżowych — 86 chorych; pozostałe 3 ogniska w środowiskach domowych — 22 chorych.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Notujemy obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 413,2 — X/1959 do 295,3 — X/1960. Wszystkie województwa

z wyjątkiem woj. Białostockiego i Rzeszowskiego notują obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z październikiem 1959 r.

Znaczny spadek zapadalności zanotowano w następujących województwach (miastach wydzielonych).

Województwo (miasto)	X/1959	X/1960
m. Wrocław	1071,7	511,2
m. Warszawa	867,9	500,0
m. Łódź	720,6	448,3
m. Poznań	907,1	693,8
m. Kraków	643,6	388,2
Zielonogórskie	540,2	286,5
Opolskie	502,0	266,6
POLSKA	413,2	295,3

W porównaniu z wrześniem 1960 r. notuje się sezonowy wzrost wskaźnika zapadalność z 239,9 — IX/1960 do 295,3 — X/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się z 34,7 — X/1959 r. do 17,1 — X/1960. Wszystkie województwa z wyjątkiem m. Poznania, woj. Poznańskiego i Krakowskiego notują w miesiącu październiku br. dalszy spadek wskaźnika zapadalności. W woj. Olsztyńskim nie zanotowano zachorowań.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Wrocławskim — 58,2; Kieleckim — 35,5; m. Poznaniu — 33,0 i m. Łodzi — 30,4.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym zanotowano niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 16,0 — IX/1960 do 17,1 — X/1960.

2. Płonica

Zanotowano obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. z 382,0 — X/1959 do 187,3 — X/1960. Proces ten obserwujemy od kwietnia do października br. W porównaniu z wrześniem 1960 r. zanotowano wzrost wskaźnika ze 140,9 do 187,3.

3. Krztusiec

Zapadalność na krztusiec wzrosła w porównaniu z październikiem 1959 r. z 215,0 — X/1959 do 329,0 — X/1960. Jedynie w woj. Szczecińskim, Bydgoskim i w m. Warszawie zapadalność obniżyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik obniżył się z 381,8 — IX/1960 do 329,0 — X/1960.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Poliomyelitis anterior acuta
						Salmonelozy	Inne			
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080
POLSKA	494	36	776	3407	10	47	280	15	10178	112
1959	494	36	776	3407	10	47	280	15	10178	112
1960	350	40	402	2523	7	36	445	8	7274	16
M. st. Warszawa	9	2	63	93	—	6	12	1	462	1
Warszawskie	48	3	9	242	—	—	14	2	408	1
Bydgoskie	27	1	26	112	—	—	63	2	381	1
M. Poznań	1	—	11	31	—	—	4	—	231	—
Poznańskie	22	—	8	122	4	5	3	—	572	—
M. Łódź	15	3	18	102	—	—	78	1	265	—
Łódzkie	37	3	10	91	—	2	10	—	404	3
Kieleckie	37	4	—	179	—	2	20	—	232	1
Lubelskie	11	1	14	56	—	—	13	—	383	—
Białostockie	3	2	22	122	—	2	—	—	142	—
Olsztyńskie	19	2	28	150	—	—	8	—	192	—
Gdańskie	14	2	25	222	—	11	77	—	270	1
Koszalińskie	4	—	12	177	—	—	—	—	146	1
Szczecińskie	5	—	11	58	—	1	11	—	189	—
Zielonogórskie	10	4	14	57	—	—	8	—	183	1
M. Wrocław	2	—	5	100	—	1	17	—	178	—
Wrocławskie	22	—	28	127	2	—	18	—	445	1
Opolskie	11	—	1	40	1	—	10	—	206	2
Katowickie	22	11	67	304	—	6	69	2	981	1
M. Kraków	2	1	15	30	—	—	5	—	152	—
Krakowskie	16	—	14	32	—	—	3	—	406	1
Rzeszowskie	13	1	1	76	—	—	2	—	446	1

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Plonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagmne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
855	9410	5750	5295	2853	80	18566	16	1	—	3	37	251
422	4614	5046	8104	4198	76	18603	24	3	—	2	31	169
4	457	155	513	496	13	51	3	1	—	—	1	13
18	270	329	493	144	—	385	4	—	—	—	1	12
17	231	302	484	66	—	480	1	—	—	—	1	14
11	83	78	165	72	—	105	—	—	—	—	1	2
24	307	303	401	129	1	407	—	—	—	—	3	6
18	281	301	251	130	1	10294	—	1	—	—	2	20
12	133	141	320	239	3	443	—	—	—	—	—	8
55	150	309	263	213	5	339	4	—	—	—	2	12
12	82	70	595	65	1	125	4	—	—	—	1	2
5	101	39	214	137	5	82	1	1	—	—	—	8
—	156	154	373	118	2	234	1	—	—	—	1	10
2	347	301	518	229	3	495	1	—	—	—	—	3
8	85	78	320	148	3	130	—	—	—	—	—	3
14	132	183	264	124	1	175	1	—	—	—	—	1
3	103	164	394	158	4	190	1	—	—	—	1	1
1	116	86	215	131	1	156	1	—	—	—	—	10
85	341	557	447	241	10	369	1	—	—	1	3	16
18	139	281	211	172	8	371	—	—	—	1	2	3
67	638	916	967	857	3	3547	—	—	—	—	1	13
8	108	30	205	143	—	75	—	—	—	—	1	4
25	184	221	167	145	3	69	—	—	—	—	3	3
15	170	48	324	41	9	81	—	—	—	—	7	5

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE*)

Województwo	Dyr brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
R o k	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	20,0	14,2	1,5	1,6	31,7	16,3	4,5	0,6
M. st. Warszawa	17,3	9,7	—	2,2	107,1	68,2	8,6	1,1
Warszawskie	35,0	24,4	2,5	1,5	24,4	4,6	7,6	0,5
Bydgoskie	44,2	18,9	0,7	0,7	27,3	18,2	9,1	0,7
M. Poznań	9,0	3,0	—	—	93,1	33,0	6,0	—
Poznańskie	8,9	13,0	—	—	25,5	4,7	1,2	—
M. Łódź	28,7	25,4	15,2	5,1	44,0	30,4	—	—
Łódzkie	26,8	26,8	—	2,2	26,1	7,2	2,9	2,2
Kieleckie	23,2	23,9	1,9	2,6	16,8	—	0,6	0,6
Lubelskie	10,5	7,2	0,6	0,6	9,9	9,2	3,9	—
Białostockie	33,4	3,2	4,3	2,1	67,9	23,7	—	—
Olsztyńskie	25,9	25,9	1,4	2,7	76,9	38,1	—	—
Gdańskie	22,9	13,9	1,0	2,0	84,7	24,9	5,0	1,0
Koszalińskie	12,2	7,0	1,7	—	24,4	20,9	1,7	1,7
Szczecińskie	29,3	8,1	—	—	48,8	17,9	3,2	—
Zielonogórskie	7,8	15,6	3,1	6,3	48,5	21,9	12,5	1,6
M. Wrocław	31,6	5,7	2,9	—	31,6	14,3	2,9	—
Wrocławskie	10,3	15,0	—	—	22,6	19,3	4,1	0,7
Opolskie	5,2	14,3	—	—	10,4	1,3	10,4	2,6
Katowickie	13,7	8,1	0,4	4,1	19,6	24,8	2,2	0,4
M. Kraków	12,8	5,1	7,7	2,5	53,6	38,3	12,8	—
Krakowskie	13,3	9,3	1,7	—	2,9	8,1	3,5	0,6
Rzeszowskie	17,5	9,5	—	0,7	2,2	0,7	9,5	0,7

*) Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
34,7	17,1	382,0	187,3	215,0	329,0	413,2	295,3
20,6	4,3	647,1	494,6	586,5	555,2	867,9	500,0
17,3	9,1	208,2	137,1	169,6	250,4	269,7	207,2
26,6	11,9	596,0	162,0	362,6	339,4	416,5	267,1
15,0	33,0	756,9	249,3	405,5	495,6	907,1	693,8
11,8	14,2	480,8	182,0	152,4	237,7	447,6	339,1
55,8	30,4	1422,6	475,3	233,4	424,6	720,6	448,3
39,8	8,7	197,7	96,3	90,0	231,7	355,5	292,5
60,0	35,5	141,4	96,8	153,6	169,8	186,5	149,7
47,3	7,9	140,8	54,0	86,9	391,6	260,6	252,0
12,9	5,4	166,0	108,9	147,7	230,7	135,8	153,1
10,9	—	451,0	212,6	189,4	508,3	273,9	261,3
10,0	2,0	540,3	345,9	330,0	516,4	406,7	269,2
15,7	13,9	259,9	148,3	324,4	558,2	380,2	254,7
47,1	22,8	344,7	214,6	489,5	429,3	401,7	307,3
9,4	4,7	465,0	161,3	300,6	616,9	540,2	286,5
31,6	2,9	491,1	333,1	281,4	617,4	1071,7	511,2
74,6	58,2	393,6	233,4	223,8	306,0	539,4	304,6
103,0	23,5	507,2	181,2	196,9	275,1	502,0	268,6
51,3	24,8	528,8	236,6	242,5	358,6	517,6	363,7
56,3	20,4	615,5	275,8	319,2	523,6	643,6	388,2
11,6	14,5	191,7	106,9	89,4	97,0	320,0	235,8
23,3	10,9	91,1	123,9	60,5	236,2	220,1	325,1

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej		Październik 1960	Październik 1959	Mediana 1956-1959	Zestawienie kumu- lacyjne I—X/1960	Zestawienie kumu- lacyjne I—X/1959
Dur brzuszny	— 040	350	494	506	2.887	3.701
Dury rzekome ABC	— 041	40	36	63	374	387
Czerwonka	— 045	402	776	544	5.043	6.499
Biegunka u dzieci do lat 2	764—571	2.523	3.407	3.508	23.135	38.583
Botulismus	— 049	7	10	9	173	119
Zatrucia pokarmowe	Salmonelozy 042	36	47	59	1.070	672
	inne — 049	445	280	236	4.442	4.354
Włośnica	— 128	8	15	27	2.039	1.094
Zakaźne zap. wątr.	— 092	7.274	10.178	4.782	59.509	54.415
Porażenie dziec. nagm.	— 080	16	112	260	266	1.012
Błonica	— 055	422	855	1.132	5.313	8.533
Płonica	— 050	4.614	9.410	7.799	41.064	55.435
Odra	— 085	5.046	5.750	5.435	60.797	97.709
Krztusiec	— 056	8.104	5.295	5.680	78.491	59.404
Zap. przyusz. nagm.	— 089	4.198	2.853	2.429	45.142	36.929
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne	— 057	76	80	90	771	1.001
Grypa	480—483	18.603	18.566	15.800	163.819	1.920.129
Dur wysypkowy sporadyczny						
Choroba Brilla	100—102	24	16	22	226	224
Zimnica	110—117	3	1	2	13	12
Wścieklizna	094	—	—	—	4	—
Choroba Banga	— 044	2	3	6	41	48
Tężec	— 061	31	37	41	257	345
Róża	— 052	169	251	234	1.445	1.666

CDW Cieszyn 2294/60 260 Wz-15

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Listopad 1960

EGZ. NR 158

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w listopadzie 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z listopadem 1959 r. zanotowano na terenie kraju niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 12,1 — XI/1959 do 13,1 — XI/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w województwach: Kieleckim — 27,7; Warszawskim — 26,9; Gdańskim — 23,9; Łódzkim — 19,5 i Olsztyńskim 16,3. W woj. Wrocławskim, Szczecińskim, Białostockim, Koszalińskim i m. Wrocławiu zanotowano znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z listopadem 1959 r. W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z miesiącem poprzedzającym wskaźnik obniżył się z 14,2 — X/1960 do 13,1 — XI/1960.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 21 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W dalszym ciągu wskaźnik zapadalności obniża się. W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zapadalność obniżyła się z 21,3 — XI/1959 do 14,5 — XI/1960 r.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z listopadem 1959 r. zanotowano w woj. Warszawskim, Bydgoskim i Katowickim. W woj. Rzeszowskim nie zanotowano zachorowań, a bardzo znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Kieleckim, Białostockim, Olsztyńskim i Koszalińskim.

W porównaniu z październikiem 1960 r. wskaźnik obniżył się z 16,3 — X/1960 do 14,5 — XI/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 16 zachorowań. Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. 2,3 — XI/1959 do 0,6 — XI/1960 r.

W listopadzie nie zanotowano zachorowań na terenie 11 województw. Liczba zachorowań według grup wieku przedstawia się następująco:

Grupy wieku	L. zach.
0— 5 lat	12
6—10 „	2
powyżej 10 „	2
Razem	16

W porównaniu z październikiem 1960 r. wskaźnik zapadalności utrzymuje się na tym samym poziomie (0,6 — X/1960; 0,6 — XI/60).

5. Zatrucia pokarmowe

W listopadzie zanotowano 5 ognisk zatruc pokarmowych o łącznej liczbie 215 chorych. Hospitalizowano 11 chorych. Zanotowano 1 zgon w woj. Kieleckim.

6. Zakaźne zapalenie wątroby

Zapadalność obniżyła się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 462,5 — XI/1959 do 355,7 — XI/1960, natomiast w porównaniu z październikiem 1960 r. notujemy sezonowy wzrost wskaźnika zapadalności z 295,3 — X/1960 r. do 355,7 — XI/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu 925,1; m. Wrocławiu 761,0; m. Warszawie — 489,1; woj. Szczecińskim — 468,3; Poznańskim — 447,0 i w woj. Katowickim — 430,9. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w woj. Szczecińskim, Rzeszowskim, i m. Poznaniu.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 36,6 — XI/1959 do 22,4 — XI/1960. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z listopadem 1959 r. zanotowano w następujących województwach (miastach wydzielonych):

Województwo (miasto)	XI/1959	XI/1960
m. Poznań	9,0	63,1
m. Kraków	38,3	40,9
Kieleckie	43,2	50,3
Koszalińskie	22,7	29,6
Krakowskie	18,0	25,0
POLSKA	36,6	22,4

W woj. Kieleckim, pow. Włoszczowa w osiedlu robotniczym — Chrzastów, zanotowano ognisko błonicy liczące 19 zachorowań. Dzieci nie były szczepione.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik wzrósł z 17,1 — X/1960 do 22,4 — XI/1960.

2. Płonica

W listopadzie 1960 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wskaźnik zapadalności obniżył się z 374,8 — XI/1959 do 206,3 — XI/1960.

W porównaniu z październikiem br. wskaźnik zapadalności wzrósł ze 187,3 — X/1960 do 206,3 — XI/1960.

3. Krztusiec

Notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 228,9 — XI/1959 r. do 394,4 — XI/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Zielonogórskim, Gdańskim, Koszalińskim, m. Warszawie, m. Poznaniu, m. Krakowie i m. Wrocławiu.

4. Grypa

W listopadzie 1960 r. na terenie kraju zanotowano 29.389 zachorowań.

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. stanowi to wzrost o 26,3%. W okresie jesiennym nie notuje się epidemicznego nasilenia zachorowań.

ZACHOROWANIA

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomylitis anterior	
						Salmonelozy	Inne				
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	
POLSKA	1959	299	41	526	2093	13	44	239	17	11391	57
	1960	323	21	358	1887	12	36	294	17	8762	16
M. st. Warszawa	9	4	33	57	—	—	35	1	452	1	
Warszawskie	53	1	19	164	—	—	3	—	505	2	
Bydgoskie	15	—	31	72	4	1	4	—	457	—	
M. Poznań	6	—	8	39	—	1	15	3	308	—	
Poznańskie	17	2	13	42	6	7	10	3	754	—	
M. Łódź	9	—	16	99	—	—	72	—	230	1	
Łódzkie	27	1	15	78	—	1	9	—	478	—	
Kieleckie	43	2	1	151	—	—	14	—	266	1	
Lubelskie	17	3	7	32	—	—	7	4	516	1	
Białostockie	9	1	19	100	—	7	—	—	196	1	
Olsztyńskie	12	—	13	112	—	—	8	—	207	—	
Gdańskie	24	1	55	249	—	2	23	—	362	3	
Koszalińskie	3	—	4	79	—	—	1	—	158	—	
Szczecińskie	2	1	15	36	—	—	17	—	288	—	
Zielonogórskie	10	—	17	43	—	2	1	6	194	2	
M. Wrocław	2	—	1	89	—	3	14	—	265	—	
Wrocławskie	5	1	17	136	—	5	16	—	517	1	
Opolskie	12	—	2	57	2	—	—	—	270	1	
Katowickie	25	2	49	178	—	7	3	—	1162	—	
M. Kraków	2	1	14	13	—	—	35	—	159	—	
Krakowskie	12	—	9	21	—	—	1	—	502	—	
Rzeszowskie	9	1	—	40	—	—	6	—	516	2	

* Liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica-Diphtheria	Łącznica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznic nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
902	9231	8766	5637	3745	74	23261	20	—	1	3	22	249
552	5081	9579	9714	7009	45	29389	22	—	—	3	29	181
4	472	300	752	936	3	3939	4	—	—	—	—	14
26	315	477	581	141	—	356	1	—	—	—	3	10
10	250	714	517	87	2	1014	—	—	—	—	—	18
21	108	138	254	162	—	438	—	—	—	—	—	3
16	375	634	448	190	3	672	1	—	—	1	—	6
20	299	729	334	277	1	13405	1	—	—	—	—	9
18	147	302	415	356	1	896	2	—	—	1	1	11
78	123	748	383	353	4	566	—	—	—	—	1	3
36	93	256	326	157	—	444	7	—	—	—	3	7
8	89	39	205	251	2	134	—	—	—	—	—	5
1	151	284	381	162	4	417	1	—	—	—	—	6
7	361	608	766	457	—	994	1	—	—	—	1	13
17	132	98	374	179	5	178	—	—	—	—	—	1
24	207	381	263	142	—	211	1	—	—	—	—	3
5	135	340	541	181	—	311	—	—	—	—	1	5
8	134	186	228	222	—	249	—	—	—	—	—	12
100	316	734	629	455	7	689	1	—	—	1	1	14
25	157	265	287	282	3	639	—	—	—	—	5	10
47	695	1716	1040	1419	3	3144	1	—	—	—	—	15
16	174	128	280	251	1	231	—	—	—	—	—	1
43	245	401	250	276	1	167	1	—	—	—	10	11
22	103	101	460	73	5	295	—	—	—	—	3	4

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	12,1	13,1	1,7	0,8	21,3	14,5	2,3	0,6
M. st. Warszawa	10,8	9,7	3,2	4,3	51,9	35,7	4,3	1,1
Warszawskie	15,7	26,9	2,0	0,5	6,1	9,6	5,6	1,0
Bydgoskie	14,7	10,5	—	—	9,1	21,7	2,1	—
M. Poznań	3,0	18,0	—	—	48,0	24,0	—	—
Poznańskie	8,3	10,1	0,6	1,2	11,8	7,7	2,4	—
M. Łódź	6,8	15,2	20,3	—	50,7	27,1	—	1,7
Łódzkie	17,4	19,5	—	0,7	12,3	10,9	3,6	—
Kieleckie	23,2	27,7	1,3	1,3	21,9	0,6	1,9	0,6
Lubelskie	6,6	11,2	1,3	2,0	6,6	4,6	1,3	0,6
Białostockie	19,4	9,7	6,5	1,1	53,9	20,5	2,1	1,1
Olsztyńskie	17,7	16,3	—	—	51,8	17,7	2,7	—
Gdańskie	18,9	23,9	—	1,0	80,7	54,8	—	3,0
Koszalińskie	12,2	5,2	—	—	33,1	7,0	5,2	—
Szczecińskie	9,7	3,2	1,6	1,6	43,9	24,4	—	—
Zielonogórskie	10,9	15,6	—	—	42,3	26,6	—	3,1
M. Wrocław	25,8	5,7	2,9	—	8,6	2,9	—	—
Wrocławskie	14,4	3,4	1,4	0,7	11,6	11,6	1,4	0,7
Opolskie	6,5	15,6	—	—	3,9	2,6	1,3	1,3
Katowickie	6,3	9,3	0,4	0,7	11,5	18,2	3,0	—
M. Kraków	10,2	5,1	10,2	2,5	43,4	35,7	—	—
Krakowskie	6,4	7,0	1,2	—	7,0	5,2	—	—
Rzeszowskie	8,0	6,6	—	0,7	0,7	—	5,1	1,4

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
36,6	22,4	374,8	206,3	228,9	394,4	462,5	355,7
10,8	4,3	806,2	510,8	561,7	813,8	668,8	489,1
19,3	13,2	186,9	160,0	124,4	295,1	281,9	256,5
20,3	7,0	556,0	175,3	341,5	362,5	465,6	320,4
9,0	63,1	630,7	324,4	333,4	762,9	856,0	925,1
10,7	9,5	362,8	222,3	166,0	265,6	525,9	447,0
72,7	33,8	1349,9	505,8	255,4	565,0	833,9	389,1
43,4	13,0	257,8	106,4	87,6	300,5	401,9	346,1
43,2	50,3	176,9	79,4	148,5	247,2	244,6	171,7
72,4	23,7	148,7	61,2	105,9	214,5	378,4	339,6
26,9	8,6	122,9	95,9	172,5	221,0	228,6	211,3
9,5	1,4	339,3	205,8	299,8	519,2	339,3	282,1
6,0	7,0	604,1	360,0	465,5	763,6	405,7	360,9
22,7	29,6	310,5	230,2	279,1	652,4	450,0	275,6
42,3	39,0	400,0	336,6	523,6	427,7	429,3	468,3
21,9	7,8	328,8	211,4	242,7	847,0	538,6	303,7
28,7	23,0	353,2	384,8	373,3	654,7	1053,9	761,0
80,1	68,4	360,7	216,3	187,5	430,5	594,1	353,9
83,4	32,6	478,5	204,7	208,6	374,2	577,6	352,0
60,8	17,4	553,2	257,7	302,2	385,6	625,2	430,9
38,3	40,9	819,8	444,4	339,7	715,1	692,1	406,1
18,0	25,0	155,1	142,3	119,1	145,2	374,6	291,6
23,3	16,0	108,6	75,1	95,5	335,3	266,8	376,2

Listopad 1960 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Listopad 1960	Listopad 1959	Mediana 1956-1959	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—XI/1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—XI/1959
Dur brzuszny — 040	323	299	337	3.210	4.000
Dury rzekome ABC — 041	21	41	38	395	428
Czerwonka — 045	358	526	385	5.401	7.025
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.887	2.093	2.086	25.022	40.676
Botulismus — 049	12	13	12	185	132
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	36	44	16	1.106	716
	inne — 049	294	239	297	4.736
Włośnica — 128	17	17	14	2.056	1.111
Zakaźne zap. wątr. — 092	8.762	11.391	5.036	68.271	65.806
Porażenie dziec. nagm. — 080	16	57	159	282	1.069
Błonica — 055	552	902	1.121	5.865	9.435
Płonica — 050	5.081	9.231	6.302	46.145	64.666
Odra — 085	9.579	8.766	8.587	70.376	106.475
Krztusiec — 056	9.714	5.637	6.629	88.205	65.041
Zap. przyusz. nagm. — 089	7.009	3.745	3.069	52.151	40.674
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	45	74	88	816	1.075
Grypa 480 — 483	29.389	23.261	20.791	193.208	1.943.390
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100—102	22	20	20	248	244
Zimnica 110—117	—	—	1	13	12
Wścieklizna 094	—	1	—	4	1
Choroba Banga — 044	3	3	4	44	51
Tężec * — 061	29	22	18	286	367
Róża — 052	181	249	221	1.626	1.915

CDW Cieszyn 89/61 260 N-14

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Grudzień 1960

EGZ. NR **50**

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w grudniu 1960 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności utrzymuje się prawie na tym samym poziomie (10,3 — XII/1959, 10,2 — XII/1960). Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z grudniem 1959 r. zanotowano w woj. Olsztyńskim i Łódzkim. W okresie sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano. W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się z 13,1 — XI/1960 do 10,2 — XII/1960.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 23 zachorowania sporadyczne.

3. Czerwonka

W grudniu br. notuje się obniżenie wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 21,4 — XII/1959 do 16,2 — XII/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w następujących województwach: Gdańskim — 62,8, Zielonogórskim — 36,0; Olsztyńskim — 34,1; Koszalińskim — 33,1; m. Poznaniu — 42,0 i m. Krakowie — 51,1. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Warszawskim, Kieleckim, Wrocławskim, Szczecińskim, Poznańskim i m. Łodzi.

W porównaniu z listopadem 1960 r. zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności z 14,5 — XI/1960 do 16,2 — XII/1960.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W okresie sprawozdawczym zanotowano 15 zachorowań. Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 1,7 — XII/1959 do 0,6 — XII/1960.

Na terenie 13 województw nie zanotowano zachorowań.

Liczba przypadków wg grup wieku przedstawia się następująco:

Grupy wieku	Liczba zach.
0— 5 lat	8
6— 10 lat	2
powyżej 10 lat	5
Razem	15

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W dalszym ciągu notujemy spadek zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. Proces ten obserwujemy od września br. W porównaniu z grudniem 1959 r. wskaźnik zapadalności obniżył się z 391,0 — XII/1959 do 306,1 — XII/1960. Wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego, Białostockiego i Rzeszowskiego notują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m.

Poznaniu — 585,7; m. Wrocławiu — 476,7; m. Warszawie — 402,6; woj. Katowickim — 440,5 i Szczecińskim — 374,0.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się z 355,7 — XI/1960 do 306,1 — XII/1960.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się z 30,0 — XII/1959 do 21,4 — XII/1960. Woj. Kieleckie, Olsztyńskie, Koszalińskie, m. Poznań i m. Łódź notuje wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z grudniem 1959 r. zanotowano w woj. Łódzkim, Lubelskim, Zielonogórskim, Opolskim i Katowickim.

W porównaniu z listopadem ub. r. notuje się niewielki spadek wskaźnika zapadalności 22,4 — XI/1960 do 21,4 — XII/1960.

2. Płonica

Zapadalność na płonicę obniżyła się z 289,1 — XII/1959 do 189,0 — XII/1960. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Krakowie — 574,6; m. Warszawie — 514,0; m. Łodzi — 510,9 i woj. Gdańskim — 459,6.

W porównaniu z listopadem br. wskaźnik obniżył się z 206,3 — XI/1960 do 189,0 — XII/1960.

3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zapadalność wzrosła z 209,2 — XII/1959 do 317,6 — XII/1960, natomiast w porównaniu z listopadem 1960 r. wskaźnik zapadalności obniżył się z 394,4 — XI/1960 do 317,6 — XII/1960.

Na terenie wszystkich województw notuje się wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z grudniem 1960 r. z wyjątkiem Bydgoskiego i Szczecińskiego.

4. Grypa

W grudniu br. zanotowano 35 085 zachorowań. W porównaniu z listopadem 1960 r. stanowi to niewielki wzrost liczby zachorowań (29 389). W okresie jesiennym nie notowano epidemicznego nasilenia zachorowań.

ZACHOROWANIA NA (ROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Poliomyelitis anterior acuta
						Salmonelozy	Inne			
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080
POLSKA 1959	254	20	527	1.815	9	48	389	18	9.632	43
POLSKA 1960	252	23	400	1.454	2	96	435	58	7.539	15
M. st. Warszawa	7	3	23	43	—	1	20	2	372	2
Warszawskie	43	—	13	118	—	—	2	30	442	—
Bydgoskie	10	—	27	47	1	—	3	—	395	2
M. Poznań	—	—	14	20	—	2	3	—	195	—
Poznańskie	15	—	15	25	—	—	16	—	523	2
M. Łódź	9	—	13	85	—	—	48	—	187	—
Łódzkie	27	—	13	31	—	1	13	1	329	—
Kieleckie	27	2	1	111	—	5	4	—	249	—
Lubelskie	6	1	14	9	—	1	2	1	358	1
Białostockie	2	3	27	93	—	9	—	2	252	—
Olsztyńskie	15	—	25	77	1	—	205	3	189	2
Gdańskie	20	1	63	189	—	2	34	7	344	—
Koszalińskie	2	—	19	102	—	6	6	2	181	—
Szczecińskie	5	—	12	60	—	—	17	—	230	1
Zielonogórskie	4	3	23	44	—	—	1	10	167	3
M. Wrocław	1	1	5	71	—	3	20	—	166	—
Wrocławskie	12	—	8	91	—	2	13	—	476	1
Opolskie	6	—	1	31	—	—	2	—	256	—
Katowickie	14	2	48	150	—	5	3	—	1188	—
M. Kraków	2	3	20	2	—	—	4	—	125	—
Krakowskie	16	3	14	14	—	59	17	—	480	—
Rzeszowskie	9	1	2	41	—	—	2	—	435	1

* Liczby bezwzględne

Fionica-Diphtheria	Pionica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
740	7.122	8958	5154	4.184	63	25844	29	1	—	4	15	206
528	4.655	13952	7822	7.956	63	35085	17	1	—	7	20	134
7	475	659	733	1.253	9	8567	—	1	—	—	—	7
18	290	676	434	153	3	285	3	—	—	—	1	4
16	278	1281	368	106	2	808	—	—	—	—	—	5
7	91	287	249	177	—	493	—	—	—	—	—	1
17	210	593	332	311	3	802	—	—	—	2	1	10
24	302	1491	269	371	—	13250	—	—	—	—	—	14
16	117	478	321	234	3	645	—	—	—	—	—	8
77	124	904	294	543	8	596	2	—	—	—	4	6
25	84	361	339	172	3	481	3	—	—	—	—	5
15	93	78	178	280	3	139	2	—	—	—	—	2
12	88	260	286	234	1	302	—	—	—	1	2	1
6	461	885	574	481	1	791	—	—	—	1	—	12
30	106	91	332	173	4	193	—	—	—	—	—	1
12	197	745	283	175	—	216	2	—	—	—	1	4
7	79	288	319	260	2	593	2	—	—	—	—	1
6	112	393	189	176	1	438	—	—	—	—	—	6
90	295	912	554	614	7	1070	2	—	—	2	—	14
15	150	321	190	278	3	766	—	—	—	1	2	1
64	596	2233	922	1374	7	3700	—	—	—	—	2	15
16	225	335	209	359	—	307	—	—	—	—	—	5
29	151	475	212	139	1	212	1	—	—	—	—	7
19	131	206	235	93	2	431	—	—	—	—	7	5

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
POLSKA	10,3	10,2	0,8	0,9	21,4	16,2	1,7	0,6
M. st. Warszawa	6,5	7,6	1,1	3,2	41,1	24,9	3,2	2,2
Warszawskie	19,8	21,8	1,0	—	44,2	6,6	4,1	—
Bydgoskie	9,8	7,1	0,7	—	9,1	18,9	—	1,4
M. Poznań	6,0	—	—	—	24,0	42,0	3,0	—
Poznańskie	9,5	8,9	0,6	—	16,0	8,9	1,8	1,2
M. Łódź	16,9	15,2	—	—	47,4	22,0	—	—
Łódzkie	9,4	19,5	—	—	11,6	9,4	0,7	—
Kieleckie	16,1	17,4	0,6	1,3	20,6	0,6	1,3	—
Lubelskie	9,9	3,9	—	0,6	13,2	9,2	0,6	0,6
Białostockie	9,7	2,1	4,3	3,2	41,0	29,1	—	—
Olsztyńskie	5,4	20,4	1,4	—	27,2	34,1	4,1	2,7
Gdańskie	15,9	19,9	1,0	1,0	53,8	62,8	1,0	—
Koszalińskie	7,0	3,5	—	—	38,4	33,1	1,7	—
Szczecińskie	13,0	8,1	—	—	37,4	19,5	—	1,6
Zielonogórskie	7,8	6,3	—	4,7	36,0	36,0	6,3	4,7
M. Wrocław	5,7	2,9	—	2,9	17,2	14,3	5,7	—
Wrocławskie	11,6	8,2	—	—	11,6	5,5	2,0	0,7
Opolskie	7,8	7,8	1,3	—	2,6	1,3	5,2	—
Katowickie	3,7	5,2	2,6	0,7	10,7	17,8	0,4	—
M. Kraków	10,2	5,1	—	7,7	25,5	51,1	2,5	—
Krakowskie	8,7	9,3	—	1,7	6,4	8,1	1,2	—
Rzeszowskie	10,2	6,6	—	0,7	2,2	1,4	1,4	0,7

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960
30,0	21,4	289,1	189,0	209,2	317,6	391,0	306,1
16,2	7,6	824,6	514,0	562,7	793,2	560,6	402,6
15,2	9,1	150,8	147,3	129,5	220,4	259,5	224,5
16,8	11,2	403,2	194,9	295,9	258,0	396,2	277,0
12,4	21,0	663,8	273,3	306,4	747,9	741,9	585,7
11,8	10,1	236,0	124,5	161,9	196,8	471,3	310,1
37,2	40,6	1084,3	510,9	206,4	455,0	522,7	316,3
32,6	11,6	141,2	84,7	92,0	232,4	393,2	238,2
43,2	49,7	122,6	80,0	133,0	189,8	196,2	160,7
33,6	16,4	67,1	55,3	80,9	223,1	216,5	235,6
17,2	16,2	119,7	100,3	108,9	191,9	235,0	271,7
6,8	16,3	344,8	119,9	216,7	389,7	287,5	257,5
12,9	6,0	381,8	459,6	488,5	572,2	465,5	342,9
36,6	52,3	233,7	184,9	191,9	579,1	439,6	315,7
22,8	19,9	320,4	320,4	611,4	460,2	404,9	374,0
28,2	10,9	320,1	123,7	176,9	499,3	436,8	261,5
17,2	17,2	419,3	321,6	330,2	542,7	723,3	476,7
71,9	61,6	327,9	201,9	191,7	379,2	579,1	325,8
69,1	19,5	329,9	195,6	140,8	247,7	602,4	333,8
47,8	23,7	395,6	221,0	315,9	341,9	485,4	440,5
46,0	40,9	641,0	574,6	260,5	533,8	429,1	319,2
19,2	16,8	118,5	87,7	77,8	123,1	308,4	278,8
22,6	13,8	84,6	95,5	46,6	171,3	194,6	317,1

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Grudzień 1960	Grudzień 1959	Mediana 1956-1959	Zestawienie kumu- lacyjne I—XII/1960	Zestawienie kumu- lacyjne I—XII/1959
Dur brzuszny — 040	252	254	316	3,462	4.254
Dury rzekome ABC — 041	23	20	29	418	448
Czerwonka — 045	400	527	393	5.801	7.552
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.454	1.815	1.608	26,476	42.491
Botulismus — 049	2	9	13	187	141
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	96	48	19	1.202	764
	inne — 049	435	389	204	4.982
Włośnica — 128	58	18	16	2.114	1.129
Zakaźne zap. wątr. — 092	7.539	9.632	4.757	75.810	75.438
Porażenie dziec. nagm. — 080	15	43	86	297	1.112
Błonica — 055	528	740	1.086	6.393	10.175
Płonica — 050	4.655	7.122	5.784	50.800	71.788
Odra — 085	13.952	8.958	9.188	84.328	115.433
Krzusiec — 056	7.822	5.154	5.761	96.027	70.195
Zap. przyusz. nagm. — 089	7.956	4.184	3.864	60,107	44.858
Zapalenie opon mózgow.-rdzen. nagminne — 057	63	63	88	879	1.138
Grypa 480 — 483	35.085	25.844	22.039	228.293	1.969.234
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	17	29	30	265	273
Zimnica 110—117	1	1	2	14	13
Wścieklizna 094	—	—	—	4	1
Choroba Banga — 044	7	4	4	51	55
Tężec — 061	20	15	12	306	382
Róża — 052	134	206	199	1.760	2.121

CDW Cieszyn 362/61 260 N-14

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny