

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15, TEL. 313-441, w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Rok 1961

EGZ. NR 000226

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiczna Polski w roku 1961

W roku 1961 notuje się poprawę sytuacji epidemicznej kraju w stosunku do lat poprzednich. Znaczne osiągnięcia zanotowano w zwalczaniu nagminnego porażenia dziecięcego i błonicy oraz jelitowych chorób infekcyjnych.

Ciągle i gwałtowne narastanie krzywej na zakaźne zapalenie wątroby uległo w 1961 r. zahamowaniu.

Sytuacja epidemiczna kraju w roku 1961 na tle sytuacji w okresie ostatnich 4 lat (1958—1961) przedstawia się następująco.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny i dury rzekome

a) Dur brzuszny

W roku 1961 zarejestrowano najniższą liczbę zachorowań (2.883) nie rejestrowaną dotąd w Polsce.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w Polsce w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	4 633	16,0
1959	4 254	14,5
1960	3 464	11,7
1961	2 883	9,7

W roku 1961 wystąpiły 2 większe ogniska duru brzuszego. 1) Styczeń — woj. Warszawskie, pow. Ciechanów — 16 zach.

W toku dochodzenia epidemiologicznego nie ustalono konkretnego źródła zakażenia — przypadki szerzyły się drogą kontaktu.

2) Listopad — woj. Kieleckie, pow. Opoczno (Drzewica) — 15 zach. Zachorowania spowodowane były złym stanem sanitarnym zakładu — Wytwórnia Wyrobów Nożowniczych „Gerlach”.

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku w latach 1958—1961

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem %
1958	3,0	39,7	22,7	26,7	7,9	100
1959	3,5	39,4	23,2	26,6	7,3	100
1960	3,6	39,3	23,2	26,3	7,6	100
1961	3,1	37,6	23,9	27,4	8,0	100

**Procentowy udział liczby zachorowań w latach 1958—1961
przedstawia się następująco:**

Rok spr.	M i e s i ą c e												Ra- zem %
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	
1958	6,7	7,8	7,1	6,3	6,4	7,4	8,5	10,9	12,3	11,0	8,1	7,5	100
1959	7,7	6,7	5,5	4,9	5,3	5,6	8,4	11,9	19,4	11,6	7,0	6,0	100
1960	7,1	8,1	8,6	5,2	6,4	6,6	7,1	10,8	13,3	10,1	9,3	7,4	100
1961	9,2	8,1	6,5	6,2	7,9	7,1	8,7	10,1	10,7	8,9	9,4	7,2	100

Jak wynika z tabeli stosunkowo duża część zachorowań występuje w miesiącach zimowych.

W roku 1961 objęto szczepieniami p/durowi brzuszemu 8 353 175 osób. Szczepiono grupy ludności powiatów endemicznych i powiatów o dużej liczbie nosicieli.

b) Dury rzekome

W roku 1961 stwierdza się obniżenie wskaźnika zapadalności na dury rzekome w stosunku do lat poprzednich.

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w Polsce
w latach 1958—1961**

R o k	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	750	2,6
1959	448	1,5
1960	422	1,4
1961	400	1,3

W roku 1961 i latach poprzednich uległa znacznej poprawie rejestracja i nadzór nad nosicielami pałeczek typhi i paratyphi A, B, C.

W ostatnich latach (1958—1961) zgłaszane są głównie zachorowania sporadyczne na dury rzekome.

Na dzień 31. XII. 1961 r. było zarejestrowanych 4 228 stałych nosicieli. Z 2 631 typowanych w 1961 r. nosicieli najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
E _{1a}	497	18,9
F ₁	393	14,9
A	293	11,1
D ₁	192	7,3
C ₁	125	4,7
E _{1b}	102	3,9

Z 2742 ognisk epidemicznych S. typhi w roku 1961 najczęściej występowały następujące typy:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba ognisk	%
E _{1a}	594	21,7
F ₁	363	13,2
A	290	10,6
D ₁	198	7,2
E _{1b}	151	5,5
C ₁	144	5,2

2. Czerwonka

W roku 1961 zanotowano znaczny wzrost liczby rejestrowanych przypadków, który był między innymi wynikiem bardziej skrupulatnej rejestracji.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w Polsce w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	6 632	22,9
1959	7 552	26,0
1960	5 970	20,2
1961	10 034	33,7

Do województw o bardzo wysokim wskaźniku należy zaliczyć północne województwa oraz woj. Wrocławskie, m. Warszawę i m. Kraków.

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku w latach 1958—1961

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem %
1958	13,3	14,6	15,5	43,2	13,4	100
1959	13,1	13,1	15,6	43,4	14,8	100
1960	13,6	15,5	14,3	42,7	13,9	100
1961	14,5	15,9	14,4	41,6	13,6	100

Zgłaszane są w większości przypadki hospitalizowane i potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Czerwonka w Polsce w latach 1958—1961 według czynnika etiologicznego

Rok	Sh. Flexneri		Sh. Sonnei		Sh. Shigae-Schmitzi		I n n e	
	l. zach.	%	l. zach.	%	l. zach.	%	l. zach.	%
1958	1 524	68,9	621	28,1	31	1,4	36	1,6
1959	2 542	70,5	1 013	28,0	25	0,7	31	0,8
1960	2 618	74,9	837	23,9	18	0,5	26	0,7
1961	3 427	60,7	2 780	38,6	16	0,3	24	0,4

Powyzsza tabela obejmuje typy pałeczek Shigella występujące w Polsce, według danych ze skróconych wywiadów epidemiologicznych, z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne — form. E. II-12.

Liczba zgonów i umieralność*) z powodu czerwonki na 100 000 ludności w latach 1958—1961

1958		1959		1960		1961	
liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność
48	0,16	119	0,40	48**	0,16**	31**	0,10**

3. Biegunki u dzieci do lat 2

Wiarygodność rejestracji biegunek w Polsce u dzieci do lat 2 należy rozpatrywać z dużymi zastrzeżeniami ze względu na stosunkowo niedostateczną jeszcze zgłaszalność. W rzeczywistości zachorowania na biegunki w Polsce prawdopodobnie znacznie przekraczają liczby, które tu przedstawiono.

Zachorowania i zapadalność na biegunki do lat 2 w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 (w grupie wieku od 0—2 lat)
1958	38 592	1 764,7
1959	42 491	2 084,6
1960	26 576	1 293,5
1961	29 661	1 521,1

4. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba zbiorowych ognisk zatruc pokarmowych zarejestrowana w 1961 roku wynosi 104 o łącznej liczbie zachorowań 3 242 osoby. W stosunku do roku 1960 liczba ognisk jest mniejsza o 10, a liczba zachorowań o 101.

W roku 1961 ognisk spowodowanych czynnikami bakteryjnymi zanotowano — 64 — 2 454 osoby, nie ustalonymi — 27 — 701 chorych, grzybami — 11 — 70 chorych oraz 2 ogniska — 17 chorych czynnikami chemicznymi.

Procentowy udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych w 1961 r. przedstawia się następująco:

Produkty żywnościowe	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	% ognisk	% zachorowań	Salmonella		Gronkowce		Cl. perfringus		Cl. Botulizmus		Inne drobnoustroje		Czynnik nie ustalony	
					L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.	L. ognisk	L. zach.
Mięso i przetwory	50	1637	54,9	51,9	9	262	22	818	1	100	2	10	10	338	6	109
Przetwory mleczne	15	724	16,5	22,9	1	23	10	565	—	—	—	—	1	71	3	65
Inne produkty	26	794	28,6	25,2	1	9	6	238	—	—	—	—	1	20	18	527
R a z e m	91	3155	100,0	100,0	11	294	38	1621	1	100	2	10	12	429	27	701

5. Włośnica

W roku 1961 notuje się zmniejszenie liczby zgłoszonych przypadków szczególnie w stosunku do roku 1959 i 1960.

Liczba zachorowań w latach 1958—1961.

1958	1959	1960	1961
342	1129	2258	328

W roku 1961 woj. Warszawskie zgłosiło 107 zachorowań

„ Lubelskie 61
 „ Białostockie 39

6. Zakaźne zapalenie wątroby

W roku 1961 w stosunku do 1960 r. obserwuje się znaczny spadek wskaźnika zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby. Spadek ten występuje we wszystkich województwach.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	43 724	151,4
1959	75 438	260,1
1960	76 193	258,4
1961	57 028	191,8

**Zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku
w latach 1958—1961**

Rok	0—2	3—6	7—13	14—17	18—24	25—39	40—49	50—59	60 i wię- cej	Zapad. krajowa
1958	58,7	380,4	362,3	152,4	132,9	97,6	56,8	62,0	50,4	151,4
1959	90,5	690,8	702,8	294,9	200,3	144,6	72,6	82,5	70,4	260,1
1960	84,4	603,8	575,2	290,7	217,8	129,5	143,1	93,4	73,1	258,4
1961	68,1	401,7	380,2	221,1	201,6	148,4	92,4	105,5	96,0	191,8

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku w latach 1958—1961

Rok	0—2	3—13	14—24	25—49	50 i więcej	Razem ‰
1958	2,9	56,7	15,5	18,2	6,7	100
1959	2,6	61,7	14,9	15,3	5,5	100
1960	2,5	58,3	15,5	17,2	6,5	100
1961	2,3	51,3	14,7	22,0	9,7	100

Z powyższej tabeli wynika, że nasilenie epidemiczne w ostatnich latach miało miejsce w grupach wiekowych dziecięcych i młodzieżowych oraz, że zachorowania przesuwają się w kierunku starszych grup wiekowych.

**Odsetek hospitalizacji chorych na zakaźne zapalenie wątroby
w Polsce w latach 1958—1964**

1958	1959	1960	1961
81,4	78,4	85,1	92,1

W roku 1961 w akcji zapobiegawczej przeciwko zakaźnemu zapaleniu wątroby zużyto 262 460 ml gamma globuliny.

7. Porażenie dziecięce nagminne

W roku 1961 zgłoszono 128 przypadków zachorowań na poliomyelitis. 32 przypadki zostały odwołane z rejestru zachorowań przez lekarzy leczących. W wyniku szczegółowej analizy klinicznej, wirusologicznej i epidemiologicznej 84 przypadki ustalono jako poliomyelitis.

12 przypadków zachorowań, które nie budziły wątpliwości klinicznych jako poliomyelitis, lecz badaniami wirusologicznymi ustalono inny czynnik etiologiczny (inne enterowirusy) ujęto retrospektywnie w grupę parapolomyelitis.

**Tabela przedstawia liczbę zachorowań na poliomyelitis i parapolioomyelitis
w roku 1961 według województw i miesiąca zachorowania**

Województwo	ogółem		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII		
	polio	p. polio	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	
																											84
M. st. Warszawa	1	4	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Warszawskie	6	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bydgoskie	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poznańskie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Łódź	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Łódzkie	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kieleckie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lubelskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Białostockie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Olsztyńskie	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gdańskie	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Koszalińskie	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Szczecińskie	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zielonogórskie	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Wrocław	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wrocławskie	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Opolskie	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Katowickie	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Kraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krakowskie	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rzeszowskie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

p. — poliomyelitis
pp. — parapolioomyelitis

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w Polsce w latach 1958—1961**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	6 090	21,1
1959	1 112	3,8
1960	301	1,0
1961	96	0,3

W roku 1961 nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, woj. Lubelskiego, Białostockiego i m. Krakowa.

**Liczba bezwzględna przypadków na poliomyelitis
w grupach wieku w roku 1961**

Rok	0—3	4—7	8—14	15 i więcej	Razem
1961	54	22	8	12	96

Sezonowość kwartałami w latach 1958—1961

Rok	I	II	III	IV	Razem
1958	123	360	3 549	2 058	6 090
1959	271	146	483	212	1 112
1960	113	79	60	49	301
1961	23	43	23	7	96

W roku 1961 zaszczepiono I typem wirusa — 758 716 dzieci — wykonując szczepienia w 74,8%, typem III wirusa — 699 418 dzieci wykonując szczepienia w 76,3% oraz typem II wirusa 1 948 352 dzieci z terenu m. Warszawy, woj. Bydgoskiego, Białostockiego, Olsztyńskiego i Katowickiego.

W roku 1961 szczepienia podskórne (2 wstrzyknięcia) otrzymało 667 884 dzieci.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Grypa

Liczba zachorowań i zapadalność w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	145 640	504,2
1959	1 969 234	6 790,5
1960	230 425	781,6
1961	580 224	1 951,6

**Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności
w latach 1958—1961**

Rok	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1958	806,5	416,8	139,9	704,4
1959	22 790,7	3 228,7	222,1	933,8
1960	982,3	734,8	280,4	1 136,3
1961	5 635,0	920,5	235,4	1 042,1

W roku 1961 w I kw. notowano epidemiczne nasilenie zachorowań, które dało 417 409 przypadków.

2. Błonica

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w latach 1958—1961**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	11 090	38,4
1959	10 175	35,1
1960	6 380	21,6
1961	4 589	15,4

W roku 1961 wyższe wskaźniki od krajowego zanotowano w:

woj. Wrocławskim	— 43,5
woj. Kieleckim	— 42,9
m. Krakowie	— 32,6
m. Łodzi	— 21,9
woj. Koszalińskie	— 19,2
m. Poznaniu	— 19,1
woj. Katowickim	— 16,9
woj. Krakowskim	— 16,9

Z terenu 5 województw: Kieleckiego (780), Wrocławskiego (783), Katowickiego (553), Krakowskiego (337) i Lubelskiego (258) zgłoszono 59% wszystkich zachorowań.

Wszystkie województwa z wyjątkiem Kieleckiego, Olsztyńskiego, m. Wrocławia i m. Krakowa notują spadek zachorowań w roku 1961 w stosunku do roku 1960.

**Liczba zgonów i umieralność*) z powodu błonicy
na 100 000 ludności w latach 1958—1961**

1958		1959		1960		1961	
Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność
497	1,70	491	1,65	295**	0,99**	205**	0,69**

W roku 1961 otrzymało szczepienia podstawowe (3 wstrzyknięcia) — 904 298 dzieci, co stanowi 58,0⁰/₀ w stosunku do liczby podlegających.

W tym zaszczepiono szczepionką skojarzoną (błonica-tężec-krztusiec, błonica-tężec) — 776 060 dzieci.

Ponadto szczepieniami powtórными w 4 i 7 roku życia objęto — 805 645 dzieci, co stanowi 80⁰/₀ w stosunku do liczby podlegających.

W tym zaszczepiono szczepionką skojarzoną (błonica-tężec-krztusiec, błonica-tężec) — 433 005 dzieci.

3. Płonica

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w latach 1958—1961**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	63 599	220,2
1959	71 788	247,5
1960	50 842	172,5
1961	44 445	149,5

W roku 1961 notuje się znaczny spadek liczby rejestrowanych przypadków.

**Liczba zgonów i umieralność*) z powodu płonicy
na 100 000 ludności w latach 1958—1961**

1958		1959		1960		1961	
Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność
85	0,29	89	0,30	49**	0,16**	49**	0,16**

4. Odra

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w latach 1958—1961**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	73 368	254,2
1959	115 433	398,0
1960	84 531	286,7
1961	138 040	464,3

**Liczba zgonów i umieralność*) z powodu odry
na 100 000 ludności w latach 1958—1961**

1958		1959		1960		1961	
Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność
280	0,96	274	0,93	126**	0,42**	249**	0,84**

5. Krztusiec

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w latach 1958—1961**

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	70 633	244,5
1959	70 195	242,0
1960	95 968	325,5
1961	53 026	178,3

W roku 1961 w stosunku do 8 poprzedzających lat zanotowano najniższą zgłoszoną liczbę zachorowań.

**Liczba zgonów i umieralność*) z powodu krztusca
na 100 000 ludności w latach 1958—1961**

1958		1959		1960		1961	
Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność	Liczba zgonów	umieralność
462	1,59	379	1,27	305**	1,02**	193**	0,65**

III. Inne schorzenia

1. Wścieklizna

W roku 1961 zgłoszono 2 przypadki wścieklizny:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) woj. Lubelskie, pow. Lublin, | — 1 zach. |
| 2) woj. Warszawskie, pow. Garwolin | — 1 zach. |

2. Wąglik

W roku 1961 zgłoszono 9 zachorowań:

- 3 zachorowania z terenu woj. Bydgoskiego (pow. Brodnica, Mogilno).
6 zachorowań zgłoszono z wo¹. Lubelskiego (pow. Opole Lubelskie, Włodawa i m. Lublin).

3. Tęžec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności
w latach 1958—1961

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000
1958	369	1,28
1959	382	1,32
1960	304	1,03
1961	362	1,22

W roku 1961 najwyższe liczby zachorowań zgłoszono z terenu woj. Rzeszowskiego — 71, Krakowskiego — 65, Wrocławskiego — 40, Warszawskiego — 23, Lubelskiego — 21 i Kieleckiego — 20 zachorowań.

*) Zgony o przyczynie stwierdzonej i nie stwierdzonej przez lekarza.
Dane GUS.

***) Dane tymczasowe.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagn. Polioomyelitis anterior acuta
						Salmonelozy	Inne			
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	754-571	049	042	049	128	092	080
POLSKA	1960	422	5970	26576	202	1213	5325	2258	76193	301
	1961	2883	400	10034	204	969	5735	328	57028	96
M. st. Warszawa	104	17	757	1159	2	36	262	18	2362	5
Warszawskie	411	31	541	2911	2	4	273	107	2977	7
Bydgoskie	268	52	919	1610	35	134	256	14	2807	4
M. Poznań	13	5	172	641	—	12	110	—	1332	—
Poznańskie	113	6	272	1303	94	42	175	1	3419	1
M. Łódź	73	6	344	1417	—	35	616	25	1796	4
Łódzkie	173	9	188	784	—	16	135	4	2263	7
Kieleckie	281	9	36	1327	—	78	384	2	2374	2
Lubelskie	144	22	363	421	—	6	173	61	2702	—
Białostockie	108	100	625	1810	9	5	110	39	1373	—
Olsztyńskie	121	3	769	1519	—	42	102	2	1533	8
Gdańskie	142	9	1167	2752	3	163	434	17	2522	5
Koszalińskie	36	—	435	1755	1	8	111	24	1037	7
Szczecińskie	73	6	332	401	9	14	444	—	1791	4
Zielonogórskie	60	11	342	765	2	41	86	2	1320	5
M. Wrocław	22	—	206	1027	1	43	554	2	1302	1
Wrocławskie	169	12	1222	2441	19	111	651	—	3699	8
Opolskie	94	4	58	418	9	4	230	4	2126	9
Katowickie	176	59	770	3348	6	86	135	6	10126	9
M. Kraków	39	19	260	722	—	25	303	—	1205	—
Krakowskie	158	9	228	388	3	64	158	—	4019	7
Rzeszowskie	105	11	28	742	9	—	33	—	2943	3

* Liczby bezwzględne

Bionica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyszysznic nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagr. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
6380	50842	84531	95968	60301	883	230425	265	13	4	54	304	1766
4589	44445	138040	53026	69057	951	580224	207	3	2	52	362	1755
66	5528	15976	4340	9770	81	71201	14	—	—	1	4	132
186	2312	7140	3702	3055	31	7798	16	—	1	4	23	136
94	2453	7739	2388	4834	41	12981	2	—	—	2	17	118
78	971	4192	1441	2005	3	3435	—	—	—	1	1	28
155	2068	7441	2849	2464	34	15125	2	1	—	14	16	84
155	2506	5241	1423	2564	1	115757	8	—	—	1	2	180
125	1471	4878	1444	2281	32	14482	5	—	—	4	12	83
780	1563	5259	2789	3101	72	21853	14	—	—	—	20	76
258	1301	4912	2536	2001	17	23993	28	—	1	—	21	64
79	974	2964	1125	2108	42	4723	38	—	—	3	9	50
71	1182	3814	1291	1511	103	9493	11	—	—	3	17	48
43	3029	10673	3539	4726	35	41103	15	1	—	1	2	96
132	975	4333	2681	1282	24	5015	10	—	—	1	2	21
88	1655	5736	2272	3276	24	6530	4	—	—	2	6	36
77	1057	4899	1828	2510	15	4346	9	—	—	3	7	48
63	945	2934	1091	2208	4	15339	2	—	—	2	2	72
783	2737	8209	3483	3468	139	13941	9	—	—	8	40	131
142	979	3741	1651	1728	66	13016	2	—	—	—	11	70
553	5256	16849	6292	7670	63	100581	3	—	—	1	14	120
156	2069	4311	1394	2258	4	33599	2	—	—	—	—	35
337	2056	3996	1994	2658	26	28196	5	1	—	—	65	85
168	1358	2803	1473	1579	94	17717	8	—	—	1	71	42

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica				
	040		041		045 — 048		080					055		050		056
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej																
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	11,7	9,7	1,4	1,3	20,2	33,7	1,0	0,3	21,6	15,4	172,5	149,5	325,5	178,3	258,4	191,8
M. st. Warszawa	12,9	9,1	3,4	1,5	46,8	66,6	2,3	0,4	9,7	5,8	429,0	486,6	605,1	382,0	328,2	207,9
Warszawskie	18,3	17,7	0,9	1,3	13,3	23,4	1,2	0,3	11,8	8,0	113,2	99,9	228,1	159,9	181,8	128,6
Bydgoskie	12,0	15,7	2,1	3,0	32,0	53,9	1,1	0,2	9,0	5,5	193,6	143,8	421,4	140,0	226,5	164,5
M. Poznań	5,5	3,2	—	1,2	25,9	42,2	1,0	—	22,6	19,1	244,4	238,1	795,7	353,3	485,6	326,6
Poznańskie	7,3	5,7	0,7	0,3	14,3	13,6	0,4	0,1	10,0	7,8	135,4	148,9	239,7	142,9	301,2	171,5
M. Łódź	13,8	10,3	4,0	0,8	34,2	48,6	1,4	0,6	37,5	21,9	477,9	353,7	474,2	200,9	336,6	253,5
Łódzkie	14,5	10,8	2,5	0,6	10,0	11,8	0,5	0,4	21,0	7,8	99,6	92,1	201,7	90,4	250,3	141,6
Kieleckie	23,7	15,4	1,0	0,5	1,4	1,7	1,0	0,1	39,3	42,9	77,9	86,0	154,8	153,4	135,9	130,6
Lubelskie	8,7	8,1	1,9	1,2	10,3	20,4	1,0	—	22,4	14,5	48,3	73,1	167,2	142,5	189,6	151,8
Białostockie	9,1	9,9	3,2	9,2	34,9	57,3	0,5	—	11,2	7,2	82,1	89,4	182,4	103,2	173,5	126,0
Olsztyńskie	17,3	13,8	0,9	0,3	38,6	87,7	1,6	0,9	3,5	8,1	214,2	134,8	356,3	147,2	220,9	174,9
Gdańskie	18,3	11,6	1,1	0,7	54,2	95,6	0,7	0,4	5,0	3,5	296,8	248,3	797,3	290,1	313,5	206,7
Koszalińskie	7,4	5,2	0,4	—	22,6	63,4	0,7	1,0	21,7	19,2	150,5	142,0	406,2	390,6	275,7	151,1
Szczecińskie	8,1	9,7	0,5	0,8	42,5	44,0	0,8	0,5	23,8	11,6	206,5	219,3	453,0	301,0	299,2	237,3
Zielonogórskie	10,4	7,7	2,8	1,4	42,8	44,0	2,7	0,6	9,9	9,9	149,9	136,0	573,7	235,2	270,9	169,8
M. Wrocław	4,4	5,1	0,7	—	20,3	48,0	1,4	0,2	13,5	14,7	273,6	220,1	502,3	254,2	404,1	303,3
Wrocławskie	10,1	9,4	0,3	0,7	17,9	67,9	1,3	0,4	61,6	43,5	229,7	152,2	313,8	193,6	303,2	205,6
Opolskie	11,3	10,1	0,2	0,4	5,2	6,2	2,1	1,0	34,1	15,3	174,1	105,6	254,3	178,0	317,1	229,2
Katowickie	6,6	5,4	1,6	1,8	16,6	23,6	0,5	0,3	28,9	16,9	240,4	161,0	368,6	192,8	336,3	310,3
M. Kraków	7,8	8,1	3,4	4,0	51,6	54,3	0,4	—	31,1	32,6	278,1	431,9	617,5	291,0	275,4	251,6
Krakowskie	9,8	7,9	0,4	0,4	6,9	11,5	0,7	0,3	18,6	16,9	93,9	103,3	110,1	100,2	224,4	202,0
Rzeszowskie	10,4	6,6	1,1	0,7	1,7	1,8	1,1	0,2	16,2	10,6	71,4	85,6	223,2	92,8	204,9	185,4

*) Zapadalność roczna na 100 000 ludności

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1961	Rok 1960	Mediana 1957—1960
Dur brzuszny — 040	2 883	3 464	4 619
Dury rzekome A.B.C. — 041	400	422	580
Czerwonka 045—048	10 034	5 970	7 270
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	29 661	26 576	44 682
Botulismus — 049	204	202	197
Zatrucia pokarmowe { Salmonelozy 042 inne — 049	969	1 213	890
	5 735	5 325	4 082
Włośnica — 128	328	2 258	889
Zakaźne zap. wątroby — 092	57 028	76 193	50 893
Porażenie dziec. nagm. — 080	96	301	1 139
Blonica — 055	4 589	6 380	13 018
Płonica — 050	44 445	50 842	50 373
Odra — 085	138 040	84 431	89 156
Krzusiec — 056	53 026	95 968	69 174
Zap. przyusz. nagm. — 089	69 057	60 301	40 808
Zapalenie opon mózgow.-rdzen. nagminne — 057	951	883	1 229
Grypa 480 — 483	580 224	230 425	1 099 829
Dur wysypkowy sporadyczny			
Choroba Brill'a 100 — 102	207	265	321
Zimnica 110—117	3	13	23
Wścieklizna — 094	2	4	2
Choroba Banga — 044	52	54	78
Tężec — 061	362	304	368
Róża — 052	1 755	1 766	2 066

CDW Cieszyn 1933/62 260 G-019

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Styczeń 1961

EGZ. NR 208

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna kraju w styczniu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W styczniu 1961 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zanotowano niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 9,8 — I/1960 do 10,5 — I/1961.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach: Warszawskim — 23,0; Kieleckim — 17,2; Bydgoskim — 15,2; Gdańskim — 14,6; Szczecińskim — 12,6; Wrocławskim — 12,6 i Lubelskim — 12,3.

W miesiącu sprawozdawczym na terenie woj. Warszawskiego w m. Ciechanowie zanotowano ognisko epidemiczne duru brzuszego, które objęło 16 zachorowań. W toku dochodzenia epidemiologicznego nie ustalono konkretnego źródła zakażenia — przypadki szerzyły się drogą kontaktu.

W porównaniu z grudniem 1960 r. wskaźnik zapadalności utrzymuje się prawie na jednakowym poziomie (10,3 — XII/1960; 10,5 — I/1961).

2. Dury rzekome

W styczniu zanotowano 23 zachorowania sporadyczne.

3. Czerwonka

Wskaźnik zapadalności w porównaniu ze styczniem ub. r. wzrósł z 15,1 — I/1960 do 17,5 — I/1961.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w następujących województwach: Lubelskim, Olsztyńskim, Krakowskim, Bydgoskim, Gdańskim i m. Krakowie. Najniższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Kieleckim, Rzeszowskim, Łódzkim i Opolskim.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności z 16,2 — XII/1960 do 17,5 — I/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z terenu woj. Opolskiego pow. Prudnik, pochodzące z grudnia 1960 r. (data zachor. 20. XII.).

W styczniu 1960 r. zgłoszono 38 zachorowań, a w grudniu 1960 r. 15 zachorowań.

W miesiącu lutym b.r. zgłoszono 9 zachorowań w tym 4 zachorowania miały miejsce w styczniu 1961 r.

2 zach. w woj. Wrocławskim (Dzierżoniów i Nowa Ruda)

1 zach. w woj. Olsztyńskim (Lidzbark Warmiński)

1 zach. w woj. Katowickim (m. Bytom).

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 362,4 — I/1960 do 268,0 — I/1961.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1960 r. zanotowano w woj. Warszawskim, Lubelskim i Rzeszowskim. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 508,8 m. Łodzi — 328,7; m. Krakowie — 314,8; woj. Katowickim — 382,9 i Opolskim — 309,1.

Bardzo znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1960 r. zanotowano w woj. Zielonogórskim (458,7 — I/1960; 174,4 — I/1961).

W porównaniu z grudniem ub. r. wskaźnik obniżył się z 306,1 — XII/1960 do 268,0 — I/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności obniżył się z 26,2 — I/1960 do 22,1 — I/1961.

Następujące województwa wykazały wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1960 r.

Województwo (miasto)	I/1960	I/1961
m. Łódź	28,5	58,7
m. Kraków	32,2	42,1
m. Poznań	17,7	29,6
Olsztyńskie	2,7	16,1
Koszalińskie	22,3	32,6
Szczecińskie	22,0	31,5
Krakowskie	17,2	24,6
POLSKA	26,2	22,1

Najniższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Gdańskim — 6,8; Zielonogórskim — 7,6; Białostockim — 8,5 i Warszawskim — 8,5.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca zanotowano niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 21,4 — XII/1960 do 22,1 — I/1961.

2. Płonica

Zapadalność na płonicę obniżyła się w porównaniu ze styczniem ub. r. z 228,7 — I/1960 do 152,2 — I/1961. Znaczny spadek zapadalności zanotowano w m. Łodzi, m. Poznaniu, woj. Bydgoskim, Łódzkim, Kieleckim, Olsztyńskim i Katowickim.

W porównaniu z grudniem 1960 r. zapadalność obniżyła się ze 189,0 — XII/1960 do 152,2 — I/1961.

3. Krztusiec

W dalszym ciągu notujemy wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. Proces ten obserwujemy od marca 1960 r.

W porównaniu ze styczniem r. ub. wskaźnik zapadalności wzrósł z 235,8 — I/1960 do 279,5 — I/1961, natomiast w porównaniu z grudniem 1960 wskaźnik obniżył się z 317,6 — XII/1960 do 279,5 — I/1961.

4. Grypa

W styczniu br. zgłoszono 34.341 zachorowań na grypę w stosunku do 15.865 w styczniu 1960 r.

III. Inne schorzenia

1. Wścieklizna

Zanotowano 1 zachorowanie w woj. Lubelskim, pow. Lubartów.
Chory został pokąsany przez wściekłego psa.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior scutula	Btonica-Diphtheria	Plonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagmienne Parotitis epidemica	Zepal. opon mózgz. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonelozy	Inne																
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	18	379	1238	6	27	253	82	9083	38	658	5733	7240	5909	3982	72	15865	24	1	—	2	12	181
	1961	23	438	1427	17	37	249	53	6718	1	554	3815	14789	7006	7606	46	34341	18	—	1	1	21	150
M. st. Warszawa	10	2	30	53	—	—	10	2	264	—	12	429	1320	644	1259	6	7289	—	—	—	—	—	11
Warszawskie	46	2	19	108	—	—	3	28	472	—	17	214	675	442	194	2	315	—	—	—	1	1	15
Bydgoskie	22	1	35	73	—	—	12	—	370	—	15	266	1031	349	143	2	690	1	—	—	—	2	10
M. Poznań	—	—	10	23	—	—	1	—	172	—	10	58	488	279	255	—	295	—	—	—	—	—	2
Poznańskie	5	—	19	30	16	13	12	—	494	—	30	183	453	332	320	1	1068	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	6	—	20	85	—	6	57	1	196	—	35	185	1749	280	408	—	14161	—	—	—	—	—	15
Łódzkie	15	1	5	33	—	—	1	—	281	—	16	100	448	205	293	3	480	—	—	—	—	1	5
Kieleckie	28	1	3	122	—	—	4	1	211	—	79	111	750	321	413	3	490	1	—	—	—	4	6
Lubelskie	19	2	27	13	—	—	6	1	367	—	25	54	450	299	168	2	215	2	—	1	—	1	6
Białostockie	8	2	30	84	—	—	5	11	189	—	8	62	123	99	235	4	108	—	—	—	—	—	7
Olsztyńskie	6	—	42	80	—	—	—	2	154	—	12	116	483	181	128	4	260	1	—	—	—	—	3
Gdańskie	15	—	69	173	—	10	29	4	273	—	7	425	992	505	415	1	619	1	—	—	—	—	10
Koszalińskie	1	—	10	106	—	—	1	—	132	—	19	98	142	302	197	2	196	8	—	—	—	—	4
Szczecińskie	8	1	10	52	—	2	14	—	177	—	20	229	991	323	297	1	161	1	—	—	—	—	4
Zielonogórskie	5	2	15	47	—	—	7	1	116	—	5	95	231	239	220	2	474	1	—	—	—	—	—
M. Wrocław	1	—	3	76	—	3	18	2	167	—	5	85	544	127	246	—	195	—	—	—	—	—	7
Wrocławskie	19	—	16	83	1	1	3	—	401	—	87	226	733	417	377	3	808	1	—	—	—	1	7
Opolskie	5	—	3	31	—	—	2	—	241	1	20	93	175	159	216	2	721	—	—	—	—	—	4
Katowickie	18	6	32	116	—	—	2	—	1058	—	56	171	2091	977	1276	4	4874	—	—	—	—	2	18
M. Kraków	4	3	17	6	—	—	61	—	127	—	17	384	295	201	347	—	394	—	—	—	—	—	5
Krakowskie	19	—	19	11	—	2	1	—	492	—	43	143	464	148	180	3	236	1	—	—	—	4	5
Rzeszowskie	4	—	4	22	—	—	—	—	364	—	16	88	161	177	119	1	292	—	—	—	—	5	4

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzztusiec Pertussis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna				
	040		041		045		080					055		056		092
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej																
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961		
POLSKA	9,8	10,5	0,7	0,9	15,1	17,5	1,5	0,04	26,2	22,1	228,7	152,2	235,8	279,5	362,4	268,0
M. st. Warszawa	10,6	10,6	2,1	2,1	40,4	31,9	4,2	—	17,0	12,8	558,4	456,3	680,7	684,9	491,4	280,8
Warszawskie	15,0	23,0	0,5	1,0	5,5	9,5	1,0	—	12,5	8,5	122,0	107,0	160,6	221,1	218,6	236,1
Bydgoskie	9,7	15,2	2,8	0,7	14,5	24,2	2,1	—	9,7	10,4	317,9	183,8	346,2	241,1	307,5	255,7
M. Poznań	8,9	—	—	—	26,6	29,6	8,9	—	17,7	29,6	393,4	171,6	541,4	825,4	662,6	508,8
Poznańskie	10,5	2,9	—	—	12,3	11,1	1,7	—	14,6	17,5	178,5	107,1	177,9	194,3	455,9	289,1
M. Łódź	6,7	10,1	—	—	33,5	33,5	5,0	—	28,5	58,7	790,0	310,3	216,3	469,6	483,0	328,7
Łódzkie	8,7	10,9	—	0,7	12,3	3,6	0,7	—	38,5	11,6	130,7	72,6	78,4	148,8	397,1	204,0
Kieleckie	20,2	17,2	—	0,6	1,2	1,8	—	—	47,9	48,5	119,6	68,1	96,3	197,0	186,5	129,5
Lubelskie	4,5	12,3	0,6	1,3	4,5	17,6	1,3	—	26,7	16,3	51,4	35,1	96,3	194,5	221,2	238,7
Białostockie	14,9	8,5	1,1	2,1	38,5	32,0	1,1	—	10,7	8,5	105,8	66,2	137,8	105,8	244,7	201,9
Olsztyńskie	5,4	8,0	1,3	—	26,8	56,3	4,0	—	2,7	16,1	300,4	155,5	171,6	242,7	315,1	206,5
Gdańskie	12,7	14,6	—	—	46,8	67,2	1,9	—	6,8	6,8	466,9	414,2	447,4	492,2	443,5	266,1
Koszalińskie	13,7	1,7	3,4	—	20,6	17,1	—	—	22,3	32,6	185,1	167,2	190,2	517,6	387,3	226,2
Szczecińskie	4,7	12,6	—	1,6	29,9	15,7	1,6	—	22,0	31,5	231,4	360,5	508,4	508,4	327,4	278,6
Zielonogórskie	7,6	7,6	—	3,0	22,9	22,9	4,6	—	16,8	7,6	211,0	145,5	408,3	365,4	458,7	174,4
M. Wrocław	2,7	2,7	—	—	19,2	8,2	2,7	—	16,5	13,7	337,6	233,3	381,5	348,6	697,1	458,3
Wrocławskie	7,3	12,6	0,7	—	18,0	10,6	1,3	—	74,6	57,9	243,1	150,5	213,1	277,7	452,2	267,1
Opolskie	5,1	6,4	—	—	5,1	3,8	1,3	1,3	41,0	25,6	177,0	119,3	200,1	203,9	500,2	309,1
Katowickie	2,5	6,5	1,4	2,2	9,0	11,6	—	—	42,0	20,3	312,7	139,0	338,7	353,4	465,0	382,9
M. Kraków	4,9	9,9	—	7,4	29,7	42,1	—	—	32,2	42,1	354,5	423,9	297,4	498,2	349,5	314,8
Krakowskie	10,3	10,9	0,6	—	0,7	10,9	0,6	—	17,2	24,6	108,1	81,8	88,7	84,7	325,5	281,5
Rzeszowskie	17,5	2,9	—	—	4,0	2,9	0,7	—	12,4	11,6	82,9	64,0	61,8	128,8	208,3	264,9

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Styczeń 1961	Styczeń 1960	Mediana 1957—1960
Dur brzuszny — 040	264	245	314
Dury rzekome ABC — 041	23	18	25
Czerwonka — 045	438	379	370
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.427	1.238	1.453
Botulismus — 049	17	6	5
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042 inne — 049	37	27	18
	249	253	149
Włośnica — 128	53	82	84
Zakaźne zap. wątr. — 092	6.718	9.083	5.031
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	38	56
Błonica — 055	554	658	1.132
Płonica — 050	3.815	5.733	5.189
Odra — 085	14.789	7.240	9.027
Krztusiec — 056	7.006	5.909	6.931
Zap. przyusz. nagm. — 089	7.606	3.982	3.620
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	46	72	86
Grypa 480 — 483	34.341	15.865	17.171
Dur wysypkowy sporađyczny Choroba Brillą 100—102	18	24	25
Zimnica 110—117	—	1	1
Wścieklizna — 094	1	—	—
Choroba Banga — 044	1	2	5
Tężec — 061	21	12	11
Róża — 052	150	181	177

CDW Cieszyn 774/61 260 S-24

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Luty 1961

EGZ. NR 98

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w lutym 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W miesiącu sprawozdawczym krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 12,3 — II/1960 do 10,5 — II/1961.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z lutym 1960 zanotowano w woj. Bydgoskim, Łódzkim, Wrocławskim, Opolskim, m. Łodzi i m. Wrocławiu.

Najwyższe wskaźniki, zanotowano w m. Łodzi — 27,8; woj. Warszawskim 20,5; Olsztyńskim — 17,8 i Bydgoskim — 16,1.

W miesiącu lutym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności utrzymuje się na tym samym poziomie (10,5 — I/1961; 10,5 — II/1961).

2. Dury rzekome

W lutym zanotowano 27 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wzrósł z 16,7 — II/1960 do 21,5 — II/1961. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z lutym r. ub. zanotowano woj. Szczecińskimi z 40,1 — II/1960 do 15,7 — II/1961; m. Krakowie z 43,9 — II/1960 do 30,2 — II/1961 i m. Warszawie z 40,0 — II/1960 do 27,1 — II/1961.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Bydgoskim — 68,1; Gdańskim — 61,5; Białostockim — 54,4; Olsztyńskim — 41,6 i m. Łodzi — 42,7.

W porównaniu ze styczniem br. wskaźnik zapadalności wzrósł z 17,5 — I/1961 do 21,5 — II/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W lutym 1961 r. zgłoszono 9 zachorowań, z których 4 miały miejsce w styczniu br.

Pozostałe 5 zachorowań wystąpiło w miesiącu lutym w następujących województwach:

1. woj. Warszawskie — 1 zach. (pow. Otwock),
2. woj. Wrocławskie — 1 zach. (pow. Lubań),
3. woj. Rzeszowskie — 3 zach. (pow. Jarosław, Jasło, m. Rzeszów).

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu analogicznym okresem r. ub. z 358,8 — II/1960 do 257,2 — II/1961.

Wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego i Rzeszowskiego wykazują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z lutym 1960 r.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w województwach: Katowickim — 393,1; Opolskim — 326,6; Szczecińskim — 291,0; Krakowskim — 283,8; Wrocławskim — 276,6 oraz miastach: Poznaniu — 393,0; Wrocławiu — 376,8 i Łodzi — 302,7.

W porównaniu ze styczniem 1961 r. zanotowano spadek wskaźnika zapadalności z 268,0 — I/1961 do 257,2 — II/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Mimo spadku krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 27,7 — II/1960 do 20,5 — II 1961 w 6 województwach zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. a mianowicie:

Województwo (miasto)	II/1960	II/1961
m. Poznań	6,5	26,2
m. Kraków	27,4	32,9
Krakowskie	17,3	32,3
Kieleckie	44,9	56,8
Olsztyńskie	4,4	10,4
Bygdoskie	4,6	9,2
POLSKA	27,7	20,5

Najwyższe wskaźniki w porównaniu z ogólnokrajowym w lutym br. zanotowano w województwach (miastach): Wrocławskim — 63,4; Kieleckim — 56,8; Krakowskim — 32,3; m. Łodzi — 33,4 i m. Krakowie — 32,9.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się z 22,1 — I/1961 do 20,5 — II/1961.

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności na płonicę obniżył się w porównaniu z lutym ub r. z 235,0 — II/1960 do 161,6 — II/1961.

Wszystkie województwa z wyjątkiem Gdańskiego, Szczecińskiego i m. Krakowa notują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zaś w woj. Lubelskim i Krakowskim wskaźnik utrzymuje się na poziomie r. ub. W porównaniu ze styczniem br. wskaźnik zapadalności wzrósł z 152,2 — I/1961 do 161,6 — II/1961.

3. Krztusiec

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 275,4 — II/1960 do 252,1 — II/1961. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 635,4; m. Krakowie — 488,5; m. Warszawie — 439,2; woj. Koszalińskim — 631,9; Gdańskim — 469,4 i Szczecińskim — 416,5.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem br. wskaźnik obniżył się z 279,5 — I/1961 do 252,1 — II/1961.

4. Grypa

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 93.700 zachorowań, w styczniu br. 34.341, a w lutym 1960 r. 25.415. Najwyższą liczbę zachorowań zgłoszono z terenu woj. Katowickiego — 41.342 i m. Łodzi — 13.672.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porazenie dziec. nagm. Poliomylitis anterior acuta	Błonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznic nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec-Tetanus	Róża Erysipelas		
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092														080	
POLSKA	1960	279	17	377	1035	21	4	209	213	8119	30	628	5316	6907	6230	5736	62	25415	26	1	—	3	7	155	
	1961	237	27	487	1433	4	35	301	37	5820	9	464	3656	16845	5704	9070	58	93700	22	—	—	3	5	113	
M. st. Warszawa	4	2	23	34	—	—	31	3	210	—	12	429	2131	373	1428	3	7440	1	—	—	—	—	—	10	
Warszawskie	37	2	24	117	2	—	1	15	831	1	10	164	782	889	320	3	413	1	—	—	—	—	1	3	
Bydgoskie	21	5	89	65	—	2	21	—	320	—	12	199	1104	344	283	5	823	—	—	—	—	—	—	4	
M. Poznań	1	—	11	36	—	1	1	—	120	—	8	59	688	194	321	1	378	—	—	—	—	—	—	4	
Poznańskie	5	—	11	49	2	—	1	—	400	—	13	155	494	398	377	1	2469	1	—	—	—	—	—	13	
M. Łódź	15	—	23	102	—	5	39	13	163	—	18	168	1105	179	450	1	13672	1	—	—	—	—	—	17	
Łódzkie	15	—	16	39	—	2	8	—	260	—	11	123	608	137	440	1	1646	1	—	—	—	—	—	4	
Kieleckie	21	1	3	82	—	—	76	—	221	—	81	98	702	251	590	6	1557	4	—	—	—	—	—	7	
Lubelskie	14	—	15	14	—	—	7	—	294	—	32	70	646	241	305	—	982	2	—	—	—	—	—	7	
Białostockie	7	2	46	73	—	—	6	6	163	—	11	61	250	96	440	6	157	5	—	—	—	—	—	1	
Olsztyńskie	12	—	28	106	—	—	3	—	171	1	7	119	554	143	242	3	390	1	—	—	—	1	—	4	
Gdańskie	3	2	57	213	—	11	23	—	245	—	6	387	1463	435	343	2	2112	1	—	—	—	—	—	5	
Koszalińskie	1	—	6	65	—	4	2	—	93	—	10	105	211	333	131	1	162	—	—	—	—	—	—	2	
Szczecińskie	5	1	9	36	—	—	15	—	167	—	11	279	1226	239	348	1	148	—	—	—	—	1	—	1	
Zielonogórskie	5	—	22	36	—	—	1	—	106	—	2	73	317	213	287	2	608	1	—	—	—	—	—	—	
M. Wrocław	3	—	6	74	—	10	6	—	124	—	2	82	566	107	209	—	624	1	—	—	—	—	—	4	
Wrocławskie	15	—	29	85	—	—	10	—	375	3	86	194	783	370	402	8	1388	—	—	—	—	1	1	9	
Opolskie	9	—	6	28	—	—	31	—	230	—	19	102	160	149	210	3	4273	—	—	—	—	—	—	2	
Katowickie	14	2	34	144	—	—	11	—	981	1	37	365	1960	621	1084	4	41342	—	—	—	—	—	—	—	4
M. Kraków	2	2	11	6	—	—	11	—	86	—	12	177	383	178	320	—	7419	—	—	—	—	—	—	5	
Krakowskie	16	1	18	2	—	—	1	—	448	—	51	154	487	163	294	1	2701	1	—	—	—	—	2	5	
Rzeszowskie	12	7	—	27	—	—	6	—	312	3	13	93	225	151	246	6	2996	1	—	—	—	—	1	2	

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	12,3	10,5	0,7	1,2	16,7	21,5	1,3	0,3
M. st. Warszawa	27,1	4,7	—	2,3	40,0	27,1	1,2	—
Warszawskie	17,2	20,5	—	1,1	10,5	13,3	2,2	0,5
Bydgoskie	9,8	16,1	—	3,8	19,9	68,1	0,8	—
M. Poznań	3,3	3,3	—	—	9,8	36,0	—	—
Poznańskie	1,3	3,2	1,3	—	9,7	7,1	1,3	—
M. Łódź	14,8	27,8	—	—	42,7	42,7	—	—
Łódzkie	6,4	12,0	—	—	11,2	12,8	—	—
Kieleckie	44,9	14,7	2,8	0,7	1,4	2,1	—	—
Lubelskie	18,7	10,1	—	—	5,8	10,8	1,4	—
Białostockie	4,7	8,2	1,2	2,4	39,0	54,4	1,2	—
Olsztyńskie	17,8	17,8	1,5	—	41,6	41,6	3,0	1,5
Gdańskie	18,3	3,2	1,1	2,1	41,0	61,5	1,1	—
Koszalińskie	13,3	1,9	—	—	15,2	11,4	—	—
Szczecińskie	7,0	8,7	—	1,7	40,1	15,7	1,7	—
Zielonogórskie	8,5	8,5	—	—	35,5	37,2	3,4	—
M. Wrocław	—	9,1	—	—	—	18,2	—	—
Wrocławskie	5,2	11,0	1,5	—	16,2	21,4	0,7	2,0
Opolskie	4,3	12,8	—	—	2,8	8,5	1,4	—
Katowickie	8,0	5,6	0,4	0,8	11,6	13,6	1,6	0,4
M. Kraków	8,2	5,5	—	5,5	43,9	30,2	2,7	—
Krakowskie	7,0	10,1	0,6	0,6	8,2	11,4	3,2	—
Rzeszowskie	8,0	9,7	3,2	5,6	—	—	0,8	2,4

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemic	
055		050		056		092	
1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
27,7	20,5	235,0	161,6	275,4	252,1	358,8	257,2
15,3	14,1	648,8	505,2	641,8	439,2	414,5	247,3
19,9	5,5	141,2	90,2	173,3	215,4	239,8	183,3
4,6	9,2	299,1	152,2	446,0	263,2	307,5	244,8
6,5	26,2	301,3	193,2	835,2	635,4	507,7	393,0
16,2	8,4	157,4	100,4	228,1	257,9	450,3	259,2
52,0	33,4	815,2	311,9	295,2	332,4	547,8	302,7
28,9	8,8	133,4	98,8	121,3	110,1	376,1	209,0
44,9	56,8	107,3	68,7	128,3	176,0	214,6	155,0
31,7	23,0	50,0	50,4	75,6	173,6	197,3	211,7
14,2	13,0	78,1	72,1	165,6	113,5	236,6	192,8
4,4	10,4	345,9	176,7	331,1	212,3	362,3	253,9
10,8	6,5	376,6	417,6	714,4	469,4	441,3	264,4
32,2	19,0	254,3	199,2	343,4	631,9	364,3	176,5
27,9	19,2	285,8	486,2	440,9	416,5	393,8	291,0
20,3	3,4	250,5	123,4	590,8	360,6	399,5	179,4
15,2	6,1	349,4	249,2	404,1	325,1	474,0	376,5
72,2	63,4	316,3	143,0	211,0	272,8	463,0	276,6
49,7	27,0	220,1	144,8	225,8	211,6	506,9	326,6
39,3	14,8	310,5	146,2	317,7	248,8	468,8	393,1
27,4	32,9	362,3	485,7	406,2	488,5	381,5	236,0
17,3	32,3	95,6	97,5	92,5	103,2	333,8	283,8
24,2	10,5	85,4	74,9	88,6	121,7	205,4	251,4

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	luty 1961	luty 1960	Mediana 1957-1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-II/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-II/1960
Dur brzuszny — 040	237	279	321	501	524
Dury rzekome ABC — 041	27	17	21	50	35
Czerwonka — 045	487	377	372	925	756
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.433	1.035	1.262	2.860	2.273
Botulismus — 049	4	21	12	21	27
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	35	4	19	72	31
	inne — 049	301	209	217	550
Włośnica — 128	37	213	145	90	295
Zakaźne zap. wątr. — 092	5.820	8.119	4.856	12.538	17.202
Porażenie dziec. nagm. — 080	9	30	54	10	68
Błonica — 055	464	628	993	1.018	1.286
Płonica — 050	3.656	5.316	4.959	7.471	11.049
Odra — 085	16.845	6.907	8.765	31.634	14.147
Krzusiec — 056	5.704	6.230	6.147	12.710	12.139
Zap. przyusz. nagm. — 089	9.070	5.736	5.422	16.676	9.718
Zapalenie opon mózgo-rdzen. nagminne — 057	58	62	98	104	134
Grypa 480 — 483	93.700	25.415	20.667	128.041	41.280
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	22	26	32	40	50
Zimnica 110—117	—	1	2	—	2
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—
Choroba Banga — 044	3	3	3	4	5
Tężec — 061	5	7	8	26	19
Róża — 052	113	155	158	263	336

CDW Cieszyn 906/61 260 S-31

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

PÓLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Marzec 1961

EGZ. NR

64

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w marcu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano najniższą zapadalność w porównaniu do miesiąca marca lat ubiegłych (wskaźnik — 7,7 — III/1961).

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 11,9 — III/1960 do 7,7 — III/1961.

W województwie Koszalińskim, m. Poznaniu i m. Wrocławiu nie zanotowano zachorowań. Znaczny spadek zapadalności zanotowano w następujących województwach:

Województwo (miasto)	III/1960	III/1961
M. st. Warszawa	31,9	5,3
Woj. Kieleckie	45,4	6,7
Woj. Opolskie	17,9	6,4
Woj. Gdańskie	14,6	5,8
P o l s k a	11,9	7,7

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Bydgoskim — 17,3; Warszawskim — 14,5; Zielonogórskim — 13,8; Szczecińskim — 12,6; Wrocławskim — 12,0 i m. Łodzi — 11,7.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się z 10,5 — II/1961 do 7,7 — III/1961.

2. Dury rzekome

W marcu zanotowano 46 zachorowań. Z tego w woj. Białostockim — 10, a w woj. Bydgoskim — 9 zachorowań.

3. Czerwonka

Wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 20,4 — III/1960 do 26,3 — III/1961. Wszystkie województwa z wyjątkiem Poznańskiego, Koszalińskiego, Szczecińskiego, Katowickiego, m. Warszawy, m. Poznania i m. Łodzi notują wzrost wskaźnika w porównaniu z marcem ub. r., zaś w woj. Opolskim i Zielonogórskim zapadalność utrzymuje się na poziomie marca 1960 r.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach: Olszynie — 76,4; Gdańskim — 63,3; Białostockim — 62,0; m. Krakowie — 69,4 i m. Warszawie — 56,4. W porównaniu z lutym b. r. zanotowano również wzrost wskaźnika zapadalności z 21,5 — II/1961 do 26,3 — III/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W marcu b. r. zgłoszono 7 zachorowań, z których 1 zachorowanie miało miejsce w lutym b. r. (woj. Rzeszowskie, m. Rzeszów), a pozostałe 6 zachorowań w miesiącu marcu b. r. w następujących województwach:

1. Woj. Łódzkie — 1 zach. (pow. Kutno),
2. Woj. Katowickie — 1 „ (m. Bytom),
3. Woj. Szczecińskie — 2 „ (m. Szczecin, pow. Wolin),
4. M. Warszawa — 1 „ (Dzielnica Śródmieście),
5. M. Wrocław — 1 „ (Dzielnica Fabryczna).

W lutym b. r. zgłoszono 9 zachorowań, a w marcu 1960 r. 45 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 290,8 — III/1960 do 197,8 — III/1961. Wszystkie województwa wykazują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach (miastach): m. Poznaniu — 328,4; m. Wrocławiu — 260,7; m. Warszawie — 240,4; m. Łodzi — 223,0; woj. Katowickim — 299,3; Opolskim — 228,3 i Szczecińskim — 220,4. Znaczny spadek zapadalności w porównaniu z marcem 1960 zanotowano w następujących województwach:

Województwo (miasto)	III/1960	III/1961
Woj. Koszalińskie	411,3	173,1
„ Opolskie	463,0	228,3
„ Poznańskie	344,7	198,4
„ Gdańskie	446,4	212,5
„ Wrocławskie	358,3	201,1
„ Zielonogórskie	310,4	154,4
M. Łódź	372,3	223,0

W porównaniu z lutym br. wskaźnik zapadalności obniżył się z 257,2 — II/1961 do 197,8 — III/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

Błonica

Notuje się znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z marcem 1960 r. z 28,7 — III/1960 do 19,6 — III/1961. Wszystkie województwa z wyjątkiem m. Poznania, m. Wrocławia, m. Krakowa, woj. Koszalińskiego Olsztyńskiego i Gdańskiego notują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. W woj. Olsztyńskim pow. Mrągowo zanotowano ognisko błonicy obejmujące 15 zachorowań. Zachorowania miały miejsce wśród dzieci szkolnych.

Wyższe wskaźniki od krajowego (19,6) zanotowano na terenie 8 następujących województw (miast): Kieleckiego 57,1; Wrocławskiego — 55,9; Koszalińskiego — 27,4; Opolskiego — 23,1; Krakowskiego — 22,9; Olsztyńskiego — 20,1; m. Krakowa — 40,0 i m. Poznania — 38,4.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się nieznaczny spadek wskaźnika z 20,5 — II/1961 do 19,6 — III/1961.

Plonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z marcem ub. r. z 228,7 — III/1960 do 147,8 — III/1961. Najwyższą zapadalność zanotowano w m. Warszawie — 507,3; m. Krakowie — 423,9; m. Wrocławiu — 307,4; m. Łodzi — 303,5; woj. Szczecińskim — 414,0 i Gdańskim — 348,0.

Krzyszczak

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 264,5 — III/1960 do 202,8 — III/1961, obniżył się również w porównaniu z poprzedzającym miesiącem z 252,1 — II/1961 do 202,8 — III/1961.

4. Grypa

W marcu zgłoszono 279,544 zachorowania. Ponad 50% zachorowań zgłoszono z niżej podanych województw:

M. Warszawa	— 51.417 zach.
Woj. Gdańskie	— 32.917 „
M. Kraków	— 25.087 „
Woj. Katowickie	— 22.772 „
M. Łódź	— 22.579 „

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior	Błonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica-Malaria	Wściekliczna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas	
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	299	13	510	1385	16	6	205	171	7282	45	719	5727	8133	6624	8131	80	30947	22	—	—	4	10	157
	1961	192	46	658	1354	11	48	371	38	4955	7	491	3702	20278	5080	10304	74	279544	15	—	—	3	10	139
M. st. Warszawa	5	2	53	41	—	1	112	—	226	1	6	477	3782	261	1806	10	51417	1	—	—	—	—	—	12
Warszawskie	29	3	70	128	—	—	2	5	309	—	18	162	1024	416	386	2	3303	—	—	—	—	—	1	7
Bydgoskie	25	9	56	65	1	9	11	1	316	—	7	186	1126	296	371	7	4126	—	—	—	—	—	1	8
M. Poznań	—	1	8	25	—	1	—	—	111	—	13	68	1072	115	339	—	852	—	—	—	—	—	—	3
Poznańskie	12	—	11	29	7	3	15	—	339	—	13	128	537	335	371	3	6893	—	—	—	—	1	—	8
M. Łódź	7	2	13	90	—	1	60	3	133	—	11	181	698	125	485	—	22579	1	—	—	—	—	1	10
Łódzkie	10	3	15	36	—	2	9	1	236	1	20	90	591	109	403	3	6917	1	—	—	—	—	1	6
Kieleckie	11	—	10	74	—	—	5	—	190	—	93	85	712	213	581	5	16054	1	—	—	—	—	1	6
Lubelskie	9	3	16	24	—	—	4	17	227	—	30	36	802	200	293	1	19703	3	—	—	—	—	—	10
Białostockie	7	10	58	71	—	1	29	—	136	—	6	61	291	154	432	2	2174	4	—	—	—	—	—	8
Olsztyńskie	6	—	57	67	—	1	2	—	148	—	15	112	477	139	167	3	4753	—	—	—	—	1	1	3
Gdańskie	6	1	65	192	2	17	20	10	218	—	7	357	1879	315	739	3	32917	1	—	—	—	—	—	7
Koszalińskie	—	—	10	66	—	1	5	—	101	—	16	115	243	336	176	1	2168	—	—	—	—	—	—	2
Szczecińskie	8	1	16	23	—	—	23	—	140	2	10	263	958	205	280	1	3831	1	—	—	—	1	1	5
Zielonogórskie	9	2	19	43	—	—	1	—	101	—	4	66	428	200	335	1	1157	—	—	—	—	—	1	3
M. Wrocław	—	—	10	49	—	7	15	—	95	1	6	112	596	93	351	—	12354	—	—	—	—	—	—	3
Wrocławskie	18	1	61	134	—	2	18	—	302	—	84	255	938	321	463	9	6949	—	—	—	—	—	—	6
Opolskie	5	—	6	16	—	—	—	—	178	—	18	108	256	81	172	5	4105	—	—	—	—	—	1	5
Katowickie	8	3	26	126	1	—	—	1	827	1	41	393	2722	711	1320	6	22772	—	—	—	—	—	—	14
M. Kraków	1	4	28	1	—	—	6	—	66	—	16	171	566	123	279	—	25087	—	—	—	—	—	—	3
Krakowskie	8	—	45	22	—	2	33	—	313	—	40	180	353	159	354	5	18606	—	—	—	—	—	1	6
Rzeszowskie	8	1	5	32	—	—	1	—	243	1	17	96	227	173	201	7	10827	2	—	—	—	—	—	4

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
	040		041		045		080		055		050		056		092	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	11,9	7,7	0,5	1,8	20,4	26,3	1,8	0,3	28,7	19,6	228,7	147,8	264,5	202,8	290,8	197,8
M. st. Warszawa	31,9	5,3	4,2	2,1	59,6	56,4	1,1	1,1	17,0	6,4	672,2	507,3	630,7	277,6	304,2	240,4
Warszawskie	13,5	14,5	—	1,5	11,5	35,0	2,5	—	19,0	9,0	132,0	81,0	178,6	208,1	199,1	154,5
Bydgoskie	9,7	17,3	0,7	6,2	21,4	38,7	2,8	—	8,3	4,8	261,9	128,5	431,8	204,5	265,3	218,3
M. Poznań	—	—	—	2,9	53,2	23,7	2,9	—	26,6	38,4	431,9	201,2	789,9	340,2	431,9	328,4
Poznańskie	1,7	7,0	0,6	—	14,0	6,4	0,6	—	8,2	7,6	132,8	74,9	218,9	196,0	344,7	198,4
M. Łódź	6,7	11,7	—	3,3	28,5	21,8	3,3	—	32,5	18,4	709,4	303,5	439,4	209,6	372,3	223,0
Łódzkie	10,2	7,2	—	2,2	6,5	10,9	—	0,6	33,4	14,5	177,1	65,3	98,0	79,1	285,3	171,3
Kieleckie	45,4	6,7	—	—	1,2	6,1	—	—	58,3	57,1	96,9	52,1	81,0	130,7	151,5	116,6
Lubelskie	7,2	5,8	0,6	1,9	8,4	10,4	1,9	—	25,4	19,5	46,8	23,4	88,5	130,1	167,2	147,7
Białostockie	11,7	7,5	2,1	10,7	40,6	62,0	1,1	—	19,2	6,4	81,2	65,2	199,8	164,5	224,4	145,3
Olsztyńskie	14,7	8,0	—	—	45,6	76,4	1,3	—	1,3	20,1	371,5	150,2	249,4	186,4	272,2	198,5
Gdańskie	14,6	5,8	1,0	1,0	60,4	63,3	—	—	3,9	6,8	317,7	348,0	695,9	307,0	446,4	212,5
Koszalińskie	10,3	—	—	—	20,6	17,1	—	—	22,3	27,4	149,1	197,1	263,9	575,8	411,3	173,1
Szczecińskie	17,3	12,6	—	1,6	47,2	25,2	1,6	3,1	28,3	15,7	302,2	414,0	393,5	322,7	341,6	220,4
Zielonogórskie	12,2	13,8	—	3,0	29,0	29,0	1,5	—	15,3	6,1	182,0	100,9	420,5	305,8	310,4	154,4
M. Wrocław	—	—	2,7	—	13,7	27,4	2,7	2,7	11,0	16,5	337,6	307,4	491,3	255,2	392,5	260,7
Wrocławskie	10,0	12,0	—	0,7	24,6	40,6	—	—	66,6	55,9	305,0	169,8	187,1	213,8	358,3	201,1
Opolskie	17,9	6,4	—	—	7,7	7,7	12,8	—	53,9	23,1	200,1	138,5	159,0	103,9	463,0	228,3
Katowickie	2,5	2,9	—	1,1	14,5	9,4	3,2	0,4	49,6	14,8	328,6	142,2	328,3	257,3	369,9	299,3
M. Kraków	7,4	2,5	—	9,9	52,0	69,4	—	—	34,7	40,0	371,8	423,9	433,8	304,9	245,4	163,6
Krakowskie	5,7	4,6	—	—	7,4	25,7	1,7	—	26,9	22,9	113,3	103,0	69,8	91,0	234,0	179,1
Rzeszowskie	7,3	5,8	1,4	0,7	—	3,6	0,7	0,7	15,3	12,4	81,5	69,8	137,5	125,9	187,0	176,8

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Marzec 1961 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Marzec 1961	Marzec 1960	Mediana 1957-1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1960
Dur brzuszny — 040	192	299	316	693	823
Dury rzekome ABC — 041	46	13	19	96	48
Czerwonka — 045	658	510	525	1.583	1.266
Biegunka u dzieci do lat 2 764—571	1.354	1.385	1.406	4.214	3.658
Botulismus — 049	11	16	9	32	43
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	48	6	9	120	37
	inne — 049	371	205	203	921
Włośnica — 128	38	171	60	128	466
Zakaźne zap. wątr. — 092	4.955	7.282	3.536	17.493	24.484
Porażenie dziec. nagm. — 080	7	45	47	17	113
Błonica — 055	491	719	986	1.509	2.005
Płonica — 050	3.702	5.727	4.662	11.173	16.776
Odra — 085	20.278	8.133	9.978	51.912	22.280
Krzusiec — 056	5.080	6.624	5.392	17.790	18.763
Zap. przyusz. nagm. — 089	10.304	8.131	5.860	26.980	17.849
Zapalenie opon mózgowo-rdzen. nagminne — 057	74	80	111	178	214
Grypa 480 — 483	279.544	30.947	150.675	407.585	72.227
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100—102	15	22	19	55	72
Zimnica 110—117	—	—	2	—	2
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—
Choroba Banga — 044	3	4	5	7	9
Teżec — 061	10	10	10	36	29
Róża — 052	139	157	145	402	493

CDW Cieszyn 1973/61 260 S-35

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Kwiecień 1961

EGZ. NR

259

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w kwietniu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W miesiącu sprawozdawczym krajowy wskaźnik zapadalności utrzymuje się prawie na tym samym poziomie co w analogicznym okresie r. ub. (7,1 — IV/1960; 7,2 — IV/1961). W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano nieznaczny spadek wskaźnika zapadalności (z 7,7 — III/1961 do 7,2 — IV/1961).

Spśród wszystkich województw w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. bardzo znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Bydgoskim (z 2,8 — IV/1960 do 22,8 — IV/1961) i w woj. Szczecińskim (z 9,4 — IV/1960 do 23,6 — IV/1961) spowodowany ogniskami epidemicznymi duru brzuszego. W woj. Bydgoskim w m. Grudziądzu zanotowano 16 zachorowań i w m. Bydgoszczy — 4 zachorowania, a w woj. Szczecińskim, pow. Gryfice — 11 zachorowań.

Ponadto epidemiczne nasilenie zachorowań zanotowano w następujących powiatach:

pow. Jelenia Góra	(woj. Wrocławskie)	— 7 zachorowań,
pow. Kłodzko	(woj. Wrocławskie)	— 4 „
pow. Ełk	(woj. Białostockie)	— 5 „
pow. Sulęcín	(woj. Zielonogórskie)	— 4 „

Najniższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Lubelskim — 1,3; Katowickim — 1,4; Koszalińskim — 1,7; Olsztyńskim — 2,7; i m. Wrocławiu — 2,7. Nie zanotowano zachorowań w m. Krakowie.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 35 zachorowań. Zachorowania miały charakter sporadyczny z wyjątkiem woj. Białostockiego (11 zach.) i Bydgoskiego (8 zach.).

3. Czerwonka

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 674 zachorowania. Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wzrósł z 16,8 — IV/1960 do 26,9 — IV/1961.

Wszystkie województwa z wyjątkiem Poznańskiego, Łódzkiego, Kieleckiego, Opolskiego i m. Wrocławia notują wzrost wskaźnika zapadalności, natomiast w m. Krakowie zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Olsztyńskim — 91,2; Koszalińskim — 75,4; Szczecińskim — 61,4 i Gdańskim — 59,4.

Powyżej 10 zachorowań w miesiącu sprawozdawczym zanotowano na terenie następujących powiatów (miast powiatowych):

m.	Słupsk	— 35 zach.	(woj. Koszalińskie)
pow.	Giżycko	— 22 „	(„ Olsztyńskie)
„	Olsztyn	— 12 „	(„ Olsztyńskie)
„	Wałbrzych	— 21 „	(„ Wrocławskie)
m.	Wałbrzych	— 18 „	(„ Wrocławskie)
„	Gdańsk	— 17 „	(„ Gdańskie)
„	Bydgoszcz	— 16 „	(„ Bydgoskie)
„	Szczcin	— 15 „	(„ Szczecińskie)
„	Katowice	— 12 „	(„ Katowickie)
„	Lublin	— 12 „	(„ Lubelskie)

W porównaniu z marcem br. zanotowano nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności (z 26,3 — III/1961 do 26,9 — IV/1961).

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W kwietniu br. zgłoszono 11 zachorowań, z tego: 1 zachorowanie z terenu m. st. Warszawy (Praga Południe), miało miejsce w 1960 r.; 5 zachorowań miało miejsce w marcu br. z terenu:

woj. Warszawskiego, pow. Grodzisk Mazowiecki	—	1 zach.
„ Kieleckiego, pow. Końskie	—	1 zach.
„ Zielonogórskiego, pow. Gorzów	—	1 zach.
„ Katowickiego, m. Chorzów	—	1 zach.
„ Rzeszowskiego, m. Rzeszów	—	1 zach.

pozostałe 5 zachorowań miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym

m. st. Warszawa, Dzielnice: Ochota, Mokotów	—	2 zach.
woj. Olsztyńskie, m. Olsztyn	—	1 zach.
„ Opolskie, pow. Nysa	—	1 zach.
„ Krakowskie, pow. Brzesko	—	1 zach.

W kwietniu 1960 r. zgłoszono 39 zachorowań, a w marcu br. 7 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Wskaźnik zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby obniżył się z 184,8 — IV/1960 do 140,7 — IV/1961. Wszystkie województwa z wyjątkiem m. Krakowa notują spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do kwietnia 1960 r. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Poznaniu — 236,7; m. Wrocławiu — 216,8; m. Łodzi — 199,6; m. Krakowie — 173,5; Katowickim — 212,8 i Opolskim — 170,6.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w następujących województwach:

1) Gdańskim	—	253,4 — IV/1960;	147,2 — IV/1961.
2) Opolskim	—	264,2 — IV/1960;	170,6 — IV/1961.
3) Koszalińskim	—	179,9 — IV/1960;	106,2 — IV/1961.
4) Wrocławskim	—	222,4 — IV/1960;	151,2 — IV/1961.
5) Szczecińskim	—	210,9 — IV/1960;	157,4 — IV/1961.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się również spadek zapadalności ze 197,8 — III/1961 do 140,7 — IV/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W kwietniu notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 22,7 — IV/1960 do 16,4 — IV/1961.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z kwietniem 1960 r. zanotowano na terenie następujących województw:

Województwo (miasto)	IV/1960	IV/1961
m. Poznań	11,8	20,7
m. Kraków	29,7	34,7
woj. Poznańskie	7,6	15,2
„ Koszalińskie	10,3	22,3
„ Kieleckie	42,3	43,6
„ Krakowskie	21,2	22,9
„ Olsztyńskie	—	6,7

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Wrocławskim 49,3; Kieleckim — 43,6; Krakowskim — 22,9; Koszalińskim — 22,3 i m. Krakowie — 34,7.

W porównaniu do poprzedzającego miesiąca wskaźnik zapadalności obniżył się z 19,6 — III/1961 do 16,4 — IV/1961.

ZACHOROWANIA NA

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Poliomyelitis anterior acuta
	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080
POLSKA 1960	179	13	421	1237	6	26	296	39	4629	39
1961	180	35	674	1446	9	79	334	34	3523	11
M. st. Warszawa	6	3	42	51	—	4	11	9	153	3
Warszawskie	11	3	37	147	—	—	18	6	167	1
Bydgoskie	33	8	59	75	5	18	10	6	191	—
M. Poznań	1	—	16	16	—	1	—	—	80	—
Poznańskie	9	—	22	41	—	2	30	—	236	—
M. Łódź	5	—	11	65	—	2	65	3	119	—
Łódzkie	7	2	11	42	—	1	12	2	167	—
Kieleckie	15	—	2	94	—	15	—	—	157	1
Lubelskie	2	1	19	12	—	—	11	—	167	—
Białostockie	13	11	39	72	—	—	21	4	91	—
Olsztyńskie	2	1	68	55	—	—	4	—	99	1
Gdańskie	8	1	61	189	—	12	25	2	151	—
Koszalińskie	1	—	44	85	—	—	1	—	62	—
Szczecińskie	15	2	39	23	—	—	20	—	100	—
Zielonogórskie	7	—	27	42	—	—	7	1	93	1
M. Wrocław	1	—	9	82	1	7	22	—	79	—
Wrocławskie	19	—	63	132	1	12	12	—	227	—
Opolskie	5	—	2	23	2	1	—	—	133	1
Katowickie	4	2	56	145	—	4	3	1	588	1
M. Kraków	—	1	18	4	—	—	48	—	70	—
Krakowskie	11	—	27	21	—	—	10	—	223	1
Rzeszowskie	5	—	2	30	—	—	4	—	170	1

* Liczby bezwzględne

Błonica-Diphtheria	Łączna-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krztusiec-Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas
055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
569	3752	7187	5921	6140	84	27955	18	1	1	9	15	144
411	2894	16973	4330	7171	71	47659	17	—	—	4	27	121
6	410	3147	327	1386	7	1868	2	—	—	—	—	9
19	132	942	302	321	4	1394	2	—	—	—	—	12
6	132	925	189	224	1	3977	—	—	—	—	3	2
7	52	743	105	239	—	483	—	—	—	—	—	2
26	102	954	260	234	3	1341	—	—	—	2	3	6
13	143	419	135	368	—	14632	—	—	—	—	—	9
11	92	365	126	237	—	1845	1	—	—	—	—	6
71	86	754	212	346	7	1817	2	—	—	—	2	6
17	85	652	219	194	1	1151	2	—	—	—	2	7
8	71	241	84	258	2	1347	2	—	—	—	1	4
5	97	419	137	117	2	2727	—	—	—	—	1	4
2	214	1469	280	673	4	1474	1	—	—	1	—	10
13	67	426	306	67	—	982	—	—	—	—	—	1
5	160	577	158	218	2	990	—	—	—	—	1	—
5	73	419	164	263	2	503	1	—	—	1	1	4
6	79	321	122	267	1	1432	—	—	—	—	—	4
74	179	676	290	342	4	1810	—	—	—	—	2	10
12	78	311	177	171	6	688	2	—	—	—	—	6
37	313	2018	423	757	10	2991	1	—	—	—	—	12
14	156	857	90	175	—	723	—	—	—	—	—	1
40	128	214	114	179	1	2388	1	—	—	—	7	4
14	65	124	110	135	14	1096	—	—	—	—	4	2

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
ROK	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	7,1	7,2	0,5	1,4	16,8	26,9	1,56	0,44
M. st. Warszawa	1,1	6,4	2,1	3,2	34,0	44,7	4,2	3,2
Warszawskie	7,5	5,5	—	1,5	10,5	18,5	3,0	0,5
Bydgoskie	2,8	22,8	2,1	5,5	20,7	40,8	2,8	—
M. Poznań	5,9	2,9	—	—	17,7	47,3	—	—
Poznańskie	0,6	5,3	—	—	17,0	12,9	—	—
M. Łódź	8,4	8,4	—	—	15,1	18,4	1,7	—
Łódzkie	11,6	5,1	—	1,4	9,4	8,0	—	—
Kieleckie	22,7	9,2	—	—	2,4	1,2	1,2	0,6
Lubelskie	5,8	1,3	0,6	0,6	11,0	12,3	2,6	—
Białostockie	8,5	13,9	—	11,7	37,4	41,7	2,1	—
Olsztyńskie	12,1	2,7	1,3	1,3	32,2	91,2	—	1,3
Gdańskie	9,7	7,8	1,0	1,0	40,9	59,4	—	—
Koszalińskie	3,4	1,7	—	—	29,1	75,4	—	—
Szczecińskie	9,4	23,6	—	3,1	28,3	61,4	3,1	—
Zielonogórskie	10,7	10,7	1,5	—	38,2	41,3	4,6	1,5
M. Wrocław	—	2,7	—	—	27,4	24,7	—	—
Wrocławskie	10,0	12,6	—	—	25,3	41,9	—	—
Opolskie	9,0	6,4	—	—	3,8	2,6	1,3	1,3
Katowickie	6,1	1,4	1,4	0,7	7,2	20,3	0,4	0,4
M. Kraków	—	—	—	2,5	44,6	44,6	—	—
Krakowskie	2,3	6,3	—	—	5,1	15,4	1,1	0,6
Rzeszowskie	2,9	3,6	—	—	0,7	1,4	5,1	0,7

*) Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
22,7	16,4	149,8	115,5	236,4	172,9	184,8	140,7
11,7	6,4	455,2	436,1	532,9	347,8	209,5	162,7
12,0	9,5	91,0	66,0	148,5	151,1	136,5	83,5
11,7	4,1	170,0	91,2	321,3	130,6	182,4	132,0
11,8	20,7	207,1	153,8	653,8	310,6	266,2	236,7
7,6	15,2	104,2	59,7	166,2	152,1	198,4	138,1
53,7	21,8	407,6	239,8	395,8	226,4	238,2	199,6
19,6	8,0	104,5	66,8	95,8	91,5	176,4	121,2
42,3	43,6	66,9	52,8	88,3	130,1	106,7	96,3
18,9	11,0	39,7	42,3	74,8	142,4	115,1	108,6
14,9	8,5	51,3	75,8	137,8	89,7	99,4	97,2
—	6,7	210,5	130,1	151,5	183,7	150,2	132,8
4,9	1,9	246,6	208,6	733,9	272,9	253,4	147,2
10,3	22,3	114,8	114,8	137,1	524,4	179,9	106,2
31,5	7,9	176,3	251,8	357,3	248,7	210,9	157,4
13,8	7,6	97,9	111,6	423,6	250,8	197,2	142,2
19,2	16,5	192,1	216,8	395,2	334,8	263,5	216,8
53,3	49,3	226,4	119,2	205,8	193,1	222,4	151,2
30,8	15,4	128,2	100,0	137,2	227,0	264,2	170,6
37,6	13,4	228,4	113,3	293,5	153,1	264,2	212,8
29,7	34,7	198,3	386,7	570,1	223,1	166,1	173,5
21,2	22,9	45,2	73,2	61,2	65,2	156,7	127,6
18,2	10,2	65,5	47,3	173,9	80,0	138,3	123,7

Kwiecień 1961 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Kwiecień 1961	Kwiecień 1960	Mediana 1957-1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1960
Dur brzuszny — 040	180	179	242	873	1.002
Dury rzekome ABC — 041	35	13	22	131	61
Czerwonka — 045	674	421	459	2.257	1.687
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.446	1.237	1.608	5.660	4.895
Botulismus — 049	9	6	8	41	49
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	79	26	49	199	63
	inne — 049	334	296	275	1.255
Włośnica — 128	34	39	42	162	505
Zakaźne zap. wątr. — 092	3.523	4.629	3.021	21.016	29.113
Porażenie dziec. nagm. — 080	11	39	49	28	152
Błonica — 055	411	569	955	1.920	2.574
Płonica — 050	2.894	3.752	4.005	14.067	20.528
Odra — 085	16.973	7.187	8.810	68.885	29.467
Krzusiec — 056	4.330	5.921	5.215	22.120	24.684
Zap. przyusz. nagm. — 089	7.171	6.140	5.294	34.151	23.989
Zapalenie opon mózgz.-rdzen. nagminne — 057	71	84	121	249	298
Grypa 480 — 483	47.659	27.955	96.218	455.244	100.182
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100—102	17	18	22	72	90
Zimnica 110—117	—	1	1	—	3
Wścieklizna — 094	—	1	—	—	1
Choroba Banga — 044	4	9	5	11	18
Tężec — 061	27	15	20	63	44
Róża — 052	121	144	161	523	637

2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 149,8 — IV/1960 do 115,5 — IV/1961. Woj. Lubelskie, Białostockie, Szczecińskie, Zielonogórskie, Krakowskie, m. Wrocław i m. Kraków notują wzrost wskaźnika zapadalności, a w woj. Koszalińskim wskaźnik utrzymuje się na poziomie kwietnia ub. r.

W porównaniu do marca br. zanotowano również spadek wskaźnika ze 147,8 — III/1961 do 115,5 — IV/1961.

3. Krztusiec

Wskaźnik zapadalności w porównaniu do kwietnia 1960 r. obniżył się z 236,4 — IV/1960 do 172,9 — IV/1961, obniżył się również w stosunku do poprzedzającego miesiąca r. ub. z 202,8 — III/1961 do 172,9 — IV/1961.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Koszalińskim — 524,4; Gdańskim — 272,9; Zielonogórskim — 250,8; Szczecińskim — 248,7; m. Warszawie — 347,8; m. Wrocławiu — 334,2 i m. Łodzi — 310,6.

4. Grypa

W kwietniu zgłoszono 47.659 zachorowań.

Errata.

Odwołuje się przypadek wścieklizny z terenu woj. Lubelskiego wykazany w Informacyjnym Biuletynie Epidemiologicznym za miesiąc styczeń 1961. Podany na str. 3 dział III „Inne schorzenia“, pozycja 1, str. 5, tabl. „Zachorowania na choroby zakaźne,“ rubryka 094; str. 8 rubryka styczeń 1961, wiersz 094.

CDW Cieszyn 1190/61 260 S-33

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Maj 1961

EGZ. NR 72

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w maju 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W miesiącu sprawozdawczym w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 8,8 — V/1960 do 9,1 — V/1961. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z majem 1960 r. zanotowano w woj. Łódzkim (5,8 — V/1960; 13,1 — V/1961) i m. Warszawie (2,1 — V/1960; 9,6 — V/1961). Najniższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach: Koszalińskim — 3,4; Zielonogórskim — 4,6; Rzeszowskim — 5,1; Lubelskim — 5,8; m. Łodzi — 5,0 i m. Wrocławiu — 5,5. Nie zanotowano zachorowań w m. Poznaniu.

W miesiącu maju większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności z 7,2 — IV/1961 do 9,1 — V/1961.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 42 zachorowania sporadyczne.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wzrósł z 22,5 — V/1960 do 45,5 — V/1961. W miesiącu sprawozdawczym z terenu woj. Wrocławskiego zgłoszono 312 zachorowań, w tym 121 zachorowań zgłoszono w m. Wałbrzycha i 129 zachorowań z pow. Wałbrzyskiego. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Wrocławiu — 222,3; m. Warszawie — 144,6 i woj. Wrocławskim — 207,8. Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 1,2; Rzeszowskim — 2,2 i Opolskim — 6,4.

W porównaniu z kwietniem br. notuje się również wzrost wskaźnika zapadalności z 26,9 — IV/1961 do 45,5 — V/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis)

W maju zgłoszono 28 zachorowań, z tego 12 zachorowań miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym w następujących województwach:

1) m. Warszawa, Dzielnica Mokotów	— 2 zach.
2) woj. Warszawskie, m. Płock	— 1 „
3) m. Łódź, Dzielnice: Górna, Widzew	— 2 „
4) woj. Olsztyńskie, pow. Kętrzyn	— 1 „
5) woj. Wrocławskie, pow. Milicz	— 1 „
6) woj. Opolskie, pow. Koźle	— 1 „
7) woj. Rzeszowskie, pow. Przeworsk, Leżajsk	— 2 „
8) woj. Krakowskie, pow. Wadowice	— 2 „

11 zachorowań ze zgłoszonych miało miejsce w kwietniu br.

1) woj. Bydgoskie, m. Grudziądz, m. Bydgoszcz	— 2 zach.
2) woj. Koszalińskie, pow. Słupsk, Szczecinek	— 2 „
3) woj. Szczecińskie, pow. Gryfice	— 1 „
4) woj. Wrocławskie, pow. Środa Śląska	— 1 „
5) woj. Opolskie, m. Nysa, pow. Krapkowice, pow. Nysa	— 3 „
6) woj. Katowickie, pow. Gliwice, Bielsko — Mikuszowice	— 2 „

2 zachorowania zgłoszono z lutego br. (woj. Warszawskie, pow. Wołomin; woj. Opolskie, pow. Głubczyce) i 3 zachorowania z marca br. (woj. Katowickie, pow. Bielsko — Mikuszowice).

W maju 1960 r. zgłoszono 26 zachorowań, a w kwietniu br. 11 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 188,7 — V/1960 do 148,4 — V/1961. Wszystkie województwa z wyjątkiem Białostockiego, Katowickiego i m. Łodzi notują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Poznaniu — 322,4; m. Łodzi — 258,3; m. Wrocławiu — 225,0; w woj. Katowickim — 241,4 i w Gdańskim — 202,7. Znaczny spadek zapadalności zanotowano w woj. Poznańskim, Wrocławskim, Zielonogórskim i Opolskim.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 140,7 — IV/1961 do 148,4 — V/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z majem ub. r. z 23,3 — V/1960 do 15,4 — V/1961. Niewielki wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Poznańskim, Olsztyńskim, m. Krakowie i m. Poznaniu. W woj. Białostockim zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Krakowie — 47,1; m. Poznaniu — 35,5; woj. Wrocławskim — 42,6; Kieleckim — 31,3; Szczecińskim — 23,6; Opolskim — 23,1 i Katowickim — 21,3.

W porównaniu z kwietniem notuje się niewielki spadek wskaźnika zapadalności z 16,4 — IV/1961 do 15,4 — V/1961.

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 153,8 — V/1960 do 132,7 — V/1961. Najwyższe wskaźniki zanotowano w następujących województwach: m. Krakowie — 443,7; m. Warszawie — 426,5; m. Łodzi — 273,4; m. Wrocławiu — 252,5; m. Poznaniu — 221,9; woj. Szczecińskim — 245,5 i Gdańskim — 237,8.

W porównaniu z kwietniem br. zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności z 115,5 — IV/1961 do 132,7 — V/1961.

3. Krztusiec

Notuje się spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem br. z 297,1 — V/1960 do 175,0 — V/1961. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z majem 1960 r. notują wszystkie województwa z wyjątkiem woj. Lubelskiego i Koszalińskiego. W porównaniu z kwietniem br. wskaźnik utrzymuje się prawie na jednakowym poziomie (172,9 — IV/1961; 175,0 — V/1961).

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica-Diphtheria	Plonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózj. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wściekliczna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas	
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	221	22	564	1746	35	107	489	486	4727	26	583	3856	8663	7440	5778	69	18482	21	1	1	5	25	121
	1961	228	42	1140	2092	48	140	1024	14	3716	28	386	3325	17072	4383	6616	75	13198	21	—	—	1	35	132
M. st. Warszawa	9	1	136	74	—	1	27	1	144	2	3	401	2749	325	1207	7	24	2	—	—	—	1	11	
Warszawskie	29	5	41	158	—	1	9	1	180	2	21	185	927	315	342	4	164	1	—	—	—	1	14	
Bydgoskie	23	14	73	77	5	22	19	4	177	2	4	201	909	137	365	2	389	—	—	—	—	2	2	
M. Poznań	—	—	12	32	—	4	2	—	109	—	12	75	537	112	201	—	173	—	—	—	—	—	2	
Poznańskie	15	3	26	67	20	6	23	—	202	—	15	136	1234	268	237	1	278	—	—	—	—	2	3	
M. Łódź	3	—	26	116	—	11	50	2	154	2	11	163	232	101	356	—	8192	1	—	—	—	—	15	
Łódzkie	18	2	14	42	—	3	11	1	153	—	11	93	443	146	298	2	360	—	—	—	—	—	6	
Kieleckie	21	—	2	127	—	—	15	—	152	—	11	97	724	193	235	6	212	1	—	—	—	1	5	
Lubelskie	9	2	16	27	—	—	11	—	181	—	20	80	681	236	221	1	212	3	—	—	—	2	4	
Białostockie	7	3	45	124	—	1	8	1	92	—	9	50	262	85	135	6	111	5	—	—	—	1	3	
Olsztyńskie	5	—	64	100	—	—	1	—	101	1	3	92	396	112	102	4	184	1	—	—	—	1	3	
Gdańskie	10	—	77	170	—	14	28	—	208	—	1	244	1588	267	453	3	197	2	—	—	1	—	6	
Koszalińskie	2	—	30	132	—	3	56	4	63	2	6	60	600	213	62	4	147	—	—	—	—	—	1	
Szczecińskie	6	—	29	31	6	4	20	—	108	1	15	156	528	210	192	3	105	—	—	—	—	—	1	
Zielonogórskie	3	—	34	56	—	11	3	—	86	—	3	43	526	154	136	—	266	2	—	—	—	1	9	
M. Wrocław	2	—	81	134	—	7	285	—	82	—	4	92	203	110	297	—	40	1	—	—	—	—	3	
Wrocławskie	15	1	312	278	6	19	302	—	254	2	64	172	803	301	279	8	509	1	—	—	—	6	19	
Opolskie	10	—	5	16	1	1	1	—	118	5	18	79	331	131	159	6	195	—	—	—	—	2	3	
Katowickie	17	3	55	186	2	5	10	—	667	5	59	441	2123	578	695	6	905	—	—	—	—	4	6	
M. Kraków	2	2	31	8	—	6	74	—	66	—	19	179	733	117	251	2	23	—	—	—	—	—	3	
Krakowskie	15	5	28	36	1	21	68	—	261	2	26	163	359	126	259	4	172	—	—	—	—	8	9	
Rzeszowskie	7	1	3	101	7	—	1	—	158	2	11	123	184	146	134	6	340	1	—	—	—	3	4	

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Pionica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna			
	040		041		045		080				055		056		092	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961			1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	8,8	9,1	0,9	1,7	22,5	45,5	1,04	1,12	23,3	15,4	153,8	132,7	297,1	175,0	188,7	148,4
M. st. Warszawa	2,1	9,6	1,1	1,1	40,4	144,6	1,1	2,1	17,0	3,2	322,3	426,5	522,2	345,7	171,2	153,1
Warszawskie	13,5	14,5	0,5	2,5	11,0	20,5	1,5	1,0	13,5	10,5	92,5	92,5	228,1	157,6	148,0	90,0
Bydgoskie	13,8	15,9	0,7	9,7	59,4	50,4	0,7	1,4	9,0	2,8	185,9	138,9	457,4	94,7	152,0	122,3
M. Poznań	—	—	—	—	14,8	35,5	—	—	32,5	35,5	159,7	221,9	760,3	331,3	346,1	322,4
Poznańskie	7,8	8,8	—	1,7	21,6	15,2	—	—	8,2	8,8	110,0	79,6	215,3	156,8	227,6	118,2
M. Łódź	13,4	5,0	—	—	31,9	43,6	1,7	3,3	65,4	18,4	434,4	273,4	553,5	169,4	246,5	258,3
Łódzkie	5,8	13,1	0,7	1,4	13,1	10,2	0,7	—	23,2	8,0	76,2	67,5	189,4	106,0	189,4	111,1
Kieleckie	11,6	12,9	0,6	—	2,4	1,2	3,1	—	38,0	31,3	79,8	59,5	128,2	118,4	109,2	93,3
Lubelskie	7,8	5,8	4,5	1,3	9,7	10,4	1,3	—	29,3	13,0	43,6	52,0	82,6	153,5	134,0	117,7
Białostockie	9,6	7,5	—	3,2	34,2	48,1	—	—	9,6	9,6	69,4	53,4	150,6	90,8	90,8	98,3
Olsztyńskie	14,7	6,7	—	—	48,3	85,8	2,7	1,3	2,7	4,0	189,1	123,4	222,6	150,2	151,5	135,4
Gdańskie	15,6	9,7	—	—	60,4	75,0	—	—	8,8	1,0	166,7	237,8	905,5	260,2	228,1	202,7
Koszalińskie	5,1	3,4	—	—	29,1	51,4	3,4	3,4	17,1	10,3	92,5	102,8	185,1	365,0	190,2	108,0
Szczecińskie	7,9	9,4	—	—	42,5	45,6	—	1,6	25,2	23,6	174,7	245,5	358,9	330,6	256,6	170,0
Zielonogórskie	10,7	4,6	7,6	—	36,7	52,0	—	—	12,2	4,6	142,2	65,7	582,6	235,5	256,9	131,5
M. Wrocław	—	5,5	—	—	19,2	222,3	2,7	—	21,9	11,0	244,3	252,5	430,9	301,9	260,7	225,0
Wrocławskie	8,0	10,0	0,7	0,7	26,0	207,8	3,3	1,3	62,6	42,6	253,1	114,5	251,7	200,5	268,4	169,2
Opolskie	16,7	12,8	1,3	—	6,4	6,4	—	6,4	32,1	23,1	166,7	101,3	214,2	168,0	242,4	151,3
Katowickie	5,4	6,1	0,4	1,1	9,4	19,9	0,4	1,8	26,8	21,3	268,2	159,6	327,1	209,2	236,7	241,4
M. Kraków	12,4	4,9	2,5	4,9	59,5	76,8	—	—	39,7	47,1	208,2	443,7	780,8	290,0	180,9	163,6
Krakowskie	6,9	8,6	—	2,9	9,7	16,0	—	1,1	17,7	14,9	78,4	93,2	86,9	72,1	172,2	149,3
Rzeszowskie	3,6	5,1	0,7	0,7	2,9	2,2	0,7	1,4	16,0	8,0	72,8	89,5	184,1	106,2	118,6	115,0

*) Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Maj 1961	Maj 1960	Mediana 1957-1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1960
Dur brzuszny — 040	228	221	257	1.101	1.223
Dury rzekome ABC — 041	42	22	38	173	83
Czerwonka — 045	1.140	564	645	3.397	2.251
Biegunka u dzieci do lat 2 764—571	2.092	1.746	2.363	7.752	6.641
Botulismus — 049	48	35	30	89	84
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	140	107	100	339	170
	inne — 049	1.024	489	383	2.279
Włośnica — 128	14	486	43	176	991
Zakaźne zap. wątr. — 092	3.716	4.727	2.573	24.732	33.840
Porażenie dziec. nagm. — 080	28	26	55	56	178
Błonica — 055	386	583	834	2.306	3.157
Płonica — 050	3.325	3.856	3.789	17.392	24.384
Odra — 085	17.072	8.663	10.376	85.957	38.130
Krztusiec — 056	4.383	7.440	5.648	26.503	32.124
Zap. przyusz. nagm. — 089	6.616	5.778	4.311	40.767	29.767
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	75	69	122	324	367
Grypa 480 — 483	13.198	18.482	15.520	468.442	118.664
Dur wysypkowy sporadyczny					
Choroba Brilla 100—102	21	21	21	93	111
Zimnica 110—117	—	1	—	—	4
Wścieklizna — 094	—	1	—	—	2
Choroba Banga — 044	1	5	8	12	23
Tężec — 061	35	25	30	98	69
Róża — 052	132	121	152	655	758

CDW Cieszyn 1272/61 260 S-33

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Czerwiec 1961

EGZ. NR 000 6.

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w czerwcu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 9,1 — VI/1960 do 8,2 — VI/1961. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Warszawskim — 19,0; Opolskim — 15,4; Gdańskim — 13,6; Bydgoskim — 11,0 i Wrocławskim — 10,0.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z czerwcem r. ub. zanotowano w woj. Krakowskim (25,2 — VI/1960; 8,6 — VI/1961. W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano. W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 9,1 — V/1961 do 8,2 — VI/1961.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 48 zachorowań. Zachorowania miały charakter sporadyczny z wyjątkiem woj. Białostockiego (18 zach.).

3. Czerwonka

W dalszym ciągu notuje się wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. Proces ten obserwujemy od stycznia br. W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności wzrósł 22,8 — VI/1960 do 39,2 — VI/1961. Natomiast w stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek wskaźnika z 45,5 — V/1961 do 39,2 — VI/1961.

Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Wrocławskim — 144,5; Bydgoskim — 105,0; Olsztyńskim — 80,5; Szczecińskim — 77,1; Gdańskim — 72,1; m. Krakowie — 94,2 i m. Warszawie — 74,4.

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. bardzo znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Wrocławskim (20,0 — VI/1960, 144,5 — VI/1961), spowodowany w dalszym ciągu znaczną liczbą zgłoszonych zachorowań z pow. Wałrzyckiego i m. Wałbrzycha.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W czerwcu zgłoszono 17 zachorowań. W tym 9 zachorowań miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

woj. Łódzkie, pow. Łask, Skierniewice, Łódź,

m. Pabianice, m. Zduńska Wola

— 5 zach.

woj. Wrocławskie, m. Legnica

— 1 "

woj. Krakowskie; pow. Kraków, m. Nowy Sącz

— 2 "

m. Łódź, dzielnica Górna

— 1 "

7 ze zgłoszonych w miesiącu sprawozdawczym zachorowań miało miejsce w maju br.:

woj. Olsztyńskie, pow. Giżycko

— 1 zach.

woj. Gdańskie, pow. Sztum, Kościerzyna, Gdańsk

— 3 "

woj. Zielonogórskie, pow. Nowa Sól

— 1 "

woj. Opolskie, pow. Krapkowie

— 1 "

woj. Krakowskie, pow. Limanowa

— 1 "

Zachorowanie 1 zgłoszono z kwietnia br. z terenu woj. Olsztyńskiego, pow. Susz-Itawa.

W czerwcu r. ub. zgłoszono 14 zachorowań, a w maju br. 28 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Wskaźniki zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby obniżył się w porównaniu z czerwcem 1960 r. ze 170,8 — VI/1960 do 128,4 — VI/1961. Notuje się spadek wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach z wyjątkiem

Rzeszowskiego, natomiast w m. Poznaniu i m. Krakowie zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w następujących województwach w porównaniu z czerwcem 1960.

Województwo	VI/1960	VI/1961
woj. Koszalińskie	226,2	97,7
„ Gdańskie	233,9	135,5
„ Białostockie	151,7	75,8
„ Poznańskie	182,6	110,0

Wyższą zapadalność od krajowej (128,4) zanotowano w woj. Katowickim — 229,4; Opolskim — 201,4; Szczecińskim — 149,5; Wrocławskim — 141,8; Gdańskim — 135,5; Zielonogórskim — 130,0; oraz miastach: Poznaniu — 248,5; Łodzi — 191,2; Wrocławiu — 186,6; Krakowie — 161,1 i Warszawie — 141,4.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się również spadek wskaźnika zapadalności ze 148,4 — V/1961 do 128,4 — VI/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 361 zachorowań. Wskaźnik zapadalność w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 20,7 — VI/1960 do 14,4 — VI/1961.

Wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw:

woj. Kieleckim	21,5 — VI/1960;	32,5 — VI/1961
„ Zielonogórskim	—	9,2 — VI/1961
„ Koszalińskim	13,7 — VI/1960;	18,8 — VI/1961
„ Poznańskim	8,2 — VI/1960;	9,4 — VI/1961

W woj. Warszawskim, Olsztyńskim i m. Krakowie zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano niewielki spadek wskaźnika zapadalności (15,4 — V/1961; 14,4 — VI/1961).

2. Płonica

Wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się ze 135,5 — VI/1960 do 130,7 — VI/1961.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Krakowie — 523,0; m. Warszawie — 324,4; m. Łodzi — 308,6 i m. Poznaniu 245,5. W porównaniu z majem br. notuje się niewielki spadek wskaźnika zapadalności ze 132,7 — V/1961 do 130,7 — VI/1961.

3. Krztusiec

Notuje się znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z czerwcem 1960 r. z 342,6 — VI/1960 do 182,8 — VI/1961. Wszystkie województwa z wyjątkiem Lubelskiego i Koszalińskiego natują spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności ze 175,0 — V/1961 do 182,8 — VI/1961.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka-Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica-Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica-Diphtheria	Płonica-Scarlatina	Odra-Morbilli	Krzusiec-Pertussis	Zapalenie przynusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa-Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica-Malaria	Wścieklizna-Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec-Tetanus	Róża Erysipelas	
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092														080
POLSKA	1960	229	44	707	2.906	47	220	753	581	4278	14	519	3393	7572	8581	4743	85	7593	21	—	—	7	25	140
	1961	206	48	981	3.266	24	171	532	8	3216	17	361	3273	15509	4578	5117	69	6892	18	1	—	8	37	138
M. st. Warszawa	4	3	70	83	—	20	18	—	133	—	3	305	1671	331	776	6	3	—	—	—	—	—	—	11
Warszawskie	38	—	45	335	—	—	41	4	151	—	19	181	811	262	233	3	85	2	—	—	—	—	2	9
Bydgoskie	16	9	152	324	4	32	25	—	140	—	6	199	889	178	457	2	157	—	—	—	—	1	1	15
M. Poznań	1	—	12	87	—	2	9	—	84	—	4	83	359	141	200	—	46	—	—	—	—	—	—	2
Poznańskie	15	2	18	145	15	7	14	—	188	—	16	208	1102	251	196	5	229	—	—	—	—	2	1	11
M. Łódź	3	1	33	152	—	6	83	—	114	1	11	184	153	138	175	—	4145	1	—	—	—	1	—	14
Łódzkie	7	1	10	79	—	5	6	—	105	5	8	87	366	113	107	2	179	1	—	—	—	—	3	6
Kieleckie	15	—	2	155	—	27	4	—	126	—	53	129	652	187	199	6	141	1	—	—	—	—	3	9
Lubelskie	10	—	20	44	—	1	9	—	163	—	18	78	558	270	146	1	100	1	—	—	—	—	3	4
Białostockie	8	18	37	244	—	1	11	3	71	—	1	47	281	93	108	3	27	3	—	—	—	—	2	6
Olsztyńskie	3	—	60	156	—	21	27	—	88	2	3	89	512	130	101	5	58	—	—	—	—	1	3	3
Gdańskie	14	—	74	333	—	12	42	—	139	3	1	180	1194	318	444	3	157	2	1	—	—	—	—	8
Koszalińskie	2	—	20	156	—	—	9	1	57	—	11	88	896	249	62	1	49	2	—	—	—	—	—	2
Szczecińskie	4	2	49	32	1	—	58	—	95	—	3	86	560	211	143	2	50	—	—	—	—	—	—	3
Zielonogórskie	4	1	25	78	2	—	7	—	85	1	6	77	524	170	130	—	102	—	—	—	—	—	2	3
M. Wrocław	—	—	7	96	—	7	76	—	68	—	3	69	152	70	219	—	8	—	—	—	—	1	1	2
Wrocławskie	15	—	217	216	—	18	59	—	213	1	61	159	897	310	221	9	180	2	—	—	—	1	3	3
Opolskie	12	—	7	28	—	—	1	—	157	1	9	71	492	238	182	6	644	—	—	—	—	—	1	9
Katowickie	5	8	63	354	—	11	8	—	633	—	60	427	1909	549	549	5	409	—	—	—	—	—	—	5
M. Kraków	4	1	38	40	—	1	21	—	65	—	16	211	760	117	191	—	10	2	—	—	—	—	—	1
Krakowskie	15	1	18	33	—	—	2	—	194	3	32	174	490	133	188	—	25	—	—	—	—	—	5	8
Rzeszowskie	11	1	4	96	2	—	2	—	147	—	17	141	281	119	90	10	88	1	—	—	—	1	7	4

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna					
	040		041		045		080				055		050		056		092	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961			1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	9,1	8,2	1,7	1,9	28,2	39,2	0,56	0,68	20,7	14,4	135,5	130,7	342,6	182,8	170,8	128,4		
M. st. Warszawa	4,2	4,2	1,1	3,2	47,9	74,4	1,1	—	9,6	3,2	288,2	324,4	411,6	352,0	182,9	141,4		
Warszawskie	14,5	19,0	0,5	—	23,0	22,5	0,5	—	9,5	9,5	103,5	90,5	272,1	131,0	122,0	75,5		
Bydgoskie	7,6	11,0	0,7	6,2	63,6	105,0	—	—	11,7	4,1	137,5	137,5	548,0	123,0	144,4	96,7		
M. Poznań	2,9	2,9	—	—	8,9	35,5	—	—	17,7	11,8	156,8	245,5	1180,4	417,1	248,5	248,5		
Poznańskie	5,3	8,8	1,2	1,2	37,4	10,5	—	—	8,2	9,4	94,8	121,7	228,8	146,9	182,6	110,0		
M. Łódź	5,0	5,0	—	1,7	60,4	55,3	—	1,7	26,8	18,4	345,5	308,6	556,8	231,4	211,3	191,2		
Łódzkie	8,0	5,1	6,5	0,7	14,5	7,2	—	3,6	26,8	5,8	84,9	63,1	184,4	82,0	139,4	76,2		
Kieleckie	7,4	9,2	1,8	—	2,4	1,2	1,2	—	21,5	32,5	63,8	79,1	130,1	114,7	79,8	77,3		
Lubelskie	5,2	6,5	3,2	—	9,1	13,0	—	—	22,1	11,7	55,9	50,7	131,4	175,6	130,7	106,0		
Białostockie	6,4	8,5	12,8	19,2	67,3	39,5	—	—	13,9	1,1	59,8	50,2	185,9	99,4	151,7	75,8		
Olsztyńskie	12,1	4,0	—	—	55,0	80,5	—	2,7	4,0	4,1	156,9	119,3	287,0	174,3	138,1	118,0		
Gdańskie	8,8	13,6	—	—	58,5	72,1	1,0	2,9	3,9	1,0	180,3	175,4	934,7	309,9	233,9	135,5		
Koszalińskie	5,1	3,4	—	—	25,7	34,3	1,7	—	13,7	18,8	120,0	150,8	395,9	426,7	226,2	97,7		
Szczecińskie	12,6	6,3	—	3,1	48,8	77,1	—	—	29,9	4,7	103,9	135,4	404,5	332,1	185,7	149,5		
Zielonogórskie	4,6	6,1	1,5	1,5	50,5	38,2	—	1,5	—	9,2	71,9	117,7	570,3	259,9	162,1	130,0		
M. Wrocław	2,7	—	—	—	60,4	19,2	2,7	—	19,2	8,2	205,8	189,4	417,2	192,1	247,0	186,6		
Wrocławskie	8,6	10,0	—	—	20,0	144,5	4,0	0,7	63,9	40,6	227,1	105,9	300,4	206,5	206,5	141,8		
Opolskie	10,3	15,4	—	—	5,1	9,0	1,3	1,3	37,2	11,5	138,5	91,1	333,5	305,3	227,0	201,4		
Katowickie	6,1	1,8	1,4	2,9	14,8	22,8	—	—	29,3	21,7	227,6	154,5	363,0	198,7	258,7	229,1		
M. Kraków	14,9	9,9	2,5	2,5	62,0	94,2	—	—	39,7	39,7	215,6	523,0	889,9	290,0	161,1	161,1		
Krakowskie	25,2	8,6	1,1	0,6	7,4	10,3	—	1,7	20,0	18,3	75,5	99,5	124,1	76,1	152,2	111,0		
Rzeszowskie	10,2	8,0	1,4	0,7	3,6	2,9	—	—	15,3	12,4	54,6	102,6	303,4	86,6	104,8	107,0		

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Czerwiec 1961 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	czerwiec 1961	czerwiec 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VI/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VI/1960
Dur brzuszny — 040	206	229	291	1.307	1.452
Dury rzekome ABC — 041	48	44	42	221	127
Czerwonka — 045	981	707	707	4.378	2.958
Biegunka u dzieci do lat 2 764—571	3.266	2.906	3.718	11.018	9.547
Botulismus — 049	24	47	36	113	131
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	171	220	114	510	390
	inne — 049	532	753	562	2.811
Włośnica — 128	8	581	54	184	1.572
Zakaźne zap. wątr. — 092	3.216	4.278	2.600	27.948	38.118
Porażenie dziec. nagm. — 080	17	14	60	73	192
Błonica — 055	361	519	772	2.667	3.676
Płonica — 050	3.273	3.393	3.614	20.665	27.777
Odra — 085	15.509	7.572	8.993	101.466	45.702
Krzusiec — 056	4.578	8.581	6.070	31.081	40.705
Zap. przyusz. nagm. — 089	5.117	4.743	3.454	45.884	34.510
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	69	85	115	393	452
Grypa 480 — 483	6.892	7.593	5.486	475.334	126.257
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100—102	18	21	21	111	132
Zimnica 110—117	1	—	1	1	4
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	2
Choroba Banga — 044	8	7	7	20	30
Teżec — 061	37	25	40	135	94
Róża — 052	138	140	154	793	898

CDW Gieszyn 1421/61 260 N-140

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Lipiec 1961

EGZ. NR 000

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w lipcu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W miesiącu sprawozdawczym krajowy wskaźnik zapadalności utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. (9,9 — VII/1960; 10,0 — VII/1961). Najwyższe wskaźniki zanotowano: w m. Łodzi — 15,1; m. Warszawie — 12,8; woj. Opolskim — 16,7; Warszawskim — 16,5; Łódzkim — 12,3; Kieleckim — 12,3 i woj. Bydgoskim — 21,4, gdzie zanotowano znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 11,7 — VII/1960 do 21,4 — VII/1961. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Rzeszowskim z 22,5 — VII/1960 do 5,8 — VII/1961.

W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z czerwcem br. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 8,2 — VI/1961 do 10,0 — VII/1961.

2. Dury rzekome

W lipcu zgłoszono 46 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. w lipcu br. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 20,6 — VII/1960 do 41,9 — VII/1961. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem 1960 r. zanotowano na terenie następujących województw:

woj. Bydgoskim	— 32,5 — VII/1960;	112,6 — VII/1961
woj. Lubelskim	— 11,7 — VII/1960;	94,3 — VII/1961
woj. Wrocławskim	— 16,0 — VII/1960;	95,9 — VII/1961
woj. Olsztyńskim	— 34,9 — VII/1960;	95,2 — VII/1961
m. Łodzi	— 28,5 — VII/1960;	82,3 — VII/1961
m. Poznaniu	— 8,9 — VII/1960;	38,4 — VII/1961

W miesiącu sprawozdawczym ponad 37% zachorowań zgłoszono z następujących powiatów:

pow. Lublin (woj. Lubelskie)	— 118 zach. zap.; — 1358,4
pow. Wałbrzych (woj. Wrocławskie)	— 51 zach. zap.; — 893,8
pow. Giżycko (woj. Olsztyńskie)	— 29 zach. zap.; — 782,8
m. Toruń (woj. Bydgoskie)	— 66 zach. zap.; — 745,2
m. Wałbrzych (woj. Wrocławskie)	— 65 zach. zap.; — 652,3
m. Bydgoszcz (woj. Bydgoskie)	— 38 zach. zap.; — 194,8
m. Gdańsk (woj. Gdańskie)	— 27 zach. zap.; — 112,4

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 39,2 — VI/1961 do 41,9 — VII/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W lipcu zgłoszono 11 zachorowań, z tego 5 zachorowań miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

woj. Olsztyńskie, pow. Kętrzyn	— 1 zach.
woj. Opolskie, pow. Koźle, Brzeg	— 2 „
woj. Łódzkie, pow. Łódź	— 1 „
m. Łódź, dzielnica Polesie	— 1 „
pozostałe 6 zachorowań miało miejsce w czerwcu br.	
woj. Łódzkie, pow. Radomsko	— 1
woj. Wrocławskie, m. Legnica	— 1
woj. Opolskie, pow. Nysa	— 1

woj. Warszawskie, pow. Pruszków — 1 zach.
 woj. Koszalińskie, pow. Słupsk 1
 woj. Rzeszowskie, m. Przemyśl — 1 „

W lipcu r. ub. zgłoszono 16 zachorowań, a w czerwcu br. 17 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 149,8 — VII/1960 do 133,2 — VII/1961. Najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Poznaniu — 284,0; m. Łodzi — 216,3; m. Wrocławiu — 211,3; woj. Katowickim — 228,0; Opolskim — 178,3 i Wrocławskim — 169,2.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem 1960 r. zanotowano w następujących województwach:

Województwo	VII/1960	VII/1961
m. Poznań	236,7	284,0
m. Łódź	192,9	216,3
m. Wrocław	192,1	211,3
woj. Kieleckie	71,8	82,2
woj. Olsztyńskie	119,3	126,0
woj. Opolskie	170,6	178,3
woj. Katowickie	214,2	228,0
woj. Rzeszowskie	92,4	107,7

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się wzrost wskaźnika zapadalności ze 128,4 — VI/1961 do 133,2 — VII/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Wskaźnik zapadalności na błonicę obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 15,1 — VII/1960 do 12,0 — VII/1961, obniżył się również w porównaniu z czerwcem br. z 14,4 — VI/1961 do 12,0 — VII/1961.

Wyższą zapadalność od krajowej zanotowano — na terenie następujących województw: Wrocławskim — 30,0; Kieleckim — 24,5; Krakowskim — 16,6; Lubelskim — 15,6; Rzeszowskim — 15,3; Zielonogórskim — 13,8; Katowickim — 14,1, m. Krakowie — 27,3 i m. Poznaniu — 17,7.

Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Gdańskim — 1,0; Opolskim — 5,1 i m. Warszawie — 3,2.

2. Płonica

W miesiącu lipcu w porównaniu z lipcem 1960 r. notuje się spadek wskaźnika zapadalności ze 102,0 — VII/1960 do 96,9 — VII/1961.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem wskaźnik zapadalności obniżył się ze 130,7 — VI/1961 do 96,9 — VII/1961.

3. Krztusiec

Notuje się bardzo znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem 1960 r. z 366,4 — VII/1960 do 182,0 — VII/1961. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach: Koszalińskim — 464,4; m. Krakowie — 352,0; m. Warszawie — 338,2 i m. Poznaniu — 322,4. W stosunku do poprzedzającego miesiąca wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie (182,2 — VI/1961; 182,0 — VII/1961).

III. Inne schorzenia

1. Wścieklizna

W miesiącu lipcu zgłoszono 2 przypadki wścieklizny. 1. woj. Warszawskie, pow. Pruszków — pokąsanie przez psa. 2. woj. Lubelskie, pow. Lublin — pokąsanie przez psa.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Bągala Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960 248	95	516	2.988	23	343	728	358	3.752	16	379	2554	5400	9176	2.811	67	5771	17	—	—	5	41	107
	1961 250	46	1049	4.116	21	115	466	17	3.336	11	300	2426	7851	4557	2.999	107	4360	15	—	2	3	40	135
M. st. Warszawa	12	2	58	169	—	3	11	—	140	—	3	207	560	318	311	9	6	1	—	—	—	1	15
Warszawskie	33	2	22	377	—	—	24	1	152	1	11	137	469	389	189	7	76	—	—	1	1	1	9
Bydgoskie	31	5	163	321	3	25	35	—	131	—	8	157	420	175	245	8	109	—	—	—	—	1	8
M. Poznań	3	1	13	111	—	—	3	—	96	—	6	49	98	109	52	—	6	—	—	—	—	—	3
Poznańskie	8	1	23	205	10	7	12	—	184	—	11	129	474	289	114	5	79	—	—	—	—	2	7
M. Łódź	9	—	49	170	—	3	46	—	129	1	5	104	106	118	87	—	2924	—	—	—	—	—	13
Łódzkie	17	1	16	146	—	—	19	—	106	2	9	77	210	142	79	4	76	—	—	—	—	1	8
Kieleckie	20	1	4	164	—	1	16	—	134	—	40	102	301	246	68	8	75	1	—	—	—	3	4
Lubelskie	12	6	145	48	—	—	22	12	153	—	24	46	360	269	86	2	100	3	—	—	—	2	3
Białostockie	9	16	48	263	1	1	8	—	87	—	6	62	167	88	57	2	24	4	—	—	1	2	1
Olsztyńskie	11	—	71	183	—	5	13	—	94	1	3	63	250	102	60	13	35	2	—	—	—	2	7
Gdańskie	8	1	92	279	—	21	66	—	144	—	1	182	668	262	258	1	90	—	—	—	—	1	8
Koszalińskie	3	—	25	211	—	—	3	—	62	1	6	48	446	271	62	6	22	—	—	—	1	1	—
Szczecińskie	2	—	27	48	4	—	34	—	99	—	7	62	210	155	200	3	17	—	—	—	—	1	5
Zielonogórskie	2	—	21	109	—	7	8	—	90	—	9	69	402	158	86	1	78	2	—	—	—	—	2
M. Wrocław	3	—	5	83	—	5	57	—	77	—	2	50	92	75	119	1	—	—	—	—	—	—	10
Wrocławskie	10	1	144	258	1	20	32	—	254	1	45	120	429	321	174	13	140	—	—	—	—	5	13
Opolskie	13	—	3	49	2	2	1	4	139	3	4	78	315	151	98	9	230	—	—	—	—	1	6
Katowickie	24	7	71	500	—	6	35	—	630	—	39	320	921	474	335	7	219	—	—	—	—	3	3
M. Kraków	3	—	33	274	—	6	14	—	51	—	11	86	277	142	104	1	7	—	—	—	—	—	3
Krakowskie	9	2	11	59	—	3	6	—	236	—	29	193	344	199	167	3	25	1	—	—	—	4	5
Rzeszowskie	8	—	5	85	—	—	1	—	148	1	21	85	332	104	48	4	22	1	—	—	—	9	2

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome ABC Paratyphus ABC		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica							
	040		041		045		080					055		050		056		092	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961				1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961			
POLSKA	9,9	10,0	3,8	1,8	20,6	41,9	0,64	0,44	15,1	12,0	102,0	96,9	366,4	182,0	149,8	133,2			
M. st. Warszawa	7,4	12,8	7,4	2,1	42,5	61,7	3,2	—	5,3	3,2	209,5	220,2	449,9	338,2	167,0	148,9			
Warszawskie	14,0	16,5	2,5	1,0	14,5	11,0	1,2	0,5	6,0	5,5	65,0	68,5	255,1	194,6	103,5	76,0			
Bydgoskie	11,7	21,4	15,2	3,4	32,5	112,6	0,7	—	3,4	5,5	125,8	108,5	483,7	120,9	120,9	90,5			
M. Poznań	8,9	8,9	—	2,9	8,9	38,4	—	—	11,8	17,7	91,7	144,9	996,9	322,4	236,7	284,0			
Poznańskie	6,4	4,7	0,6	0,6	7,6	13,4	—	—	5,3	6,4	82,5	75,5	284,4	169,1	186,1	107,7			
M. Łódź	8,4	15,1	18,4	—	28,5	82,3	—	1,7	21,8	8,4	196,2	174,4	649,1	197,9	192,9	216,3			
Łódzkie	9,4	12,3	13,1	0,7	9,4	11,6	—	1,4	20,3	6,5	58,8	55,9	275,8	103,1	148,1	76,9			
Kieleckie	10,4	12,3	1,2	0,6	0,6	2,4	0,6	—	17,2	24,5	47,2	62,2	154,6	150,9	71,8	82,2			
Lubelskie	5,8	7,8	—	3,9	11,7	94,3	—	—	26,0	15,6	35,1	29,9	176,9	175,0	119,0	99,5			
Białostockie	4,3	9,6	2,1	17,1	29,9	51,3	—	—	7,5	6,4	70,5	66,2	133,5	94,0	100,4	92,9			
Olsztyńskie	13,4	14,7	—	—	34,9	95,2	1,3	1,3	4,0	4,0	140,8	84,5	378,2	136,8	119,3	126,0			
Gdańskie	14,6	7,8	1,0	1,0	69,2	89,7	—	—	—	1,0	180,3	177,4	1090,7	255,4	196,9	140,3			
Koszalińskie	—	5,1	1,7	—	17,1	42,8	—	1,7	22,3	10,3	90,8	82,3	365,0	464,4	161,1	106,2			
Szczecińskie	6,3	3,1	4,7	—	91,3	42,5	—	—	11,0	11,0	50,4	97,6	476,9	244,0	179,4	155,8			
Zielonogórskie	3,0	3,0	4,6	—	35,2	32,1	3,0	—	6,1	13,8	68,8	105,5	588,7	241,6	159,0	137,6			
M. Wrocław	8,2	8,2	—	—	21,9	13,7	2,7	—	8,2	5,5	150,9	137,2	507,7	205,8	192,1	211,3			
Wrocławskie	9,3	6,7	—	0,7	16,0	95,9	2,0	0,7	57,0	30,0	195,1	79,9	340,3	213,8	179,8	169,2			
Opolskie	11,5	16,7	1,3	—	11,5	3,8	—	3,8	21,8	5,1	110,3	100,0	239,8	193,7	170,6	178,3			
Katowickie	8,7	8,7	2,9	2,5	13,4	25,7	—	—	12,7	14,1	140,4	115,8	429,2	171,5	214,2	228,0			
M. Kraków	14,9	7,4	14,9	—	66,9	81,8	2,5	—	32,2	27,3	104,1	213,2	691,6	352,0	133,8	126,4			
Krakowskie	9,1	5,1	—	1,1	6,3	6,3	—	—	16,6	16,6	85,8	110,4	127,0	113,8	144,7	135,0			
Rzeszowskie	22,5	5,8	2,9	—	2,2	3,6	0,7	0,7	12,4	15,3	45,1	61,8	314,4	75,7	92,4	107,7			

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	lipiec 1961	lipiec 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VII/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VII/1960
Dur brzuszny — 040	250	248	372	1.557	1.700
Dury rzekome ABC — 041	46	95	108	267	222
Czerwonka — 045	1.049	516	695	5.427	3.474
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	4.112	2.988	6.343	15.130	12.535
Botulismus — 049	21	23	19	134	154
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	115	343	267	625	733
	inne — 049	466	728	544	3.277
Włośnica — 128	17	358	183	201	1.930
Zakaźne zap. wątr. — 092	3.336	3.752	2.923	31.284	41.870
Porażenie dziec. nagm. — 080	11	16	166	84	208
Błonica — 055	300	379	719	2.967	4.055
Plonica — 050	2.426	2.554	3.553	23.091	30.331
Odra — 085	7.851	5.400	6.130	109.317	51.102
Krzusiec — 056	4.557	9.176	7.284	35.638	49.881
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.999	2.811	2.312	48.883	37.321
Zapalenie opon mózgow.-rdzen. nagminne — 057	107	67	114	500	519
Grypa 480 — 483	4.360	5.771	3.683	479.694	132.028
Dur wysypkowy sporadyczny					
Choroba Brillia 100—102	15	17	26	126	149
Zimnica 110—117	—	—	1	1	4
Wścieklizna — 094	2	—	—	2	2
Choroba Banga — 044	3	5	10	23	35
Tężec — 061	40	41	55	175	135
Róża — 052	135	107	145	928	1.005

CDW Cieszyn 1642/61 260 S-26

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej --
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Sierpień 1961

EGZ. NR

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w sierpniu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 14,9 — VIII/1960 do 11,8 — VIII/1961. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach: Olsztyńskim — 28,2; Warszawskim — 24,5; Bydgoskim — 20,7; Kieleckim — 17,8; Koszalińskim — 15,4 i m. Krakowie — 14,9; Nie zanotowano zachorowań w m. Wrocławiu.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w m. Łodzi (25,1 — VIII/1960; 8,4 — VIII/1961), woj. Łódzkim (23,2 — VIII/1960; 13,1 — VIII/1961), Gdańskim (33,1 — VIII/1960; 9,7 — VIII/1961), Olsztyńskim (38,9 — VIII/1960; 28,2 — VIII/1961).

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano wzrost wskaźnika zapadalności z 10,0 — VII/1961 do 11,8 — VIII/1961.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zanotowano 45 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

W sierpniu br. w porównaniu z analogicznym okresem 1960 r. wskaźnik zapadalności wzrósł z 29,7 — VIII/1960 do 39,0 — VIII/1961. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w następujących województwach:

Województwo	VIII/1960	VIII/1961
woj. Olsztyńskie	40,2	110,0
woj. Gdańskie	77,0	106,2
woj. Wrocławskie	14,6	63,3
woj. Białostockie	23,5	60,9
woj. Koszalińskie	17,1	41,1
m. st. Warszawa	55,3	75,5
m. Wrocław	32,9	60,4

Najniższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Kieleckim — 0,6; Rzeszowskim — 2,2 i Opolskim — 3,8.

W porównaniu z lipcem br. notuje się niewielki spadek wskaźnika zapadalności z 41,9 — VII/1961 do 39,0 — VIII/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W sierpniu zgłoszono 21 zachorowań, w tym: 9 zachorowań miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

woj. Warszawskie, pow. Pruszków	— 1 zach.
woj. Bydgoskie, pow. Wąbrzeźno	— 1 "
woj. Łódzkie, pow. Tomaszów Mazowiecki, m. Zduńska Wola	— 2
woj. Opolskie, pow. Nysa, pow. Opole pow. Strzelce Opolskie	— 3
woj. Rzeszowskie, pow. Gorlice	— 1
m. Łódź, dzielnica Górna	— 1

10 ze zgłoszonych zachorowań miało miejsce w miesiącu lipcu br.

woj. Bydgoskie, m. Bydgoszcz	— 1 zach.
woj. Olsztyńskie, pow. Pisz	— 1 „
woj. Gdańskie, m. Tczew	— 1 „
woj. Opolskie, pow. Nysa	— 2 „
woj. Opolskie, pow. Prudnik	— 1 „
woj. Katowickie, m. Bytom, m. Ruda Śląska	— 2 „
m. Łódź, dzielnice: Widzew, Polesie	— 2 „

Jedno zachorowanie zgłoszono z czerwca (woj. Kieleckie, pow. Włoszczowa) i jedno zgłoszono z marca (woj. Zielonogórskie, pow. Żagań).

W sierpniu 1960 r. zgłoszono 23 zachorowania. W lipcu br. — 10 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Wskaźnik zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 185,9 — VIII/1960 do 165,7 — VIII/1961. Natomiast w porównaniu z lipcem br. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 133,2 — VII/1961 do 165,7 — VIII/1961.

Wskaźnik zapadalności obniżył się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Bydgoskiego, Kieleckiego, Katowickiego, Rzeszowskiego, m. Wrocławia i m. Poznania. Najwyższe wskaźniki zapadalności notuje się: w m. Poznaniu — 381,6; m. Wrocławiu — 236,0; m. Łodzi — 221,4; m. Krakowie — 208,2; m. st. Warszawie — 196,8; woj. Katowickim — 271,1; Szczecińskim — 199,9; Opolskim — 194,9; Wrocławskim — 189,8; Gdańskim — 184,2.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W sierpniu zgłoszono 277 zachorowań. W porównaniu z sierpniem 1960 r. notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 16,9 — VIII/1960 do 11,0 — VIII/1961. Wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw: Kieleckiego, Białostockiego, Olsztyńskiego, Koszalińskiego i Zielonogórskiego. Nie notowano zachorowań w woj. Gdańskim. W lipcu br. wskaźnik zapadalności wynosił 12,0.

2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z sierpniem 1960 r. ze 106,1 — VIII/1960 do 93,9 — VIII/1961. Obniżył się również w porównaniu z poprzedzającym miesiącem z 96,9 — VII/1961 do 93,9 — VIII/1961.

3. Krztusiec

Notuje się bardzo znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 440,7 — VIII/1960 do 174,3 — VIII/1961.

Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem 1960 r. zanotowano we wszystkich województwach. W porównaniu z lipcem br. notuje się również spadek wskaźnika zapadalności z 182,0 — VII/1961 do 174,3 — VIII/1961.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonelozy	Inne																
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960
	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961
M. st. Warszawa	12	—	71	163	2	2	11	—	185	—	4	173	139	364	178	8	1	1	—	—	—	1	11
Warszawskie	49	2	67	576	—	—	91	2	208	1	9	103	184	348	118	—	64	2	—	—	—	5	11
Bydgoskie	30	4	83	204	2	4	33	—	235	2	4	168	216	173	176	3	99	—	—	—	—	—	14
M. Poznań	2	2	22	91	—	2	15	—	129	—	6	73	44	94	59	1	10	—	—	—	—	—	2
Poznańskie	12	—	43	254	12	2	39	1	234	—	7	154	233	280	69	4	118	—	—	—	1	2	5
M. Łódź	5	—	32	169	—	—	55	1	132	3	7	89	50	71	45	—	3435	—	—	—	—	—	6
Łódzkie	18	—	26	99	1	1	22	—	166	2	5	73	91	148	59	3	163	—	—	—	—	3	8
Kieleckie	29	2	1	147	—	19	1	—	160	1	53	71	113	303	47	5	67	1	—	—	—	1	6
Łubelskie	15	3	31	69	—	7	35	13	184	—	23	40	125	220	27	3	78	5	—	—	—	2	2
Białostockie	7	12	57	264	7	1	6	—	76	—	7	77	53	148	51	7	45	5	—	—	1	2	3
Olsztyńskie	21	1	82	207	—	6	25	—	101	1	2	80	198	60	47	14	62	—	—	—	—	5	5
Gdańskie	10	1	109	313	1	24	86	—	189	1	—	155	314	285	149	6	123	2	—	—	—	—	8
Koszalińskie	9	—	24	195	—	4	6	—	83	—	9	65	222	204	54	1	24	—	—	—	—	—	2
Szczecińskie	4	1	20	18	1	—	166	—	127	—	3	65	113	181	152	7	23	—	—	—	—	2	6
Zielonogórskie	4	4	31	76	—	4	21	—	102	1	10	62	237	127	72	—	77	—	—	—	—	—	6
M. Wrocław	—	—	22	116	—	1	23	—	86	—	1	43	55	68	81	1	5	—	—	—	—	—	8
Wrocławskie	8	2	95	301	1	17	41	—	285	—	39	171	287	227	118	20	129	1	—	—	1	6	11
Opolskie	10	1	3	48	2	—	123	—	152	6	8	67	230	160	55	7	244	—	—	—	—	4	6
Katowickie	19	7	107	466	1	10	12	—	749	2	41	310	470	488	191	10	207	—	—	—	—	2	10
M. Kraków	6	2	26	204	—	2	22	—	84	—	4	101	92	127	75	—	—	—	—	—	—	—	3
Krakowskie	13	1	22	100	1	10	19	—	285	—	22	142	168	207	181	4	15	2	—	—	—	9	8
Rzeszowskie	13	—	3	85	—	—	2	—	200	1	13	71	117	86	50	9	96	—	—	—	—	13	3

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045		080	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	14,9	11,8	2,4	1,8	29,7	39,0	0,92	0,84
M. st. Warszawa	17,0	12,8	9,6	—	55,3	75,5	5,3	—
Warszawskie	22,5	24,5	2,0	1,0	35,0	33,5	0,5	0,5
Bydgoskie	19,3	20,7	—	2,8	53,2	57,3	0,7	1,4
M. Poznań	5,9	5,9	—	5,9	50,3	65,1	—	—
Poznańskie	5,8	7,0	1,7	—	15,2	25,2	—	—
M. Łódź	25,1	8,4	11,7	—	52,0	53,7	—	5,0
Łódzkie	23,2	13,1	2,9	—	10,2	18,9	—	1,5
Kieleckie	13,5	17,8	—	1,2	1,8	0,6	1,8	0,6
Lubelskie	10,4	9,7	4,5	1,9	16,3	20,2	1,9	—
Białostockie	13,9	7,5	5,3	12,8	23,5	60,9	—	—
Olsztyńskie	38,9	28,2	2,7	1,3	40,2	110,0	—	1,3
Gdańskie	33,1	9,7	1,9	1,0	77,0	106,2	—	1,0
Koszalińskie	20,6	15,4	—	—	17,1	41,1	—	—
Szczecińskie	4,7	6,3	—	1,6	89,7	31,5	—	—
Zielonogórskie	9,2	6,1	4,6	6,1	85,6	47,4	3,0	1,5
M. Wrocław	11,0	—	2,7	—	32,9	60,4	2,7	—
Wrocławskie	11,3	5,3	0,7	1,3	14,6	63,3	2,0	—
Opolskie	6,4	12,8	—	1,3	3,8	3,8	2,6	7,7
Katowickie	8,7	6,9	3,6	2,5	31,8	38,7	0,4	0,7
M. Kraków	4,9	14,9	2,5	4,9	76,8	64,4	—	—
Krakowskie	12,6	7,4	—	0,6	8,6	12,6	0,6	—
Rzeszowskie	12,4	9,5	1,4	—	2,9	2,2	—	0,7

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
16,9	11,0	106,1	93,9	440,7	174,3	185,9	165,7
4,2	4,2	178,7	184,0	613,7	387,1	225,5	196,8
6,5	4,5	65,0	51,5	322,6	174,1	137,0	104,6
6,9	2,8	116,1	116,1	518,9	119,5	158,9	162,4
20,7	17,7	142,0	215,9	955,5	278,1	304,7	381,6
7,6	4,1	97,7	90,1	355,8	163,8	194,9	136,9
33,5	11,7	204,6	149,3	592,1	119,1	281,8	221,4
16,0	3,6	66,8	53,0	309,9	107,4	177,8	120,5
29,4	32,5	33,7	43,6	208,0	185,9	69,9	98,2
19,5	15,0	30,6	26,0	243,3	143,1	138,5	119,7
5,3	7,5	49,1	82,3	179,5	158,1	136,7	81,2
—	2,7	132,8	107,3	502,9	80,5	144,8	135,4
3,9	—	227,1	151,1	1271,9	277,8	247,6	184,2
13,7	15,4	89,1	111,4	548,4	349,6	267,4	142,2
20,5	4,7	125,9	102,3	640,6	284,9	264,4	199,9
9,2	15,3	157,5	94,8	634,6	194,2	214,1	156,0
8,2	2,7	192,1	118,0	565,4	186,6	214,1	236,0
52,6	26,0	168,5	113,9	466,7	151,2	207,1	189,8
30,8	10,3	133,4	85,9	354,0	205,2	198,8	194,9
18,8	14,8	153,8	112,2	475,5	176,6	255,5	271,1
9,9	9,9	84,3	250,3	803,1	314,8	225,6	208,2
17,2	12,6	74,4	81,2	163,6	118,4	169,3	163,0
21,8	9,5	24,7	51,7	401,7	62,6	128,8	145,5

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Sierpień 1961	Sierpień 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1960
Dur brzuszny — 040	296	374	507	1.853	2.074
Dury rzekome ABC — 041	45	61	80	312	283
Czerwonka — 045	977	744	1.000	6.404	4.218
Biegunka u dzieci do lat 2 764— 571	4.165	4.368	8.721	19.295	16.903
Botulismus — 049	30	11	16	164	165
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	116	110	85	741	843
	inne — 049	854	654	544	4.131
Włośnica — 128	17	25	8	218	1.955
Zakaźne zap. wątroby — 092	4.152	4.660	3.512	35.436	46.530
Porażenie dziec. nagm. — 080	21	23	196	105	231
Błonica — 055	277	425	666	3.244	4.480
Płonica — 050	2.353	2.660	3.799	25.444	32.991
Odra — 085	3.751	2.602	2.923	113.068	53.704
Krzusiec — 056	4.369	11.046	7.485	40.007	60.927
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.054	1.829	1.358	50.937	39.150
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	113	103	121	613	622
Grypa 480 — 483	5.085	4.918	4.656	484.779	136.946
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill'a 100 — 102	19	34	27	145	183
Zimnica 110—117	—	2	3	1	6
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	2
Choroba Banga — 044	3	4	7	26	39
Tężec — 061	57	52	57	232	187
Róża — 052	144	127	153	1.072	1.132

CDW Cieszyn 1840/61 260 S-18

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
**MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ**
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Wrzesień 1961

EGZ. NR 000

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna we wrześniu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny (040)

Wskaźnik zapadalności na dur brzuszny obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 18,4 — IX/1960 do 12,5 — IX/1961. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem 1960 r. zanotowano w woj. Olsztyńskim, m. Wrocławiu i m. Krakowie, natomiast znaczny spadek w woj. Kieleckim i m. Łodzi.

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano niewielki wzrost wskaźnika zapadalności z 11,8 — VIII/1961 do 12,5 — IX/1961.

2. Dury rzekome (041)

We wrześniu zgłoszono 35 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka (045, 048)

W miesiącu sprawozdawczym, w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 23,2 — IX/1960 do 31,9 — IX/1961, natomiast w porównaniu z sierpniem br. notuje się spadek wskaźnika z 39,0 — VIII/1961 do 31,9 — IX/1961.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw:

Województwo	IX/1960	IX/1961
Gdańskie	45,8	106,2
Olsztyńskie	46,9	80,5
Koszalińskie	33,7	65,6
Wrocławskie	16,6	42,6
m. Poznań	17,7	88,7
m. Łódź	35,2	77,1
m. Wrocław	13,7	71,3

Nie zanotowano zachorowań w woj. Rzeszowskim, natomiast najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 0,6; Opolskim — 3,8; Szczecińskim — 9,4 i Łódzkim — 10,9.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta) (080)

We wrześniu zgłoszono 7 zachorowań; z tego 4 zachorowania miały miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

woj. Olsztyńskie, pow. Szczytno	— 1 zach.
woj. Gdańskie, pow. Malbork	— 1 „
woj. Koszalińskie, m. Słupsk	— 1 „
woj. Zielonogórskie, m. Gorzów Wielkopolski	— 1 „
pozostałe 3 zachorowania wystąpiły w sierpniu br.	
woj. Olsztyńskie, pow. Pasiek	— 1 „
woj. Koszalińskie, m. Słupsk	— 1 „
woj. Opolskie, pow. Koźle	— 1 „

We wrześniu r. ub. zgłoszono 21 zachorowań. W sierpniu br. zgłoszono również 21 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby (092)

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem r. ub. z 237,6 — IX/1960 do 175,7 — IX/1961.

Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem 1960 r. notują wszystkie województwa z wyjątkiem woj. Katowickiego (264,9 — IX/1960; 303,6 — IX/1961). Wyższą zapadalność od krajowej zanotowano w m. Poznaniu 355,0; m. Wrocławiu — 351,3; m. Łodzi — 229,8; m. Warszawie — 202,1; woj. Katowickim — 303,6; Szczecińskim — 207,8; Gdańskim — 188,1; Opolskim — 187,2; Rzeszowskim — 186,3 i Wrocławskim — 185,8.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w: m. Poznaniu, m. Krakowie, m. Warszawie, woj. Wrocławskim, Poznańskim i Łódzkim.

W sierpniu br. wskaźnik zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby wyniósł 165,7.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica (055)

Mimo spadku krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 15,8 — IX/1960 do 11,3 — IX/1961, to na terenie następujących województw notuje się niewielki wzrost wskaźnika:

woj. Kieleckie	— 26,4 — IX/1960;	30,9 — IX/1961
woj. Koszalińskie	— 8,9 — IX/1960;	21,3 — IX/1961
woj. Olsztyńskie	— 5,4 — IX/1960;	6,7 — IX/1961
woj. Zielonogórskie	— 1,5 — IX/1960;	6,1 — IX/1961
woj. Gdańskie	— 1,9 — IX/1960;	2,9 — IX/1961
m. Kraków	— 24,8 — IX/1960;	27,3 — IX/1961
m. Wrocław	— 2,7 — IX/1960;	8,2 — IX/1961
m. Warszawa	— 2,1 — IX/1960;	3,2 — IX/1961

W porównaniu z sierpniem br. notuje się nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności krajowej (11,0 — VIII/1961; 11,3 — IX/1961).

2. Płonica (050)

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wskaźnik zapadalności obniżył się ze 138,9 — IX/1960 do 126,8 — IX/1961.

Najwyższe wskaźniki zanotowano: w m. Warszawie — 342,5; m. Krakowie — 275,1 i m. Łodzi — 228,1.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 93,9 — VIII/1961 do 126,8 — IX/1961.

3. Krztusiec (056)

Notuje się bardzo znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem 1960 r. z 375,1 — IX/1960 do 138,7 — IX/1961.

Spadek wskaźnika zapadalności notuje się na terenie wszystkich województw w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

W porównaniu z sierpniem 1960 r. notuje się również spadek wskaźnika zapadalności ze 174,3 — VIII/1961 do 138,7 — IX/1961.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	462	56	582	3817	13	198	512	4	5951	21	396	3473	2326	9394	1968	75	9928	19	4	2	2	37	149
	1961	314	35	798	3778	9	77	375	25	4401	7	282	3176	2747	3473	2175	88	7813	18	2	--	7	45	166
M. st. Warszawa	12	—	65	207	—	2	11	1	190	—	3	322	60	270	194	5	15	1	—	—	—	—	—	14
Warszawskie	43	6	26	395	—	1	14	22	205	—	11	177	93	310	116	4	72	—	—	—	—	—	4	11
Bydgoskie	21	3	61	182	—	3	32	—	195	—	9	196	129	158	211	2	180	—	—	—	—	—	—	15
M. Poznań	1	1	30	86	—	1	9	—	120	—	2	56	23	74	62	—	48	—	—	—	—	—	—	1
Poznańskie	12	—	18	168	4	—	21	—	203	—	8	171	196	116	75	2	161	1	1	—	—	3	3	5
M. Łódź	5	—	46	171	—	1	35	1	137	—	10	136	37	67	34	—	5341	1	—	—	—	—	—	19
Łódzkie	26	1	15	95	—	1	23	—	147	—	14	159	94	104	64	5	374	—	—	—	—	1	2	12
Kieleckie	26	1	1	139	—	5	16	—	198	—	49	99	78	224	60	5	99	2	—	—	—	—	2	7
Lubelskie	21	3	24	77	—	1	16	1	191	—	11	129	81	155	54	1	99	1	—	—	—	—	3	3
Białostockie	10	10	44	234	1	—	11	—	112	—	6	113	76	100	64	5	55	5	—	—	—	1	1	8
Olsztyńskie	22	—	60	279	—	5	11	—	101	2	5	94	88	65	103	12	82	1	—	—	—	—	1	2
Gdańskie	9	1	109	273	—	17	37	—	193	1	3	151	212	232	135	2	159	2	1	—	—	—	1	7
Koszalińskie	3	—	37	255	—	—	1	—	79	2	12	69	100	118	40	1	43	—	—	—	—	—	—	3
Szczecińskie	5	—	6	29	—	—	28	—	132	—	4	66	91	147	175	—	28	—	—	—	—	—	—	2
Zielonogórskie	9	1	35	91	—	1	14	—	108	1	4	105	283	116	111	1	102	—	—	—	—	—	—	13
M. Wrocław	9	—	26	134	—	2	15	—	128	—	3	61	51	46	54	—	22	—	—	—	—	1	—	3
Wrocławskie	13	1	64	322	3	4	19	—	279	—	46	224	362	310	139	20	138	2	—	—	—	1	7	11
Opolskie	5	1	3	34	—	—	35	—	146	1	9	80	148	122	56	10	267	—	—	—	—	—	—	7
Katowickie	27	5	86	438	1	4	4	—	839	—	35	374	362	380	202	2	397	2	—	—	—	—	2	11
M. Kraków	9	—	21	115	—	3	13	—	150	—	11	111	22	99	68	—	19	—	—	—	—	—	—	—
Krakowskie	15	—	21	50	—	26	2	—	292	—	14	168	98	163	107	3	13	—	—	—	—	—	9	8
Rzeszowskie	11	1	—	104	—	—	8	—	256	—	13	115	63	97	51	8	99	—	—	—	—	—	10	4

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045, 048		080	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	18,4	12,5	2,2	1,4	23,2	31,9	0,84	0,28
M. st. Warszawa	26,6	12,8	3,2	—	68,1	69,1	1,1	—
Warszawskie	27,5	21,5	2,5	3,0	15,0	13,0	0,5	—
Bydgoskie	20,0	14,5	2,1	2,1	34,5	42,1	—	—
M. Poznań	8,9	2,9	—	2,9	17,7	88,7	—	—
Poznańskie	15,2	7,0	1,7	—	12,3	10,5	—	—
M. Łódź	20,1	8,4	11,7	—	35,2	77,1	3,3	—
Łódzkie	22,5	18,9	3,6	0,7	5,8	10,9	2,2	—
Kieleckie	35,0	15,9	0,6	0,6	1,2	0,6	2,4	—
Lubelskie	15,6	13,7	4,3	1,9	21,5	15,6	—	—
Białostockie	17,1	10,7	6,4	10,7	33,1	47,0	—	—
Olsztyńskie	14,7	29,5	1,3	—	46,9	80,5	2,7	2,7
Gdańskie	33,1	8,8	3,9	1,0	45,8	106,2	1,0	1,0
Koszalińskie	—	5,3	—	—	33,7	65,6	1,8	3,5
Szczecińskie	*7,9	7,9	—	—	23,6	9,4	—	—
Zielonogórskie	18,3	13,8	3,0	1,5	90,2	53,5	3,0	1,5
M. Wrocław	13,7	24,7	—	—	13,7	71,3	—	—
Wrocławskie	24,0	8,6	—	0,7	16,6	42,6	0,7	—
Opolskie	15,4	6,4	—	1,3	10,3	3,8	—	1,3
Katowickie	8,3	9,8	2,2	1,8	24,6	31,1	—	—
M. Kraków	9,9	22,3	4,9	—	52,0	52,0	—	—
Krakowskie	11,4	8,6	0,6	—	4,6	12,0	0,6	—
Rzeszowskie	16,0	8,0	—	0,7	4,4	—	1,4	—

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Blonica Diphtheria		Plonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
15,8	11,3	138,9	126,8	375,1	138,7	237,6	175,7
2,1	3,2	306,3	342,5	578,8	287,2	366,9	202,1
10,0	5,5	96,0	88,5	209,6	155,1	169,6	102,5
11,0	6,2	170,0	135,4	505,1	109,2	201,8	134,8
5,9	5,9	189,3	165,7	760,3	218,9	579,8	355,0
9,9	4,7	129,3	100,1	271,5	67,9	265,1	118,8
25,1	16,8	306,9	228,1	481,3	112,4	296,9	229,8
10,2	10,2	65,3	115,4	267,1	75,5	213,4	106,7
26,4	30,9	43,6	60,7	190,2	137,4	124,6	121,5
19,5	7,1	52,7	83,9	187,3	100,8	208,2	124,2
8,5	6,4	106,8	120,7	235,0	106,8	149,5	119,6
5,4	6,7	178,3	126,0	417,0	87,2	187,7	135,4
1,9	2,9	229,0	147,2	851,9	226,1	281,7	188,1
8,9	21,3	118,8	122,4	668,7	209,3	237,7	140,1
7,9	6,3	165,3	103,9	521,0	231,4	264,4	207,8
1,5	6,1	122,3	160,5	689,6	177,4	224,8	165,1
2,7	8,2	252,5	167,4	625,8	126,2	411,7	351,3
45,9	30,6	166,5	149,2	452,9	206,5	293,7	185,8
34,6	11,5	220,6	102,6	270,6	156,5	259,1	187,2
23,2	12,7	192,5	135,3	437,2	137,5	264,9	303,6
24,8	27,3	151,2	275,1	716,4	245,4	349,5	171,8
10,3	8,0	86,4	96,1	132,1	93,2	191,1	167,0
16,7	9,5	42,9	83,7	229,2	70,6	228,5	186,3

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Wrzesień 1961.	Wrzesień 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—IX. 1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—IX. 1961
Dur brzuszny — 040	314	462	601	2.167	2.536
Dury rzekome ABC — 041	35	56	76	347	339
Czerwonka — 045, 048	798	582	651	7.202	4.800
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	3.778	3.817	6.102	23.073	20.720
Botulismus — 049	9	13	11	173	178
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042	77	198	45	818	1.041
	inne — 049	375	512	331	4.099
Włośnica — 128	25	4	5	243	1.959
Zakaźne zap. wątroby — 092	4.401	5.951	5.068	39.837	52.481
Porażenie dziec. nagm. — 080	7	21	156	112	252
Błonica — 055	282	396	785	3.526	4.876
Płonica — 050	3.176	3.473	5.618	28.620	36.464
Odra — 085	2.747	2.326	2.467	115.815	56.030
Krzusiec — 056	3.473	9.394	6.316	43.480	70.321
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.175	1.968	1.644	53.112	41.118
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	88	75	83	701	697
Grypa 480 — 483	7.813	9.928	9.493	492.592	146.874
Dur wysypkowy sporadyczny					
Choroba Brill 100 — 102	18	19	23	163	202
Zimnica 110—117	2	4	1	3	10
Wścieklizna — 094	—	2	—	2	4
Choroba Banga — 044	7	2	4	33	41
Tężec — 061	45	37	51	277	224
Róża — 052	166	149	179	1.238	1.281

CDW Cieszyn 1921/61 260 N-140

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Październik 1961

EGZ. NR 000028

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w październiku 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny (040)

Krajowy wskaźnik zapadalności w październiku 1961 w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obniżył się z 14,0 — X/1960 do 10,3 — X/1961. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw:

m. Łodzi	25,1 — X/1960;	10,0 — X/1961
✓ woj. Łódzkim	26,8 — X/1960;	13,8 — X/1961
woj. Zielonogórskim	15,3 — X/1960;	4,6 — X/1961
✓ woj. Poznańskim	12,9 — X/1960;	3,5 — X/1961
✓ woj. Wrocławskim	14,6 — X/1960;	5,3 — X/1961
✓ woj. Kieleckim	22,1 — X/1960;	14,7 — X/1961

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano: w woj. Warszawskim — 19,0; Olsztyńskim — 18,8; Gdańskim — 16,6; Kieleckim — 14,7 i m. Krakowie — 17,3.

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 12,5 — IX/1961 do 10,3 — X/1961.

2. Dury rzekome (041)

W październiku zgłoszono 26 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka (045, 048)

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 16,2 — X/1960 do 34,9 — X/1961.

Wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Krakowskiego, natomiast w m. Krakowie i woj. Rzeszowskim zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. W dalszym ciągu najniższe wskaźniki wykazuje woj. Rzeszowskie (0,7) i Kieleckie (2,4).

W porównaniu z wrześniem 1961 notuje się nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności z 31,9 — IX/1961 do 34,9 — X/1961.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta) (080)

W październiku br. zgłoszono 11 zachorowań, w tym: 3 zachorowania miały miejsce w miesiącu sprawozdawczym:

woj. Warszawskie, m. Płock	— 1 zach.
woj. Łódzkie, m. Pabianice	— 1 „
woj. Koszalińskie, pow. Słupsk	— 1 „
5 zachorowań miało miejsce we wrześniu br.	
woj. Koszalińskie, pow. Kołobrzeg	— 1 zach.
woj. Zielonogórskie, pow. Nowa Sól	— 1 „
woj. Wrocławskie, pow. Jelenia Góra	— 1 „
woj. Opolskie, pow. Grodków	— 1 „
m. st. Warszawa, dzielnica Praga Północ	— 1 „

2 zachorowania miały miejsce w lipcu br. (woj. Koszalińskim, pow. Szczecinek, woj. Krakowskie, pow. Bochnia) i 1 zachorowanie w sierpniu br. (woj. Gdańskie, pow. Kartuzy).

We wrześniu br. zgłoszono 7 zachorowań. W październiku 1960 r. zgłoszono 16 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby (092)

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 291,9 — X/1960 do 214,9 — X/1961, natomiast w porównaniu z wrześniem br. notuje się wzrost wskaźnika ze 175,7 — IX/1961 do 214,9 — X/1961.

W październiku br. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano spadek wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Katowickiego, Rzeszowskiego i m. Krakowa. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w: m. Wrocławiu — 425,4; m. Krakowie — 401,6; m. Łodzi — 352,2; m. Poznaniu — 301,7; woj. Katowickiego — 368,4 i Rzeszowskim — 333,6.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica (055)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 360 zachorowań. W porównaniu z październikiem 1960 r. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 16,8 — X/1960 do 14,4 — X/1961. We wrześniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł 11,3. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w:

m. Wrocławiu	2,7 — X/1960;	21,9 — X/1961
woj. Kieleckim	33,1 — X/1960;	41,1 — X/1961
woj. Koszalińskim	13,7 — X/1960;	22,3 — X/1961
woj. Lubelskim	7,8 — X/1960;	15,6 — X/1961

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. Kieleckim — 41,1; Wrocławskim — 32,0; Koszalińskim — 22,3; m. Łodzi — 23,5 i m. Wrocławiu — 21,9.

2. Płonica (050)

Notuje się wzrost wskaźnika zapadalności ze 186,4 — X/1960 do 201,9 — X/1961. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w: m. Warszawie — 609,4; m. Łodzi — 582,0; m. Krakowie — 545,3; m. Poznaniu — 272,2 i m. Wrocławiu — 249,7.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem zanotowano wzrost wskaźnika ze 126,8 — IX/1961 do 201,9 — X/1961.

3. Krztusiec (056)

Wskaźnik zapadalności obniżył się z 322,3 — X/1960 do 126,0 — X/1961. Zapadalność obniżyła się we wszystkich województwach w porównaniu z analogicznym okresem r. ub.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acute	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózgow. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonelozy	Inne																
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	764-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960
	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961
M. st. Warszawa	12	2	80	119	—	2	9	—	258	1	7	573	122	310	262	7	32	2	—	—	—	—	8
Warszawskie	38	1	45	255	—	—	9	16	215	1	22	305	278	155	169	2	129	2	—	—	—	3	12
Bydgoskie	19	—	48	92	7	6	23	1	208	—	6	256	195	130	307	6	260	—	—	—	—	2	12
M. Poznań	1	—	20	49	—	—	64	—	102	—	4	92	33	74	60	1	172	—	—	—	1	—	3
Poznańskie	6	—	21	143	4	2	9	—	296	—	7	274	573	80	130	2	379	—	—	—	1	1	7
M. Łódź	6	3	45	142	—	—	51	—	210	—	14	347	69	68	72	—	6720	2	—	—	—	1	22
Łódzkie	19	—	18	103	—	—	13	—	202	1	11	215	290	92	103	2	671	—	—	—	—	1	6
Kieleckie	24	1	4	108	—	—	55	—	230	—	67	253	163	202	113	4	222	—	—	—	—	1	11
Lubelskie	8	—	16	59	—	—	13	—	200	—	24	238	202	107	200	3	262	3	—	—	—	1	5
Białostockie	9	6	46	187	—	—	2	1	100	—	7	145	171	67	71	1	82	1	—	—	—	—	3
Olsztyńskie	14	—	91	173	—	2	8	—	152	—	5	120	160	104	154	28	117	—	—	—	—	1	3
Gdańskie	17	—	110	254	—	8	46	—	235	1	4	236	268	260	251	3	319	1	—	—	—	—	11
Koszalińskie	8	—	29	240	1	—	6	—	80	3	13	67	231	143	82	—	123	—	—	—	—	—	1
Szczecińskie	3	—	29	47	—	—	34	—	172	—	3	83	162	161	301	4	83	2	—	—	—	1	6
Zielonogórskie	3	2	37	94	—	1	7	—	136	1	6	154	544	95	202	3	216	3	—	—	—	1	2
M. Wrocław	2	—	19	70	—	1	17	—	155	—	8	91	71	80	102	1	13	—	—	—	—	1	16
Wrocławskie	8	1	62	334	1	—	13	—	349	1	48	297	642	259	257	20	454	—	—	—	—	2	14
Opolskie	8	2	9	62	—	—	30	—	187	1	11	85	283	92	70	3	348	—	—	—	—	—	6
Katowickie	18	7	120	374	—	27	2	—	1018	—	51	630	556	362	359	2	692	—	—	—	—	—	14
M. Kraków	7	1	15	49	—	6	6	—	162	—	6	220	17	50	104	—	24	—	—	—	—	—	1
Krakowskie	22	—	9	38	—	2	4	—	398	1	20	196	338	129	248	—	92	—	—	—	—	11	11
Rzeszowskie	7	—	1	65	—	—	2	—	321	—	16	183	201	139	120	11	200	—	—	—	—	7	8

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna		
	040		041		0,45—0,48		080			055		050		092		
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej																
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961		
POLSKA	14,0	10,3	1,6	1,0	16,2	34,9	0,64	0,40	16,8	14,4	186,4	201,9	322,3	126,0	291,9	214,9
M. st. Warszawa	9,6	12,8	2,1	2,1	67,0	85,1	1,1	1,1	4,2	7,4	486,1	609,4	545,6	329,7	493,5	274,4
Warszawskie	24,0	19,0	1,5	0,5	5,0	22,5	0,5	0,5	9,5	11,0	135,0	152,6	246,6	77,5	207,1	107,5
Bydgoskie	18,6	13,1	0,7	—	18,0	33,2	0,7	—	11,7	4,1	159,6	176,9	334,4	89,8	264,6	143,7
M. Poznań	2,9	2,9	—	—	32,5	59,2	—	—	32,5	11,8	245,5	272,2	488,1	218,9	689,3	301,7
Poznańskie	12,9	3,5	—	—	5,3	12,3	—	—	14,0	4,1	179,6	160,3	234,7	46,8	334,7	173,2
M. Łódź	25,1	10,0	5,0	5,0	30,2	75,5	—	—	30,2	23,5	471,3	582,0	421,0	114,0	444,4	352,2
Łódzkie	26,8	13,8	2,2	—	7,2	13,1	2,2	0,7	8,7	8,0	96,5	156,1	232,3	66,8	293,3	146,6
Kieleckie	22,1	14,7	2,4	0,6	—	2,4	0,6	—	33,1	41,1	92,0	155,2	161,4	82,6	144,2	141,1
Lubelskie	7,1	5,2	0,6	—	9,7	10,4	—	—	7,8	15,6	53,3	154,8	387,0	69,6	249,8	130,1
Białostockie	4,3	9,6	2,1	6,4	22,4	49,1	—	—	5,3	7,5	107,9	154,9	228,6	71,6	152,8	106,8
Olsztyńskie	25,5	18,8	2,7	—	36,2	122,0	—	—	—	6,7	209,2	160,9	500,2	139,5	258,8	203,8
Gdańskie	13,6	16,6	1,9	—	25,4	107,2	1,0	1,0	1,9	3,9	338,2	230,0	504,9	253,4	264,1	229,0
Koszalińskie	6,8	13,7	—	—	20,6	49,7	1,7	5,1	13,7	22,3	233,1	114,8	548,4	245,1	257,1	137,1
Szczecińskie	7,9	4,7	—	—	18,9	45,6	—	—	22,0	4,7	207,8	136,0	415,6	253,4	305,4	270,7
Zielonogórskie	15,3	4,6	6,1	3,0	21,4	56,6	1,5	1,5	4,6	9,2	157,5	235,5	602,5	145,3	284,4	207,9
M. Wrocław	5,5	5,5	—	—	13,7	52,1	—	—	2,7	21,9	318,4	249,7	590,1	219,6	496,8	425,4
Wrocławskie	14,6	5,3	—	0,7	18,6	41,3	0,7	0,7	56,6	32,0	227,1	197,8	297,7	172,5	298,4	232,4
Opolskie	14,1	10,3	—	2,6	1,3	11,5	2,6	1,3	23,1	14,1	178,3	109,0	270,6	118,0	269,3	239,8
Katowickie	8,0	6,5	4,0	2,5	24,6	43,4	0,4	—	24,2	18,4	230,9	228,0	349,9	131,0	355,0	368,4
M. Kraków	4,9	17,3	2,5	2,5	37,2	37,2	—	—	19,8	14,9	267,7	545,3	508,1	123,9	376,8	401,6
Krakowskie	9,1	12,6	—	—	8,0	5,1	0,6	0,6	14,3	11,4	108,7	112,1	95,5	73,8	232,8	227,7
Rzeszowskie	9,5	5,1	0,7	—	0,7	0,7	0,7	—	10,9	11,6	123,7	133,2	235,8	101,1	324,5	333,6

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Paździe- nik 1961	Paździe- nik 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—X/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—X/1960
Dur brzuszny — 040	259	350	426	2.426	2.886
Dury rzekome ABC — 041	26	40	44	373	379
Czerwonka 0,45—0,48	874	406	440	8.076	5.206
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	3.057	2.530	3.415	26.130	23.250
Botulismus — 049	13	7	7	186	185
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozy 042 inne — 049	57	37	54	875	1.078
	423	446	254	4.929	4.545
Włośnica — 128	18	221	30	261	2.180
Zakaźne zap. wątroby — 092	5.386	7.316	6.763	45.223	59.797
Porażenie dziec. nagm. — 080	11	16	114	111	268
Błonica — 055	360	422	914	3.886	5.298
Płonica — 050	5.060	4.671	7.793	33.680	41.135
Odra — 085	5.569	5.056	5.092	121.384	61.086
Krztusiec — 056	3.159	8.104	5.565	46.639	78.425
Zap. przyusz. nagm. — 089	3.737	4.207	3.404	56.849	45.325
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	103	76	78	804	773
Grypa 480 — 483	11.610	18.703	18.634	504.202	165.577
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill'a 100 — 102	16	24	22	179	226
Zimnica 110—117	—	3	2	3	13
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	4
Choroba Banga — 044	2	2	4	35	43
Tężec — 061	34	31	38	311	255
Róża — 052	182	169	213	1.420	1.450

CDW Cieszyn 2066/61 260 G-190

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



**INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY**

Listopad 1961

EGZ. NR 000017

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w listopadzie 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności na dur brzuszny obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 12,9 — XI/1960 do 10,7 — XI/1961. Wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano: w m. st. Warszawie (9,6 — XI/1960; 15,9 — XI/1961), w woj. Białostockim (9,6 — XI/1960; 13,9 — XI/1961), Szczecińskim (3,1 — XI/1960; 12,6 — XI/1961), Wrocławskim (3,3 — XI/1960; 6,6 — XI/1961), Kieleckim (26,4 — XI/1960; 28,2 — XI/1961) i Rzeszowskim (6,5 — XI/1960; 7,3 — XI/1961). W woj. Kieleckim — pow. Opoczno (Drzewica) zanotowano ognisko duru brzuszego — 15 zachorowań. Zachorowania spowodowane były złym stanem sanitarnym zakładu — Wytwórnia WYROBÓW NOŻOWNICZYCH „Gerlach”.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się nieznaczny wzrost wskaźnika zapadalności z 10,3 — X/1961 do 10,7 — XI/1961.

2. Dury rzekome

W listopadzie zgłoszono 19 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notuje się znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z listopadem 1960 r. (14,4 — XI/1960; 32,5 — XI/1961). Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw:

woj. Białostockiego	20,3 — XI/1960;	106,8 — XI/1961
woj. Olsztyńskiego	17,4 — XI/1960;	92,5 — XI/1961
woj. Koszalińskiego	6,8 — XI/1960;	82,3 — XI/1961
woj. Szczecińskiego	23,6 — XI/1960;	70,8 — XI/1961
woj. Wrocławskiego	11,3 — XI/1960;	51,3 — XI/1961
m. st. Warszawy	31,1 — XI/1960;	78,7 — XI/1961
m. Łodzi	26,8 — XI/1960;	55,3 — XI/1961

Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 1,2 i Krakowskim — 2,9. Nie zanotowano zachorowań w woj. Rzeszowskim.

W październiku br. wskaźnik zapadalności wynosił — 34,9.

4. Porażenia dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W listopadzie zgłoszono 2 zachorowania, w tym: jedno ze zgłoszonych miało miejsce w miesiącu sprawozdawczym — woj. Koszalińskie, pow. Ustka i jedno zachorowanie z września br. woj. Koszalińskie, m. Koszalin.

W październiku br. zgłoszono 11 zachorowań, a w listopadzie 1960 r. 17 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

- Zapadalność obniżyła się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 351,9 — XI/1960 do 256,9 — XI/1961. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Kieleckiego, Katowickiego i m. Krakowa. Wyższą zapadalność od krajowej zanotowano w: m. Krakowie — 401,6; m. Poznaniu — 369,8; m. Wrocławiu — 337,6; m. st. Warszawie — 280,8; m. Łodzi — 265,0; woj. Katowickim — 437,9; Szczecińskim — 374,6; Opolskim — 304,0; Wrocławskim — 291,0 i Krakowskim — 272,9.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowały następujące województwa:

Województwo (miasto)	XI/1960	XI/1961
m. Poznań	911,1	569,8
m. Wrocław	697,1	337,6
m. st. Warszawa	481,8	280,8
woj. Poznańskie	442,4	207,7
woj. Łódzkie	347,0	179,3

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się sezonowy wzrost wskaźnika zapadalności z 214,9 — X/1961 do 256,9 — XI/1961.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Krajowy wskaźnik zapadalności na błonicę obniżył się w porównaniu z listopadem r. ub. z 22,1 — XI/1960 do 16,2 — XI/1961. Natomiast w porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się wzrost wskaźnika zapadalności z 14,4 — X/1961 do 16,2 — XI/1961. Wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. katowickim (17,0 — XI/1960; 21,3 — XI/1961), Gdańskim (6,8 — XI/1960; 7,8 — XI/1961) i Kieleckim (47,9 — XI/1960; 61,4 — XI/1961). W listopadzie br. najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w woj. kieleckim — 61,4; Wrocławskim — 55,9 i m. Krakowie — 34,7. W powiecie i mieście Sandomierzu (woj. kieleckie) zanotowano 26 zachorowań (pow. 21 zach., m. 5 zach.). Zachorowania wystąpiły wśród dzieci w wieku szkolnym nie szczepionych.

2. Płonica

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z listopadem r. ub. z 201,4 — XI/1960 do 226,4 — XI/1961, jak również wzrost w stosunku do poprzedzającego miesiąca z 201,9 — X/1961 do 226,4 — XI/1961.

Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. st. Warszawie — 866,8; m. Krakowie — 619,7; m. Łodzi 607,1 i m. Poznaniu — 588,7.

3. Krztusiec

Mimo dalszego spadku krajowego wskaźnika zapadalności (388,1 — XI/1960; 147,2 — XI/1961), to niektóre województwa notują jeszcze dość wysokie wskaźniki: m. st. Warszawa — 490,3; m. Wrocław — 271,7; m. Poznań — 330,7; m. Kraków — 215,6 i woj. Koszalińskie — 245,1.

W październiku br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 126,0.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Pionica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózgz. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tétanus	Roża Erysipelas
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	754-571	049	042																
POLSKA	1960	20	360	1865	12	73	293	18	8812	17	554	5045	9583	9719	7004	46	29616	22	—	—	3	29	181
	1961	19	813	2096	13	41	324	17	6433	2	406	5671	8166	3687	5690	72	18662	15	—	—	11	32	187
M. st. Warszawa	15	—	74	109	—	—	11	1	264	—	1	815	140	461	395	9	37	3	—	—	1	—	10
Warszawskie	34	1	43	193	—	1	11	3	325	—	12	321	508	210	340	—	288	1	—	—	1	3	19
Bydgoskie	12	—	36	74	8	7	14	—	276	—	7	282	412	121	695	2	532	1	—	—	—	1	17
M. Poznań	3	—	14	55	—	—	—	—	125	—	5	199	70	78	108	—	346	—	—	—	—	1	2
Poznańskie	8	—	26	115	2	1	—	—	355	—	6	235	677	125	230	2	872	—	—	—	4	1	8
M. Łódź	3	—	33	80	—	—	34	1	158	—	10	362	246	95	43	—	8798	1	—	—	—	—	23
Łódzkie	17	—	18	38	—	1	5	—	247	—	5	173	849	84	77	3	704	1	—	—	3	—	11
Kieleckie	46	—	2	62	—	1	5	1	308	—	100	237	188	256	214	8	411	—	—	—	—	1	5
Lubelskie	11	2	22	28	—	—	23	—	327	—	19	273	156	191	166	1	517	4	—	—	—	5	9
Białostockie	13	4	100	86	—	—	1	10	131	—	2	113	409	64	132	2	131	1	—	—	—	1	4
Olsztyńskie	12	—	69	147	—	1	2	—	163	—	2	110	146	68	172	7	125	3	—	—	—	1	6
Gdańskie	23	2	63	219	—	8	29	1	260	—	8	258	292	210	430	1	615	—	—	—	—	—	7
Koszalińskie	2	—	48	132	—	—	3	—	111	2	10	96	373	143	168	3	264	—	—	—	—	1	1
Szczecińskie	8	—	45	40	—	—	11	—	238	—	4	109	164	119	470	1	110	—	—	—	—	—	4
Zielonogórskie	7	—	28	52	—	6	2	—	160	—	4	151	505	96	358	2	361	—	—	—	2	—	4
M. Wrocław	2	—	11	58	—	3	17	—	123	—	7	97	71	99	103	—	325	—	—	—	—	—	5
Wrocławskie	10	2	77	179	1	2	125	—	437	—	84	399	722	269	335	13	737	—	—	—	—	3	12
Opolskie	8	1	9	40	—	—	2	—	237	—	9	70	501	94	154	2	550	—	—	—	—	2	10
Katowickie	12	7	77	307	1	10	1	—	1210	—	59	708	887	372	436	2	2149	—	—	—	—	3	13
M. Kraków	2	—	13	11	—	—	22	—	162	—	14	250	92	87	156	1	53	—	—	—	—	—	6
Krakowskie	10	—	5	14	1	—	6	—	477	—	26	243	376	338	263	1	388	—	—	—	—	6	8
Rzeszowskie	10	—	—	57	—	—	—	—	339	—	12	170	382	107	245	12	349	—	—	—	—	3	3

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemiczna			
	040		041		045—048		080			055		050		056		092	
	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961		1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	12,9	10,7	0,8	0,7	14,4	32,5	0,68	0,08	22,1	16,2	201,4	226,4	388,1	147,2	351,9	256,9	
M. st. Warszawa	9,6	15,9	4,2	—	35,1	78,7	1,1	—	4,2	1,1	502,0	866,8	799,8	490,3	481,8	280,8	
Warszawskie	26,0	17,0	0,5	0,5	10,0	21,5	0,5	—	13,0	6,0	157,5	160,5	290,5	105,0	260,5	162,5	
Bydgoskie	11,7	8,3	—	—	21,4	24,9	—	—	6,9	4,8	172,7	194,9	357,2	83,6	317,2	190,7	
M. Poznań	17,7	8,9	—	—	23,7	41,4	—	—	62,1	14,8	319,5	588,7	751,4	230,7	911,1	369,8	
Poznańskie	9,4	4,7	1,2	—	7,6	15,2	—	—	9,4	3,5	219,4	137,5	266,8	73,1	442,4	207,7	
M. Łódź	15,1	5,0	—	—	26,8	55,3	1,7	—	33,5	16,8	501,5	607,1	560,2	159,3	387,4	265,0	
Łódzkie	19,6	12,3	0,7	—	10,2	13,1	—	—	13,1	3,6	106,7	125,6	301,2	61,0	347,0	179,3	
Kieleckie	26,4	28,2	0,6	—	0,6	1,2	0,6	—	47,9	61,4	74,8	145,4	235,0	157,0	163,8	189,0	
Lubelskie	11,0	7,1	1,9	1,3	4,5	14,3	0,6	—	23,4	12,3	60,5	177,6	212,1	124,2	336,9	212,7	
Białostockie	9,6	13,9	1,1	4,3	20,3	106,8	1,1	—	8,5	2,1	95,1	120,7	219,0	68,4	209,4	140,0	
Olsztyńskie	16,1	16,1	—	—	17,4	92,5	1,3	—	1,3	2,7	202,5	147,7	510,9	91,2	280,3	218,6	
Gdańskie	23,4	22,4	1,0	1,9	54,6	61,4	2,9	—	6,8	7,8	351,9	251,5	740,8	204,7	358,7	253,4	
Koszalińskie	5,1	3,4	—	—	6,8	82,3	—	3,4	32,6	17,1	162,8	164,5	641,0	245,1	286,2	190,2	
Szczecińskie	3,1	12,6	1,5	—	23,6	70,8	—	—	37,8	6,3	325,8	171,6	414,0	187,3	465,9	374,6	
Zielonogórskie	15,3	10,7	—	—	26,0	42,8	4,6	—	7,6	6,1	206,4	230,9	824,2	146,8	299,7	244,6	
M. Wrocław	5,5	5,5	—	—	2,7	30,2	—	—	21,9	19,2	367,8	266,2	625,8	271,7	697,1	337,6	
Wrocławskie	3,3	6,6	0,7	1,3	11,3	51,3	0,7	—	66,6	55,9	210,4	265,7	418,9	179,1	345,6	291,0	
Opolskie	15,4	10,3	—	1,3	2,6	11,5	1,3	—	32,1	11,5	202,6	89,8	368,1	120,6	346,3	304,0	
Katowickie	9,0	4,3	0,7	2,5	17,7	27,9	—	—	17,0	21,3	251,5	256,2	376,4	134,6	421,2	437,9	
M. Kraków	4,9	4,9	2,5	—	37,2	32,2	—	—	39,7	34,7	433,8	619,7	694,1	215,6	396,6	401,6	
Krakowskie	6,9	5,1	—	—	5,1	2,9	—	—	24,6	14,9	140,2	139,0	142,4	193,4	287,8	272,9	
Rzeszowskie	6,5	7,3	0,7	—	—	—	1,4	—	16,0	8,7	74,9	123,7	334,7	77,9	377,7	246,7	

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Listopad 1961 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	listopad 1961	listopad 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-XI, 1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-XI/1960
Dur brzuszny — 040	268	323	311	2.694	3.209
Dury rzekome ABC — 041	19	20	33	392	399
Czerwonka 0,45—0,48	813	360	385	8.889	5.566
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	2.096	1.865	2.025	28.226	25.115
Botulismus — 049	13	12	12	199	197
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042	41	73	31	916	1.151
	inne — 049	324	293	247	5.253
Włośnica — 128	17	18	15	278	2.198
Zakaźne zap. wątroby — 092	6.433	8.812	7.981	51.656	68.609
Porażenie dziec. nagm. — 080	2	17	61	113	285
Błonica — 055	406	554	900	4.292	5.852
Płonica — 050	5.671	5.045	6.457	39.351	46.180
Odra — 085	8.166	9.583	8.587	129.550	70.669
Krzusiec — 056	3.687	9.719	6.629	50.326	88.144
Zap. przyusz. nagm. — 089	5.690	7.004	4.747	62.539	52.329
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	72	46	81	876	819
Grypa 480 — 483	18.662	29.616	26.438	522.864	195.193
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	15	22	20	194	248
Zimnica 110—117	—	—	—	7	13
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	4
Choroba Banga — 044	11	3	3	46	46
Tężec — 061	32	29	18	343	284
Róża — 052	187	181	193	1.607	1.631

CDW Cieszyn 233/62 260 G-190

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Grudzień 1961

EGZ. NR

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w grudniu 1961 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w grudniu br. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 10,2 — XII/1960 do 8,4 — XII/1961. Najwyższe wskaźniki zapadalności w miesiącu sprawozdawczym zanotowano w: woj. Gdańskim — 18,5; Kieleckim — 18,4; Wrocławskim — 14,6; Warszawskim — 13,0 i Szczecińskim — 12,6. Nie zanotowano zachorowań w m. Poznaniu, m. Wrocławiu i m. Krakowie. Niewielki wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Bydgoskim (6,9 — XII/1960; 9,7 — XII/1961, Kielickim (16,6 — XII/1960; 18,4 — XII/1961), Białostockim (2,1 — XII/1960; 8,5 — XII/1961), Lubelskim (3,9 — XII/1960; 9,1 — XII/1961), Szczecińskim (7,9 — XII/1960; 12,6 — XII/1961), Wrocławskim (8,0 — XII/1960; 14,6 — XII/1961) i Rzeszowskim (6,5 — XII/1960; 8,0 — XII/1961).

W grudniu br. większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 10,7 — XI/1961 do 8,4 — XII/1961.

2. Dury rzekome

W grudniu br. zgłoszono 20 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wzrósł z 16,1 — XII/1960 do 25,7 — XII/1961, natomiast w porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się spadek wskaźnika zapadalności z 32,5 — XI/1961 do 25,7 — XII/1961. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie następujących województw:

Wrocławskiego	5,3 — XII/1960;	51,9 — XII/1961
Białostockiego	28,8 — XII/1960;	74,8 — XII/1961
Olsztyńskiego	35,5 — XII/1960;	80,5 — XII/1961
Gdańskiego	62,4 — XII/1960;	86,7 — XII/1961
m. st. Warszawy	24,5 — XII/1960;	47,9 — XII/1961

Nie zanotowano zachorowań w woj. Rzeszowskim. Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 0,6; Opolskim — 2,5 i Krakowskim — 2,9.

4. Porażenia dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W grudniu br. zgłoszono 3 zachorowania, w tym: 2 zachorowania miały miejsce w miesiącu sprawozdawczym — woj. Poznańskie, pow. Śrem — 1 zach. i woj. Szczecińskie m. Szczecin — 1 zach. Jedno zachorowanie zgłoszono z listopada br. — woj. Olsztyńskie, pow. Lidzbark Warmiński.

W grudniu 1960 r. zgłoszono 16 zachorowań. W listopadzie br. 2 zachorowania.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Wskaźnik zapadalności na zakaźne zapalenie wątroby obniżył się w porównaniu z grudniem r. ub. z 302,8 — XII/1960 do 203,7 — XII/1961. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Kieleckiego. Najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Szczecińskim — 341,6; Katowickim — 331,5; Opolskim — 246,2; Krakowskim — 233,4; Gdańskim — 222,2; m. Wrocławiu — 307,4; m. Krakowie — 290,0 i m. Łodzi — 245,9.

W listopadzie br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 256,9.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z grudniem 1960 r. z 21,1 — XII/1960 do 13,0 — XII/1961. Wszystkie województwa notują spadek wskaźnika zapadalności z wyjątkiem woj. Zielonogórskiego (10,7 — XII/1960; 22,9 — XII/1961) i m. Wrocławia (13,7 — XII/1960; 24,7 — XII/1961), natomiast w woj. Warszawskim i m. Krakowie zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu r. ub. Najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w m. Krakowie — 39,7; m. Wrocławiu — 24,7; m. Łodzi — 21,8; woj. Kieleckim — 30,7 i Zielonogórskim — 22,9. W listopadzie br. krajowy wskaźnik dalności wyniósł 16,2

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności ze 186,1 — XII/1960 do 203,8 — XII/1961. Wyższe wskaźniki od krajowego (203,8) zanotowano w: m. st. Warszawie, m. Łodzi, m. Krakowie, m. Poznaniu, m. Wrocławiu, woj. Wrocławskim, Gdańskim i Katowickim.

W listopadzie br. krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł —226,4.

3. Krztusiec

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w grudniu br. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 312,4 — XII/1960 do 109,6 — XII/1961, notuje się również spadek w porównaniu z listopadem br. ze 147,2 — XI/1961 do 109,6 — XII/1961. Spadek wskaźnika zapadalności zanotowano na terenie wszystkich województw w porównaniu z analogicznym okresem w ub.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome ABC Paratyphus ABC	Czerwonka Dysenteria	Biegunka u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagn. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagn. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	794-571	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061
1960	255	23	404	1461	5	62	487	60	7584	16	528	4662	13862	7824	7972	64	35232	17	—	—	8	20	135
POLSKA	210	20	643	1363	8	34	283	50	5102	3	326	5104	8283	2745	6178	70	46163	15	—	—	4	19	139
1961	210	20	643	1363	8	34	283	50	5102	3	326	5104	8283	2745	6178	70	46163	15	—	—	4	19	139
M. st. Warszawa	3	1	45	56	—	1	8	1	176	—	6	994	155	356	558	3	2478	—	—	—	—	—	10
Warszawskie	26	3	34	121	—	—	9	4	239	—	18	231	445	164	308	—	288	5	—	—	1	1	14
Bydgoskie	14	3	57	58	—	—	16	2	228	—	8	229	389	133	1176	—	841	—	—	—	1	2	8
M. Poznań	—	—	4	30	—	—	2	—	73	—	1	107	37	66	106	—	439	—	—	—	—	—	2
Poznańskie	8	1	32	58	3	—	10	—	277	1	10	192	451	110	204	2	1231	—	—	—	—	1	9
M. Łódź	6	—	12	75	—	—	40	—	146	—	13	444	367	46	43	—	11145	—	—	—	—	—	17
Łódzkie	9	—	11	32	—	1	8	—	196	—	9	179	491	38	73	4	900	—	—	—	—	—	5
Kieleckie	30	1	1	54	—	—	4	—	275	—	50	195	122	182	233	9	364	—	—	—	—	—	4
Lubelskie	14	—	12	6	—	—	16	17	242	—	15	192	197	129	137	1	519	1	—	—	—	—	4
Białostockie	8	3	70	52	—	—	1	3	116	—	2	99	624	48	116	—	127	2	—	—	—	—	2
Olsztyńskie	6	1	60	66	—	1	6	—	146	1	10	88	131	50	109	8	149	2	—	—	—	1	5
Gdańskie	19	1	89	133	—	10	48	—	228	—	3	237	333	170	430	6	877	2	—	—	—	—	9
Koszalińskie	3	—	18	112	—	—	6	19	85	—	5	93	428	63	176	4	356	—	—	—	—	—	2
Szczecińskie	8	—	17	27	—	2	13	—	217	1	3	96	132	142	493	—	138	—	—	—	—	—	—
Zielonogórskie	4	1	34	44	—	6	10	—	124	—	15	91	482	96	319	2	341	—	—	—	—	1	2
M. Wrocław	—	—	8	55	—	—	6	—	112	—	9	84	211	94	158	—	151	—	—	—	—	—	7
Wrocławskie	22	2	78	108	3	3	14	—	305	—	65	353	908	186	349	12	474	1	—	—	1	2	12
Opolskie	5	—	2	43	2	—	3	—	192	—	5	68	538	77	177	7	633	—	—	—	—	—	6
Katowickie	6	1	41	189	—	9	45	4	916	—	38	591	814	355	454	5	23630	—	—	—	1	1	7
M. Kraków	—	2	13	4	—	1	7	—	117	—	16	235	216	63	187	—	59	—	—	—	—	—	4
Krakowskie	8	—	5	2	—	—	5	—	408	—	16	178	306	115	235	1	369	—	—	—	—	1	8
Rzeszowskie	11	—	—	38	—	—	6	—	284	—	9	128	506	62	137	6	654	2	—	—	—	9	2

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna		
	040		041		045—048		080			055		056		092		
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
R o k	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961	1960	1961
POLSKA	10,2	8,4	0,9	0,8	16,1	25,7	0,64	0,12	21,2	13,0	186,1	203,8	312,4	109,6	302,8	203,7
M. st. Warszawa	7,4	3,2	3,2	1,1	24,5	47,9	2,1	—	7,4	6,4	505,2	1057,2	779,6	378,6	395,6	187,2
Warszawskie	21,5	13,0	—	1,5	6,5	17,0	0,5	—	9,0	9,0	145,0	115,5	217,1	82,0	221,6	119,5
Bydgoskie	6,9	9,7	—	2,1	19,3	39,4	1,4	—	11,0	5,5	192,1	158,2	254,3	91,9	273,6	157,5
M. Poznań	—	—	—	—	41,4	11,8	—	—	20,7	2,9	260,2	316,5	736,6	195,2	585,7	215,9
Poznańskie	9,4	4,7	—	0,6	8,8	18,7	1,2	0,6	9,9	5,8	122,9	112,3	195,4	64,4	309,0	162,1
M. Łódź	15,1	10,1	—	—	21,8	20,4	—	—	40,2	21,8	506,5	744,7	451,2	77,1	313,6	215,9
Łódzkie	19,6	6,5	—	—	9,4	8,0	—	—	11,6	6,5	84,9	129,9	233,0	27,6	241,0	140,1
Kieleckie	16,6	18,4	1,2	0,6	0,6	0,6	—	—	47,2	30,7	76,1	119,6	180,4	111,6	154,6	168,7
Lubelskie	3,9	9,1	0,6	—	9,1	7,8	0,6	—	16,3	9,7	54,6	124,9	220,5	83,9	233,5	157,4
Białostockie	2,1	8,5	3,2	3,2	28,8	74,8	—	—	16,0	2,1	99,4	105,8	190,2	51,3	269,2	123,9
Olsztyńskie	20,1	8,0	—	1,3	33,5	80,5	2,7	1,3	16,1	13,4	118,0	118,0	383,5	80,5	256,1	195,8
Gdańskie	19,5	18,5	1,0	1,0	62,4	86,7	—	—	6,8	2,9	449,3	231,0	559,5	165,7	338,2	222,2
Koszalińskie	5,1	5,1	—	—	32,6	30,8	—	—	51,4	8,6	190,2	159,4	569,0	108,0	320,5	145,7
Szczecińskie	7,9	12,6	—	—	20,5	26,7	1,6	1,6	18,9	4,7	310,1	151,1	445,5	223,5	365,2	341,6
Zielonogórskie	7,6	6,1	4,6	1,5	36,7	52,0	4,6	—	10,7	22,9	120,8	139,1	487,8	146,8	261,5	189,6
M. Wrocław	2,7	—	2,7	—	13,7	21,9	—	—	13,7	24,7	307,4	230,5	518,7	258,0	461,1	307,4
Wrocławskie	8,0	14,6	—	1,3	5,3	51,9	0,7	—	59,9	43,3	196,5	235,1	369,0	123,1	319,0	203,1
Opolskie	7,8	6,4	—	—	1,3	2,5	—	—	19,2	6,4	194,9	87,2	243,7	98,8	334,7	246,2
Katowickie	5,1	2,2	0,7	0,4	17,4	14,8	—	—	23,2	13,7	215,7	213,9	333,7	128,5	429,9	331,5
M. Kraków	4,9	—	7,4	4,9	49,6	32,2	—	—	39,7	39,7	557,7	582,5	518,1	156,2	312,3	290,0
Krakowskie	9,1	4,6	1,7	—	8,0	2,9	—	—	16,6	9,1	86,4	101,8	121,3	65,8	274,0	233,4
Rzeszowskie	6,5	8,0	0,7	—	1,4	—	0,7	—	13,8	6,5	95,3	93,1	171,0	45,1	317,3	206,7

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Grudzień 1961	Grudzień 1960	Mediana 1957— —1960	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-XII/1961	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-XII/1960
Dur brzuszny — 040	210	255	267	2.904	3.464
Dury rzekome ABC — 041	20	23	26	412	422
Czerwonka 0,45—0,48	643	404	426	9.532	5.970
Biegunka u dzieci do lat 2 764 — 571	1.363	1.461	1.597	29.589	26.576
Botulismus — 049	8	5	13	207	202
Zatrucia pokarmowe } Salmonelozы 042 inne — 049	34	62	34	950	1.213
	283	487	338	5.536	5.325
Włośnica — 128	50	60	20	328	2.258
Zakaźne zap. wątroby — 092	5.102	7.584	7.276	56.758	76.193
Porażenie dziec. nagm. — 080	3	16	51	96	301
Błonica — 055	326	528	904	4.618	6.380
Płonica — 050	5.104	4.662	5.855	44.455	50.842
Odra — 085	8.283	13.862	10.460	137.833	84.531
Krzusiec — 056	2.745	7.824	5.946	53.071	95.968
Zap. przyusz. nagm. — 089	6.178	7.972	5.616	68.717	60.301
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	70	64	78	946	883
Grypa 480 — 483	46.163	35.232	30.538	569.027	230.425
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillą 100 — 102	15	17	28	209	265
Zimnica 110—117	—	—	1	3	13
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	4
Choroba Banga — 044	4	8	6	50	54
Tężec — 061	19	20	14	362	304
Róża — 052	139	135	175	1.746	1.766

CDW Cieszyn 445/62 260 G-190

W roku 1961 zgłoszono 128 przypadków zachorowań na poliomyelitis.

32 przypadki zostały odwołane z rejestru zachorowań przez lekarzy leczących. W wyniku szczegółowej analizy klinicznej, wirusologicznej i epidemiologicznej 84 przypadki ustalono jako poliomyelitis.

12 przypadków zachorowań, które nie budziły wątpliwości klinicznych jako poliomyelitis, lecz badaniami wirusologicznymi ustalono inny czynnik etiologiczny (inne enterowirusy) ujęto retrospektywnie w grupę parapoliomyelitis.

Tabela przedstawia liczbę zachorowań na poliomyelitis i parapoliomyelitis w roku 1961 według województw i miesiąca zachorowania

Województwo	ogółem		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
	polio	p. polio	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.	p.	pp.
	84	12	6	—	2	1	11	3	11	3	16	2	11	—	11	—	4	1	6	1	3	—	—	1	3	—
M. st. Warszawa	1	4	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Warszawskie	6	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bydgoskie	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poznańskie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
M. Łódź	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Łódzkie	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kieleckie	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lubelskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Białostockie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Olsztyńskie	8	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Gdańskie	4	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Koszalińskie	6	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Szecińskie	4	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Zielonogórskie	4	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
M. Wrocław	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wrocławskie	8	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Opolskie	9	—	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Katowickie	7	2	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
M. Kraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krakowskie	7	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rzeszowskie	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

UWAGA: W zestawieniu kumulacyjnym w Informacyjnym Biuletynie Epidemiologicznym w miesiącu październiku uwzględniono 12 odwołanych przypadków.