

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

ROK 1964

EGZ. NR 000033

Sytuacja epidemiczna Polski w roku 1964

Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W roku 1964 notuje się najniższą zapadalność z dotychczas notowanych w Polsce.

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	2.368	7,8
1963	2.771	9,0
1964	1.565	5,0

W roku 1964 najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Warszawskim — 10,3; Białostockim — 7,6; Bydgoskim — 7,5; Lubelskim — 7,1; Kieleckim — 6,0 i Opolskim — 6,0.

W roku 1964 zanotowano 3 ogniska duru brzuszego.

1) woj. Warszawskie, pow. Pułtusk (Pieścirogi-Mogowo) w kwietniu i maju — 26 zachorowań. Epidemia szerzyła się drogą wody. Osiedle kolejarzy i bufet na stacji kolejowej podłączony był do wodociągu trakcyjnego, który czerpał wodę z rzeki Nasiółki poniżej ujścia ścieków z osiedla.

Od chorych wyhodowano *S. typhi*, typ fagowy F 1.

2) woj. Lubelskie m. Lublin (Parowozownia DOKP), w okresie lipiec—sierpień zanotowano łącznie 18 przypadków zachorowań wśród pracowników PKP. Źródłem zakażenia pierwszego przypadku była woda trakcyjna używana do picia. Następne zachorowania szerzyły się prawdopodobnie drogą kontaktu.

3) woj. Łódzkie m. Skierniewice w czerwcu, lipcu i sierpniu zanotowano łącznie 15 zachorowań. Źródłem zakażenia była woda trakcyjna używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Zachorowania na dur brzuszny w Polsce wg grup wieku w odsetkach

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25—64	65 i więcej	Razem
1963	4,9	13,6	23,5	15,3	10,0	31,4	1,3	100%
1964	5,4	13,5	20,8	13,1	10,7	35,1	1,4	100%

**Liczba zachorowań, liczba zgonów*), zapadalność i umieralność
na 100 000 ludności**

Podział	1963				1964			
	liczba zachorowań	liczba zgonów	zapa- dal- ność na 100 000	umie- ral- ność na 100 000 lud- ności	liczba zachorowań	liczba zgonów**)	zapa- dal- ność na 100 000	umie- ral- ność na 100 000 lud- ności**)
miasta i osiedla	1.543	28	10,3	0,19	765	6	5,0	0,04
gromady (wsie)	1.228	39	7,8	0,25	800	25	5,1	0,16
Polska	2.771	67	9,0	0,22	1.565	31	5,0	0,10

W roku 1964 w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań — 47,1% stanowiły kobiety; — 52,9% mężczyźni.

Od roku 1964 wprowadzono do szczepień p/durowi brzuszemu szczepionkę bakteryjną formolowo-fenolową i formolowo-fenolową skojarzoną z anatoksyną tężcową. Pełne szczepienie podstawowe w/w szczepionką obejmuje 3 wstrzyknięcia (z tego 2 wstrzyknięcia w jednym roku, trzecie w roku następnym) a następnie co 3 lata jedno podanie szczepionki jako dawka przypominająca.

W roku 1964 szczepieniom podlegały powiaty, gdzie współczynnik zapadalności na dur brzuszny wynosił 10,0 i powyżej 10,0 na 100 000 ludności oraz ludność tych terenów gdzie dur brzuszny występuje endemicznie (gromada, wieś), osoby z bezpośredniego kontaktu z nosicielami, ludność terenów o szczególnie złym stanie sanitarno-higienicznym, personel służby zdrowia lecznictwa otwartego i zamkniętego, pracownicy zatrudnieni przy wodociągach, kanalizacji i zakładach oczyszczania miast, dzieci wyjeżdżające na kolonie letnie, dzieci wstępujące do I klas szkół podstawowych w roku szkolnym 1964/1965 i grupy ludności zatrudnionej w zakładach kłuczowych gospodarki narodowej (np. zagłębiach węglowych, siarkowych).

W roku 1964 zaszczepiono:

Rodzaj stosowanej szczepionki	I wstrzyknięcie		II wstrzyknięcie	
	liczba zaszczep.	% zaszczep. w stosunku do liczby podleg.	liczba zaszczep.	% 1)
formolowo-fenolowa	1.985.187	92,2	1.736.696	87,5
formolowo-fenolowa z tężcem	5.885.792	79,4	4.940.175	83,9
Razem	7.870.979	82,3	6.676.871	84,8

1) Odsetek szczepionych II wstrzyknięciami w stosunku do liczby osób, które otrzymały I wstrzyknięcie.

Na dzień 31. XII. 1964 r. było zarejestrowanych 4.709 stałych nosicieli S. typhi. Z 2.822 typowanych nosicieli w roku 1964 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
Ela	633	22,4
Fl	404	14,3
A	264	9,3
Dl	205	7,3
Cl	150	5,3
Flb	93	3,3
F4	66	2,3

W roku 1964 u 1010 zbadanych chorych na dur brzuszny (tj. 64% ogółem zgłoszonych zachorowań w 1964 r.) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe w roku 1964	Liczba chorych	%
Ela	237	23,5
Fl	166	16,4
A	130	12,9
Dl	75	7,4
Elb	40	4,0
Cl	35	3,5

2. Dury rzekome

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

R o k	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	265	0,9
1963	415	1,3
1964	136	0,4

W roku 1964 zanotowano najniższą liczbę zachorowań z dotychczas notowanych w Polsce.

Z terenu 5 województw tj: Białostockiego (29), Warszawskiego (15), Lubelskiego (13), m. Łodzi (13) i m. st. Warszawy (11) zgłoszono łącznie 81 zachorowań tj. 59,5% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań.

Na dzień 31. XII. 1964 r. zarejestrowanych było 343 stałych nosicieli S. paratyphi B. Z 343 typowanych nosicieli najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
Taunton	126	36,7
1	69	20,1
3aI	38	11,1
Dundee	24	7,0
BAOR	22	6,4
A aI war. 1,2	20	5,8

W roku 1964 u 80 badanych chorych na dury rzekome (tj. 59% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1964) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe w roku 1964	Liczba chorych	%
Taunton	34	40,5
1	16	20,0
3a I	7	8,7
BAOR	6	7,5

3. Czerwonka

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	9.715	32,2
1963	10.795	35,2
1964	8.463	27,1

Do województw o najwyższej zapadalności w roku 1964 należy zaliczyć: woj. Olsztyńskie — 99,8; m. st. Warszawę — 98,7; woj. Wrocławskie — 71,4; Gdańskie — 46,6; Szczecińskie — 40,1; Zielonogórskie — 38,1 i Bydgoskie — 31,2.

W woj. Wrocławskim, pow. Dzierżoniów — m. Bielawa zanotowano począwszy od drugiej dekady maja, w czerwcu i lipcu epidemię czerwonki. Łącznie zanotowano 814 zachorowań. Epidemia spowodowana została zakażeniem wody pitnej ściekami na terenie Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków.

W roku 1964 hospitalizowano 73,1% ogółem zgłoszonych zachorowań.

Procentowy udział liczby zachorowań w grupach wieku

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25—64	65 i więcej	Razem
1963	23,4	9,1	6,1	4,6	6,9	47,3	2,6	100%
1964	19,8	8,4	9,4	5,9	6,4	47,1	3,0	100%

Liczba zachorowań, liczba zgonów*), zapadalność i umieralność
na 100 000 ludności

Podział	1 9 6 3				1 9 6 4			
	liczba za- chorowań	liczba zgonów	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności	liczba za- chorowań	liczba zgonów**)	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności**)
miasta i osiedla gromady (wsie)	7.874	18	52,4	0,12	6.491	13	42,3	0,08
	2.921	25	18,6	0,16	1.972	16	12,5	0,10
POLSKA	10.795	43	35,2	0,14	8.463	29	27,1	0,09

W dalszym ciągu notuje się znacznie niższą zapadalność na wsi w stosunku do zapadalności w mieście, co wskazuje na niedostateczną zgłaszalność czerwonki w środowiskach wiejskich.

Czerwonka w Polsce w latach 1963 i 1964 wg czynnika etiologicznego

Rok	Sh. Flexneri		Sh. Sonnei		Sh. Shigae Shmitzi		Inne	
	Liczba zach.	%	Liczba zach.	%	Liczba zach.	%	Liczba zach.	%
1963	3.274	51,1	3.082	48,1	11	0,2	36	0,6
1964	2.866	63,6	1.591	35,3	9	0,2	41	0,9

Zgłaszane są w większości przypadki potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

Powyższa tabela obejmuje typy pałeczek Shigella występujące w Polsce wg danych ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne — form. E. II—12.

4. Biegunki u dzieci do lat 2.

Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 dzieci, liczba zgonów*)
i śmiertelność

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 dzie- ci (w grupie wieku 0—2 lata)	Liczba zgonów	Śmiertelność
1962	26.232	1.338,4	4.432	16,9
1963	32.016	1.779,6	4.651	14,5
1964	25.205	1.447,4	3.073**)	12,2**)

Zachorowania na biegunki w Polsce prawdopodobnie znacznie przekraczają liczby, które tu przedstawiono.

W roku 1964 wskaźniki zapadalności z powodu biegunek u dzieci do lat 2 na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata w poszczególnych województwach kształtowały się następująco:

m. Łódź	— 3301,9	woj. Bydgoskie	— 1296,6
woj. Koszalińskie	— 2690,6	woj. Opolskie	— 1294,5
woj. Białostockie	— 2344,8	woj. Poznańskie	— 1111,3
woj. Warszawskie	— 2196,8	woj. Łódzkie	— 1035,2
m. Wrocław	— 2166,5	m. Poznań	— 1032,9
woj. Olsztyńskie	— 2069,8	woj. Rzeszowskie	— 990,3
woj. Gdańskie	— 2035,8	woj. Zielonogórskie	— 815,2
woj. Katowickie	— 2025,9	woj. Kieleckie	— 750,5
m. st. Warszawa	— 1518,6	m. Kraków	— 653,3
woj. Szczecińskie	— 1491,3	woj. Lubelskie	— 627,5
woj. Wrocławskie	— 1365,8	woj. Krakowskie	— 595,4

5. Zatrucia pokarmowe

Procentowy udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych w roku 1964

Produkty żywnościowe	Liczba ognisk		% ognisk	% zachorowań	Salmo-nella		Gron-kowce		Cl. per-fringens		Cl. Bot-ulinum		Inne drobno-ustroje		Czynnik nieustalony	
	liczba ognisk	liczba zachorowań			liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań
mięso i przetwory	81	1612	54,8	43,5	10	253	27	504	4	75	1	4	18	474	21	302
ryby i przetwory	11	122	7,4	3,3	—	—	9	110	—	—	—	—	—	—	2	12
mleko i przetwory	15	660	10,1	17,8	—	—	13	639	—	—	—	—	1	5	1	16
inne produkty	41	1314	27,7	35,4	3	117	13	373	—	—	1	5	6	361	18	458
Razem	148	3708	100%	100%	13	370	62	1626	4	75	2	9	25	840	42	788

Ogólna liczba zbiorowych ognisk zatruc pokarmowych zarejestrowanych w roku 1964 wynosi 161 o łącznej liczbie zachorowań — 3809 osób.

W stosunku do roku 1963 ogólna liczba ognisk zmniejszyła się o 35 a liczba zachorowań zmniejszyła się również o 614 osób.

W roku 1964 ognisk spowodowanych ustalonymi czynnikami bakteryjnymi zanotowano 106—2920 chorych, nieustalonymi — 42—788 chorych. Spożycie trujących grzybów wywołało 10 zbiorowych ognisk, które objęły 75 zachorowań.

W 3 ogniskach — 26 zachorowań czynnikiem etiologicznym były trujące rośliny, w tym w jednym przypadku związek chemiczny.

6. Włośnica

W roku 1964 notuje się spadek zgłoszonej liczby zachorowań w stosunku do roku 1963.

Liczba zachorowań w latach 1962—1964

1962	1963	1964
207	1.161	450

W roku 1964 tylko z 4 województw tj. Białostockiego (111), Warszawskiego (87), Gdańskiego (71) i Olsztyńskiego (59) zgłoszono łącznie 328 przypadków tj. 72,9% w stosunku do ogółem zarejestrowanych zachorowań.

W roku 1964 najwyższą liczbę przypadków zgłoszono z woj. Białostockiego, obejmującego endemiczne tereny włośnicy, gdzie przeważają zachorowania rodzinne.

Największe ognisko epidemiczne włośnicy w roku 1964 zaistniało we wsi Trelkowo, pow. Szczytno, woj. Olsztyńskie. Objęło ono 33 chorych, spośród 40 uczestników wesela, na którym spożywano nie badane mięso ze świni własnego uboju.

7. Zakaźne zapalenie wątroby

Notowany wskaźnik zapadalności w roku 1964 jest jednym z najwyższych od roku 1951 tj. od roku wprowadzenia obowiązku rejestracji zakaźnego zapalenia wątroby w Polsce.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	46.664	154,8
1963	75.944	247,4
1964	124.322	399,0

Narastająca liczba zachorowań od III kwartału 1963 roku przybrała w roku 1964 w niektórych województwach rozmiary epidemii.

Opolskie	— 539,2
Katowickie	— 519,2
Wrocławskie	— 513,5
m. st. Warszawa	— 501,2
m. Łódź	— 474,9
Olsztyńskie	— 461,9
Warszawskie	— 441,2
m. Wrocław	— 425,4

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach w latach 1962—1964.

Rok	I kw.		II kw.		III kw.		IV kw.	
	liczba zach.	zapa- dalność	liczba zach.	zapa- dalność	liczba zach.	zapa- dalność	liczba zach.	zapa- dalność
1962	12.255	161,9	8.644	113,0	10.019	129,5	15.746	203,8
1963	13.537	178,8	10.075	131,7	17.209	222,5	35.123	454,1
1964	30.531	394,1	19.607	253,1	27.141	346,6	47.043	600,7

Odsetek hospitalizowanych chorych na zakaźne zapalenie wątroby w latach 1962—1964.

1962	1963	1964
95,2	85,4	81,8

W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań odsetek hospitalizowanych chorych jest niższy niż w latach poprzednich i wynosi dla całego kraju 81,8 ale np. w m. st. Warszawie hospitalizowano tylko 59,7⁰/₀ chorych, w woj. Warszawskim — 64,2⁰/₀ chorych.

Zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku w latach 1963—1964

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25—64	65 i więcej
1963	155,8	645,7	440,9	241,5	214,2	143,5	91,7
1964	240,1	1166,9	863,4	372,7	311,7	181,5	106,7

Zapadalność na 100 000 ludności w grupie wieku 0—14 lat w roku 1963 wynosi 429,6; w roku 1964 — 802,3.

Zachorowania w grupie wieku 0—14 lat w roku 1963 stanowią 57,2⁰/₀ w stosunku do ogółem zgłoszonych przypadków, a w roku 1964 — 64,0⁰/₀.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w miastach i na wsi w latach 1963—1964

Podział	1 9 6 3		1 9 6 4	
	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności
miasta powyżej 100 000 ludności	19.145	297,9	29.464	453,9
miasta od 20—100 tys. ludności	13.289	359,7	18.027	466,3
miasta do 20 tys. ludności łącznie z osiedlami	15.086	308,2	22.751	468,9
wsie	28.424	181,3	54.080	341,9
P o l s k a	75.944	247,4	124.322	399,0

Ogółem w miastach i osiedlach zapadalność na 100 000 ludności w roku 1963 wynosi — 316,6; w roku 1964 — 461,8.

W roku 1963 zachorowania w miastach i osiedlach stanowiły — 62,6%; na wsiach 37,4%; a w roku 1964 zachorowania w miastach i osiedlach stanowiły — 56,5%, na wsiach — 43,5%.

W postępowaniu profilaktycznym przeciwko zakaźnemu zapaleniu wątroby stosuje się między innymi gamma-globulinę dzieciom do lat 14 z kontaktu z chorym. W roku 1964 zużyto 681.939 ml. gamma-globuliny tj. ponad dwukrotnie więcej niż w roku 1963.

Liczba zachorowań w grupach usługowych

Grupy usługowe	1 9 6 3		1 9 6 4	
	Liczba zachorowań	‰	Liczba zachorowań	‰
Służba zdrowia	1.385	2,1	1.817	1,6
Pracownicy umysłowi	1.461	2,2	1.888	1,7
Pracownicy fizyczni	2.897	4,3	3.410	3,1
Rolnicy	2.552	3,8	3.728	3,3
Dzieci przedszkolne	17.162	25,7	28.708	25,8
Młodzież szkolna	30.061	45,1	57.352	51,6
Inne	11.150	16,8	14.311	12,9
Brak danych	9.276	—	13.108	—
P o l s k a	75.944	100‰	124.322	100‰

3. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań		Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zgonów
	Ogółem	w tym para- poliomyelitis		
1962	51	9	0,17	2
1963	29	2	0,09	2
1964	11	2	0,03	2

W roku 1964 zgłoszono 11 zachorowań z następujących województw:

Województwo	Powiat	Liczba zachorowań	Miesiące (wg daty zachorowania)
Białostockie	pow. Wys. Mazowieckie	1	marzec
Gdańskie	miasto Gdańsk	1	marzec
Katowickie	pow. Lubliniec	1	maj
	m. Częstochowa	1	czerwiec
	pow. Wodzisław Śląski	1	wrzesień
Koszalińskie	miasto Słupsk	1	sierpień
Rzeszowskie	pow. Nisko	1	maj
Szczecińskie	pow. Świnoujście	1	czerwiec
Wrocławskie	pow. Ząbkowice Śl.	1	marzec
Zielonogórskie	pow. Sulechów	1	czerwiec
	pow. Zielona Góra	1	lipiec

Z w/w zachorowań 2 przypadki ustalono jako parapolioomyelitis tj. woj. Rzeszowskie — 1 zach. z maja i woj. Zielonogórskie — 1 zach. z lipca.

W roku 1964 zanotowano 2 zgony z powodu poliomyelitis woj. Wrocławskie — 1 zgon i woj. Koszalińskie — 1 zgon.

Liczba przypadków na poliomyelitis w grupach wieku w latach 1963—1964

Rok	0—3	4—7	8—14	15 i więcej	Razem
1963	12	14	3	—	29
1964	3	2	4	2	11

Szczepienia przeciwko poliomyelitis w latach 1963—1964

Rok	Szczepienia podskórne (2 wstrzyknięcia szczep. Salka)		Szczepienia doustne			
			I typ		II typ	
	liczba za- szczepio- nych	% za- szczepio- nych w stosunku do liczby podleg.	liczba za- szczepio- nych	% za- szczepio- nych w stosunku do liczby podleg.	liczba za- szczepio- nych	% za- szczepio- nych w stosunku do liczby podleg.
1963	515.658	73,3	785.582	86,6	882.101	32,0
1964	572.558	91,5	772.234	85,6	795.381	84,0

Choroby szerzące się drogą kropelkową

1. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów*), zapadalność na 100 000 ludności, śmiertelność

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1962	3.131.027	1.308	10 390,6	0,04
1963	299.729	604	976,6	0,20
1964	776.663	1.177**)	2 492,2	0,15**)

W roku 1964 najwyższe wskaźniki z powodu grypy zanotowano w następujących województwach:

m. Wrocław	— 9634,7
m. Łódź	— 6531,2
m. Poznań	— 5359,7
woj. Katowickie	— 4914,2
woj. Wrocławskie	— 4588,4
woj. Poznańskie	— 4393,3
m. Kraków	— 3668,9
m. st. Warszawa	— 3150,2
woj. Zielonogórskie	— 3044,2

Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności

Rok	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	Zap. roczna
1963	2150,5	1298,0	181,6	304,8	976,6
1964	509,9	9144,3	54,9	313,6	2492,4 t

Z powyższej tabeli wynika, że epidemiczne nasilenie zachorowań w roku 1964 zanotowano w II kwartale (kwiecień — 611.113 zachorowań, maj — 92.868, czerwiec — 4.330).

2. Błonica

W roku 1964 zanotowano najniższy wskaźnik zapadalności z dotychczas notowanych w Polsce.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	3.083	10,2
1963	1.579	5,1
1964	749	2,4

W roku 1964 w stosunku do roku 1963 wszystkie województwa notują spadek wskaźnika zapadalności z wyjątkiem woj. Koszalińskiego.

W roku 1964 — 5 i więcej zachorowań na błonicę zgłoszono z powiatów:

- 1) m. Warszawa — dzielnica Praga Północ — 5
- 2) m. Kraków — dzielnica Podgórze — 12
Stare Miasto — 9
Nowa Huta — 9
Grzegórzki — 8
Zwierzyniec — 5
- 3) m. Łódź — dzielnica Bałuty — 8
Śródmieście — 5
- 4) woj. Białostockie — pow. Łomża — 14
- 5) woj. Gdańskie — Puck — 11
- 6) woj. Katowickie — pow. Rybnik — 5
- 7) woj. Kieleckie — pow. Kielce — 16
pow. Jędrzejów — 15
m. Kielce — 10
m. Skarżysko — 6
m. Radom — 5
- 8) woj. Koszalińskie — pow. Szczecinek — 22
pow. Miastko — 11
pow. Bytów — 7
- 9) woj. Krakowskie — m. Tarnów — 17
pow. Tarnów — 10
pow. Kraków — 9
pow. Nowy Targ — 7
pow. Żywiec — 5
- 10) woj. Lubelskie — pow. Lublin — 13
pow. Bełżyce — 7
pow. Lubartów — 5
pow. Radzyń — 5
- 11) woj. Opolskie — pow. Koźle — 11
pow. Prudnik — 5

12) woj. Rzeszowskie	— pow. Przemysł	— 17
	pow. Jarosław	— 13
13) woj. Szczecińskie	— m. Szczecin	— 23
	pow. Kamień	— 5
14) woj. Warszawskie	— pow. Grodzisk Maz.	— 5
	pow. Nowy Dwór	— 5
	pow. Pruszków	— 5
	pow. Sierpc	— 5
15) woj. Wrocławskie	— pow. Dzierżoniów	— 27
	pow. Bolesławiec	— 11
	pow. Wałbrzych	— 10
	pow. Kłodzko	— 9
	pow. Strzelin	— 7
	m. Wałbrzych	— 7
	m. Legnica	— 6
	pow. Kamienna Góra	— 5
	pow. Trzebnica	— 5
	pow. Ząbkowice	— 5
16) woj. Zielonogórskie	— pow. Gorzów	— 5
	pow. Żary	— 5

Z w/w 50 powiatów zgłoszono łącznie 457 zachorowań tj. 61% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1964.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku w latach 1963—1964

Rok	0—3		4—7		8—14		15—24		25 i więcej		Razem	
	licz- ba zach.	zap.	licz- ba zach.	zap.	licz- ba zach.	zap.	licz- ba zach.	zap.	licz- ba zach.	zap.	licz- ba zach.	zap.
1963	456	19,1	408	14,7	433	9,0	168	3,8	114	0,7	1579	5,1
1964	165	7,1	186	6,8	245	5,0	95	2,0	58	0,3	749	2,4

Liczba zachorowań, liczba zgonów*), zapadalność i umieralność na 100 000 ludności w miastach i na wsiach w latach 1963—1964

Podział	1 9 6 3				1 9 6 4			
	liczba zach.	liczba zgonów	zapa- dal- ność	umie- ral- ność	liczba zach.	liczba zgonów**)	zapa- dal- ność	umie- ral- ność**)
miasta i osiedla	977	28	6,5	0,19	431	18	2,8	0,12
gromady (wsie)	602	56	3,8	0,36	318	40	2,0	0,25
Polska	1.579	84	5,1	0,27	749	58	2,4	0,19

Szczepienia ochronne przeciwko błonicy w latach 1963—1964

Rok	Dzieci uodpornione podstawowo (3 wstrzyk.)		Szczepienia powtórne w 4 i 7 roku życia		Liczba zaszczipionych dzieci w wieku 8—14 lat wg wskazań epidemiologicznych
	liczba zaszczipionych	% zaszczipionych w stosunku do liczby podleg.	liczba zaszczipionych	% zaszczipionych w stosunku do liczby podleg.	
1963	691.341	70,9	1.321.189	83,4	392.327
1964	686.891 ²⁾	82,1	1.372.630 ³⁾	86,2	154.365

w tym: 2) w roku 1964 uodporniono podstawowo szczepionkami skojarzonymi (błonica — tężec — krztusiec, błonica — tężec) — 684.621 dzieci

3) powtórnie 1.263.298.

3. Błonica

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	58.437	193,9
1963	79.085	257,7
1964	63.815	204,8

W roku 1964 najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Krakowie — 668,8; m. st. Warszawie — 628,4; m. Wrocławiu — 533,7; m. Łodzi — 456,3; m. Poznaniu — 305,3; woj. Gdańskim — 300,5; Szczecińskim — 272,2; Wrocławskim — 264,7 i Zielonogórkim — 213,1.

Liczba zgonów¹⁾ i umieralność na 100 000 ludności w związku z zachorowaniami na błonicę w latach 1962—1964

1 9 6 2		1 9 6 3		1 9 6 4 ^{**)}	
liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność
22	0,07	28	0,09	52 ⁴⁾	0,17

4) łącznie z paciorkowcowym zapaleniem gardła.

4. Odra

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	109.924	364,8
1963	124.492	405,6
1964	131.534	422,1

W roku 1964 notuje się najwyższą zapadalność w okresie powojennym z wyjątkiem roku 1961.

Zapadalność powyżej „400” na 100 000 ludności w roku 1964 zanotowano w następujących województwach:

m. Wrocław	— 970,6
woj. Koszalińskim	— 797,1
m. st. Warszawie	— 781,0
m. Poznaniu	— 672,7
m. Łodzi	— 635,1
woj. Gdańskim	— 621,7
woj. Olsztyńskim	— 555,7
m. Krakowie	— 529,1
woj. Wrocławskim	— 527,0
woj. Katowickim	— 500,4
woj. Zielonogórskim	— 466,5
woj. Bydgoskim	— 427,4
woj. Kieleckim	— 417,3

Liczba zgonów*) i umieralność na 100 000 ludności z powodu odry w latach 1962—1964

1962		1963		1964**)	
liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność
155	0,51	301	0,98	252	0,81

5. Krztusiec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	47.351	157,1
1963	44.772	145,9
1964	29.391	94,3

W roku 1964 notuje się najniższą liczbę zachorowań w stosunku do 12 poprzedzających lat.

Liczba zgonów*) i umieralność na 100 000 ludności z powodu krztuśca
w latach 1962—1964

1962		1963		1964**)	
liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność	liczba zgonów	umieralność
115	0,38	227	0,74	128	0,41

Inne choroby

1. Wąglik

W roku 1964 zanotowano 5 przypadków; w tym: woj. Lubelskie — 4 zachorowania (powiaty: Hrubieszów, Biała Podlaska, Lublin, Parczew), woj. Warszawskie — 1 zachorowanie (pow. Siedlce).

2. Tęžec

Liczba zachorowań, liczba zgonów*), zapadalność i umieralność na 100 000 ludności w latach 1962—1964

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1962	326	177	1,10	0,58
1963	309	172	1,00	0,56
1964	321	143**)	1,00	0,46**)

W roku 1960 zanotowano 195 zgonów, a w roku 1961 — 200 zgonów.
W roku 1964 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Krakowskiego — 63 (zap. na 100 000 — 3,0)
Rzeszowskiego — 52 (zap. na 100 000 — 3,1)
Wrocławskiego — 25 (zap. na 100 000 — 1,3)
Lubelskiego — 24 (zap. na 100 000 — 1,3)

Z w/w województw zgłoszono 164 zachorowania tj. 51,1% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań.

W roku 1964 — 4 i więcej przypadków tęžca zgłoszono z powiatów:

1) woj. Kieleckie,	pow. Sandomierz	— 4
2) woj. Krakowskie,	pow. Limanowa	— 11
	pow. Nowy Sącz	— 9
	pow. Sucha	— 7
	pow. Nysienice	— 5
	pow. Wadowice	— 5
	pow. Dąbrowa Tarn.	— 4
	pow. Kraków	— 4
	pow. Tarnów	— 4
3) woj. Lubelskie,	pow. Chełm	— 4
4) Łódzkie,	pow. Łęczyca	— 4
	pow. Łowicz	— 5

5) woj. Opolskie,	pow. Niemodlin	—	4
	pow. Opole	—	4
6) woj. Rzeszowskie,	pow. Rzeszów	—	7
	pow. Gorlice	—	6
	pow. Jasło	—	6
	pow. Ropczyce	—	5
	pow. Jarosław	—	4
7) woj. Wrocławskie,	pow. Świdnica	—	5
	pow. Środa Śląska	—	4

Z w/w 21 powiatów zgłoszono łącznie 111 zachorowań.

Liczba zachorowań na tężec w roku 1964. Dane ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne — form. E.II—12

Województwo	Razem	w tym:																		
		Od 0 do 28 dnia życia					od 29 dnia życia		od 30 do 363 dnia życia		od 1—3 lat		od 4—7 lat		od 8—14 lat		15 i więcej		brak danych	
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		od 1—3 lat	od 4—7 lat	od 8—14 lat	15 i więcej	brak danych						
			od 0—7 dnia życia	od 8—14 dnia życia	od 15—21 dnia życia	od 22—28 dnia życia		od 29 dnia życia do 3 miesięcy	od 4 mies. do 363 dnia życia											
Polska	1963	286	25	17	7	1	—	2	1	1	4	24	41	179	11					
	1964	304	38	20	16	2	—	3	2	1	3	12	34	207	7					
m. Warszawa	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—					
m. Kraków	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—					
m. Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
m. Poznań	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—					
m. Wrocław	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	—					
Białostockie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1					
Bydgoskie	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	6	—					
Gdańskie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—					
Katowickie	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	—					
Kieleckie	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—					
Kozalińskie	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—					
Krakowskie	59	14	7	6	1	—	—	—	—	—	1	4	—	38	2					
Lubelskie	24	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	15	—					
Łódzkie	18	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	12	—					
Olsztyńskie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1					
Opolskie	19	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	—					
Poznańskie	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	11	—					
Rzeszowskie	52	11	5	6	—	—	1	1	—	1	3	3	—	33	—					
Szczecińskie	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—					
Warszawskie	15	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	11	—					
Wrocławskie	24	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	17	1					
Zielonogórskie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2					

Jak wynika z tabeli, zachorowania wśród noworodków stanowią w roku 1964 — 12,5‰; zachorowania w grupie wieku 0—14 lat stanowią 29,4‰. Zapadalność na 100 000 dzieci w stosunku do żywourodzonych w roku 1964 stanowi — 6,7.

3. Wścieklizna

W roku 1964 zanotowano 1 przypadek wścieklizny.

- 1) woj. Koszalińskie, pow. Koszalin — 1 zachorowanie (47 lat). Pokąsanie przez wściekłego lisa.

4. Dur wysypkowy

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1962	154	0,5
1963	154	0,5
1964	124	0,4

W roku 1964 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z następujących województw:

1) Białostockiego — 30 zach. (2,6 na 100 000) w tym: m. Białystok — 10; pow. Bielsk Podl. — 5; pow. Białystok — 3, pow. Mońki — 2, pow. Siemiatyczne — 2 oraz po 1 zach. powiaty: Ełk, Gołdap, Grajewo, Hajnówka, Łapy, Łomża, Wysokie Maz., Zambrów.

2) Warszawskiego — 22 zach. (0,9 na 100 000) w tym powiaty: Pruszków, Ryki, Sokołów Podl. po 3 zach., Mińsk Maz., Grójec, Wołomin po 2 zach., Gostynin, Łosice, Nowy Dwór Maz., Otwock, Piaseczno, Prznysz, Wyszaków po 1 zach.

3) Lubelskiego — 17 zach. (0,9 na 100 000) w tym: pow. Lublin — 6, pow. Łuków — 3, Lubartów — 2 oraz po 1 zach. powiaty: Bełżyce, Chełm, Kraśnik, Parczew, Radzyń, Tomaszów.

*) zgony o przyczynie stwierdzonej i nie stwierdzonej przez lekarza — dane GUS.

**) dane tymczasowe.

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A.B.C. Paratyphus A.B.C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 — Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
	Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045 048	571— —764	049	Salmonellozy	Inne	128	092
POLSKA	1963	2.771	415	10.795	32.016	295	2.663	7.051	1.161	75.944
	1964	1.565	136	8.463	25.205	201	3.514	6.670	450	124.322
M. st. Warszawa	58	11	1.216	714	—	134	246	12	6.175	
M. Kraków	21	1	109	162	—	1	140	—	1.719	
M. Łódź	35	13	182	869	—	6	244	5	3.502	
M. Poznań	11	—	59	209	5	97	7	—	1.575	
M. Wrocław	11	1	15	493	3	49	448	—	1.981	
Białostockie	87	29	333	1.709	—	8	290	111	3.718	
Bydgoskie	137	3	566	1.402	47	216	404	3	7.377	
Gdańskie	71	9	618	1.623	14	285	1.223	71	5.679	
Katowickie	89	4	580	3.532	13	761	317	32	18.074	
Kieleckie	114	3	48	780	—	80	118	4	5.190	
Koszalińskie	16	3	123	1.345	6	414	326	15	2.793	
Krakowskie	74	2	142	765	10	3	267	—	7.390	
Lubelskie	134	13	268	651	—	153	342	2	5.912	
Łódzkie	65	5	198	863	6	129	181	27	4.871	
Olsztyńskie	48	1	939	1.449	2	160	261	59	4.345	
Opolskie	60	3	19	882	6	8	135	—	5.371	
Poznańskie	80	6	305	1.317	45	113	128	7	6.804	
Rzeszowskie	54	8	14	1.019	—	8	102	—	4.858	
Szczecińskie	34	2	332	728	28	213	576	—	2.924	
Warszawskie	250	15	698	2.774	1	85	169	87	10.720	
Wrocławskie	91	4	1.382	1.504	1	162	639	15	9.937	
Zielonogórskie	25	—	317	415	14	429	107	—	3.407	

* Liczby bezwzględne

Porażenie dziecięce nagminne — Poliomye- litis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyusznic nagminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych nagminne Meningitis epidemica	Crypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Billia	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tęzec Tetanus	Róża Erysipelas
080	055	050	085	056	089	057	480— —483	100- 102	110- 117	094	044	061	052
29	1.579	79.085	124.492	44.772	64.300	975	299.729	154	15	3	76	309	2.229
11	749	63.815	131.534	29.391	94.195	928	776.663	124	12	1	63	321	2.393
—	7	7.742	9.622	2.202	10.772	129	38.810	7	3	—	1	4	164
—	47	3.404	2.693	894	2.225	2	18.675	—	1	—	—	2	54
—	22	3.365	4.683	876	2.757	—	48.161	3	—	—	—	2	242
—	3	1.318	2.904	712	2.060	6	23.138	1	3	—	—	2	51
—	8	2.485	4.519	504	2.488	1	44.859	1	1	—	4	5	82
1	21	1.173	2.475	660	1.910	45	18.189	30	1	—	—	6	40
—	8	3.116	7.758	1.610	5.791	35	19.482	—	—	—	—	16	162
1	17	3.983	8.240	1.378	8.276	27	5.611	8	—	—	4	2	180
3	31	6.247	17.419	3.355	16.011	76	171.063	—	—	—	1	13	135
—	86	1.570	7.889	1.376	4.704	81	18.207	6	—	—	—	17	65
1	58	1.024	5.901	762	2.117	43	5.005	—	1	1	2	6	37
—	60	3.675	5.369	1.397	4.102	74	22.662	5	1	—	—	63	109
—	52	2.365	4.754	2.396	2.970	41	37.674	17	—	—	4	24	83
—	28	2.425	5.727	611	1.894	20	29.570	4	—	—	—	19	123
—	3	1.008	5.227	802	1.849	47	8.332	3	—	—	8	3	94
—	25	1.818	3.357	882	2.508	58	20.243	1	—	—	9	19	90
—	8	2.954	3.691	1.248	3.065	34	92.379	1	—	—	3	14	96
1	46	1.608	3.909	1.491	2.649	94	19.222	4	—	—	—	52	53
1	39	2.256	3.260	1.699	3.174	33	12.868	1	1	—	6	3	127
—	44	3.383	8.056	2.513	4.716	16	8.388	22	—	—	1	17	173
1	118	5.122	10.198	1.378	5.760	51	88.785	8	—	—	13	25	185
2	18	1.774	3.883	645	2.397	15	25.340	2	—	—	7	7	48

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A.B.C. Paratyphus A.B.C.		Czerwonka Dysenteria	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964
Numery klasyfikacji międzynarodowej	040		041		045—048	
R o k	1963	1964	1963	1964	1963	1964
P O L S K A	9,0	5,0	1,3	0,4	35,2	27,1
M. st. Warszawa	8,9	4,7	0,9	0,9	131,9	98,7
M. Kraków	6,0	4,1	1,0	0,2	46,2	21,4
M. Łódź	8,9	4,7	0,3	1,8	40,9	24,7
M. Poznań	3,0	2,5	0,2	—	53,2	13,7
M. Wrocław	4,6	2,4	0,6	0,2	11,4	3,2
Białostockie	11,4	7,6	4,9	2,5	58,5	29,0
Bydgoskie	12,1	7,5	0,2	0,2	43,3	31,2
Gdańskie	9,0	5,3	1,1	0,7	94,1	46,6
Katowickie	4,9	2,5	0,1	0,1	17,9	16,7
Kieleckie	11,3	6,0	0,3	0,1	2,4	2,5
Koszalińskie	9,3	2,2	0,4	0,4	23,5	16,6
Krakowskie	15,3	3,5	0,2	0,1	15,5	6,7
Lubelskie	8,6	7,1	1,9	0,7	23,0	14,2
Łódzkie	8,9	3,9	0,8	0,3	15,8	11,9
Olsztyńskie	13,8	5,1	0,1	0,1	96,4	99,8
Opolskie	9,6	6,0	0,5	0,3	5,8	1,9
Poznańskie	5,0	3,8	0,3	0,3	13,0	14,5
Rzeszowskie	8,2	3,2	12,0	0,5	5,0	0,8
Szczecińskie	5,2	4,1	0,5	0,2	60,1	40,1
Warszawskie	13,4	10,3	0,9	0,6	34,3	28,7
Wrocławskie	6,9	4,8	0,6	0,2	41,4	71,4
Zielonogórskie	5,6	3,0	0,4	—	63,0	38,1

*) Zapadalność na 100 000 ludności.

Porażenie dziecięce nagminne Poliomyeli- tis anterio- r acuta		Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epide- mica	
080		055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
0,1	0,03	5,1	2,4	257,7	204,8	145,9	94,3	247,4	399,0
0,1	—	1,2	0,6	776,6	628,4	214,7	178,7	279,6	501,2
0,2	—	25,8	9,2	690,3	668,8	354,2	175,6	292,2	337,7
—	—	5,2	3,0	650,5	456,3	148,5	118,8	347,3	474,9
—	—	2,3	0,7	458,3	305,3	162,1	164,9	257,9	364,8
—	—	5,9	1,7	441,5	533,7	200,6	108,2	336,0	425,5
0,3	0,09	2,5	1,8	137,2	102,2	118,1	57,5	169,1	323,8
0,1	—	1,1	0,4	212,3	171,7	170,6	88,7	210,6	406,4
0,4	0,07	1,9	1,3	325,0	300,5	220,1	104,0	260,3	428,5
—	0,09	1,9	0,9	315,2	179,4	182,1	96,4	317,6	519,2
0,1	—	11,9	4,5	111,0	83,0	74,1	72,8	260,3	274,5
0,3	0,13	5,1	7,8	133,6	138,3	208,9	102,9	233,3	377,3
0,1	—	7,8	2,8	205,4	174,8	93,7	66,4	232,7	351,5
0,1	—	3,6	2,7	134,1	125,4	89,2	127,0	226,6	313,5
0,1	—	3,3	1,7	189,2	146,3	109,5	36,8	183,3	293,8
—	—	0,6	0,2	162,4	107,2	169,5	85,3	313,0	461,9
—	—	3,5	2,5	176,9	182,5	141,6	38,5	322,8	539,2
—	—	1,1	0,4	204,5	140,5	132,8	59,3	167,0	323,6
0,1	0,06	5,2	2,7	113,6	96,0	105,6	89,0	215,5	290,1
—	0,12	12,7	4,7	302,9	272,2	149,7	105,0	219,9	352,8
0,1	—	4,9	1,8	230,7	139,2	114,8	103,4	192,7	441,2
0,1	0,05	14,1	6,1	275,0	264,7	136,1	71,2	289,9	513,5
0,2	0,24	4,6	2,2	214,1	213,3	239,1	77,5	285,9	409,3

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1964	Rok 1963	Mediana 1960—1963	
Dur brzuszny 040	1.565	2.771	2.847	
Dury rzekome AB.C. 041	136	415	407	
Czerwonka 045—048	8.463	10.795	2.874	
Biegunki u dzieci do lat 2 571, 764	25.205	32.016	28.118	
Botulismus 049	201	295	249	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 049	3.514	2.663	1.701
	Inne 042	6.670	7.051	5.530
Włośnica 128	450	1.161	744	
Zakaźne zapalenie wątroby 092	124.322	75.944	66.486	
Porażenie dziecięce nagminne 080	11	29	73	
Błonica 055	749	1.579	3.836	
Płonica 050	63.815	79.085	54.639	
Odra 085	131.534	124.492	117.208	
Krztusiec 056	29.391	44.772	50.188	
Zapalenie przyusznicy nagminne 089	94.195	64.300	62.300	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne 057	928	975	917	
Grypa 480—483	776.663	299.729	439.976	
Dur wysypkowy sporadyczny choroba Brilla 100—102	124	154	180	
Zimnica 110—117	12	15	13	
Wścieklizna 094	1	3	2	
Choroba Banga 044	63	76	60	
Tężec 061	321	309	317	
Róża 052	2.393	2.229	1.904	

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Styczeń 1964

EGZ. NR

035 *

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w styczniu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się nieznaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 5,8 — I/1963 do 5,5 — I/1964.

Najwyższe wskaźniki i wyższe od krajowego (5,5) obserwuje się w następujących województwach: Olsztyńskim — 11,5; Warszawskim — 11,1; Wrocławskim — 9,9; m. st. Warszawie — 9,8; Lubelskim — 8,8; Zielonogórskim — 7,2; Bydgoskim — 7,2; m. Łodzi — 6,4 i Kieleckim — 6,3.

Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, woj. Koszalińskiego i Szczecińskiego. Najniższe wskaźniki notuje się w woj. Katowickim — 1,0 i Opolskim — 1,2.

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z grudniem r. ub. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 7,4 — XII/1963 do 5,5 — I/1964.

2. Dury rzekome

W styczniu zgłoszono z terenu całej Polski 9 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 24,9 — I/1963 do 20,2 — I/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, woj. Białostockiego, Bydgoskiego, Kieleckiego, Łódzkiego i Olsztyńskiego. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się w woj. Bydgoskim (19,7 — I/1963; 34,9 — I/1964). W styczniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 68,5; woj. Gdańskim — 52,7; Szczecińskim — 51,3 i Olsztyńskim — 48,8. Najniższe wskaźniki notuje się w woj. Rzeszowskim — 0,7; Kieleckim — 1,2; Opolskim — 1,2 i Krakowskim — 3,4.

Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Wrocławia.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 20,3.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 4 zachorowania; w tym:

woj. Zielonogórskie, pow. Sulęcín z września 1963 r.	— 1 zach.
woj. Gdańskie, pow. Nowy Dwór z maja 1963 r.	— 1 zach.
woj. Gdańskie, pow. Kartuzy z czerwca 1963 r.	— 1 zach.
woj. Gdańskie, pow. Tczew z września 1963 r.	— 1 zach.

W grudniu 1963 r. zgłoszono 3 zachorowania. W analogicznym okresie r. ub. miały miejsce 2 zachorowania.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W styczniu br. zgłoszono z terenu całego kraju 12 134 zachorowania w stosunku do 5 343 zachorowań zgłoszonych w tym samym okresie 1963 r.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 79,6% zgłoszonych zachorowań.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 205,1 — I/1963 do 465,9 — I/1964. Wzrost wskaźnika zapadal-

ności w porównaniu ze styczniem 1963 r. notuje się we wszystkich województwach; natomiast znaczny wzrost wystąpił w województwach:

Województwo	I/1963	I/1964
Kieleckim	137,5	537,9
Wrocławskim	203,3	601,9
Olsztyńskim	192,5	632,8
m. Krakowie	157,8	487,5
Katowickim	276,8	597,8
Opolskim	319,0	622,4

Najwyższe wskaźniki i wyższe od krajowego (465,9) notuje się w woj. Olsztyńskim — 632,8; Opolskim — 622,4; Wrocławskim — 601,9; Katowickim — 597,8; m. Łodzi — 538,4; Kieleckim — 537,9; Zielonogórskim — 494,6; m. Wrocławiu — 491,4; m. Krakowie — 487,5; Gdańskim — 487,0 i m. st. Warszawie — 476,5.

W grudniu 1963 r. krajowy wskaźnik wynosił — 463,5.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W styczniu br. zgłoszono 106 zachorowań. Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 7,3 — I/1963 do 4,1 — I/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Koszalińskim — 22,9; Szczecińskim — 17,6; Wrocławskim — 10,6; m. Łodzi — 9,7 i woj. Kieleckim — 8,2. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano w woj. Koszalińskim (3,3 — I/1963; 22,9 — I/1964).

Z terenu woj. Koszalińskiego zgłoszono 14 zachorowań; w tym. pow. Szczecinek 9 zach. Zachorowania wystąpiły we wsi Okonek, objęły 7 dzieci w wieku szkolnym, jedno dziecko w wieku przedszkolnym oraz jedną osobę w grupie wieku powyżej 15 lat; w 4 przypadkach dotyczyły dzieci nie szczepionych, natomiast pozostałe szczepione przed 7 latami.

Z terenu woj. Szczecińskiego, m. Szczecina zgłoszono dalsze 6 zachorowań powiązane z zachorowaniami, które wystąpiły jesienią r. ub.

W pozostałych województwach zachorowania wystąpiły sporadycznie.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 6,2.

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności ze 192,8 — I/1963 do 276,4 — I/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Katowickiego i Poznańskiego. Znaczny wzrost wskaźnika zanotowano w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Wrocławiu, m. Łodzi, m. Poznaniu i woj. Gdańskim.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 374,8 — XII/1963 do 276,4 — I/1964.

3. Krztusiec

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 167,5 — I/1963 do 125,1 — I/1964. W stosunku do poprzedzającego miesiąca krajowy wskaźnik utrzymuje się prawie na tym samym poziomie (126,5 — XII/1963; 125,1 — I/1964). Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1963 r. zanotowano w m. Krakowie, woj. Szczecińskim i Koszalińskim; natomiast znaczny spadek w m. Poznaniu, woj. Gdańskim, Bydgoskim, Warszawskim i Zielonogórskim.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznic nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózq. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonellozy	Inne																
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963
	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964
M. st. Warszawa	10	1	70	28	—	—	9	4	487	—	—	1108	1014	228	689	2	49	2	—	—	1	—	17
M. Kraków	1	—	12	10	—	—	12	—	207	—	2	354	80	165	154	1	241	—	—	—	—	—	4
M. Łódź	4	—	12	47	—	—	19	—	334	—	6	409	137	94	280	—	594	—	—	—	—	—	29
M. Poznań	—	—	8	18	—	4	1	—	114	—	1	189	346	46	245	—	224	—	1	—	—	—	8
M. Wrocław	2	—	—	25	—	9	22	—	190	—	—	272	978	87	311	—	111	—	—	—	2	—	16
Białostockie	5	1	33	52	—	—	1	28	358	—	5	113	105	105	219	5	94	1	—	—	—	—	2
Bydgoskie	11	—	53	95	—	24	26	3	664	—	—	374	767	125	358	1	685	—	—	—	—	—	22
Gdańskie	6	1	58	102	1	18	16	24	536	3	7	503	1127	102	676	6	494	—	—	—	—	—	20
Katowickie	3	—	32	267	1	59	4	—	1741	—	5	743	1201	529	2299	5	1371	—	—	—	1	1	5
Kieleckie	10	—	2	46	—	4	5	—	857	—	13	155	684	120	427	5	459	1	—	—	—	1	20
Koszalińskie	—	—	13	80	—	21	4	—	239	—	14	111	322	105	126	4	99	—	—	—	—	—	4
Krakowskie	9	1	6	20	—	—	5	—	773	—	4	406	346	151	471	8	437	—	—	—	—	6	19
Lubelskie	14	—	10	30	—	—	10	—	673	—	3	170	402	193	145	3	194	1	—	—	1	—	9
Łódzkie	3	—	19	31	—	3	10	1	470	—	4	267	255	84	183	1	576	—	—	—	—	2	13
Olsztyńskie	9	—	38	60	—	19	9	53	493	—	—	119	509	116	217	3	284	1	—	—	—	—	12
Opolskie	1	—	1	40	—	—	—	—	517	—	5	164	391	107	288	3	402	—	—	—	—	1	18
Poznańskie	8	2	15	89	—	11	5	4	582	—	2	322	464	91	475	1	638	—	—	—	2	—	10
Rzeszowskie	3	1	1	22	—	—	10	—	534	—	2	146	264	112	169	7	265	—	—	—	—	—	5
Szczecińskie	—	—	35	37	—	2	20	—	253	—	12	248	406	271	279	—	203	—	—	—	—	—	11
Warszawskie	23	2	41	168	—	—	4	7	801	—	4	406	892	166	221	1	668	—	—	—	—	1	25
Wrocławskie	16	—	39	89	—	—	30	1	968	—	17	428	639	192	770	5	381	2	—	—	1	2	14
Zielonogórskie	5	—	28	17	—	31	5	—	343	1	—	192	227	68	295	—	212	—	—	—	—	—	5

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	5,8	5,5	0,2	0,3	24,9	20,2	0,08	0,16
M. st. Warszawa	3,9	9,8	—	1,0	69,5	68,5	—	—
M. Kraków	4,7	2,3	—	—	68,3	28,3	—	—
M. Łódź	6,4	6,4	—	—	35,5	19,3	—	—
M. Poznań	—	—	—	—	19,4	22,1	—	—
M. Wrocław	5,2	5,2	—	—	7,7	—	—	—
Białostockie	2,1	5,2	3,1	1,0	30,1	34,3	—	—
Bydgoskie	8,5	7,2	—	—	19,7	34,9	0,6	—
Gdańskie	8,2	5,4	—	0,9	79,0	52,7	—	2,7
Katowickie	2,7	1,0	—	—	14,1	11,0	—	—
Kieleckie	8,8	6,3	0,6	—	0,6	1,2	0,6	—
Koszalińskie	3,3	—	—	—	27,8	21,2	—	—
Krakowskie	2,3	5,1	—	0,6	8,5	3,4	—	—
Lubelskie	1,9	8,8	—	—	19,5	6,3	—	—
Łódzkie	3,6	2,1	—	—	12,9	13,6	—	—
Olsztyńskie	19,2	11,5	—	—	41,1	48,8	—	—
Opolskie	4,8	1,2	—	—	1,2	1,2	—	—
Poznańskie	2,3	4,5	—	1,1	19,3	8,5	—	—
Rzeszowskie	10,7	2,1	—	0,7	2,1	0,7	—	—
Szczecińskie	1,5	—	—	—	60,0	51,3	—	—
Warszawskie	11,6	11,1	0,5	1,0	21,8	19,9	—	—
Wrocławskie	5,6	9,9	—	—	37,9	24,2	—	—
Zielonogórskie	10,1	7,2	—	—	43,3	40,4	—	1,4

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
7,3	4,1	192,8	276,4	167,5	125,1	205,1	465,9
1,0	—	589,0	1084,1	286,7	223,1	193,7	467,5
30,6	4,7	431,0	833,8	169,6	388,6	157,8	487,5
11,3	9,7	485,2	659,3	143,3	151,5	267,6	538,4
8,3	2,8	373,8	523,3	409,8	127,4	227,1	315,7
7,7	—	416,4	703,5	238,0	225,0	346,6	491,4
—	5,2	60,2	117,4	143,3	109,0	134,0	371,8
0,6	—	184,3	246,2	227,7	82,3	184,9	437,0
—	6,4	212,6	457,0	377,1	92,7	212,6	487,0
2,7	1,7	263,7	255,1	229,4	181,6	276,8	597,8
18,8	8,2	94,8	97,3	126,2	75,3	137,5	537,9
3,3	22,9	93,2	181,5	138,9	171,6	188,0	390,7
9,1	2,3	132,8	230,4	69,2	85,7	235,5	438,6
1,9	1,9	52,3	107,2	71,9	121,7	226,4	424,4
3,6	2,9	138,7	190,9	143,7	60,1	130,9	336,1
—	—	107,8	152,7	160,4	148,9	192,5	632,8
8,4	6,0	116,8	197,4	126,4	128,8	319,0	622,4
2,8	1,1	189,2	182,4	135,4	51,6	166,6	329,8
5,0	1,4	31,3	103,9	76,1	79,7	192,8	380,0
20,5	17,6	291,5	363,3	133,3	397,0	212,4	370,6
12,1	1,9	163,4	196,8	176,5	80,5	148,4	388,4
22,3	10,6	237,5	266,1	97,6	119,4	203,3	601,9
8,6	—	154,3	276,9	275,4	98,0	281,2	494,6


* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Styczeń 1964	Styczeń 1963	Mediana 1960-1963	
Dur brzuszny — 040	143	151	198	
Dury rzekome A.B.C. — 041	9	5	17	
Czerwonka 045—048	526	648	544	
Biegunki u dzieci do lat 2 571 — 764	1373	1317	1339	
Botulismus — 049	2	7	9	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	205	157	31
	inne — 049	227	246	247
Włośnica — 128	125	75	64	
Zakaźne zap. wątroby — 092	12134	5343	6053	
Porażenie dziec. nagm. — 080	4	2	2	
Błonica — 055	106	192	455	
Płonica — 050	7199	5022	4970	
Odra — 085	11556	16247	11020	
Krztusiec — 056	3257	4363	5136	
Zap. przyusz. nagm. — 089	9297	7571	6097	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	61	55	69	
Grypa 480 — 483	8681	43238	39030	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	8	18	18	
Zimnica 110—117	1	—	—	
Wścieklizna — 094	—	—	—	
Choroba Banga — 044	8	3	2	
Tężec — 061	14	4	12	
Róża — 052	288	164	172	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

CDW Cieszyn 1004/64 210 + 50 egz. B-020

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Luty 1964

EGZ. NR 000032

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w lutym 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 4,4 — II/1963 do 4,1 — II/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki i wyższe od krajowego (4,1) notuje się w woj. Opolskim — 13,2; Bydgoskim — 9,2; Warszawskim — 7,8; Olsztyńskim — 7,7; Wrocławskim — 7,5; Kieleckim — 5,0; Rzeszowskim — 5,0 i Gdańskim — 4,5. Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia, woj. Kozłańskiego i Zielonogóskiego. Najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Poznańskim — 0,6; Katowickim — 1,0; Szczecińskim — 1,5 i m. Łodzi — 1,6.

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 5,5 — I/1964 do 4,1 — II/1964.

2. Dury rzekome

W lutym zgłoszono 1 zachorowanie.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z lutym r. ub. z 23,8 — II/1963 do 19,7 — II/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. st. Warszawy, woj. Kieleckiego, Szczecińskiego, i Warszawskiego. W woj. Bydgoskim zapadalność utrzymuje się na poziomie lutego 1963 r. W lutym najwyższe wskaźniki wystąpiły: w m. st. Warszawie — 62,6; woj. Olsztyńskim — 51,3; woj. Gdańskim — 46,3; Wrocławskim — 44,1; Szczecińskim — 39,5; Zielonogóskim — 37,5 i Białostockim — 31,1. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Wrocławia.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obserwuje się w woj. Gdańskim (83,6 — II/1963; 46,3 — II/1964) i Lubelskim (34,7 — II/1963; 12,0 — II/1964).

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 20,2.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W analogicznym okresie r. ub. nie notowano zachorowań.

W styczniu br. zgłoszono 4 zachorowania z 1963 r.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 9 792 zachorowania w stosunku do 4 329 zgłoszonych zachorowań w tym samym okresie r. ub. W lutym hospitalizowano 81,7% zgłoszonych zachorowań.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w stosunku do lutego 1963 r. ze 166,2 — II/1963 do 376,0 — II/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w po-

równaniu z lutym r. ub. notuje się we wszystkich województwach; natomiast znaczny wzrost wystąpił w:

woj. Wrocławskim	-- 200,8	-- II/1963;	548,4	-- II/1964
woj. Olsztyńskim	-- 166,9	-- II/1963;	505,7	-- II/1964
woj. Kieleckim	-- 109,2	-- II/1963;	386,0	-- II/1964
woj. Białostockim	-- 88,3	-- II/1963;	336,5	-- II/1964
woj. Katowickim	-- 236,9	-- II/1963;	477,7	-- II/1964
woj. Bydgoskim	-- 116,5	-- II/1963;	355,4	-- II/1964
woj. Warszawskim	-- 112,6	-- II/1963;	320,8	-- II/1964
m. Łodzi	-- 193,4	-- II/1963;	420,7	-- II/1964

Najwyższe wskaźniki obserwuje się w woj. Wrocławskim — 548,4; Opolskim — 516,5; Olsztyńskim — 505,7; Katowickim — 477,7; m. Wrocławiu — 429,4; m. Łodzi — 420,7; Zielonogórskim — 413,8 i Gdańskim — 412,5.

Najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Poznańskim — 249,9; m. Krakowie — 282,6; Łódzkim — 286,6; Szczecińskim — 293,0 i Rzeszowskim — 293,9.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 465,9.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 90 zachorowań. Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z lutym 1963 r. z 6,1 — II/1963 do 3,4 — II/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Białostockiego, Kozalińskiego i Opolskiego. W m. Łodzi, woj. Katowickim i Lubelskim zapadalność utrzymuje się na poziomie tego samego okresu r. ub. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania woj. Bydgoskiego, Gdańskiego i Olsztyńskiego.

W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (3,4) wystąpiły w woj. Wrocławskim — 10,6; Białostockim — 9,3; Szczecińskim — 8,8; Kozalińskim — 8,2; Opolskim — 7,2; Kieleckim — 6,9; m. Łodzi — 6,4; m. Krakowie — 4,7 i woj. Łódzkim — 3,6.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 4,1.

2. Płonica

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności ze 162,7 — II/1963 do 258,6 — II/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Katowickiego. Najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 917,7; m. Wrocławiu — 770,8; m. Krakowie — 737,2; m. Łodzi — 636,7; m. Poznaniu — 556,6 i woj. Gdańskim — 395,2.

W porównaniu ze styczniem br. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 276,4 — I/1964 do 258,6 — II/1964.

3. Krztusiec

W stosunku do lutego 1963 r. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 133,4 — II/1963 do 87,9 — II/1964, obniżył się również w porównaniu z poprzedzającym miesiącem ze 125,1 — I/1964 do 87,9 — II/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem 1963 r. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Lubelskiego, Olsztyńskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego i Rzeszowskiego.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Plonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przusz. nagminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózgo- -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	115	10	620	1185	7	85	364	61	4329	158	4236	12 065	3474	6583	63	56 764	9	—	—	7	7	128
	1964	107	1	513	1354	5	306	252	103	9792	90	6735	15 737	2290	10 028	66	9108	10	1	—	5	10	204
M. st. Warszawa	3	—	64	32	—	1	12	1	386	—	1	938	1403	142	728	7	37	—	—	—	—	—	10
M. Kraków	1	—	8	4	—	—	4	—	120	—	2	313	275	64	211	—	238	—	—	—	—	—	11
M. Łódź	1	—	12	33	—	—	9	—	261	—	4	395	302	70	231	—	622	1	—	—	—	—	21
M. Poznań	1	—	2	15	—	2	—	—	116	—	—	201	494	21	248	1	222	—	—	—	—	—	4
M. Wrocław	—	—	—	18	—	9	2	—	166	—	1	298	1174	35	307	—	68	—	—	—	—	—	8
Białostockie	4	—	30	56	—	—	33	40	324	—	9	128	205	48	230	2	125	5	—	—	—	—	2
Bydgoskie	14	1	43	40	1	6	16	—	540	—	—	438	959	111	476	3	548	—	—	—	—	1	12
Gdańskie	5	—	51	111	—	21	27	34	454	—	—	435	1374	65	777	4	389	—	—	—	—	—	11
Katowickie	3	—	22	273	—	93	3	2	1391	—	6	627	1827	364	2303	6	1336	—	—	—	—	1	13
Kieleckie	8	—	6	37	—	2	—	—	615	—	11	147	968	80	503	4	454	—	—	—	—	—	7
Koszalińskie	—	—	7	87	—	18	13	—	193	—	5	137	750	67	139	1	144	—	—	—	1	—	5
Krakowskie	5	—	8	9	—	—	2	—	598	—	3	354	454	89	448	2	691	—	1	—	—	3	16
Lubelskie	5	—	19	31	—	—	16	2	526	—	4	174	435	149	136	5	381	—	—	—	—	—	4
Łódzkie	3	—	9	51	—	9	3	2	401	—	5	240	292	31	285	3	777	1	—	—	—	—	7
Olsztyńskie	6	—	40	61	—	2	3	6	394	—	—	116	569	105	126	3	198	—	—	—	1	—	9
Opolskie	11	—	2	41	1	—	1	—	429	—	6	202	546	57	401	3	292	—	—	—	1	—	18
Poznańskie	1	—	19	75	3	13	—	1	441	—	1	271	448	111	539	7	680	—	—	—	—	1	7
Rzeszowskie	7	—	1	57	—	—	4	—	413	—	4	120	363	75	265	5	333	—	—	—	—	3	3
Szczecińskie	1	—	27	48	—	49	34	—	200	—	6	196	477	219	282	1	217	—	—	—	1	—	7
Warszawskie	16	—	46	168	—	—	8	2	655	—	4	378	1162	153	223	1	441	3	—	—	—	1	12
Wrocławskie	12	—	71	88	—	9	51	13	882	—	17	427	1047	189	827	6	609	—	—	—	1	—	16
Zielonogórskie	—	—	26	19	—	72	1	—	287	—	1	200	213	45	343	2	306	—	—	—	—	—	1

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)


Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce naqminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna							
	040		041		045—048		080					055		050		056		092	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964				1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	4,4	4,1	0,4	0,04	23,8	19,7	—	—	6,1	3,4	162,7	258,6	133,4	87,9	166,2	376,0			
M. st. Warszawa	1,9	2,9	1,0	—	41,1	62,6	—	—	2,9	1,0	569,4	917,7	209,4	138,9	189,8	377,7			
M. Kraków	2,3	2,3	—	—	25,9	18,8	—	—	35,3	4,7	299,1	737,2	193,1	150,7	155,4	282,6			
M. Łódź	4,8	1,6	—	—	27,4	19,3	—	—	6,4	6,4	385,3	636,7	167,6	112,8	193,4	420,7			
M. Poznań	—	2,8	—	—	11,1	5,5	—	—	—	—	191,1	556,6	207,7	58,1	185,5	321,2			
M. Wrocław	—	—	—	—	5,2	—	—	—	10,3	2,6	287,1	770,8	170,7	90,5	276,8	429,4			
Białostockie	7,3	4,1	4,1	1,0	36,3	31,1	—	—	7,3	9,3	76,8	132,9	98,7	49,8	88,3	336,5			
Bydgoskie	7,9	9,2	—	—	28,3	28,3	—	—	2,0	—	163,2	288,3	140,8	73,1	116,5	355,4			
Gdańskie	4,5	4,5	—	—	83,6	46,3	—	—	0,9	—	182,6	395,2	308,9	59,0	214,4	412,5			
Katowickie	0,7	1,0	—	—	9,6	7,5	—	—	2,1	2,1	238,0	215,3	183,7	125,0	236,9	477,7			
Kieleckie	5,0	5,0	0,6	—	—	3,8	—	—	10,7	6,9	84,7	92,3	81,6	50,2	109,2	386,0			
Koszalińskie	6,5	—	—	—	19,6	11,4	—	—	6,5	8,2	112,8	224,0	142,2	109,5	168,4	315,5			
Krakowskie	5,7	2,8	—	—	9,6	4,5	—	—	10,8	1,7	106,1	200,8	99,3	50,5	153,2	339,3			
Lubelskie	6,3	3,1	—	—	34,7	12,0	—	—	2,5	2,5	64,3	109,7	71,9	93,9	146,9	331,7			
Łódzkie	2,1	2,1	2,1	—	14,3	6,4	—	—	4,3	3,6	132,3	171,6	113,0	22,2	100,1	286,6			
Olsztyńskie	6,4	7,7	—	—	56,5	51,3	—	—	1,3	—	95,0	148,9	129,6	134,8	166,9	505,7			
Opolskie	3,6	13,2	—	—	3,6	2,4	—	—	—	7,2	112,0	243,2	103,5	68,6	328,7	516,5			
Poznańskie	1,7	0,6	—	—	13,0	10,8	—	—	1,7	0,6	92,3	153,5	132,0	62,9	121,8	249,9			
Rzeszowskie	6,4	5,0	—	—	1,4	0,7	—	—	4,3	2,8	44,1	85,4	42,7	53,4	158,7	293,9			
Szczecińskie	5,8	1,5	1,5	—	30,8	39,5	—	—	17,6	8,8	181,6	287,1	79,1	320,8	187,5	293,0			
Warszawskie	8,8	7,8	—	—	19,6	22,5	—	—	3,9	1,9	155,7	185,1	140,6	74,9	112,6	320,8			
Wrocławskie	3,1	7,5	—	—	47,9	44,1	—	—	17,4	10,6	183,4	265,5	95,7	117,5	200,8	548,4			
Zielonogórskie	1,4	—	—	—	46,1	37,5	—	—	10,1	1,4	122,6	288,4	158,6	64,9	209,1	413,8			

Zapadalność na 100 000 ludności.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Luty 1964	Luty 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-II/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-II/1963		
Dur brzuszny -- 040	107	115	233	250	266		
Dury rzekome A. B. C. —041	1	10	15	10	15		
Czerwonka 045 — 048	513	620	558	1 039	1 268		
Biegunki u dzieci do lat 2 571 — 764	1 354	1 185	1 172	2 727	2 502		
Botulismus -- 049	5	7	13	7	14		
Zatrucia pokarmowe {		Salmonellozy 042	306	85	43	511	242
		inne — 049	252	364	297	479	610
Włośnica — 128	103	61	49	228	136		
Zakaźne zap. wątroby -- 092	9 792	4 329	5 046	21 926	9 672		
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	—	5	—	2		
Błonica — 055	90	158	391	196	350		
Płonica — 050	6 735	4 236	3 963	13 934	9 258		
Odra — 085	15 737	12 065	9 486	27 293	28 339		
Krzusiec — 056	2 290	3 474	4 590	5 547	7 837		
Zap. przyusz. nagm. — 089	10 028	6 583	6 159	19 325	14 154		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeni- nagminne — 057	66	63	62	127	118		
Grypa 480 — 483	9 108	56 764	76 573	17 789	100 002		
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100 — 102	10	9	10	18	27		
Zimnica 110 — 117	1	—	—	2	—		
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—		
Choroba Banga — 044	5	7	4	13	10		
Tężec — 061	10	7	7	24	11		
Róża — 052	204	128	127	492	292		

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Marzec 1964

EGZ. NR 000031

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w marcu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 7,0 — III/1963 do 3,8 — III/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z marcem r. ub. zanotowano w woj. Krakowskim (28,9 — III/1963; 2,3 — III/1964). W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (3,8) notuje się w woj. Bydgoskim — 10,5; Warszawskim — 8,3; Białostockim — 7,3; Opolskim — 7,2; Kieleckim — 6,3; Gdańskim — 5,4 i m. st. Warszawie — 4,9. Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia i woj. Szczecińskiego. W marcu ognisk epidemicznych nie notowano.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 4,1.

2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 3 zachorowania.

3. Czerwonka

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 26,5 — III/1963 do 16,2 — III/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z marcem 1963 r. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, woj. Białostockiego i Katowickiego. W m. Wrocławiu i woj. Rzeszowskim zapadalność utrzymuje się na poziomie tego samego okresu 1963 r.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności występuje w m. st. Warszawie, woj. Gdańskim, Szczecińskim i Olsztyńskim.

Najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Olsztyńskim — 59,0, m. st. Warszawie — 39,1; woj. Białostockim — 38,4; Wrocławskim — 35,4; Zielonogórskim — 33,2; Gdańskim — 27,2 i Szczecińskim — 26,4.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca krajowy wskaźnik obniżył się z 19,7 — II/1964 do 16,2 — III/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W lutym br. nie zgłoszono zachorowań.

W marcu 1963 r. nie notowano zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W marcu br. zgłoszono z terenu całego kraju 8 505 zachorowań w stosunku do 3 865 zgłoszonych zachorowań w tym samym okresie r. ub.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 86,1% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w stosunku do analogicznego okresu r. ub. ze 148,4 — III/1963 do 326,6 — III/1964. Wzrost wskaźnika zapadal-

ności w porównaniu z marcem 1963 r. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania. Znaczny wzrost wskaźnika w porównaniu z marcem r. ub. wystąpił w:

województwo	III/1963	III/1964
Olsztyńskim	175,8	496,7
m. st. Warszawie	144,8	432,4
Warszawskim	88,2	356,1
Wrocławskim	195,9	456,4
Kieleckim	88,5	307,6
Opolskim	219,1	426,2

Najwyższe wskaźniki obserwuje się w woj. Olsztyńskim — 496,7; Wrocławskim — 456,4; m. st. Warszawie — 432,4; Opolskim — 426,2; m. Łodzi — 399,8; m. Wrocławiu — 385,4; Katowickim — 369,5; i Warszawskim — 356,1. W lutym br. krajowy wskaźnik wynosił — 376,0.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W marcu br. zgłoszono 92 zachorowania. Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 5,2 — III/1963 do 3,5 — III/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. Krakowie — 9,4; woj. Kieleckim — 8,2; Koszalińskim — 8,2; Opolskim — 7,2; Wrocławskim — 6,8; Zielonogórskim — 5,8; Krakowskim — 5,1 i Rzeszowskim — 5,0. Najniższe wskaźniki notuje się w woj. Poznańskim — 0,6; Katowickim — 1,0 i m. st. Warszawie — 1,0. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Bydgoskiego i Olsztyńskiego. W lutym br. krajowy wskaźnik wynosił 3,4.

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności ze 193,6 — III/1963 do 264,3 — III/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 1021,4; m. Krakowie — 946,8; m. Wrocławiu — 763,0; m. Łodzi — 599,7; m. Poznaniu — 498,4; Gdańskim — 475,2 i Szczecińskim — 329,6. W lutym br. krajowy wskaźnik wynosił — 258,6.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 125,8 — III/1963 do 84,7 — III/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Łodzi, m. Poznania, woj. Lubelskiego i Szczecińskiego. W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się niewielki spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 87,9 — II/1964 do 84,7 — III/1964.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Difteria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przusz. nagminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózgo- -różni. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080													
POLSKA	183	6	691	1119	—	95	290	118	3865	—	135	5042	12 650	3276	7468	56	62 794	10	—	—	6	8	194
1963	183	6	691	1119	—	95	290	118	3865	—	135	5042	12 650	3276	7468	56	62 794	10	—	—	6	8	194
1964	100	3	422	1326	5	298	387	74	8505	—	92	6884	16 813	2205	10 440	71	20 800	4	—	—	15	11	193
M. st. Warszawa	5	—	40	31	—	1	12	—	442	—	1	1044	1540	139	927	12	44	—	—	—	—	—	13
M. Kraków	1	—	3	17	—	—	5	—	121	—	4	402	537	67	303	—	240	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	1	—	8	66	—	—	20	—	248	—	2	372	478	99	369	—	628	1	—	—	—	—	19
M. Poznań	1	—	7	15	—	7	1	—	78	—	—	180	577	40	333	1	229	—	—	—	—	—	5
M. Wrocław	—	—	1	13	—	3	18	—	149	—	—	295	1155	31	297	—	2240	—	—	—	—	—	4
Białostockie	7	1	37	58	—	—	6	11	277	—	4	161	250	27	351	3	104	1	—	—	—	—	4
Bydgoskie	16	—	26	59	—	17	32	—	475	—	—	339	949	141	462	5	362	—	—	—	—	1	19
Gdańskie	6	1	30	134	—	15	12	2	343	—	5	523	1208	75	742	—	263	—	—	—	1	—	16
Katowickie	4	—	20	203	—	74	—	29	1076	—	3	646	2228	286	2063	7	1318	—	—	—	—	2	8
Kieleckie	10	—	3	41	—	18	5	—	490	—	13	143	863	87	630	8	356	—	—	—	—	—	6
Koszalińskie	2	—	4	69	—	14	2	1	205	—	5	100	919	83	169	4	141	—	—	—	—	—	3
Krakowskie	4	—	13	18	—	—	2	—	496	—	—	337	394	87	443	4	460	1	—	—	—	—	7
Lubelskie	5	—	26	22	—	—	13	—	444	—	4	173	406	132	208	—	203	1	—	—	1	2	7
Łódzkie	1	1	13	54	—	7	56	—	308	—	3	195	342	29	250	1	852	—	—	—	—	—	12
Olsztyńskie	2	—	46	46	—	6	11	10	387	—	—	89	620	56	141	1	141	—	—	—	5	—	3
Opolskie	6	—	—	40	—	—	120	—	354	—	6	212	563	75	420	3	449	—	—	—	—	4	11
Poznańskie	6	—	8	65	5	5	—	2	428	—	1	348	413	146	441	4	496	—	—	—	—	—	5
Rzeszowskie	2	—	2	56	—	8	7	—	332	—	7	150	501	90	188	7	405	—	—	—	—	—	2
Szczecińskie	—	—	18	54	—	35	23	—	159	—	3	225	504	141	394	2	94	—	—	—	—	1	10
Warszawskie	17	—	37	144	—	2	9	19	729	—	7	319	974	172	310	5	332	—	—	—	—	—	14
Wrocławskie	3	—	57	102	—	—	19	—	734	—	11	457	1089	150	718	4	11 234	—	—	—	3	4	19
Zielonogórskie	1	—	23	19	—	86	14	—	230	—	4	174	303	52	281	—	209	—	—	—	1	—	3

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce naqminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna							
	040		041		045—048		080					055		050		056		092	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964				1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	7,0	3,8	0,2	0,1	26,5	16,2	—	—	5,2	3,5	193,6	264,3	125,8	84,7	148,4	326,6			
M. st. Warszawa	1,0	4,9	—	—	87,1	39,1	—	—	2,9	1,0	570,4	1021,4	201,5	136,0	144,8	432,4			
M. Kraków	2,3	2,3	—	—	16,5	7,1	—	—	35,3	9,4	393,3	946,8	195,5	157,8	122,5	285,0			
M. Łódź	1,6	1,6	—	—	32,2	12,9	—	—	4,8	3,2	374,0	599,7	146,7	159,6	241,8	399,8			
M. Poznań	—	2,8	—	—	8,3	19,4	—	—	—	—	216,0	498,4	99,7	110,8	252,0	216,0			
M. Wrocław	—	—	—	—	2,6	2,6	—	—	10,3	—	227,6	763,0	162,9	80,2	222,4	385,4			
Białostockie	9,3	7,3	4,1	1,0	30,1	38,4	—	—	*2,1	4,1	112,2	167,2	90,3	28,0	100,7	287,7			
Bydgoskie	13,8	10,5	—	—	21,7	17,1	—	—	2,6	—	157,3	223,1	131,0	92,8	121,1	312,6			
Gdańskie	6,4	5,4	1,8	0,9	91,8	27,2	—	—	—	4,5	266,2	475,2	291,7	68,1	184,4	311,6			
Katowickie	2,7	1,4	—	—	13,0	6,9	—	—	1,0	1,0	250,0	221,8	156,2	98,2	197,4	369,5			
Kieleckie	6,3	6,3	—	—	—	1,9	—	—	14,4	8,2	105,4	89,8	64,0	54,6	88,5	307,6			
Koszalińskie	6,5	3,3	—	—	16,3	6,5	—	—	8,2	8,2	109,5	163,5	192,9	135,7	170,0	335,1			
Krakowskie	28,9	2,3	—	—	20,4	7,4	—	—	5,7	5,1	128,8	191,2	63,5	49,4	131,6	281,4			
Lubelskie	6,9	3,1	—	—	17,6	16,4	—	—	5,7	2,5	103,4	109,1	54,9	83,2	144,4	280,0			
Łódzkie	1,4	0,7	—	0,7	10,7	9,3	—	—	2,1	2,1	203,1	139,5	120,9	20,7	102,3	220,3			
Olsztyńskie	3,8	2,6	—	—	80,9	59,0	—	—	—	—	161,7	114,2	91,1	71,9	175,8	496,7			
Opolskie	4,8	7,2	—	—	2,4	—	—	—	1,2	7,2	160,1	255,2	120,4	90,3	219,1	426,2			
Poznańskie	1,7	3,4	—	—	9,6	4,5	—	—	0,6	0,6	139,9	197,2	125,8	82,7	125,2	242,5			
Rzeszowskie	8,5	1,4	—	—	1,4	1,4	—	—	7,1	5,0	38,4	106,7	89,7	64,0	121,7	236,2			
Szczecińskie	—	—	—	—	54,2	26,4	—	—	5,8	4,4	246,1	329,6	93,7	206,5	169,9	232,9			
Warszawskie	11,3	8,3	—	—	25,9	18,1	—	—	4,4	3,4	189,5	156,2	139,1	84,2	88,2	356,1			
Wrocławskie	5,6	1,9	—	—	42,9	35,4	—	—	14,9	6,8	213,9	284,2	106,9	93,2	195,9	456,4			
Zielonogórskie	4,3	1,4	—	—	54,8	33,2	—	—	2,9	5,8	226,4	250,9	155,7	75,0	155,7	331,7			

Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.


Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Marzec 1964	Marzec 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-III/1963	
Dur brzuszny — 040	100	183	185	350	449	
Dury rzekome A. B. C. — 041	3	6	13	13	21	
Czerwonka 045 — 048	422	691	674	1461	1959	
Biegunki u dzieci do lat 2 571 — 764	1326	1119	1364	4053	3621	
Botulismus — 049	5	—	13	12	14	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	298	95	59	809	337
	inne — 049	387	290	247	866	900
Włośnica — 128	74	118	78	302	254	
Zakaźne zap. wątroby — 092	8505	3865	4413	30 431	13 537	
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	—	7	—	2	
Błonica — 055	92	135	407	288	485	
Płonica — 050	6884	5042	5069	20 818	14 300	
Odra — 085	16 813	12 650	10 391	44 106	40 989	
Krztusiec — 056	2205	3276	4174	7752	11 113	
Zap. przyusz. nagm. — 089	10 440	7468	7799	29 765	21 622	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	71	56	69	198	174	
Grypa 480 — 483	20 800	62 794	194 377	38 589	162 796	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	4	10	14	22	37	
Zimnica 110 — 117	—	—	—	2	—	
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—	
Choroba Banga — 044	15	6	5	28	16	
Tężec — 061	11	8	9	35	19	
Róża — 052	193	194	148	685	486	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294

4234



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Kwiecień 1964

EGZ. NR 00031

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w kwietniu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. obniżył się z 8,8 — IV/1963 do 5,0 — IV/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Warszawskim — 18,6; m. Krakowie — 9,4; Bydgoskim — 8,5; Olsztyńskim — 7,7 i Białostockim — 7,3. Z terenu woj. Warszawskiego zgłoszono 38 zach., w tym 21 zach. z pow. Pułtuskiego. Zachorowania wystąpiły przedewszystkim w Nasielsku, szerzyły się drogą wody — zaopatrzenia ludności w wodę przemysłową.

W kwietniu br. nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia i woj. Wrocławskiego.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika 3,8 — III/1964 do 5,0 — IV/1964.

2. Dury rzekome

W kwietniu br. zgłoszono 3 zachorowania.

3. Czerwonka

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 28,4 — IV/1963 do 19,8 — IV/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, woj. Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Poznańskiego i Warszawskiego. W m. Wrocławiu, woj. Koszalińskim i Opolskim zapadalność utrzymuje się na poziomie tego okresu r. ub.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w woj. Krakowskim, Olsztyńskim i Gdańskim. W kwietniu br. najwyższe wskaźniki obserwuje się w woj. Olsztyńskim — 52,6; Zielonogórskim — 49,0; Gdańskim — 44,5; Szczecińskim — 36,6; m. st. Warszawie — 33,0 i woj. Białostockim — 31,1; natomiast najniższe wskaźniki w woj. Rzeszowskim — 0,7; Opolskim — 1,2; m. Wrocławiu — 2,6; Katowickim — 4,5 i Kieleckim — 7,5.

W marcu br. krajowy wskaźnik wynosił — 16,2.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W marcu br. nie zgłoszono zachorowań.

W analogicznym okresie r. ub. miały miejsce 3 zachorowania.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W kwietniu br. zgłoszono z terenu całego kraju 7 903 zach., w stosunku do 3 456 zgłoszonych zachorowań w tym samym okresie r. ub.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 88,5% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z kwietniem 1963 r. ze 132,7 — IV/1963 do 303,5 — IV/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się we wszystkich województwach; natomiast znaczny wzrost ilustruje następująca tabela.

Województwo	IV/1963	IV/1964
Warszawskie	77,9	379,1
Zielonogórskie	132,7	367,7
Bydgoskie	107,9	344,2
Białostockie	63,3	296,0
Opolskie	187,8	398,5
Wrocławskie	172,9	381,8
Katowickie	184,4	385,6
M. Łódź	203,1	407,8

W kwietniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w m. Łodzi — 407,8 woj. Opolskim — 398,5; Katowickim — 385,6; Wrocławskim — 381,8; Warszawskim — 379,1; Olsztyńskim — 376,1 i Zielonogórskim — 367,7.

Najniższe wskaźniki występują w m. Krakowie — 190,8; woj. Poznańskim — 197,7; Łódzkim — 210,3; Kieleckim — 214,0 i Rzeszowskim — 215,6.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 326,6.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono z terenu całej Polski 46 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. st. Warszawy, m. Łodzi, m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Białostockiego, Bydgoskiego, Olsztyńskiego i Opolskiego. Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 5,7—IV/1963 do 1,8 IV/1964. Wyższe wskaźniki od krajowego (1,8) notuje się w m. Krakowie, — 14,1; woj. Koszalińskim — 6,5; Wrocławskim — 5,0; Zielonogórskim — 4,3; Kieleckim — 3,8; Szczecińskim — 2,9; Krakowskim — 2,3; Lubelskim — 2,0 i Warszawskim — 1,9.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 3,5—III/1964 do 1,8—IV 1964.

2. Płonica

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z kwietniem 1963 r. ze 177,9—IV/1963 do 216,2—IV/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Bydgoskiego, Kieleckiego, Katowickiego i Olsztyńskiego.

W marcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 264,3.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do tego samego okresu r. ub. ze 105,7—IV/1963 do 94,3—IV/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Szczecińskim — 291,1; m. st. Warszawie — 205,5 i m. Łodzi — 204,7.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się wzrost krajowego wskaźnika z 84,7—III/1964 do 94,3—IV/1964.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. naǵm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy naǵm. Parotitis epidemica	Zapał. opon mózǵ. -rdzen. naǵm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	230	10	741	1394	8	91	599	786	3456	3	148	4632	15084	2754	7.156	72	69701	9	—	—	7	11	173
	1964	131	3	517	1469	10	255	258	29	7903	—	46	5630	16452	2455	9.416	83	595304	16	3	1	5	21	200
M. st. Warszawa	6	—	34	38	—	8	15	3	346	—	—	856	1829	210	1.069	8	20516	2	1	—	—	1	15	
M. Kraków	4	—	12	8	—	—	12	—	81	—	6	277	508	84	278	—	12661	—	—	—	—	—	7	
M. Łódź	4	—	14	75	—	—	12	—	253	—	—	300	804	127	490	—	35874	—	—	—	—	—	23	
M. Poznań	2	—	7	8	—	24	—	—	96	—	—	130	554	44	276	3	21071	—	1	—	—	—	11	
M. Wrocław	—	—	1	19	1	7	13	—	125	—	—	193	500	52	263	—	41364	—	1	—	—	—	3	
Białostockie	7	1	30	72	—	—	15	12	285	—	—	142	158	28	282	3	14895	6	—	—	—	—	2	
Bydgoskie	13	—	40	56	—	5	24	—	523	—	—	209	898	153	630	4	10645	—	—	—	—	2	15	
Gdańskie	7	1	49	101	—	18	21	8	357	—	1	409	1015	148	873	2	791	—	—	—	—	—	7	
Katowickie	8	—	13	236	1	73	1	—	1123	—	1	492	1926	293	1734	11	142677	—	—	—	—	1	6	
Kieleckie	3	—	12	37	—	8	—	—	341	—	6	103	938	106	543	9	12017	1	—	—	—	—	4	
Koszalińskie	1	—	11	80	—	21	17	—	185	—	4	95	1324	98	158	5	1554	—	—	1	—	—	—	
Krakowskie	4	—	22	18	1	—	5	—	422	—	4	331	374	94	367	11	15041	1	—	—	—	7	8	
Lubelskie	8	—	35	24	—	—	26	—	378	—	3	176	476	133	194	2	32623	4	—	—	—	—	5	
Łódzkie	3	—	24	67	1	7	11	5	294	—	1	190	312	20	186	1	19692	—	—	—	—	2	10	
Olsztyńskie	6	—	41	83	—	3	18	—	293	—	—	73	678	62	112	3	2033	—	—	—	2	—	7	
Opolskie	1	—	1	49	1	—	—	—	331	—	—	146	356	47	298	4	13859	—	—	—	—	1	6	
Poznańskie	3	1	17	67	2	12	13	—	349	—	1	228	379	95	177	2	81413	—	—	—	—	1	7	
Rzeszowskie	9	—	1	57	—	—	—	—	303	—	2	132	321	91	144	9	13910	—	—	—	—	3	6	
Szczecińskie	3	—	25	56	2	19	24	—	175	—	2	250	576	199	315	2	5575	—	—	—	—	—	14	
Warszawskie	38	—	52	200	1	4	10	—	774	—	4	309	982	239	399	1	2519	2	—	—	—	2	14	
Wrocławskie	—	—	42	104	—	9	19	1	614	—	8	436	1017	98	449	2	73569	—	—	—	1	1	25	
Zielonogórskie	1	—	34	14	—	37	2	—	255	—	3	153	527	34	179	1	21005	—	—	—	1	1	5	

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
R o k	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	8,8	5,0	0,4	0,1	28,4	19,8	0,1	—
M. st. Warszawa	6,8	5,9	1,0	—	35,2	33,3	—	—
M. Kraków	7,1	9,4	2,3	—	37,7	28,3	—	—
M. Łódź	6,4	6,4	—	—	33,8	22,6	—	—
M. Poznań	2,8	5,5	—	—	16,6	19,4	—	—
M. Wrocław	2,6	—	—	—	2,6	2,6	—	—
Białostockie	2,1	7,3	4,1	1,0	49,8	31,1	—	—
Bydgoskie	4,6	8,5	—	—	30,9	26,3	—	—
Gdańskie	6,4	6,4	—	0,9	76,3	44,5	—	—
Katowickie	11,0	2,7	—	—	10,6	4,5	—	—
Kieleckie	8,8	1,9	—	—	0,6	7,5	—	—
Koszalińskie	8,2	1,6	—	—	18,0	18,0	—	—
Krakowskie	42,5	2,3	—	—	58,4	12,5	0,6	—
Lubelskie	3,3	5,3	—	—	19,1	23,1	—	—
Łódzkie	2,9	2,1	—	—	12,9	17,2	—	—
Olsztyńskie	6,4	7,7	—	—	88,6	52,6	—	—
Opolskie	7,2	1,2	1,2	—	1,2	1,2	—	—
Poznańskie	2,3	1,7	1,1	0,6	7,9	9,6	—	—
Rzeszowskie	14,2	6,4	—	—	9,2	0,7	—	—
Szczecińskie	1,5	4,4	—	—	45,4	36,6	—	—
Warszawskie	9,3	18,6	—	—	22,0	25,1	0,5	—
Wrocławskie	4,3	—	0,6	—	46,0	26,1	0,6	—
Zielonogórskie	1,4	1,4	—	—	60,6	49,0	—	—

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
5,7	1,8	177,9	216,2	105,7	94,3	132,7	303,5
1,9	—	558,7	837,5	170,2	205,5	150,7	338,5
44,7	14,1	431,0	652,4	143,7	197,8	139,0	190,8
3,2	—	409,4	483,6	90,3	204,7	203,1	407,8
5,5	—	174,4	360,0	119,1	121,8	188,3	265,8
10,3	—	235,4	499,2	253,5	134,5	227,6	323,3
2,1	—	129,8	147,5	82,0	29,1	63,3	296,0
2,0	—	144,1	137,6	132,3	100,7	107,9	344,2
1,8	0,9	189,9	371,6	204,4	134,5	142,6	324,4
1,4	0,3	242,8	168,9	138,4	100,6	184,4	385,6
11,9	3,8	109,8	64,6	59,6	66,5	81,0	214,0
4,9	6,5	80,1	155,3	189,6	160,2	132,4	302,4
11,9	2,3	115,2	187,8	48,2	53,3	127,1	239,4
5,3	2,0	105,7	116,3	56,1	87,5	134,1	249,7
2,9	0,7	125,2	135,9	72,9	14,3	94,4	210,3
—	—	197,7	93,7	98,8	79,6	182,3	376,1
2,4	—	115,6	175,8	103,5	56,6	187,8	398,5
1,7	0,6	115,6	129,2	85,5	53,8	99,2	197,7
5,7	1,4	41,3	93,9	92,5	64,7	113,8	215,6
2,9	2,9	205,1	366,2	68,8	291,1	161,1	256,3
4,4	1,9	145,5	151,3	86,7	117,1	77,9	379,1
17,4	5,0	259,3	271,1	102,6	60,9	172,9	381,8
1,4	4,3	118,2	220,6	141,3	49,0	132,7	367,7

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.


Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Kwiecień 1964	Kwiecień 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IV/1963	
Dur brzuszny -- 040	131	230	179	481	679	
Dury rzekome A. B. C. —041	3	10	13	16	31	
Czerwonka 045 — 048	517	741	680	1978	2700	
Biegunki u dzieci do lat 2 571 — 764	1469	1394	1420	5522	5015	
Botulismus — 049	10	8	10	22	22	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	255	91	85	1064	428
	inne — 049	258	599	411	1124	1499
Włośnica — 128	29	786	36	331	1040	
Zakaźne zap. wątroby — 092	7903	3456	3501	38 334	16 993	
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	3	9	—	5	
Błonica — 055	46	148	362	334	633	
Płonica — 050	5630	4632	4351	26 448	18 932	
Odra — 085	16 452	15 084	11 230	60 558	56 073	
Krzusiec — 056	2455	2754	3552	10 207	13 867	
Zap. przyusz. nagm. — 089	9416	7156	6648	39 181	28 778	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	83	72	72	281	246	
Grypa 480 — 483	595 304	69 701	49 326	633 893	232 497	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill'a 100 — 102	16	9	12	38	46	
Zimnica 110 — 117	3	—	—	5	—	
Wścieklizna — 094	1	—	—	1	—	
Choroba Banga — 044	5	7	7	33	23	
Tężec — 061	21	11	15	56	30	
Róża — 052	200	173	155	885	659	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294

4234



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Maj 1964

EGZ. NR 00032

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w maju 1964 r.

I. Schorzenia szeregające się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się z 8,7—V/1963 do 3,7—V/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, m. Wrocławia i woj. Warszawskiego. W woj. Białostockim, Szczecińskim i Zielonogórskim zapadalność utrzymuje się na poziomie maja 1963 r.

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Warszawskim — 12,2; Białostockim — 9,3; m. Wrocławiu — 7,7; woj. Bydgoskim — 5,3 i Olsztyńskim — 5,1. Z terenu woj. Warszawskiego zgłoszono 25 zachorowań; w tym 7 zachorowań z pow. Pułtuskiego — powiązane z epidemią duru brzuszego, która wystąpiła w kwietniu br.

W maju br. nie zgłoszono zachorowań z woj. Koszalińskiego i Opolskiego. W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 5,0.

2. Dury rzekome

W maju zgłoszono z terenu całej Polski 8 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 43,6 — V/1963 do 27,7 — V/1964. Spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. st. Warszawy, woj. Krakowskiego, Łódzkiego, i Wrocławskiego. Wyższe wskaźniki od krajowego (27,7) notuje się na terenie 10 województw w tym najwyższe w woj. Wrocławskim — 108,8; m. st. Warszawie — 104,7; woj. Szczecińskim — 55,7; Olsztyńskim — 50,1; Gdańskim — 40,9 i Zielonogórskim — 40,4.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się w woj. Gdańskim — (123,6 — V/1963; 40,9 — V/1964), Olsztyńskim (183,5 — V/1963; 50,1 — V/1964) i Bydgoskim (82,9 — V/1963; 22,4 — V/1964). Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia. W porównaniu z kwietniem br. krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł z 19,8 — IV/1964 do 27,7 — V/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie: woj. Wrocławskie, pow. Ząbkowice z kwietnia br.

W poprzedzającym miesiącu nie zgłoszono zachorowań.

W analogicznym okresie r. ub. zanotowano 8 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W maju zgłoszono z terenu całego kraju 5 777 zachorowań, w stosunku do 3 658 zgłoszonych zachorowań w tym samym okresie r. ub.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 92,7% chorych.

W porównaniu z majem r. ub. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności ze 140,5—V/1963 do 221,8—V/1964. Wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem 1963 r. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Wrocławia; natomiast znaczny wzrost ilustruje następująca tabela:

województwo	V/1963	V/1964
Warszawskie	84,2	254,7
Wrocławskie	160,4	296,0
Olsztyńskie	201,5	328,6
Bydgoskie	106,0	229,0
Szczecińskie	155,3	251,9
M. st. Warszawa	143,8	261,2

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 303,5.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W maju br. zgłoszono z terenu całej Polski 71 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. st. Warszawy, m. Łodzi, woj. Katowickiego, Olsztyńskiego i Poznańskiego. Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 4,6 — V/1963 do 2,7 — V/1964. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (2,7) obserwuje się w woj. Koszalińskim — 13,1; Wrocławskim — 8,1; Krakowskim — 5,7; Kieleckim — 5,6; m. Poznaniu — 5,5; Rzeszowskim — 4,3; Lubelskim — 3,1 i Zielonogórskim — 2,9.

W porównaniu z kwietniem br. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 1,8 — IV/1964 do 2,7 — V/1964.

2. Płonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 176,5 — V/1963 do 145,6 — V/1964. Najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 546,4; m. st. Warszawie — 472,6; m. Wrocławiu — 388,0; m. Łodzi — 296,6; woj. Szczecińskim — 265,1; Wrocławskim — 214,5 i Gdańskim — 201,7.

W kwietniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 216,2.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z majem 1963 r. ze 131,4—V/1963 do 87,5—V/1964. Obniżył się również w stosunku do poprzedzającego miesiąca z 94,3 — IV/1964 do 87,5 — V/1964.

Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Łodzi, woj. Kieleckiego, Lubelskiego, Szczecińskiego i Warszawskiego.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. naqm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Pionica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przusz. naqminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózq.- rdzeń. naqm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
						Salmonellozy	Inne																
Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963	1963
	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964
M. st. Warszawa	3	1	107	40	—	11	8	1	267	—	—	483	1287	163	776	11	17 455	1	1	—	—	—	8
M. Kraków	1	—	13	18	—	—	6	—	65	—	1	232	485	78	176	—	4545	—	1	—	—	—	6
M. Łódź	1	—	21	57	—	—	14	—	192	—	—	184	640	79	333	—	7943	—	—	—	—	—	12
M. Poznań	1	—	2	12	—	7	1	—	98	—	2	56	333	57	174	1	164	—	—	—	—	—	2
M. Wrocław	3	—	—	29	—	3	35	—	74	—	1	150	245	57	238	—	65	—	—	—	—	1	6
Białostockie	9	2	38	103	—	1	6	1	152	—	1	50	133	33	145	2	2015	2	1	—	—	—	3
Bydgoskie	8	—	34	62	5	17	27	—	348	—	1	138	665	130	434	3	3846	—	—	—	—	3	10
Gdańskie	3	—	45	121	—	13	345	—	244	—	3	222	831	77	717	2	905	1	—	—	1	—	16
Katowickie	3	—	10	229	—	47	8	—	880	—	—	344	1809	239	1247	8	17264	—	—	—	—	1	14
Kieleckie	6	—	2	52	—	11	3	—	218	—	9	81	1021	146	367	7	3193	—	—	—	—	—	2
Koszalińskie	—	1	13	107	3	28	—	—	134	—	8	48	717	60	92	6	1086	—	—	—	—	—	3
Krakowskie	7	—	48	14	6	—	14	—	331	—	10	249	360	104	236	2	3299	—	—	—	—	8	9
Lubelskie	5	—	23	24	—	—	20	—	289	—	5	118	485	183	157	3	2285	1	—	—	1	3	2
Łódzkie	3	—	15	47	1	4	12	—	193	—	2	142	293	30	116	3	4032	—	—	—	—	2	10
Olsztyńskie	4	—	39	59	—	2	15	—	256	—	—	48	448	56	91	1	3556	—	—	—	1	1	10
Opolskie	—	—	1	59	2	—	—	—	224	—	2	107	220	56	203	4	2225	—	—	—	—	1	3
Poznańskie	5	2	10	87	7	21	10	—	265	—	—	139	415	131	125	2	6022	—	—	—	—	1	4
Rzeszowskie	2	—	1	36	—	—	9	—	208	—	6	119	332	83	92	5	2777	—	—	—	—	7	7
Szczecińskie	3	—	38	40	9	10	48	—	172	—	1	181	457	124	271	2	5475	—	1	—	2	—	5
Warszawskie	25	1	58	194	—	7	5	2	520	—	4	219	687	239	278	2	1941	—	—	—	—	1	11
Wrocławskie	4	—	175	101	—	8	57	—	476	1	13	345	1020	112	387	1	418	—	—	—	—	1	21
Zielonogórskie	1	1	28	27	1	30	—	—	171	—	2	137	607	43	124	1	1236	—	—	—	—	—	1

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nażminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej																
R o k	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964		
POLSKA	8,7	3,7	4,1	0,3	43,6	27,7	0,3	0,04	4,6	2,7	176,5	145,6	131,4	87,5	140,5	221,8
M. st. Warszawa	12,7	2,9	2,9	1,0	93,9	104,7	—	—	—	—	467,7	472,6	198,6	159,5	143,8	261,2
M. Kraków	9,4	2,3	—	—	62,1	30,6	2,3	—	23,5	2,3	339,2	546,4	219,0	183,7	117,8	153,1
M. Łódź	3,2	1,6	—	—	59,6	33,8	—	—	4,8	—	293,4	296,6	98,3	127,3	269,2	309,5
M. Poznań	—	2,8	2,8	—	27,7	5,5	—	—	—	5,5	218,7	155,1	163,4	157,8	213,2	271,4
M. Wrocław	5,2	7,7	—	—	28,4	—	—	—	—	2,6	276,8	388,0	155,2	147,4	194,0	191,4
Białostockie	9,3	9,3	5,2	2,1	77,9	39,5	1,0	—	3,1	1,0	116,3	51,9	84,1	34,3	78,9	157,9
Bydgoskie	7,2	5,3	—	—	82,9	22,4	—	—	1,3	0,6	138,2	90,8	151,4	85,6	106,0	229,0
Gdańskie	9,1	2,7	2,7	—	123,6	40,9	0,9	—	—	2,7	232,6	201,7	298,9	70,0	156,3	221,7
Katowickie	3,4	1,0	0,3	—	16,8	3,4	—	—	2,1	—	260,6	118,1	152,5	82,1	216,7	302,2
Kieleckie	5,0	3,8	—	—	3,1	1,2	—	—	13,2	5,6	81,6	50,8	53,3	91,6	78,5	136,8
Koszalińskie	3,3	—	—	1,6	44,1	21,2	—	—	3,3	13,1	106,3	78,5	214,1	98,1	160,2	219,1
Krakowskie	32,3	4,0	1,1	—	18,7	27,2	0,6	—	14,2	5,7	136,2	141,3	74,3	59,0	132,2	187,8
Lubelskie	7,6	3,1	1,9	—	24,6	14,5	0,6	—	1,9	3,1	75,0	74,4	54,9	115,4	127,4	182,2
Łódzkie	5,0	2,1	—	—	9,3	10,7	0,7	—	2,9	1,4	136,6	101,5	108,0	21,4	95,8	138,0
Olsztyńskie	15,4	5,1	—	—	183,5	50,1	—	—	—	—	161,7	61,6	170,7	71,9	201,5	328,6
Opolskie	19,3	—	—	—	12,0	1,2	—	—	1,2	2,4	143,3	128,8	126,4	67,4	220,3	269,7
Poznańskie	4,0	2,8	1,1	1,1	9,1	5,7	—	—	1,1	—	122,9	78,7	152,4	74,2	90,1	150,1
Rzeszowskie	5,7	1,4	56,9	—	11,4	0,7	0,7	—	4,3	4,3	37,7	84,7	122,4	59,1	111,7	148,0
Szczecińskie	4,4	4,4	1,5	—	67,4	55,7	—	—	1,5	1,5	208,0	265,1	80,6	181,6	155,3	251,9
Warszawskie	8,3	12,2	1,9	0,5	46,0	28,4	—	—	1,0	1,9	157,7	107,3	105,8	117,1	84,2	254,7
Wrocławskie	10,6	2,5	—	—	58,4	108,8	0,6	0,6	16,2	8,1	273,0	214,5	128,1	69,6	160,4	296,0
Zielonogórskie	1,4	1,4	2,9	1,4	49,0	40,4	—	—	2,9	2,9	152,8	197,5	173,0	62,0	170,1	246,6

Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Maj 1964 r.	Maj 1963 r.	Mediana 1960—1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-V/1963
Dur brzuszny — 040	97	228	224	578	907
Dury rzekome A.B.C. — 041	8	107	32	24	138
Czerwonka 045—048	721	1136	1008	2699	3836
Biegunki u dzieci do lat 2 571 — 764	1518	2329	2068	7040	7344
Botulismus — 049	34	62	55	56	84
Zatrucia { Salmonellozy 042 pokarmowe { inne — 049	220	175	133	1284	603
	643	853	678	1767	2352
Włośnica — 128	4	18	30	335	1058
Zakaźne zap. wątroby — 092	5777	3658	3726	44 111	20 651
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	8	13	1	13
Błonica — 055	71	119	338	405	751
Płonica — 050	3792	4596	4226	30 240	23 528
Odra — 085	13 490	16 119	12 803	74 048	72 192
Krztusiec — 056	2280	3421	3851	12 541	17 288
Zap. przyusz. nagm. — 089	6779	5963	5870	45 960	34 741
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	66	81	78	347	327
Grypa 480 — 483	91 747	22 538	15 919	725 640	255 035
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	5	13	18	43	59
Zimnica 110—117	4	1	1	9	1
Wścieklizna — 094	—	—	—	1	—
Choroba Banga — 044	5	16	7	38	39
Tężec — 061	30	20	28	86	50
Róża — 052	165	152	143	1050	811

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Czerwiec 1964

EGZ. NR

75099

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w czerwcu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 8,2—VI/1963 do 3,6—VI/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Wrocłavia i woj. Wrocławskiego. W woj. Szczecińskim zapadalność utrzymuje się na poziomie tego samego okresu r. ub. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Opolskim — 14,4; m. Krakowie — 9,4; woj. Warszawskim — 7,8; Wrocławskim — 7,5 i Białostockim — 7,3. Nie zgłoszono zachorowań z m. Łodzi, m. Poznania, woj. Koszalińskiego i Zielonogórskiego.

W czerwcu br. większych ognisk nie notowano.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 3,7.

2. Dury rzekome

W czerwcu br. zgłoszono z terenu całego kraju 20 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do tego samego okresu r. ub. z 48,3—VI/1963 do 44,4—VI/1964. Spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. st. Warszawy (108,6—VI/1963; 124,2—VI/1964), Warszawskiego (65,1—VI/1963; 79,8—VI/1964) i Wrocławskiego (52,2—VI/1963; 303,4—VI/1964). W woj. Wrocławskim, pow. Dzierżoniowskim — m. Bielawa zanotowano epidemię czerwonki, której pierwsze zachorowania wystąpiły w drugiej dekadzie maja br. (151). W czerwcu zgłoszono dalsze 439 zachorowań. Wymieniona epidemia czerwonki była spowodowana zakażeniem wody pitnej ściekami (wody w studni na terenie Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków w Bielawie).

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 27,7—V/1964 do 44,4—VI/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie — woj. Rzeszowskie, pow. Nisko z maja br.

W analogicznym okresie r. ub. miało miejsce 6 zachorowań.

W maju br. zgłoszono 1 zachorowanie.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W czerwcu br. zgłoszono z terenu całej Polski 5820 zachorowań; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 2961 zachorowań.

W czerwcu hospitalizowano 91,5% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 113,7—VI/1963 do 223,5—VI/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się we wszys-

tkich województwach, natomiast znaczny wzrost wskaźnika w poszczególnych województwach ilustruje następująca tabela:

Województwo	VI/1963	VI/1964
Olsztyńskie	123,2	314,5
Wrocławskie	138,0	323,3
Opolskie	158,9	333,5
Warszawskie	68,1	223,3
Bydgoskie	100,0	248,8
Szczecińskie	93,7	234,4
M. Poznań	174,4	348,9
M. Łódź	190,2	327,2
M. st. Warszawa	133,1	234,8

W porównaniu z majem br. notuje się nieznaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 221,8—V/1964 do 223,5—VI/1964.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 3,5—VI/1963 do 1,7—VI/1964. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (1,7) notuje się w woj. Koszalińskim — 14,7; m. Łodzi — 4,8; m. Krakowie — 4,7; woj. Krakowskim — 4,5; Kieleckim — 3,8; Łódzkim — 2,9; Opolskim — 2,4 i Lubelskim — 1,9. Nie zgłoszono zachorowań z m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Białostockiego, Gdańskiego, Katowickiego, Olsztyńskiego, Poznańskiego, Rzeszowskiego i Zielonogórskiego.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 2,7.

2. Płonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do czerwca r. ub. ze 182,3—VI/1963 do 139,8—VI/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, m. Wrocławia, woj. Opolskiego, Wrocławskiego i Zielonogórskiego.

W porównaniu z majem br. krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 145,6—V/1964 do 139,8—VI/1964.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do czerwca r. ub. ze 142,8—VI/1963 do 123,7—VI/1964. W czerwcu br. najwyższe wskaźniki notuje się w m. Poznaniu — 376,6; m. st. Warszawie — 218,2; m. Łodzi — 193,4; m. Krakowie — 169,6; woj. Szczecińskim — 187,5; Warszawskim — 169,0; Bydgoskim — 160,6 i Lubelskim — 160,2.

W maju br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 87,5.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. naqm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przusz. naqmine Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózq.- rdzeń. naqm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	214	48	1257	3374	87	329	644	8	2961	6	91	4747	12 698	3719	4405	74	7073	17	—	1	8	37	127
	1964	95	20	1156	2798	48	417	964	8	5820	1	45	3641	15 737	3222	5966	86	4283	10	—	—	3	40	191
M. st. Warszawa	1	2	127	71	—	16	62	—	240	—	1	372	1009	223	689	9	25	2	—	—	—	—	—	12
M. Kraków	4	—	11	14	—	—	9	—	69	—	2	237	349	72	164	—	64	—	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	—	—	30	96	—	1	50	—	203	—	3	163	779	120	299	—	186	—	—	—	—	—	—	21
M. Poznań	—	—	2	16	—	18	—	—	126	—	—	58	330	136	140	—	17	—	—	—	—	—	—	3
M. Wrocław	1	—	1	37	—	3	63	—	95	—	—	137	143	56	173	—	19	—	—	—	—	1	8	
Białostockie	7	4	27	196	1	—	7	8	150	—	—	68	253	57	92	2	77	1	—	—	—	—	—	7
Bydgoskie	7	—	49	179	8	41	108	—	378	—	1	117	894	244	379	4	337	—	—	—	—	1	8	
Gdańskie	2	1	69	182	—	52	70	—	244	—	—	202	810	117	473	4	181	—	—	—	—	—	—	20
Katowickie	3	1	30	328	1	83	111	—	815	—	—	345	2125	358	1083	3	468	—	—	—	—	3	12	
Kieleckie	6	1	4	60	—	11	47	—	183	—	6	77	1496	156	371	11	204	—	—	—	—	—	5	20
Koszalińskie	—	1	12	101	3	10	5	—	116	—	9	33	704	57	75	3	110	—	—	—	—	—	1	1
Krakowskie	4	—	10	127	1	1	21	—	406	—	8	242	1145	112	247	5	1022	1	—	—	—	—	7	5
Lubelskie	7	2	21	53	—	4	49	—	274	—	3	162	622	254	223	4	207	3	—	—	—	1	3	3
Łódzkie	3	—	19	101	2	29	20	—	201	—	4	151	434	78	91	3	349	—	—	—	—	—	3	15
Olsztyńskie	3	—	24	191	1	8	24	—	245	—	—	49	487	58	115	1	226	—	—	—	2	—	—	4
Opolskie	12	—	2	98	—	6	2	—	277	—	2	100	322	74	140	5	245	—	—	—	—	—	4	4
Poznańskie	3	—	9	223	10	11	41	—	281	—	—	220	432	201	133	6	41	—	—	—	—	—	1	2
Rzeszowskie	2	1	1	96	—	—	38	—	213	1	—	93	519	153	179	11	118	—	—	—	—	—	4	4
Szczecińskie	2	—	40	51	9	7	96	—	160	—	1	131	358	128	178	7	55	—	—	—	—	—	1	5
Warszawskie	16	3	163	339	—	28	16	—	456	—	3	202	827	345	218	3	233	2	—	—	—	—	1	18
Wrocławskie	12	4	488	197	—	42	125	—	520	—	2	353	1165	160	398	4	51	—	—	—	—	—	4	12
Zielonogórskie	—	—	17	42	12	46	—	—	168	—	—	129	534	63	106	1	48	1	—	—	—	—	1	4

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964			1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	8,2	3,6	1,8	0,8	48,3	44,4	0,2	0,03	3,5	1,7	182,3	139,8	142,8	123,7	113,7	223,5
M. st. Warszawa	2,9	1,0	—	1,9	108,6	124,2	—	—	1,0	1,0	371,8	364,0	231,9	218,2	133,1	234,8
M. Kraków	18,8	9,4	—	—	58,9	25,9	—	—	23,5	4,7	449,9	558,2	327,4	169,6	136,6	162,5
M. Łódź	11,3	—	—	—	85,4	48,4	—	—	4,8	4,8	370,8	262,7	154,7	193,4	190,2	327,2
M. Poznań	2,8	—	—	—	36,0	5,5	—	—	—	—	312,9	160,6	127,4	376,6	174,4	348,9
M. Wrocław	—	2,6	—	—	15,5	2,6	—	—	2,6	—	297,4	354,4	175,9	144,8	204,3	245,7
Białostockie	9,3	7,3	4,1	4,1	70,6	28,0	—	—	—	—	147,5	70,6	155,8	59,2	49,8	155,8
Bydgoskie	7,9	4,6	—	—	77,0	32,2	0,6	—	0,6	0,6	152,0	77,0	186,9	160,6	100,0	248,8
Gdańskie	5,4	1,8	2,7	0,9	182,6	62,7	0,9	—	—	—	189,0	183,5	219,0	106,3	126,3	221,7
Katowickie	1,7	1,0	—	0,3	15,4	10,3	—	—	2,1	—	246,2	113,5	189,2	122,9	170,3	279,9
Kieleckie	6,9	3,8	—	0,6	7,5	2,5	—	—	8,2	3,8	92,3	48,3	54,6	97,9	75,3	114,9
Koszalińskie	11,4	—	—	1,6	27,8	19,6	3,3	—	4,9	14,7	116,1	53,9	330,2	93,2	127,5	189,6
Krakowskie	14,7	2,3	—	—	16,4	5,7	—	—	9,1	4,5	141,3	137,3	97,0	63,5	121,4	230,4
Lubelskie	6,3	4,4	1,3	1,3	24,6	13,2	—	—	3,1	1,9	122,3	102,1	70,0	160,2	97,1	172,8
Łódzkie	12,1	2,1	—	—	22,9	13,6	—	—	2,9	2,9	138,7	108,0	103,0	55,8	84,4	143,7
Olsztyńskie	12,8	3,8	—	—	141,2	30,8	—	—	—	—	124,5	62,9	172,0	74,4	123,2	314,5
Opolskie	19,3	14,4	1,2	—	4,8	2,4	—	—	—	2,4	102,3	120,4	119,2	89,1	158,9	333,5
Poznańskie	3,4	1,7	0,6	—	17,6	5,1	—	—	1,7	—	209,6	124,6	149,0	113,9	73,6	159,2
Rzeszowskie	11,4	1,4	25,6	0,7	10,7	0,7	—	0,7	7,1	—	67,6	56,2	108,9	108,9	79,0	151,6
Szczecińskie	2,9	2,9	—	—	82,0	58,6	—	—	4,4	1,5	234,4	191,9	115,7	187,5	93,7	234,4
Warszawskie	10,8	7,8	—	1,5	65,1	79,8	—	—	1,9	1,5	151,8	98,9	82,3	169,0	68,1	223,3
Wrocławskie	6,8	7,5	0,6	2,5	52,2	303,4	0,6	—	3,1	1,2	207,7	219,5	88,9	99,5	138,0	323,3
Zielonogórskie	13,0	—	—	—	80,7	24,5	1,4	—	4,3	—	164,4	186,0	220,6	90,8	135,5	242,2

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Czerwiec 1964 r.	Czerwiec 1963 r.	Mediana 1960—1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VI/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VI/1963	
Dur brzuszny — 040	95	214	260	673	1121	
Dury rzekome A.B.C. — 041	20	48	44	44	186	
Czerwonka 045—048	1156	1257	925	3855	5093	
Biegunki u. dzieci do lat 2 571 — 764	2798	3374	2083	9838	10718	
Botulismus — 049	48	87	56	104	171	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	417	329	195	1701	932
	inne — 049	964	644	599	2731	2996
Włośnica — 128	8	8	8	343	1066	
Zakaźne zap. wątroby — 092	5820	2961	3087	49931	23612	
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	6	9	2	19	
Błonica — 055	45	91	271	450	843	
Płonica — 050	3641	4747	4018	33881	28275	
Odra — 085	15737	12698	11450	89785	84890	
Krztusiec — 056	3222	3719	4153	15763	21007	
Zap. przyusz. nagm. — 039	5966	4405	4574	51926	39146	
Zapalenie opon mózgow.-rdzen. nagminne — 057	86	74	73	433	401	
Grypa 480 — 483	4283	7073	7333	729923	262108	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	10	17	19	53	76	
Zimnica 110—117	—	—	—	9	1	
Wścieklizna — 094	—	1	—	1	1	
Choroba Banga — 044	3	8	7	41	47	
Tęzec — 061	40	37	34	126	87	
Róża — 052	191	127	134	1241	938	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294

EE-320-7/64

5551



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Lipiec 1964

EGZ. NR 10 053

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w lipcu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 9,8 — VII/1963 do 6,1 — VII/64. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (6,1) wystąpiły w woj. Lubelskim — 15,1; Łódzkim — 10,0; Kieleckim — 10,0; Warszawskim — 9,3; Bydgoskim — 7,9 i Koszalińskim — 6,5. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania i Wrocławia.

W lipcu br. większych ognisk nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca obserwuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 3,6 — VI/1964 do 6,1 — VII/1964.

2. Dury rzekome

W lipcu br. zgłoszono z terenu całego kraju 30 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 42,0 — VII/1963 do 32,9 — VII/1964. Spadek wskaźnika w porównaniu z lipcem r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Wrocławskiego (44,8 VII/1963; 161,0 — VII/1964) i m. st. Warszawy (127,2 — VII/1963; 140,9 — VII/1964). W woj. Szczecińskim zapadalność utrzymuje się na poziomie lipca r. ub. Z terenu woj. Wrocławskiego zgłoszono 259 zachorowań, w tym 224 zachorowania z pow. Dzierżoniów, powiązane z epidemią czerwonki w m. Bielawie, która wystąpiła w maju i czerwcu br.

W lipcu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Wrocławskim — 161,0; m. st. Warszawie — 140,9; woj. Olsztyńskim — 73,2; Szczecińskim — 58,6 i Gdańskim — 57,2. W lipcu br. nie zgłoszono zachorowań z woj. Opolskiego.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik wynosił — 44,4.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Szczecińskiego, pow. Swinoujście z lipca br.

W czerwcu br. zgłoszono 1 zachorowanie.

W analogicznym okresie r. ub. miały miejsce 3 zachorowania.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W lipcu zgłoszono z terenu całej Polski 6 232 zachorowania; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 3 759 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 94,8% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z lipcem 1963 r. ze 144,3 — VII/1963 do 239,3 — VII/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się we wszystkich województwach; natomiast znaczny wzrost przedstawia następująca tabela:

Województwo	VII/1963	VII/1964
Gdańskie	134,5	314,4
Szczecińskie	105,5	260,7
Warszawskie	99,9	249,8
Wrocławskie	174,1	317,7
Koszalińskie	165,1	302,4
Bydgoskie	140,8	270,5
Zielonogórskie	183,1	307,1
Białostockie	65,4	180,7
Opolskie	198,6	305,8
Katowickie	203,6	308,7

W porównaniu z czerwcem br. notuje się niewielki wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 223,5 — VI/1964 do 239,3 — VII/1964.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W lipcu br. zgłoszono 49 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. st. Warszawy, m. Łodzi, m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Białostockiego, Bydgoskiego, Gdańskiego i Olsztyńskiego.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z lipcem r. ub. z 3,5 — VII/1963 do 1,9 — VII/1964. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Szczecińskim — 7,3; Wrocławskim — 5,0; m. Krakowie — 4,7; woj. Krakowskim — 4,5 i Zielonogórskim — 4,3.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,7.

2. Płonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem 1963 r. ze 168,5 — VII/1963 do 113,8 — VII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, woj. Rzeszowskiego i Zielonogórskiego. Najwyższe wskaźniki notuje się w m. Krakowie — 289,7; m. Warszawie — 247,5; woj. Szczecińskim — 216,8 i Wrocławskim — 206,4.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 139,8.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 181,1 — VII/1963 do 119,6 — VII/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności notuje się w m. Krakowie, woj. Zielonogórskim, Łódzkim, Koszalińskim, Olsztyńskim, Bydgoskim, Białostockim i m. Wrocławiu.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 123,7.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziecięce. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Bionica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekłość Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
	NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052
POLSKA 1963	255	96	1093	5332	42	275	995	1	3759	3	92	4389	9302	4716	2792	141	4698	13	2	—	12	45	161	
POLSKA 1964	159	30	858	3447	21	356	707	2	6232	1	49	2965	8982	3116	4053	111	1288	10	—	—	3	44	174	
M. st. Warszawa	3	5	144	131	—	10	13	—	250	—	—	253	574	238	438	21	12	—	—	—	—	—	—	13
M. Kraków	1	1	6	22	—	1	21	—	70	—	2	123	261	61	86	—	52	—	—	—	—	—	—	5
M. Łódź	3	1	26	96	—	—	12	—	187	—	—	100	287	66	127	—	101	—	—	—	—	1	—	28
M. Poznań	—	—	2	31	—	—	1	—	101	—	—	51	155	114	92	—	8	—	—	—	—	—	1	1
M. Wrocław	—	—	1	92	—	2	87	—	71	—	—	48	37	37	73	—	6	—	—	—	—	—	1	3
Białostockie	5	6	43	292	—	1	32	1	174	—	—	40	213	47	39	3	43	3	—	—	—	—	1	5
Bydgoskie	12	2	39	242	7	51	52	—	411	—	—	139	484	180	300	5	40	—	—	—	—	—	1	14
Gdańskie	6	1	63	170	1	26	80	—	346	—	—	183	432	175	354	2	40	1	—	—	—	—	—	10
Katowickie	14	—	33	340	1	60	18	—	899	—	4	273	1258	279	646	6	164	—	—	—	—	—	2	10
Kieleckie	16	—	3	103	—	8	4	—	206	—	4	44	713	148	216	10	37	—	—	—	—	—	3	3
Koszalińskie	4	—	1	143	—	16	71	—	185	—	1	46	376	63	94	6	12	—	—	—	—	—	1	4
Krakowskie	4	1	10	121	—	4	13	—	380	—	8	261	260	142	180	10	191	—	—	—	—	—	7	8
Lubelskie	24	1	21	101	—	11	23	—	280	—	3	112	533	343	140	4	44	2	—	—	—	—	5	3
Łódzkie	14	1	18	115	1	9	25	—	234	—	2	113	535	52	51	1	139	—	—	—	—	—	1	4
Olsztyńskie	1	—	57	239	1	92	19	—	214	—	—	44	295	74	111	10	48	—	—	—	—	—	—	7
Opolskie	5	—	—	119	—	—	3	—	254	—	2	77	232	71	107	11	100	—	—	—	—	—	2	3
Poznańskie	7	—	9	188	7	13	31	—	349	—	3	198	240	145	118	2	23	—	—	—	—	—	3	4
Rzeszowskie	6	1	2	185	—	—	8	—	209	—	3	82	323	201	105	10	56	—	—	—	—	—	7	6
Szczecińskie	4	1	40	92	2	11	90	—	178	1	5	148	216	117	176	5	12	—	—	—	—	—	2	10
Warszawskie	19	3	61	426	—	1	41	1	510	—	1	173	524	391	219	1	79	4	—	—	1	2	16	
Wrocławskie	9	6	259	147	—	4	56	—	511	—	8	332	732	107	263	2	50	—	—	—	—	—	1	13
Zielonogórskie	2	—	20	52	1	23	7	—	213	—	3	125	302	65	118	2	31	—	—	—	—	—	3	4

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica		
	040		041		045—048		080			055		056		092		
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964		1963	1964	1963	1964	1963	1964	
Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	040		041		045—048		080		055		050		056		092	
R o k	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	9,8	6,1	3,7	1,1	42,0	32,9	0,11	0,04	3,5	1,9	168,5	113,8	181,1	119,6	144,3	239,3
M. st. Warszawa	10,8	2,9	—	4,9	127,2	140,9	1,0	—	1,0	—	311,1	247,5	217,2	232,8	147,7	244,6
M. Kraków	4,7	2,3	7,1	2,3	58,9	14,1	—	—	16,5	4,7	228,5	289,7	471,1	143,7	127,2	164,9
M. Łódź	3,2	4,8	—	1,6	48,4	41,9	—	—	4,8	—	241,8	161,2	198,3	106,4	228,9	301,4
M. Poznań	5,5	—	—	—	113,5	5,5	—	—	—	—	276,9	141,2	149,5	315,7	213,2	279,7
M. Wrocław	7,7	—	—	—	10,3	2,6	—	—	—	—	227,6	124,1	204,3	95,7	170,7	183,6
Białostockie	4,1	5,2	10,4	6,2	78,9	44,6	—	—	3,1	—	128,8	41,5	150,6	48,8	65,4	180,7
Bydgoskie	17,8	7,9	—	1,3	59,2	25,7	—	—	—	—	162,6	91,5	224,4	118,5	140,8	270,5
Gdańskie	10,9	5,4	1,8	0,9	109,0	57,2	0,9	—	—	—	219,0	166,3	232,6	159,0	134,5	314,4
Katowickie	2,4	4,8	—	—	22,0	11,3	—	—	1,7	1,4	191,3	93,7	232,5	95,8	203,6	308,7
Kieleckie	17,6	10,0	1,2	—	3,8	1,9	—	—	8,8	2,5	70,3	27,6	59,6	92,9	123,0	129,3
Koszalińskie	11,4	6,5	1,6	—	11,4	1,6	—	—	8,2	1,6	124,2	75,2	291,0	103,0	165,1	302,4
Krakowskie	14,7	2,3	0,6	0,6	12,5	5,7	—	—	5,1	4,5	178,7	148,1	113,5	80,6	136,7	215,6
Lubelskie	13,2	15,1	1,9	0,6	25,2	13,2	0,6	—	—	1,9	102,1	70,6	93,9	216,3	131,2	176,6
Łódzkie	17,2	10,0	1,4	0,7	25,7	12,9	—	—	2,9	1,4	115,9	80,8	190,2	37,2	115,1	167,3
Olsztyńskie	10,3	1,3	—	—	93,7	73,2	—	—	—	—	143,8	56,5	224,6	95,0	196,4	274,7
Opolskie	12,0	6,0	2,4	—	3,6	—	—	—	1,2	2,4	121,6	92,7	118,0	85,5	198,6	305,8
Poznańskie	5,7	4,0	—	—	13,6	5,1	—	—	0,6	1,7	221,0	112,2	167,1	82,1	109,9	197,7
Rzeszowskie	7,8	4,3	44,1	0,7	10,7	1,4	—	—	5,0	2,1	52,6	58,3	143,0	143,0	106,0	148,7
Szczecińskie	2,9	5,8	1,5	1,5	58,6	58,6	—	1,5	4,4	7,3	224,1	216,8	149,4	171,4	105,5	260,7
Warszawskie	12,2	9,3	2,4	1,5	53,9	29,9	—	—	1,9	0,5	163,1	84,7	121,5	191,5	99,9	249,8
Wrocławskie	4,3	5,6	1,2	3,7	44,8	161,0	—	—	13,7	5,0	233,8	206,4	199,6	66,5	174,1	317,7
Zielonogórskie	8,6	2,9	—	—	93,7	28,8	—	—	4,3	4,3	145,6	180,2	419,6	93,7	183,1	307,1

*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Lipiec 1964	Lipiec 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VII/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VII/1963	
Dur brzuszny -- 040	159	255	249	832	1376	
Dury rzekome A. B. C. —041	30	96	69	74	282	
Czerwonka 045 — 048	858	1093	940	4713	6186	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	3447	5332	3610	13285	16050	
Botulismus -- 049	21	42	32	125	213	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	356	275	309	2057	1207
	inne — 049	707	995	635	3438	3991
Włośnica — 128	2	1	28	345	1067	
Zakaźne zap. wątroby — 092	6232	3759	3560	56163	27371	
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	3	10	3	22	
Błonica — 055	49	92	248	409	935	
Płonica — 050	2965	4389	3170	26246	32664	
Odra — 085	8982	9302	8286	98767	94192	
Krzusiec — 056	3116	4716	4906	18879	25723	
Zap. przyusz. nagm. — 089	4053	2792	2801	55979	41938	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	111	141	86	544	542	
Grypa 480 — 483	1288	4698	4591	731211	266806	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	10	13	14	63	89	
Zimnica 110 — 117	—	2	1	9	3	
Wścieklizna — 094	—	—	—	1	1	
Choroba Banga — 044	3	12	5	44	59	
Tężec — 061	44	45	43	170	132	
Róża — 052	174	161	143	1415	1099	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294

№ 6139 data 25. III. 1966

Dot. Epidemiologii

Podpis Dyrektora

M. Kuryłko

INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Sierpień 1964

EGZ. NR 000224



DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Sytuacja epidemiologiczna w sierpniu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z sierpniem r. ub. z 12,1—VIII/1963 do 6,3—VIII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem nieznacznego wzrostu w m. Łodzi i woj. Szczecińskim. W m. Poznaniu i woj. Wrocławskim zapadalność utrzymuje się na poziomie sierpnia 1963 r. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (6,3) obserwuje się w m. Łodzi — 12,9; woj. Gdańskim — 11,8; Szczecińskim — 11,7; Warszawskim — 11,3; Lubelskim — 10,7; Bydgoskim — 8,5; Rzeszowskim — 7,1; Kieleckim — 6,9 i Łódzkim — 6,4.

W sierpniu br. nie zgłoszono zachorowań z m. Krakowa, m. Wrocławia i woj. Zielonogórskiego.

W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 6,1.

2. Dury rzekome

W sierpniu br. z terenu całej Polski zgłoszono 25 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 52,3 — VIII/1963 do 21,4—VIII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem 1963 r. notuje się we wszystkich województwach. W sierpniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 104,7; woj. Gdańskim — 57,2; Olsztyńskim — 56,5; m. Krakowie — 47,1 i woj. Bydgoskim — 39,5; natomiast najniższe wskaźniki w woj. Rzeszowskim — 0,7; Opolskim — 1,2; Kieleckim — 2,5 i m. Wrocławiu — 2,6.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 32,9—VII/1964 do 21,4—VIII/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W sierpniu zgłoszono 5 zachorowań; w tym:

woj. Koszalińskie, m. Słupsk z sierpnia	— 1 zach.
woj. Katowickie, m. Częstochowa z czerwca	— 1 zach.
woj. Katowickie, pow. Lubliniec z maja	— 1 zach.
woj. Białostockie, pow. Wysokie Mazowieckie z marca	— 1 zach.
woj. Gdańskie, m. Gdańsk z marca	— 1 zach.

W lipcu br. zgłoszono 1 zachorowanie.

W sierpniu 1963 r. miało miejsce 1 zachorowanie.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W sierpniu br. zgłoszono z terenu całej Polski 7 782 zachorowania; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 5 125 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 92,5% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 1963 r. ze 196,8—VIII/1963 do 298,8—VIII/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem r. ub. notuje się we wszystkich wo-

jewództwach z wyjątkiem Kieleckiego; natomiast znaczny wzrost ilustruje następująca tabela:

województwo	VIII/1963	VIII/1964
Wrocławskie	203,9	422,2
Warszawskie	135,7	312,0
Gdańskie	194,4	352,5
Olsztyńskie	222,1	378,7
Zielonogórskie	249,5	386,4
m. Łódź	285,3	425,6

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Łodzi — 425,6; woj. Wrocławskim — 422,2; Opolskim — 397,3; Zielonogórskim — 386,4; Olsztyńskim — 378,7; Gdańskim — 352,5; Katowickim — 346,8; Bydgoskim — 321,8 i Warszawskim — 312,0.

W stosunku do lipca br. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Koszalińskiego.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 239,3.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

W sierpniu br. zgłoszono 55 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. st. Warszawy, m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Białostockiego, Gdańskiego, Olsztyńskiego, Opolskiego i Zielonogórskiego. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. Krakowie — 9,4; woj. Rzeszowskim — 7,1 i Wrocławskim — 5,6.

W porównaniu z lipcem br. notuje się nieznaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 1,9—VII/1964 do 2,1—VIII/1964.

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 148,2—VIII/1963 do 94,6—VIII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Opolskiego i Zielonogórskiego. W sierpniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w m. Krakowie — 249,7; m. Łodzi — 191,8; m. st. Warszawie — 182,0 i woj. Wrocławskim — 157,9.

W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 113,8.

3. Krztusiec

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. ze 165,1—VIII/1963 do 98,6—VIII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do sierpnia 1963 r. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, woj. Gdańskiego, Kieleckiego i Lubelskiego. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się w m. Krakowie, woj. Białostockim, Koszalińskim i Zielonogórskim.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 119,6.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przusz. nagminne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózg.- rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048 571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110 117	094	044	061	052	
POLSKA	1963	316	52	1362	6190	27	255	921	—	5125	1	76	3860	3116	4301	1449	152	4178	9	5	—	4	50	163
	1964	164	25	557	3697	17	474	943	—	7782	5	55	2464	3410	2567	2514	94	991	11	—	—	8	41	187
M. st. Warszawa	5	1	107	134	—	20	37	—	310	—	—	186	118	161	323	17	5	—	—	—	—	—	—	22
M. Kraków	—	—	20	41	—	—	10	—	117	—	4	106	53	90	69	—	31	—	—	—	—	1	3	
M. Łódź	8	12	13	88	—	—	35	—	264	—	2	119	86	73	49	—	83	—	—	—	—	—	20	
M. Poznań	1	—	3	36	4	13	—	—	106	—	—	34	48	58	48	—	4	—	—	—	—	—	3	
M. Wrocław	—	—	1	100	—	4	31	—	112	—	—	45	27	19	29	—	14	—	—	—	1	1	9	
Białostockie	4	3	25	297	—	6	11	—	202	1	—	48	113	47	28	3	19	2	—	—	—	—	5	
Bydgoskie	13	1	60	270	5	10	77	—	489	—	4	97	191	138	153	4	62	—	—	—	—	—	14	
Gdańskie	13	—	63	148	1	37	350	—	388	1	—	161	263	224	452	—	47	1	—	—	—	1	10	
Katowickie	7	—	36	466	—	52	30	—	1010	2	1	240	529	242	307	6	152	—	—	—	—	—	10	
Kieleckie	11	—	4	137	—	7	18	—	276	—	4	69	245	144	107	10	45	—	—	—	—	3	6	
Koszalińskie	3	—	4	178	—	224	23	—	168	1	2	45	130	47	56	1	24	—	—	—	—	1	4	
Krakowskie	10	—	6	179	—	—	121	—	494	—	6	203	110	130	101	5	117	—	—	—	—	5	8	
Lubelskie	17	3	21	85	—	18	26	—	427	—	5	82	169	260	67	7	16	2	—	—	—	3	6	
Łódzkie	9	1	11	99	—	2	19	—	286	—	2	118	232	63	34	3	70	2	—	—	—	5	10	
Olsztyńskie	3	—	44	202	—	22	56	—	295	—	—	30	161	77	49	9	40	1	—	—	2	2	10	
Opolskie	5	—	1	148	1	—	2	—	330	—	—	110	75	67	75	6	108	—	—	—	—	4	7	
Poznańskie	9	—	11	207	5	8	6	—	419	—	1	145	81	110	47	1	18	—	—	—	1	2	8	
Rzeszowskie	10	1	1	184	—	—	12	—	288	—	10	95	156	195	82	12	38	1	—	—	—	7	1	
Szczecińskie	8	—	19	55	1	8	23	—	207	—	2	89	93	77	82	1	13	—	—	—	1	—	12	
Warszawskie	23	2	48	376	—	9	17	—	637	—	3	95	150	187	152	—	29	1	—	—	—	3	5	
Wrocławskie	5	1	48	202	—	18	35	—	679	—	9	254	284	117	152	9	32	—	—	—	1	3	9	
Zielonogórskie	—	—	11	65	—	16	4	—	268	—	—	93	96	41	52	—	24	1	—	—	2	—	5	

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomylitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
Rok	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	12,1	6,3	2,0	1,0	52,3	21,4	0,04	0,19
M. st. Warszawa	8,8	4,9	1,0	1,0	220,1	104,7	—	—
M. Kraków	2,3	—	—	—	80,0	47,1	—	—
M. Łódź	11,3	12,9	1,6	19,3	56,4	20,9	—	—
M. Poznań	2,8	2,8	—	—	254,7	8,3	—	—
M. Wrocław	2,6	—	—	—	23,3	2,6	—	—
Białostockie	16,6	4,1	5,2	3,1	91,4	26,0	—	1,0
Bydgoskie	17,1	8,5	1,3	0,6	69,8	39,5	—	—
Gdańskie	12,7	11,8	—	—	81,8	57,2	—	0,9
Katowickie	9,9	2,4	—	—	33,6	12,4	—	0,7
Kieleckie	25,1	6,9	1,2	—	5,6	2,5	—	—
Koszalińskie	6,5	4,9	—	—	45,8	6,5	—	1,6
Krakowskie	13,0	5,7	—	—	9,6	3,4	—	—
Lubelskie	20,2	10,7	11,3	1,9	25,2	13,2	—	—
Łódzkie	14,3	6,4	2,1	0,7	26,5	7,9	—	—
Olsztyńskie	15,4	3,8	—	—	111,7	56,5	—	—
Opolskie	7,2	6,0	—	—	10,8	1,2	—	—
Poznańskie	8,5	5,1	0,6	—	33,4	6,2	—	—
Rzeszowskie	9,2	7,1	8,5	0,7	5,0	0,7	—	—
Szczecińskie	7,3	11,7	1,5	—	43,9	27,8	—	—
Warszawskie	15,7	11,3	1,5	1,0	51,9	23,6	0,5	—
Wrocławskie	3,1	3,1	1,9	0,6	49,7	29,8	—	—
Zielonogórskie	7,2	—	—	—	109,6	15,9	—	—

* Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAZNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
2,9	2,1	148,2	94,6	165,1	98,6	196,8	298,8
—	—	266,1	182,0	192,7	157,5	249,5	303,3
9,4	9,4	353,3	249,7	602,9	212,0	221,4	275,6
1,6	3,2	272,4	191,8	175,7	117,7	285,3	425,6
5,5	—	207,7	94,1	63,7	160,6	180,0	293,5
7,7	—	183,6	116,4	129,3	49,1	248,3	289,7
2,1	—	113,2	49,8	174,5	48,8	112,2	209,8
1,3	2,6	125,0	63,8	200,1	90,8	192,8	321,8
—	—	179,0	146,3	183,5	203,5	194,4	352,5
1,3	0,3	182,7	82,4	234,9	83,1	261,7	346,8
4,4	2,5	57,1	43,3	57,1	90,4	227,2	173,2
8,2	3,3	148,8	73,6	255,0	76,8	204,3	274,6
3,4	3,4	169,6	115,2	131,6	73,8	185,5	280,3
0,6	3,1	64,3	51,7	123,6	163,9	169,6	278,3
0,7	1,4	98,7	84,4	90,8	45,0	123,0	204,5
—	—	109,1	38,6	222,1	98,8	222,1	378,7
2,4	—	120,4	132,4	133,6	80,7	276,9	397,3
0,6	0,6	171,1	82,1	126,9	62,3	145,0	237,4
2,1	7,1	76,1	67,6	156,5	138,8	172,2	212,0
4,4	2,9	202,1	130,4	162,6	112,8	186,0	303,2
2,4	1,5	122,9	46,5	111,7	91,6	135,7	312,0
13,7	5,6	189,0	157,9	144,9	72,7	203,9	422,2
2,9	—	125,4	134,1	297,0	59,1	249,5	386,4

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	sierpień 1964 r.	sierpień 1963 r.	Mediana 1960—1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-VIII/1963	
Dur brzuszny — 040	164	316	303	996	1692	
Dury rzekome A.B.C. — 041	25	52	47	99	334	
Czerwonka 045—048	557	1362	913	5270	7548	
Biegunki u dzieci do lat 2 571, 764	3697	6190	4358	16 982	22 240	
Botulismus — 049	17	27	28	142	240	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	474	255	182	2531	1462
	inne — 049	943	921	755	4381	4912
Włośnica — 128	—	—	16	345	1067	
Zakaźne zap. wątroby — 092	7782	5125	4408	63 945	32 496	
Porażenie dziec. nagm. — 080	5	1	4	8	23	
Błonica — 055	55	76	228	554	1011	
Płonica — 050	2464	3860	2795	39 310	36 524	
Odra — 085	3410	3116	3448	102 177	97 308	
Krzusiec — 056	2567	4301	5286	21.392	30 024	
Zap. przyusz. nagm. — 089	2514	1449	1776	58 493	43 387	
Zapalenie opon mózgo-rodzen. nagminne — 057	94	152	108	638	694	
Grypa 480 — 483	991	4178	5548	732 202	270 984	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	11	9	18	74	98	
Zimnica 110—117	—	5	1	9	8	
Wścieklizna — 094	—	—	—	1	1	
Choroba Banga — 044	8	4	4	52	63	
Tężec — 061	41	50	51	211	182	
Róża — 052	187	163	154	1602	1262	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny
CDW Cieszyn 2378/64 260 egz. B-020.

Uwaga:

W biuletynach za maj, czerwiec i lipiec 1964 należy wnieść poprawki w tabeli na str. 8 w wierszu krztusiec „Zestawienie kumulacyjne 1964” winno być: maj — 12.487, czerwiec — 15.709, lipiec — 18.825.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294

6797
Epidemiologia



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Wrzesień 1964

EGZ. NR 206

Sytuacja epidemiologiczna we wrześniu 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 14,5 — IX/1963 do 7,7 — IX/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach w stosunku do tego samego okresu 1963 r. W m. Wrocławiu wskaźnik zapadalności utrzymuje się na poziomie września r. ub. Z terenu m. Poznania nie zgłoszono zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Wrocławiu — 12,9; woj. Gdańskim — 10,9; Warszawskim — 10,8; Wrocławskim — 10,6; Szczecińskim — 10,2 i Lubelskim — 10,1.

We wrześniu większych ognisk nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 6,3 — VIII/1964 do 7,7 — IX/1964.

2. Dury rzekome

We wrześniu zgłoszono z terenu całego kraju 20 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 46,3 — IX/1963 do 23,6 — IX/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Wrocławskiego; natomiast znaczny spadek wystąpił w:

m. st. Warszawie	343,4 — IX/1963;	87,1 — IX/1964
Olsztyńskim	124,5 — IX/1963;	56,5 — IX/1964
Szczecińskim	99,6 — IX/1963;	30,8 — IX/1964
Białostockim	62,3 — IX/1963;	14,5 — IX/1964
m. Poznaniu	72,0 — IX/1963;	16,6 — IX/1964

We wrześniu najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. st. Warszawie — 87,1; woj. Wrocławskim — 85,8; Olsztyńskim — 56,5; Gdańskim — 49,1 i Zielonogórskim — 43,3.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik wynosił — 21,4.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Zielonogórskiego, pow. Sulechów z czerwca br.

We wrześniu r. ub. miały miejsce 4 zachorowania.

W poprzedzającym miesiącu zgłoszono 5 zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

We wrześniu zgłoszono z terenu całej Polski 13 004 zachorowania; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 8 325 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 77,4% chorych.

W bieżącym miesiącu notuje się jeden z najwyższych wskaźników (miesięcznych) dotychczas notowanych — 499,3. Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 319,7 — IX/1963 do

499,3 — IX/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu w wrześniem r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Kieleckiego. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. ilustruje następująca tabela:

województwo	IX/1963	IX/1964
m. st. Warszawa	463,8	856,1
Warszawskie	251,3	581,4
Wrocławskie	338,2	643,6
Gdańskie	313,5	579,7
Szczecińskie	260,7	496,6
Katowickie	405,5	623,6
Koszalińskie	206,0	407,1

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 856,1; woj. Wrocławskim — 643,6; m. Wrocławiu — 633,7; m. Krakowie — 631,2; woj. Katowickim — 623,6 i m. Łodzi — 610,9; natomiast najniższe wskaźniki w woj. Białostockim — 259,6 i Kieleckim — 264,3.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 298,8.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

We wrześniu zgłoszono 48 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. st. Warszawy, m. Łodzi, m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Białostockiego, Bydgoskiego, Gdańskiego, Łódzkiego, Olsztyńskiego i Poznańskiego.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 4,2 — IX/1963 do 1,8 — IX/1964. W bieżącym miesiącu najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 11,8; woj. Koszalińskim — 6,5, Szczecińskim — 5,8 i Rzeszowskim — 4,3.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 2,1 — VIII/1964 do 1,8 — IX/1964.

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 264,9 — IX/1963 do 153,8 — IX/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Koszalińskiego. We wrześniu najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Krakowie — 504,0; m. Wrocławiu — 403,5; m. Łodzi — 328,8 m. Warszawie — 288,6; woj. Szczecińskim — 238,8 i Wrocławskim — 228,2.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 94,6.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 142,5 — IX/1963 do 90,2 — IX/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania, woj. Krakowskiego, Lubelskiego, Rzeszowskiego i Warszawskiego. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw; natomiast najwyższe w m. Krakowie — 202,5; m. st. Warszawie — 178,1; woj. Lubelskim — 145,0; m. Poznaniu — 144,0 i Szczecińskim — 143,5.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik wynosił — 98,6.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
						Salmonellozy	Inne																	
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571-764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-102	110-117	094	044	061	052	
POLSKA	1963	377	31	1207	4388	14	663	681	14	8325	4	109	6898	2258	3710	2018	101	5165	19	2	—	2	40	184
	1964	200	20	616	3123	19	225	762	13	13004	1	48	4006	3000	2350	2936	84	1871	17	—	—	5	44	219
M. st. Warszawa	4	2	89	63	—	32	10	1	875	—	—	295	90	182	335	11	7	—	—	—	—	—	1	19
M. Kraków	3	—	11	12	—	—	17	—	268	—	5	214	29	86	92	—	68	—	—	—	—	—	—	1
M. Łódź	6	—	16	89	—	2	22	4	379	—	—	204	46	45	52	—	265	—	—	—	—	—	1	22
M. Poznań	—	—	6	16	—	5	2	—	172	—	—	54	23	52	36	—	11	—	—	—	—	—	1	3
M. Wrocław	5	—	1	63	—	1	67	—	245	—	—	156	23	40	59	—	11	—	—	—	—	—	—	8
Białostockie	9	5	14	254	—	—	27	1	250	—	—	77	76	71	26	9	27	—	—	—	—	—	3	4
Bydgoskie	15	—	33	162	9	10	14	—	813	—	—	208	214	84	239	1	105	—	—	—	—	—	3	10
Gdańskie	12	2	54	221	—	31	153	—	638	—	—	207	148	131	289	—	45	2	—	—	—	—	—	19
Katowickie	17	2	42	413	5	46	6	—	1816	—	2	450	349	240	358	5	239	—	—	—	—	—	1	16
Kieleckie	12	—	1	102	—	8	18	4	421	—	4	97	107	90	122	7	98	1	—	—	—	—	1	4
Koszalińskie	2	—	11	172	—	4	4	1	249	—	4	96	72	54	65	3	28	—	—	—	—	—	—	2
Krakowskie	10	—	7	141	—	—	49	—	777	—	3	270	166	219	122	7	131	1	—	—	—	—	4	7
Lubelskie	16	4	19	119	—	21	9	—	574	—	3	162	137	230	138	4	53	3	—	—	—	—	3	12
Łódzkie	11	—	16	116	—	3	7	1	552	—	—	148	311	43	91	2	244	—	—	—	—	—	2	5
Olsztyńskie	3	—	44	155	—	2	65	—	358	—	—	70	265	57	55	6	44	—	—	—	—	—	—	8
Opolskie	5	1	1	69	—	2	—	—	456	—	2	132	92	94	63	6	102	—	—	—	—	1	3	4
Poznańskie	10	—	10	143	2	7	20	—	769	—	—	222	85	61	146	2	111	1	—	—	—	—	3	10
Rzeszowskie	9	3	3	173	—	—	3	—	512	—	6	125	118	162	101	7	43	3	—	—	—	—	6	6
Szczecińskie	7	—	21	147	3	22	35	—	339	—	4	163	41	98	105	3	25	—	—	—	—	—	—	9
Warszawskie	22	1	49	282	—	4	42	1	1187	—	7	184	117	180	185	—	59	4	—	—	—	—	4	19
Wrocławskie	17	—	138	178	—	12	152	—	1035	—	6	367	343	75	178	9	95	2	—	—	—	2	6	22
Zielonogórskie	5	—	30	33	—	13	40	—	319	1	2	105	148	56	79	2	60	—	—	—	—	2	2	9

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce naqminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	14,5	7,7	1,2	0,8	46,3	23,6	0,15	0,04
M. st. Warszawa	16,6	3,9	—	1,9	343,4	87,1	—	—
M. Kraków	11,6	7,1	2,3	—	54,2	25,9	—	—
M. Łódź	25,6	9,7	1,6	—	29,0	25,8	—	—
M. Poznań	13,8	—	—	—	72,0	16,6	—	—
M. Wrocław	12,9	12,9	2,6	—	20,7	2,6	—	—
Białostockie	22,8	9,3	8,3	5,2	62,3	14,5	2,1	—
Bydgoskie	22,4	9,9	0,6	—	25,7	21,7	—	—
Gdańskie	14,5	10,9	—	1,8	85,4	49,1	0,9	—
Katowickie	7,5	5,8	—	0,7	30,6	14,4	—	—
Kieleckie	15,1	7,5	—	—	3,8	0,6	—	—
Koszalińskie	11,7	3,3	—	—	26,1	18,0	—	—
Krakowskie	7,9	5,7	—	—	8,5	4,0	—	—
Lubelskie	15,1	10,1	3,8	—	23,3	12,0	—	—
Łódzkie	15,7	7,9	3,6	—	17,9	11,4	—	—
Olsztyńskie	14,1	3,8	—	—	124,5	56,5	—	—
Opolskie	10,8	6,0	—	1,2	7,2	1,2	—	—
Poznańskie	10,8	5,7	0,6	—	12,5	5,7	—	—
Rzeszowskie	9,2	6,4	2,1	2,1	4,3	2,1	—	—
Szczecińskie	14,6	10,2	—	—	99,6	30,8	—	—
Warszawskie	23,0	10,8	1,9	0,5	38,2	24,0	—	—
Wrocławskie	16,8	10,6	—	—	41,0	85,8	—	—
Zielonogórskie	8,6	7,2	—	—	82,2	43,3	1,4	1,4

*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)


Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
4,2	1,8	264,9	153,8	142,5	90,2	319,7	499,3
—	—	584,1	288,6	204,5	178,1	463,8	856,1
18,8	11,8	836,1	504,0	348,6	202,5	527,6	631,2
1,6	—	833,4	328,8	137,0	72,5	472,3	610,9
2,8	—	445,8	149,5	108,0	144,0	360,0	476,3
7,7	—	556,1	403,5	162,9	103,5	470,8	633,7
3,1	—	137,1	80,0	146,4	73,7	152,7	259,6
—	—	225,1	136,9	163,2	55,3	285,6	535,1
0,9	—	315,3	188,1	129,9	119,0	313,5	579,7
1,7	0,7	352,7	154,5	159,0	82,4	405,5	623,6
6,3	2,5	104,8	60,9	74,1	56,5	381,0	264,3
—	6,5	132,4	156,9	197,8	88,3	206,0	407,1
9,6	1,7	187,2	153,2	92,5	124,3	268,4	440,9
3,1	1,9	121,7	102,1	111,6	145,0	301,4	362,0
5,7	—	207,4	105,8	89,4	30,7	240,3	394,8
—	—	169,4	89,8	209,2	73,1	360,7	459,5
1,2	2,4	170,9	158,9	185,4	113,2	363,6	549,0
1,1	—	231,7	125,8	120,1	34,6	245,3	435,7
4,3	4,3	153,0	88,9	98,2	115,3	274,0	364,3
8,8	5,8	285,6	238,8	150,9	143,5	260,7	496,6
2,4	3,4	232,6	90,1	77,4	88,2	251,3	581,4
14,9	3,7	259,3	228,2	201,5	46,6	338,2	643,6
4,3	2,9	229,3	151,4	310,0	80,7	373,5	460,0

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Wrzesień 1964	Wrzesień 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IX/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-IX/1963
Dur brzuszny -- 040	200	377	343	1 196	2 069
Dury rzekome A. B. C. —041	20	31	33	119	3 65
Czerwonka 045 — 048	616	1207	1026	5 886	8 755
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	3123	4388	3798	20 105	26 628
Botulismus — 049	19	14	13	161	254
Zatrucia pokarmowe { Salmonellozy 042	225	663	157	2 756	2 125
	inne — 049	762	681	5 143	5 593
Włośnica — 128	13	14	9	358	1 081
Zakaźne zap. wątroby — 092	13004	8325	5191	76 949	40 821
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	4	5	9	27
Błonica — 055	48	109	237	602	1 120
Płonica — 050	4006	6898	3560	43 316	43 422
Odra — 085	3000	2258	2539	105 177	99 566
Krzusiec — 056	2350	3710	4122	23 742	33 734
Zap. przyusz. nagm. — 089	2936	2018	1993	61 429	45 405
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	84	101	90	722	795
Grypa 480 — 483	1871	5168	7368	734 073	276 152
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	17	19	18	91	117
Zimnica 110 — 117	—	2	2	9	10
Wścieklizna — 094	—	—	—	1	1
Choroba Banga — 044	5	2	2	57	65
Tężec — 061	44	40	40	255	222
Róża — 052	219	184	173	1 821	1 446

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Październik 1964

EGZ. NR 000046

Do użytku służbowego

Sytuacja epidemiologiczna w październiku 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 11,7 — X/1963 do 5,2 — X/1964. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do października r. ub. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Lubelskiego i Szczecińskiego. W m. Krakowie zapadalność utrzymuje się na poziomie analogicznego okresu 1963 r. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Białostockim — 16,6; Lubelskim — 11,3; Szczecińskim — 8,8; Warszawskim — 8,8 i Poznańskim — 7,9. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, woj. Koszalińskiego i Olsztyńskiego.

W październiku br. ognisk epidemicznych nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 7,7 — IX/1964 do 5,2 — X/1964.

2. Dury rzekome

W październiku zgłoszono 12 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 37,4 — X/1963 do 25,6 — X/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności notuje się w m. st. Warszawie (239,7 — X/1963; 118,4 — X/1964), woj. Białostockim (93,5 — X/1963; 35,3 — X/1964), Gdańskim (88,1 — X/1963; 39,1 — X/1964) i Szczecińskim (70,3 — X/1963; 32,2 — X/1964).

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Olsztyńskim — 152,7; m. st. Warszawie — 118,4 i Zielonogórskim — 49,0. Nie zgłoszono zachorowań z terenu woj. Rzeszowskiego. W październiku br. najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Krakowskim, Opolskim, Kieleckim, Poznańskim, m. Wrocławiu i m. Krakowie.

We wrześniu br. krajowy wskaźnik wynosił — 23,6.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W październiku br. zgłoszono 1 zachorowanie z terenu woj. Katowickiego, pow. Wodzisław Śląski z września br.

W analogicznym okresie r. ub. miało miejsce 1 zachorowanie.

W poprzedzającym miesiącu zgłoszono 1 zachorowanie.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 15 353 zachorowania w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 11 282 zachorowania. W październiku br. hospitalizowano 75,6% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 433,2 — X/1963 do 589,5 — X/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, woj. Kieleckiego, Lubelskiego i Olsztyńskiego.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu 1963 r. ilustruje następująca tabela:

województwo	X/1963	X/1964
m. st. Warszawa	609,5	1 133,0
Warszawskie	372,2	711,2
Katowickie	481,8	803,9
Opolskie	462,3	725,9
Poznańskie	267,4	523,0
m. Poznań	390,4	645,2

Wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw, natomiast najwyższe w m. st. Warszawie — 1 133,0; woj. Katowickim — 803,9; Opolskim — 725,9; Warszawskim — 711,2; Wrocławskim — 693,3 i Gdańskim — 651,5.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 499,3

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z październikiem 1963 r. z 6,3 — X/1963 do 1,3 — X/1964. W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 35 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z terenu 10 województw. W październiku br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 11,8; woj. Lubelskim — 5,2; Kieleckim — 3,8; m. Łodzi — 3,2 i woj. Wrocławskim — 3,1.

W stosunku do września br. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 1,8 — IX/1964 do 1,3 — X/1964.

2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 517,8 — X/1963 do 259,2 — X/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach w stosunku do tego samego okresu 1963 r.

We wrześniu br. krajowy wskaźnik wynosił — 153,8.

3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. ze 139,8 — X/1963 do 74,6 — X/1964. Spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. st. Warszawy i woj. Szczecińskiego. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w m. st. Warszawie — 201,5; m. Krakowie — 124,8; m. Poznaniu — 116,3; m. Wrocławiu — 100,9; woj. Szczecińskim — 180,2 i Lubelskim — 100,9.

We wrześniu br. krajowy wskaźnik wynosił — 90,2.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dru brzuszy Typhus abdominalis	Dru rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. naqm. Polomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Pionica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przusz. naqmne Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózq.- rdzeń. naqm. Meningitis epidemica	Grypa influenza	Dru wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
						Salmonellozy	Inne																	040
POLSKA	1963	306	24	973	2802	22	215	467	24	11282	1	164	13485	5188	3642	4539	65	9249	16	1	—	4	35	293
	1964	136	12	667	2299	9	249	503	19	15353	1	35	6751	6468	1944	7330	70	5148	12	1	—	2	31	228
M. st. Warszawa	6	—	121	70	—	19	59	2	1158	—	—	571	211	206	867	9	27	—	1	—	—	—	6	
M. Kraków	2	—	3	9	—	—	35	—	244	—	5	397	25	53	115	—	85	—	—	—	—	—	6	
M. Łódź	1	—	21	79	—	2	14	—	392	—	2	352	79	35	90	—	526	1	—	—	—	—	13	
M. Poznań	—	—	6	22	—	—	—	—	233	—	—	135	18	42	113	—	102	—	—	—	—	—	4	
M. Wrocław	1	—	2	22	—	1	70	—	250	—	—	301	36	39	192	—	36	—	—	—	—	—	9	
Białostockie	16	3	34	160	—	—	29	3	430	—	—	101	194	52	116	9	63	4	—	—	—	2	3	
Bydgoskie	7	—	37	112	1	8	25	—	924	—	—	372	313	71	415	—	524	—	—	—	—	2	10	
Gdańskie	7	2	43	154	2	18	50	—	717	—	—	326	300	91	621	2	173	—	—	—	1	1	18	
Katowickie	5	—	49	351	2	56	21	1	2341	1	2	726	879	203	903	6	954	—	—	—	—	1	10	
Kieleckie	9	—	4	77	—	1	1	—	474	—	6	196	260	101	342	2	210	2	—	—	—	4	11	
Koszalińskie	—	1	13	113	—	44	6	13	323	—	—	104	94	32	452	2	115	—	—	—	—	2	3	
Krakowskie	8	—	3	50	3	—	10	—	867	—	3	364	640	88	349	9	206	1	—	—	—	5	15	
Lubelskie	18	1	16	102	—	35	75	—	675	—	4	353	257	160	416	2	143	—	—	—	—	2	17	
Łódzkie	7	1	22	75	—	—	11	—	593	—	1	324	805	56	101	—	535	—	—	—	—	—	22	
Olsztyńskie	—	—	119	147	—	4	15	—	384	—	1	119	380	55	203	4	127	1	—	—	—	—	7	
Opolskie	5	1	2	100	—	—	1	—	603	—	—	209	115	68	148	5	269	—	—	—	—	2	5	
Poznańskie	14	1	7	87	1	5	—	—	923	—	—	349	120	52	183	4	287	—	—	—	—	2	10	
Rzeszowskie	1	—	—	61	—	—	11	—	567	—	4	186	272	126	248	8	105	—	—	—	—	6	4	
Szczecińskie	6	—	22	85	—	38	39	—	329	—	—	184	62	123	357	2	94	1	—	—	—	—	22	
Warszawskie	18	2	66	216	—	2	9	—	1452	—	1	394	325	142	575	1	154	1	—	—	—	1	17	
Wrocławskie	3	—	43	177	—	4	19	—	1115	—	5	550	774	80	336	4	251	1	—	—	1	1	10	
Zielonogórskie	2	—	34	30	—	12	3	—	359	—	1	138	309	69	188	1	162	—	—	—	—	—	6	

*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dyr brzuszny Typhus abdom.		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dzie- cięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
NrNr wg klasyfikacji międzynarodowej								
Rok	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	11,7	5,2	0,9	0,5	37,4	25,6	0,04	0,04
M. st. Warszawa	16,6	5,9	1,0	—	239,7	118,4	—	—
M. Kraków	4,7	4,7	—	—	47,1	7,1	—	—
M. Łódź	19,3	1,6	—	—	24,2	33,8	—	—
M. Poznań	8,3	—	—	—	24,9	16,6	—	—
M. Wrocław	5,2	2,6	2,6	—	10,3	5,2	—	—
Białostockie	30,1	16,6	7,3	3,1	93,5	35,3	—	—
Bydgoskie	12,5	4,6	—	—	31,6	24,3	—	—
Gdańskie	13,6	6,4	2,7	1,8	88,1	39,1	—	—
Katowickie	7,9	1,7	—	—	19,6	16,8	—	0,3
Kieleckie	17,6	5,6	—	—	1,2	2,5	—	—
Koszalińskie	6,5	—	1,6	1,6	18,0	21,2	—	—
Krakowskie	9,6	4,5	0,6	—	6,2	1,7	—	—
Lubelskie	10,1	11,3	1,9	0,6	26,5	10,1	—	—
Łódzkie	11,4	5,0	—	0,7	18,6	15,7	—	—
Olsztyńskie	16,7	—	—	—	121,9	152,7	—	—
Opolskie	10,8	6,0	—	1,2	14,4	2,4	—	—
Poznańskie	8,5	7,9	—	0,6	7,4	4,0	—	—
Rzeszowskie	3,5	0,7	1,4	—	2,1	—	0,7	—
Szczecińskie	4,4	8,8	—	—	70,3	32,2	—	—
Warszawskie	19,1	8,8	1,0	1,0	23,5	32,3	—	—
Wrocławskie	8,7	1,9	1,2	—	27,3	26,7	—	—
Zielonogórskie	7,2	2,9	1,4	—	47,6	49,0	—	—

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
6,3	1,3	517,8	259,2	139,8	74,6	433,2	589,5
—	—	1501,8	558,7	194,7	201,5	609,5	1133,0
23,5	11,8	1559,2	935,0	426,3	124,8	635,9	574,7
9,7	3,2	1636,2	567,4	164,4	56,4	630,3	631,9
—	—	1149,2	373,8	202,1	116,3	390,4	645,2
12,9	—	851,0	778,6	219,9	100,9	501,8	646,6
—	—	233,7	104,9	90,3	54,0	303,3	446,2
0,6	—	410,0	244,8	179,0	46,7	358,7	608,2
—	—	615,1	296,2	102,7	82,7	401,6	651,5
3,1	0,7	565,6	249,3	142,8	69,7	481,8	803,9
13,2	3,8	213,4	123,0	113,0	63,4	600,1	297,5
4,9	—	184,7	170,0	150,4	52,3	369,5	528,0
5,7	1,7	436,9	206,5	78,9	49,9	443,1	491,9
6,3	5,2	303,9	222,6	112,2	100,9	428,8	425,6
5,7	0,7	371,9	231,7	69,4	40,0	324,7	424,1
—	1,3	238,7	152,7	209,2	70,6	501,9	492,9
9,6	—	345,5	151,6	197,4	81,9	462,3	725,9
—	—	407,9	197,7	113,3	29,5	267,4	523,0
7,8	2,8	350,8	132,3	113,1	89,7	400,6	403,5
33,7	—	597,6	269,5	156,7	180,2	334,0	481,9
7,8	0,5	525,5	193,0	96,5	69,5	372,2	711,2
11,2	3,1	445,8	342,0	151,7	49,7	458,3	693,3
7,2	1,4	357,6	199,0	279,7	99,5	503,2	517,7

*) Zapadalność miesięczna na 100.000 ludności w stosunku rocznym

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	październik 1964 r.	październik 1963 r.	Mediana 1960—1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-X/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I-X/1963
Dur brzuszny — 040	136	306	293	1 332	2 375
Dury rzekome A.B.C. — 041	12	24	27	131	389
Czerwonka 045—048	667	973	947	6 553	9 728
Biegunki u dzieci do lat 2 571, 764	2 299	2 802	2 710	22 404	29 430
Botulismus — 049	9	22	17	170	276
Zatrucia { Salmonellozy 042 pokarmowe { inne — 049	249	215	96	3 005	2 340
	503	467	456	5 646	6 060
Włośnica — 128	19	24	21	377	1 105
Zakaźne zap. wątroby — 092	15 353	11 282	6 373	92 302	52 103
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	1	2	10	28
Błonica — 055	35	164	310	637	1 284
Płonica — 050	6 751	13 485	5 699	50 067	56 907
Odra — 085	6 468	5 188	5 377	111 645	104 754
Krzusiec — 056	1 944	3 642	4 292	25 686	37 376
Zap. przyusz. nagm. — 089	7 330	4 539	4 335	68 759	49 944
Zapalenie opon mózq.-rdzen. nagminne — 057	70	65	87	792	860
Grypa 480 — 483	5 148	9 249	13 682	739 221	285 401
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	12	16	16	103	133
Zimnica 110—117	1	1	1	10	11
Wścieklizna — 094	—	—	—	1	1
Choroba Banga — 044	2	4	2	59	69
Tężec — 061	31	35	35	286	257
Róża — 052	228	293	206	2 049	1 739


Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
 Departament Sanitarno-Epidemiologiczny
 CDW Cieszyn 2378/64 260 egz. B-020.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294

INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

LISTOPAD 1964

EGZ. NR 070102



Sytuacja epidemiologiczna w listopadzie 1964 r.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 8,2 — XI/1963 do 4,7 — XI/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się w województwach:

Koszalińskim	— 24,5 — XI/1963;	4,9 — XI/1964
Olsztyńskim	— 24,4 — XI/1963;	5,1 — XI/1964
Łódzkim	— 13,6 — XI/1963;	2,9 — XI/1964
Szczecińskim	— 11,7 — XI/1963;	1,5 — XI/1964

Wyższe wskaźniki od krajowego (4,7) notuje się na terenie 12 województw; natomiast najwyższe w m. Poznaniu — 13,8; m. st. Warszawie — 9,9; woj. Kieleckim — 8,2; Warszawskim — 7,3; Opolskim — 7,2 i Zielonogórkim — 7,2.

W miesiącu sprawozdawczym ognisk epidemicznych nie notowano. W październiku br. krajowy wskaźnik wynosił — 5,2.

2. Dury rzekome

W listopadzie zgłoszono z terenu całego kraju 6 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 1963 r. z 21,6 — XI/1963 do 27,9 — XI/1964. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności notuje się w woj. Poznańskim (5,1 — XI/1963; 75,3 — XI/1964) i Katowickim (15,4 — XI/1963; 62,5 — XI/1964). Z terenu woj. Poznańskiego zgłoszono 133 zachorowania, w tym pow. Krotoszyn 126 zachorowań; a z terenu woj. Katowickiego zgłoszono 182 zachorowania, w tym pow. Gliwice 132 zachorowania.

W listopadzie br. wyższe wskaźniki od krajowego wystąpiły w m. st. Warszawie — 92,4; woj. Poznańskim — 75,3; Olsztyńskim — 70,6; Katowickim — 67,5 i Zielonogórkim — 28,8. Najniższe wskaźniki notuje się w woj. Rzeszowskim — 0,7; Kieleckim — 1,9; Opolskim — 2,4; Krakowskim — 3,4 i Koszalińskim — 4,9.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 25,6 — X/1964 do 27,9 — XI/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W poprzedzającym miesiącu zgłoszono 1 zachorowanie.

W listopadzie 1963 r. miało miejsce 1 zachorowanie.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W listopadzie br. zgłoszono 16 194 zachorowania; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 12 316 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 72,1% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w stosunku do tego samego okresu r. ub. z 472,9 — XI/1963 do 621,8 — XI/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności

obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, woj. Kieleckiego i Olsztyńskiego. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności ilustruje następująca tabela:

województwo:	XI/1963	XI/1964
Poznańskie	279,3	611,9
Opolskie	577,9	895,7
Warszawskie	443,7	747,4
Katowickie	576,9	876,3
m. st. Warszawa	478,4	733,8
Wrocławskie	574,8	761,1
Bydgoskie	386,4	606,9

W listopadzie br. najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Kieleckim — 354,6; m. Poznaniu — 420,9; woj. Lubelskim — 437,6; Rzeszowskim — 451,9; m. Krakowie — 473,4 i woj. Łódzkim — 492,8.

W październiku br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 589,5.

II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 5,4 — XI/1963 do 2,3 — XI/1964. W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 61 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z m. Poznania, m. Wrocławia, woj. Bydgoskiego, Opolskiego i Poznańskiego. W listopadzie br. wyższe wskaźniki od krajowego (2,3) wystąpiły w m. Krakowie — 14,1; woj. Lubelskim — 7,6; Wrocławskim — 6,8; Koszalińskim — 4,9; m. Łodzi — 3,2; woj. Zielonogórskim — 2,9 i Kieleckim — 2,5.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca obserwuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 1,3 — X/1964 do 2,3 — XI/1964.

2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z listopadem 1963 r. z 472,2 — XI/1963 do 268,8 — XI/1964. Spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności notuje się w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Łodzi, m. Poznaniu, woj. Gdańskim, Katowickim i Warszawskim. W listopadzie br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 956,2; m. Wrocławiu — 799,2; m. st. Warszawie — 713,2; m. Łodzi — 641,6; woj. Gdańskim — 360,7; Wrocławskim — 360,6 i Szczecińskim — 326,6.

W październiku br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 259,2.

3. Krztusiec

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. ze 163,7 — XI/1963 do 82,7 — XI/1964. Spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności notuje się w m. Krakowie, m. Łodzi, m. Wrocławiu, woj. Koszalińskim, Łódzkim, Olsztyńskim, Poznańskim i Wrocławskim. Najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Szczecińskim — 193,3; m. st. Warszawie — 177,1; m. Poznaniu — 141,2; woj. Zielonogórskim — 119,7; Lubelskim — 119,2; Opolskim — 105,9 i m. Krakowie — 101,3.

W październiku br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 74,6.

ZACHOROWANIA NA (CHOROBY ZAKAŻNE*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045-048	571, 764	049	Salmonellozy	Inne	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-192	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1963	16	563	1501	14	153	353	24	12316	1	142	12296	9841	4264	7272	67	5736	8	1	1	3	26	265
	1964	6	726	1634	15	182	200	52	16194	—	61	6999	9183	2155	11475	65	8966	10	1	—	2	14	207
M. st. Warszawa	10	1	95	47	—	10	2	—	750	—	2	729	248	181	1532	9	43	—	—	—	—	—	10
M. Kraków	2	—	6	5	—	—	3	—	201	—	6	406	48	43	258	1	167	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	4	—	6	87	—	1	17	—	457	—	2	398	294	33	158	—	678	—	—	—	—	—	16
M. Poznań	5	—	8	4	1	4	1	—	152	—	—	107	12	51	138	—	189	—	1	—	—	—	3
M. Wrocław	2	—	2	37	1	—	31	—	266	—	—	309	72	37	249	—	100	—	—	—	1	—	6
Białostockie	2	3	15	106	—	—	4	—	536	—	1	122	345	64	203	2	104	3	—	—	—	—	1
Bydgoskie	10	—	25	59	3	14	13	—	922	—	—	362	514	124	778	1	724	—	—	—	—	1	17
Gdańskie	2	—	27	87	6	17	10	3	637	—	1	397	321	83	923	2	558	—	—	—	—	—	18
Katowickie	5	—	182	249	—	49	29	—	2552	—	5	696	1556	230	1475	9	1373	—	—	—	—	—	19
Kieleckie	13	—	3	65	—	—	—	—	565	—	4	242	273	109	545	1	369	1	—	—	—	1	4
Koszalińskie	3	—	3	81	—	5	2	—	332	—	3	106	123	46	434	2	134	—	—	—	—	1	5
Krakowskie	2	—	6	48	—	—	5	—	995	—	2	375	895	120	515	8	322	—	—	—	—	4	4
Lubelskie	8	1	34	36	—	24	15	—	694	—	12	354	338	189	470	4	359	—	—	—	—	1	9
Łódzkie	4	—	17	69	1	—	4	6	689	—	2	285	1028	73	300	1	826	1	—	—	—	2	11
Olsztyńskie	4	—	55	138	—	—	8	—	474	—	1	117	390	49	282	3	332	—	—	—	—	—	12
Opolskie	6	—	2	85	—	—	4	—	744	—	—	198	190	88	162	5	548	1	—	—	—	1	3
Poznańskie	8	—	133	34	2	—	—	—	1080	—	—	280	307	57	356	2	568	—	—	—	—	—	18
Rzeszowskie	6	1	1	69	—	—	—	—	635	—	3	195	327	118	541	10	330	—	—	—	—	2	7
Szczecińskie	1	—	18	28	1	3	29	43	357	—	1	223	33	132	368	3	86	—	—	—	—	—	13
Warszawskie	15	—	44	161	—	19	4	—	1526	—	3	330	567	176	897	—	288	4	—	—	—	—	11
Wrocławskie	6	—	24	91	—	3	19	—	1224	—	11	580	1005	69	545	2	605	—	—	—	—	1	13
Zielonogórskie	5	—	20	48	—	33	—	—	406	—	2	188	297	83	346	—	263	—	—	—	—	—	5

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Polioomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	8,2	4,7	0,6	0,2	21,6	27,9	0,04	—
M. st. Warszawa	10,8	9,9	2,9	1,0	98,8	92,4	—	—
M. Kraków	—	4,7	—	—	25,9	14,1	—	—
M. Łódź	6,4	6,4	—	—	30,6	9,7	—	—
M. Poznań	—	13,8	—	—	24,9	22,1	—	—
M. Wrocław	2,6	5,2	2,6	—	5,2	5,2	—	—
Białostockie	10,4	2,1	—	3,1	33,2	15,6	—	—
Bydgoskie	10,5	6,6	0,6	—	30,9	16,4	—	—
Gdańskie	7,3	1,8	—	—	48,1	24,5	—	—
Katowickie	4,1	1,7	0,3	—	15,4	62,5	—	—
Kieleckie	13,2	8,2	—	—	1,2	1,9	—	—
Kozalińskie	24,5	4,9	1,6	—	13,1	4,9	—	—
Krakowskie	5,1	1,1	0,6	—	7,9	3,4	—	—
Lubelskie	5,0	5,0	0,6	0,6	15,8	21,4	—	—
Łódzkie	13,6	2,9	—	—	10,0	12,1	—	—
Olsztyńskie	24,4	5,1	1,3	—	51,3	70,6	—	—
Opolskie	6,0	7,2	1,2	—	6,0	2,4	—	—
Poznańskie	5,1	4,5	—	—	5,1	75,3	—	—
Rzeszowskie	5,0	4,3	1,4	0,7	—	0,7	0,7	—
Szczecińskie	11,7	1,5	—	—	41,0	26,4	—	—
Warszawskie	11,3	7,3	0,5	—	18,1	21,5	—	—
Wrocławskie	5,0	3,7	1,2	—	21,1	14,9	—	—
Zielonogórskie	1,4	7,2	—	—	40,4	28,8	—	—

* Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemic	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
5,4	2,3	472,2	268,8	163,7	82,7	472,9	621,8
—	1,9	1663,3	713,2	218,2	177,1	478,4	733,8
25,9	14,1	1507,4	956,2	572,3	101,3	598,2	473,4
4,8	3,2	1300,9	641,6	153,1	53,2	556,1	736,7
—	—	1140,9	296,3	144,0	141,2	312,9	420,9
—	—	874,3	799,2	294,9	95,7	605,3	688,0
2,1	1,0	193,2	126,7	112,2	66,5	417,5	556,7
—	—	353,4	238,3	159,3	81,6	386,4	606,9
4,5	0,9	632,4	360,7	153,5	75,4	456,1	578,8
1,4	1,7	540,8	239,0	169,6	79,0	576,9	876,3
9,4	2,5	154,4	151,9	77,8	68,4	583,8	354,6
6,5	4,9	207,6	173,3	227,2	75,2	475,7	542,7
4,5	1,1	381,9	212,8	116,3	68,1	441,4	564,6
8,8	7,6	273,7	223,2	148,8	119,2	401,7	437,6
2,9	1,4	334,0	203,8	133,7	52,2	399,1	492,8
—	1,3	210,5	150,2	196,4	62,9	688,0	608,4
7,2	—	332,3	238,4	214,3	105,9	577,9	395,7
1,1	—	286,7	158,6	143,9	32,3	279,3	611,9
4,3	2,1	262,6	138,8	113,8	84,0	426,2	451,9
23,4	1,5	479,0	326,6	312,0	193,3	392,6	522,9
11,3	1,5	432,0	161,6	121,5	86,2	443,7	747,4
9,3	6,8	414,1	360,6	162,9	42,9	524,8	761,1
5,8	2,9	386,4	271,1	237,9	119,7	562,4	585,4

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Listopad 1964	Listopad 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawienie kumula- cyjne I—XI. 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—XI. 1963
Dur brzuszny — 040	123	214	268	1 455	2 589
Dury rzekome A. B. C. — 041	6	16	19	137	405
Czerwonka 045 — 048	726	563	651	7 279	10 291
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 634	1 501	1 811	24 038	30 931
Botulismus — 049	15	14	12	185	290
Zatrucia pokarmowe {					
	200	353	319	5 846	6 413
Włośnica — 128	52	24	17	429	1 129
Zakaźne zap. wątroby — 092	16 194	12 316	7 634	108 496	64 419
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	1	3	10	29
Błonica — 055	61	142	325	698	1 426
Płonica — 050	6 999	12 296	6 330	57 066	69 203
Odra — 085	9 183	9 841	9 712	120 823	114 595
Krzusiec — 056	2 155	4 264	5 028	27 841	41 640
Zap. przyusz. nagm. — 089	11 475	7 272	7 100	80 234	57 216
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	65	67	66	857	927
Grypa 480 — 483	8 966	5 736	19 829	748 187	291 137
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	10	8	12	113	141
Zimnica 110 — 117	1	1	—	11	12
Wścieklizna — 094	—	1	—	1	2
Choroba Banga — 044	2	3	5	61	72
Tężec — 061	14	26	30	300	283
Róża — 052	207	265	184	2 256	2 004

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

Grudzień 1964

EGZ. NR 000063

Do użytku służbowego

Sytuacja epidemiologiczna w grudniu 1964.

I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 7,0—XII/1963 do 4,6—XII/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się w m. st. Warszawie, woj. Warszawskim i Olsztyńskim. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Białostockim — 13,5; Warszawskim — 9,3; Olsztyńskim — 7,7; Kieleckim — 6,9 i Katowickim — 6,2; natomiast najniższe w woj. Rzeszowskim — 0,7; Poznańskim — 1,1 i Koszalińskim — 1,6. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, m. Wrocławia i woj. Szczecińskiego.

W grudniu br. ognisk epidemicznych nie notowano.

W listopadzie br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 4,7.

2. Dury rzekome

W grudniu zgłoszono z terenu całego kraju 8 zachorowań sporadycznych.

3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem 1963 r. z 19,3—XII/1963 do 16,0—XII/1964. W grudniu br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się w m. st. Warszawie — 86,1; woj. Olsztyńskim — 51,3; Zielonogórskim — 41,8; Gdańskim — 39,1; m. Poznaniu — 16,6 i woj. Warszawskim — 16,2; natomiast najniższe wskaźniki w woj. Krakowskim — 1,1; Kieleckim — 1,9 i Poznańskim — 2,8. Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia, woj. Rzeszowskiego i Szczecińskiego.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem krajowy wskaźnik obniżył się z 27,9—XI/1964 do 16,0—XII/1964.

4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W tym samym okresie 1963 r. nie zanotowano zachorowań.

W listopadzie br. nie zgłoszono zachorowań.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

W grudniu br. zgłoszono z terenu całej Polski 15 334 zachorowania; w tym samym okresie r. ub. zgłoszono 11 525 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 73,2% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 1963 r. z 442,6—XII/1963 do 588,8—XII/1964. Wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do grudnia r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, m. Łodzi, woj. Kieleckiego, Olsztyńskiego i Zielonogórskiego. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności przedstawia następująca tabela:

województwo:	XII/1963	XII/1964
Opolskie	487,6	986,0
Warszawskie	385,0	703,3
Katowickie	527,8	827,2
Koszalińskie	379,3	670,3
Poznańskie	241,9	513,3
m. st. Warszawa	386,5	628,1
Szczecińskie	331,0	533,2

W grudniu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Opolskim — 986,0; Katowickim — 827,2; Warszawskim — 703,3; Wrocławskim — 701,4; Koszalińskim — 670,3; Olsztyńskim — 670,0; Gdańskim — 667,8 i m. st. Warszawie — 628,1. Najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Kieleckim — 340,8 i m. Krakowie — 343,9.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 621,8 — XI/1964 do 588,8 — XII/1964.

Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

1. Błonica

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 5,9 — XII/1963 do 1,9 — XII/1964. W grudniu br. wyższe wskaźniki od krajowego wystąpiły w m. Krakowie — 16,5; woj. Wrocławskim — 6,2; Koszalińskim — 3,3; Szczecińskim — 2,9; m. Wrocławiu — 2,6; woj. Kieleckim — 2,5 i Łódzkim — 2,1. W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z m. Poznania, woj. Gdańskiego, Opolskiego i Zielonogórskiego.

W stosunku do listopada br. notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 2,3 — XI/1964 do 1,9 — XII/1964.

2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z grudniem 1963 r. z 379,5 — XII/1963 do 257,6 — XII/1964. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Kieleckiego, Koszalińskiego, Lubelskiego i Wrocławskiego. Wyższe wskaźniki od krajowego (257,6) obserwuje się w m. st. Warszawie — 890,3; m. Krakowie — 805,5; m. Wrocławiu — 729,4; m. Łodzi — 594,8; woj. Gdańskim — 371,6; Wrocławskim — 359,4; m. Poznaniu — 340,6 i woj. Szczecińskim — 316,4.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 268,8.

3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem 1963 r. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 120,3 — XII/1963 do 64,5 — XII/1964. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do grudnia r. ub. notuje się w m. Krakowie, m. Wrocławiu, woj. Katowickim, Krakowskim, Poznańskim, Olsztyńskim, Szczecińskim, Wrocławskim i Zielonogórskim. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. st. Warszawie — 164,1; m. Poznaniu — 141,2; woj. Szczecińskim — 120,1 i Lubelskim — 107,2. Najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Poznańskim — 26,6; Wrocławskim — 32,3; Krakowskim — 34,6 i m. Wrocławiu — 36,2.

W listopadzie br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 82,7.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Salmonellozy	Inne	Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Bągla Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045-048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480- 483	100- 102	110- 117	094	044	061	052
POLSKA	1963 182	10	504	1085	5	170	638	32	11 525	—	153	9 882	9 897	3 132	7 084	48	8 592	13	3	1	4	26	225
	1964 120	8	416	1239	10	201	417	30	15 334	—	51	6 708	10 942	1 679	13 884	60	9 991	10	—	—	6	18	165
M. st. Warszawa	4	1	88	29	—	1	8	—	642	—	2	910	299	168	2 394	13	57	—	—	—	—	1	15
M. Kraków	1	—	5	—	—	—	6	—	146	—	7	342	44	31	316	—	157	—	—	—	—	1	3
M. Łódź	3	—	3	56	—	—	20	1	326	—	1	369	751	35	279	—	642	—	—	—	—	—	18
M. Poznań	—	—	6	16	—	—	—	—	167	—	—	123	14	51	215	—	147	1	—	—	—	—	4
M. Wrocław	—	1	—	38	1	1	9	—	229	—	1	282	129	14	297	—	65	1	—	—	—	1	4
Białostockie	13	—	7	63	—	—	11	5	572	—	1	123	445	59	179	3	69	2	—	—	—	—	4
Bydgoskie	7	—	18	66	1	5	14	—	841	—	2	311	910	109	1 167	3	574	—	—	—	—	1	11
Gdańskie	3	—	43	92	4	19	94	—	735	—	—	409	401	90	1 375	2	420	2	—	—	1	—	16
Katowickie	18	1	46	186	2	67	84	—	2 409	—	4	662	1 731	162	1 647	3	2 611	—	—	—	—	—	12
Kieleckie	11	—	3	26	—	1	23	—	543	—	4	236	276	86	529	7	600	—	—	—	—	—	7
Koszalińskie	1	—	6	134	—	9	—	—	410	—	2	100	169	50	256	6	102	—	—	—	1	—	3
Krakowskie	8	—	2	22	—	—	13	—	853	—	2	282	925	61	616	3	443	—	—	—	—	5	3
Lubelskie	7	1	19	32	—	40	8	—	670	—	3	328	414	170	675	3	274	—	—	—	—	2	6
Łódzkie	4	1	13	41	—	2	7	12	655	—	3	255	879	58	204	—	926	—	—	—	—	—	4
Olsztyńskie	6	1	40	68	—	—	18	—	522	—	—	133	353	37	344	3	214	—	—	—	—	—	5
Opolskie	4	—	4	34	1	—	2	—	819	—	—	160	255	78	201	3	543	—	—	—	—	—	8
Poznańskie	2	—	5	53	1	1	12	—	906	—	1	213	308	47	329	—	549	—	—	—	—	—	5
Rzeszowskie	1	—	—	23	—	—	—	—	626	—	2	165	413	85	542	2	370	—	—	—	—	6	2
Szczecińskie	—	1	26	34	—	10	20	—	364	—	2	216	36	82	365	1	112	—	—	—	1	—	9
Warszawskie	19	1	33	100	—	10	5	12	1 436	—	3	373	849	124	1 038	2	263	1	—	—	—	1	11
Wrocławskie	6	—	20	82	—	1	29	—	1 128	—	10	578	1 020	52	636	3	608	3	—	—	2	—	13
Zielonogórskie	2	—	29	44	—	34	34	—	335	—	—	138	321	30	280	3	245	—	—	—	1	—	2

* Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA

NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
NUMERY KLASYFIK. MIĘDZYNARODOWEJ	040		041		045—048		080	
R o k	1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
POLSKA	7,0	4,6	0,4	0,3	19,3	16,0	—	—
M. st. Warszawa	11,7	3,9	1,0	1,0	88,0	86,1	—	—
M. Kraków	2,3	2,3	—	—	9,4	11,8	—	—
M. Łódź	4,8	4,8	—	—	19,3	4,8	—	—
M. Poznań	—	—	—	—	16,6	16,6	—	—
M. Wrocław	10,3	—	—	2,6	—	—	—	—
Białostockie	10,4	13,5	2,1	—	35,3	7,3	—	—
Bydgoskie	12,5	4,6	—	—	31,6	11,8	—	—
Gdańskie	7,3	2,7	0,9	—	59,0	39,1	—	—
Katowickie	3,1	6,2	—	0,3	9,9	15,8	—	—
Kieleckie	3,8	6,9	—	—	1,2	1,9	—	—
Koszalińskie	6,5	1,6	—	—	8,2	9,8	—	—
Krakowskie	2,8	4,5	—	—	5,7	1,1	—	—
Lubelskie	5,0	4,4	—	0,6	15,8	12,0	—	—
Łódzkie	5,7	2,9	—	0,7	4,3	9,3	—	—
Olsztyńskie	18,0	7,7	—	1,3	39,8	51,3	—	—
Opolskie	7,2	4,8	—	—	1,2	4,8	—	—
Poznańskie	5,1	1,1	—	—	5,1	2,8	—	—
Rzeszowskie	5,0	0,7	1,4	—	0,7	—	—	—
Szczecińskie	4,4	—	—	1,5	54,2	—	—	—
Warszawskie	16,6	9,3	1,5	0,5	18,1	16,2	—	—
Wrocławskie	6,8	3,7	0,6	—	18,0	12,4	—	—
Zielonogórskie	1,4	2,9	—	—	33,2	41,8	—	—

* Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemiczna	
055		050		056		092	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
5,9	1,9	379,5	257,6	120,3	64,5	442,6	588,8
2,9	1,9	1687,7	890,3	201,5	164,4	386,5	628,1
16,5	16,5	1300,1	805,5	501,7	73,0	501,7	343,9
3,2	1,6	1052,6	594,8	117,7	56,4	548,1	525,5
5,5	—	686,7	340,6	113,5	141,2	337,8	462,4
—	2,6	763,0	729,4	194,0	36,2	486,3	592,3
4,1	1,0	167,2	127,7	62,3	61,3	425,8	594,1
2,0	1,3	284,3	204,7	112,5	71,7	379,1	553,5
14,5	—	593,3	371,6	89,0	81,8	528,8	667,8
2,7	1,4	377,0	227,3	156,6	55,6	527,8	827,2
21,3	2,5	138,7	148,1	51,5	54,0	580,0	340,8
1,6	3,3	156,9	163,5	129,1	81,7	379,3	670,3
3,4	1,1	305,8	160,0	118,6	34,6	363,1	484,0
3,8	1,9	194,2	206,8	82,6	107,2	365,1	422,5
2,1	2,1	224,6	182,4	54,3	41,5	347,6	468,4
6,4	1,3	191,2	170,7	110,4	47,5	672,6	670,0
6,0	—	242,0	192,6	119,2	93,9	487,6	986,0
0,6	0,6	219,8	120,7	111,6	26,6	241,9	513,3
4,3	1,4	182,2	117,4	86,6	60,5	380,7	445,5
22,0	2,9	416,6	316,4	260,7	120,1	331,0	533,2
3,4	1,5	275,3	182,7	90,1	60,7	385,0	703,3
11,8	6,2	321,1	359,4	121,9	32,3	642,3	701,4
—	—	336,0	199,0	144,2	43,3	526,3	483,1

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Grudzień 1964	Grudzień 1963	Mediana 1960— 1963	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—XII/1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—XII/1963
Dur brzuszny — 040	120	182	195	1 575	2 771
Dury rzekome A. B. C. — 041	8	10	19	145	415
Czerwonka 045 — 048	416	504	570	7 695	10 795
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 239	1 085	1 368	25 277	32 016
Botulismus — 049	10	5	6	195	295
Zatrucia { Salmonelloza 042 pokarmowe { inne — 049	201	170	74	3 388	2 663
	417	638	562	6 263	7 051
Włośnica — 128	30	32	41	459	1 161
Zakaźne zap. wątroby — 092	15 334	11 525	6 368	123 830	75 944
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	—	2	11	29
Błonica — 055	51	153	261	749	1 579
Płonica — 050	6 708	9 882	5 753	63 774	79 085
Odra — 085	10 942	9 897	11 879	131 770	124 492
Krztusiec — 056	1 679	3 132	3 922	29 520	44 772
Záp. przyusz. nagm. — 089	13 884	7 084	7 058	94 118	64 300
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	60	48	56	917	975
Grypa 480 — 483	9 991	8 592	32 395	758 178	299 729
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	10	13	16	123	154
Zimnica 110 — 117	—	3	1	11	15
Wścieklizna — 094	—	1	—	1	3
Choroba Banga — 044	6	4	5	67	76
Tężec — 061	18	26	20	318	309
Róża — 052	165	225	160	2 421	2 229