

POLSKA RZECZYPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

ROK 1965

86

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

# SYTUACJA EPIDEMICZNA POLSKI W ROKU 1965

## CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ POKARMOWĄ

### 1. Dur brzuszny

W roku 1965 notuje się najniższą liczbę zachorowań z dotychczas notowanych w Polsce.

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1963	2.771	9,0
1964	1.565	5,0
1965	1.040	3,3

W roku 1965 — 10 i więcej przypadków duru brzuszego zgłoszono z następujących powiatów:

1) m. st. Warszawa,	dzielnica Śródmieście	— 12
	dz. Praga Południe	— 10
2) m. Łódź,	dz. Bałuty	— 10
3) woj. Kieleckie,	pow. Kielce	— 14
	pow. Busko	— 11
4) woj. Koszalińskie,	pow. Słupsk	— 10
5) woj. Lubelskie,	pow. Biłgoraj	— 11
6) woj. Poznańskie	pow. Koło	— 15
	pow. Konin	— 10
7) woj. Rzeszowskie,	pow. Rzeszów	— 13
	pow. Sanok	— 11
	pow. Krosno	— 10
8) woj. Szczecińskie,	pow. i m. Szczecin	— 12
9) woj. Warszawskie,	pow. Płońsk	— 14
	pow. Płock	— 11
	pow. Mińsk Mazowiecki	— 11
	pow. Mława	— 10

W roku 1965 notowano kilka ognisk, głównie o charakterze ognisk rodzinnych:

#### woj. Bydgoskie:

pow. Inowrocław, gromada Pakość — 4 zachorowania. Źródłem zakażenia była nosicielka duru brzuszego, zatrudniona jako kucharka na weselu,  
pow. Tuchola — 5 zachorowań. Nie ustalono źródła zakażenia dla pierwszego przypadku, od którego zakażyła się pozostała liczba chorych z rodziny;

#### woj. Lubelskie:

miasto Biłgoraj — w okresie luty — kwiecień zanotowano 4 zach. W otoczeniu tych chorych wykryto nosiciela o typie fagowym ELA; w okresie lipiec — sierpień zanotowano 3 zachorowania w jednej rodzinie. W obu powyższych ogniskach stwierdzono zgodny typ fagowy z wykrytym nosicielem;

pow. Biłgoraj, wieś Stanisławów — w październiku zanotowano 3 zach. Przypadki były powiązane epidemicznie z ogniskiem w m. Biłgoraju,

pow. Hrubieszów, wieś Strzyżów — w styczniu zanotowano 4 zachorowania w jednej rodzinie. W otoczeniu tych chorych wykryto 2 nosicielki;

**woj. Rzeszowskie:**

pow. Rzeszów, wieś Dylągówka 9 zach. Źródłem zakażenia była woda zakażona ściekami;

miasto Sanok — 11 zachorowań. Źródła zakażenia nie ustalono.

**Zachorowania na dur brzuszny w Polsce wg grup wieku w odsetkach**

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25—64	65 i więcej	Ra- zem
1964	5,4	13,5	20,8	13,1	10,7	35,1	1,4	100%
1965	8,1	14,6	13,6	13,7	12,3	35,4	2,3	100%

**Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności w miastach i w gromadach**

Podział	1964				1965			
	liczba zachorowań	liczba zgonów	zapa- dal- ność na 100000	umie- ral- ność na 100000	liczba zachorowań	liczba zgonów*)	zapa- dal- ność na 100000	umie- ral- ność na 100000
Miasta i osiedla	765	6	5,0	0,04	541	8	3,5	0,05
Gromady (wsie)	800	23	5,1	0,14	499	17	3,1	0,11
Polska	1.565	29	5,0	0,09	1.040	25	3,3	0,08

W roku 1965 w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań — 51% stanowiły kobiety; 49% mężczyźni.

**W roku 1965 zaszczepiono przeciwko durowi brzuszemu:**

Rodzaj stosowanej szczepionki	I wstrzyknięcie		II wstrzyknięcie		III wstrzyknięcie	
	liczba zaszczepionych	% <sup>1)</sup>	liczba zaszczepionych	% <sup>2)</sup>	liczba zaszczepionych	% <sup>3)</sup>
formolowo-fenolowa	848.795	84,6	705.876	83,2	1.268.652	73,0
formolowo-fenolowa z tężcem	3.087.034	76,9	2.412.578	78,1	4.696.972	95,1
R a z e m	3.935.829	78,4	3.118.454	79,2	5.965.624	89,3

- 1) odsetek zaszczepionych w stosunku do liczby osób podlegających,
- 2) odsetek zaszczepionych w stosunku do liczby osób, które otrzymały I wstrzyknięcie,
- 3) odsetek zaszczepionych w stosunku do liczby osób, które otrzymały II wstrzyknięcie w roku 1964.

Na dzień 31. XII. 1965 r. zarejestrowanych było 4,623 stałych nosicieli *S. typhi*. Z 2837 typowanych nosicieli w roku 1965 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
E 1a	616	21,7
F 1	418	14,7
A	275	9,7
D 1	210	7,4
C 1	142	5,0
E 1b	109	3,8
F 4	47	1,6
D 4	41	1,4
Szczepy zdegradowane	346	12,2
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	222	7,8

W roku 1965 u 753 zbadanych chorych na dur brzuszny (tj. 72,4% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
E 1a	161	21,4
A	91	12,1
F 1	89	11,8
E 1b	64	8,5
D 1	48	6,4
C 1	36	4,8
F 4	28	3,7
Szczepy zdegradowane	57	7,6
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	38	5,0

## 2. Dury rzekome

### Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1963	415	1,3
1964	136	0,4
1965	133	0,4

Z terenu 4 województw tj. Białostockiego (24), Wrocławskiego (19), Łódzkiego (14) i Rzeszowskiego (12) zgłoszono łącznie 69 zachorowań tj. 51,9% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań.

W roku 1965, w woj. Łódzkim, pow. Pajęczno zanotowano jedno ognisko duru rzekomego — 7 osób. Przyczyną zakażenia były najprawdopodobniej lody.

Na dzień 31. XII. 1965 r. zarejestrowanych było 377 stałych nosicieli S. paratyphi B. Z 343 typowanych nosicieli w roku 1965 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
Taunton	98	28,6
1	85	24,8
3 a I	42	12,2
BAOR	41	11,9
Dundee	10	2,9
Beccles	10	2,9
Szczyepy zdegradowane	10	2,9
Szczyepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	27	7,9

W roku 1965 u 87 badanych chorych na dury rzekome (tj. 65,4% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
1	33	37,9
Taunton	27	31,0
BAOR	12	13,8
3 a I	4	4,6
Szczyepy zdegradowane	3	3,4
Szczyepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	6	6,9

## Salmonella enteritidis

W roku 1965 zanotowano ogniska Salmonella enteritidis Gartneri (dane te zebrano na podstawie sprawozdań opisowych WSSE/MSSE i skróconych wywiadów epidemiologicznych w meldunkach o zachorowaniach na choroby zakaźne):

m. st. Warszawa — 17 ognisk — 248 zachorowań na oddziałach dziecięcych;  
m. Łódź — 4 ogniska — 200 zachorowań; 2 ogniska w szpitalach dziecięcych (im. Konopnickiej i Korczaka), jedno w szpitalu zakaźnym (im. Wł. Biegańskiego) i jedno ognisko w sanatorium p/gruźliczym w Łagiewnikach;

m. Wrocław — 1 ognisko — 74 zachorowania;

woj. Białostockie — 3 ogniska — 167 zachorowań;

woj. Olsztyńskie — 5 ognisk — 267 zachorowań na oddziałach dziecięcych;

woj. Lubelskie — 6 ognisk — 308 zachorowań; oddziały szpitala w Łukowie: noworodkowy, dziecięcy, zakaźny; w Biłgoraju 2 ogniska na oddziałach dziecięcych, w Radzyniu Podl., Włodawie i Zamościu na oddziałach dziecięcych;

woj. Warszawskie — 15 ognisk — 781 zachorowań (63 zgony) z tego; 12 ognisk na oddziałach dziecięcych, 2 ogniska — Państwowy Dom Dziecka 1, ognisko — żłobek,

oraz w województwach: m. Poznaniu (49 zach.), Bydgoskim (156 zach.), Gdańskim (83 zach.), Katowickim (481 zach.), Kieleckim (114 zach.), Łódzkim (87 zach.), Opolskim (21 zach.), Poznańskim (90 zach.), Szczecińskim (172 zach.), Wrocławskim (194 zach.) i Zielonogórskim (152 zach.).

### 3. Czerwonka

#### Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1963	10.795	35,2
1964	8.463	27,1
1965	7.154	22,7

Do województw o najwyższej zapadalności w roku 1965 należy zaliczyć: m. st. Warszawę — 76,3; woj. Olsztyńskie — 71,2; Zielonogórskie — 56,3; Gdańskie — 49,9; Koszalińskie — 37,8 i Szczecińskie — 36,1.

W roku 1965, na terenie kraju zanotowano kilkanaście ognisk czerwonki. Ogniska te dotyczyły przede wszystkim:

1. zakładów dziecięcych (żłobek, przedszkole, dom małego dziecka) w województwach: m. st. Warszawie, m. Krakowie, Warszawskim, Białostockim, Koszalińskim, Katowickim;

2. szpitali dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w województwach: m. Krakowie, Gdańskim i Warszawskim;

3. ośrodków młodzieżowych np.: Internat Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej w woj. Koszalińskim, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego w Białymstoku.

Procentowy udział zachorowań w grupach wieku

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25—64	65 i więcej	Ra- zem
1964	19,8	8,4	9,4	5,9	6,4	47,1	3,0	100%
1965	24,8	8,8	8,3	6,9	6,5	41,2	3,5	100%

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Podział	1964				1965			
	liczba zachorowań	liczba zgonów	zapa- dal- ność na 100000	umie- ral- ność na 100000	liczba zachorowań	liczba zgo- nów*	zapa- dal- ność na 100000	umie- ral- ność na 100000
Miasta i osiedla	6.491	12	42,3	0,08	4.901	14	31,4	0,09
Gromady (wsie)	1.972	15	12,5	0,09	2.253	5	14,2	0,03
Polska	8.463	27	27,1	0,09	7.154	19	22,7	0,06

Czerwonka w Polsce w latach 1964 i 1965 wg czynnika etiologicznego

Rok	Sh. Flexneri		Sh. Sonnei		Sh. Shigae Shmitzi		Inne	
	liczba zachorowań	%	liczba zachorowań	%	liczba zachorowań	%	liczba zachorowań	%
1964	2.866	63,6	1.591	35,3	9	0,2	41	0,9
1965	2.351	52,3	2.094	46,5	3	0,1	48	1,1

Powyższa tabela obejmuje typy pałeczek Shigella występujące w Polsce wg danych ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne form. E. II-12.

#### 4. Biegunki u dzieci do lat 2

##### Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata
1963	32.016	1 779,6
1964	25.205	1 447,4
1965	26.429	1 561,1

Zachorowania na biegunki w Polsce prawdopodobnie przekraczają liczby, które tu przedstawiono.

W roku 1965 wskaźniki zapadalności z powodu biegunek u dzieci do lat 2 na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata w poszczególnych województwach przedstawiały się następująco:

m. Łódź	— 3 766,7
Koszalińskie	— 3 570,5
Białostockie	— 2 754,5
Olsztyńskie	— 2 545,0
Gdańskie	— 2 084,2
Łódzkie	— 1 925,0
Katowickie	— 1 878,7
Warszawskie	— 1 852,1
Bydgoskie	— 1 681,1
Wrocławskie	— 1 604,4
Szczecińskie	— 1 548,6
m. Wrocław	— 1 533,1
m. Kraków	— 1 435,7
m. Warszawa	— 1 280,3
Opolskie	— 1 178,5
Poznańskie	— 1 041,5
Zielonogórskie	— 999,7
Rzeszowskie	— 903,6
Lubelskie	— 870,2
Kieleckie	— 776,6
Krakowskie	— 637,8
m. Poznań	— 541,0

#### 5. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba ognisk zbiorowych zatruc pokarmowych zarejestrowanych w roku 1965 wynosi 203 o łącznej liczbie zachorowań 4.811 chorych.

W stosunku do roku 1964 liczba ognisk wzrosła o 42, a liczba zachorowań o 1 002.

W roku 1965 liczba ognisk o ustalonym czynniku bakteryjnym wynosi 127 o łącznej liczbie chorych 4 118, o nieustalonym natomiast czynnika 43 — 527 chorych. Spożycie trujących grzybów spowodowało 31 ognisk o łącznej liczbie chorych 156 osób.

2 ogniska — 10 zachorowań wywołane były spożyciem żywności zanieczyszczonej związkami chemicznymi.



## 5. Zatrucia pokarmowe

Procentowy udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych w roku 1965

Produkty żywnościowe	liczba ognisk	liczba zachorowań	% ognisk	% zachorowań	Salmonella		Gronkowce		Cl. perfringens		Cl. Botulinum		Inne drobnoustroje		Czynnik nieustalony	
					liczba ognisk	liczba zach.	liczba ognisk	liczba zach.	liczba ognisk	liczba zach.	liczba ognisk	liczba zach.	liczba ognisk	liczba zach.	liczba ognisk	liczba zach.
Mięso i przetwory	103	2759	60,6	59,4	16	1132	39	792	4	141	6	32	18	399	20	263
Ryby i przetwory	6	32	3,5	0,7	—	—	3	17	—	—	1	7	—	—	2	8
Mleko i przetwory	11	196	6,5	4,2	1	7	9	173	—	—	—	—	1	16	—	—
Inne	50	1658	29,4	35,7	8	336	14	573	2	359	—	—	5	134	21	256
Razem	170	4645	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	25	1475	65	1555	6	500	7	39	24	549	43	527

## 6. Włośnica

### Liczba zachorowań

1963	1964	1965
1.161	450	279

W roku 1965 z terenu 6 następujących województw zgłoszono łącznie 241 zachorowań:

1) Białostockiego	— 63
2) Łódzkiego	— 55
3) Gdańskiego	— 35
4) Warszawskiego	— 33
5) Olsztyńskiego	— 27
6) m. st. Warszawy	— 28

Na terenie w/w województw zanotowano następujące ogniska:

#### 1) woj. Białostockie — 10 ognisk:

- 9 ognisk w gospodarstwach indywidualnych,
- 1 ognisko w Internacie Technikum Gospodarczego.

Ogniska notowano przede wszystkim w powiatach: Białystok, Łomża, Sokółka, Zambrów i m. Białymstoku.

Chorych hospitalizowano w 100 procentach.

#### 2) woj. Łódzkie — 1 ognisko:

pow. Bełchatów — 45 zachorowań. Powodem zakażenia było mięso pochodzące z nielegalnego uboju, rozprzedane wśród mieszkańców wsi Zgoda (hospitalizowano 38 osób);

#### 3) woj. Gdańskie — 2 ogniska:

- jedno — miasto Gdańsk (styczeń/luty) — 17 zachorowań. Przyczyną była kiełbasa z dzika i sarny (hospitalizowano 17 osób),
- drugie również miasto Gdańsk (marzec) — 16 zachorowań. Przyczyną zachorowań było mięso wieprzowe własnego uboju nie badane, spożyte w gronie rodzinnym (hospitalizowano 11 osób);

#### 4) woj. Warszawskie — 4 ogniska:

- pow. Garwolin, gromada Parysów — 6 zachorowań (hospitalizowano 6 osób),
- pow. Siedlce, gromada Chodaków — 5 zachorowań (hospitalizowano 5 osób),
- pow. Ostrołęka, gromada Dobki — 8 zachorowań (hospitalizowano — 3 osoby),
- pow. Grodzisk Mazowiecki, gromada Gogole — 3 zachorowania (hospitalizowano 3 osoby).

W pierwszym ognisku źródła zakażenia nie ustalono, zaś w następnych 3 ogniskach mięso pochodziło z uboju prywatnego.

#### 5) woj. Olsztyńskie — 1 ognisko:

- Ostróda, gromada Miłomłyn — 27 zachorowań. Przyczyną było spożycie nie badanego mięsa (hospitalizowano 11 osób);

6) miasto Warszawa — 4 ogniska:

- w jednym ognisku (5 zachorowań) — przyczyną była kiełbasa z dzika,
- w drugim i trzecim (6 i 4 zachorowania) — mięso wieprzowe z nielegalnego uboju.
- w czwartym ognisku (4 zachorowania) — mięso z dzika. Z w/w chorych hospitalizowano 18 osób.

7. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100000 ludności	Umieralność na 100000 ludności
1963	75.944	258	247,4	0,84
1964	124.322	315	399,0	1,01
1965	94.146	.	298,9	.

W roku 1965 notuje się spadek wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach w porównaniu z rokiem 1964 z wyjątkiem woj. Poznańskiego i m. Poznania.

W roku 1965 — 400 i więcej przypadków zakaźnego zapalenia wątroby notowano w następujących powiatach:

m. st. Warszawa, dz. Wola	— 534	m. Bytom	— 749
dz. Praga Południe	— 533	pow. Tarnowskie Góry	— 734
dz. Mokotów	— 512	pow. Tychy	— 645
dz. Śródmieście	— 503	m. Chorzów	— 623
m. Łódź, dz. Górna	— 659	pow. Bielsko	— 603
dz. Bałuty	— 637	pow. Gliwice	— 602
dz. Śródmieście	— 514	pow. Wodzisław	— 601
dz. Polesie	— 419	m. Częstochowa	— 590
m. Poznań, dz. Grunwald	— 568	m. Gliwice	— 559
m. Wrocław, dz. Śródmieście	— 470	m. Sosnowiec	— 406
woj. Bydgoskie, m. Bydgoszcz	— 621	woj. Krakowskie, pow. Kraków	— 516
woj. Gdańskie, m. Gdańsk	— 914	pow. Nowy Targ	— 513
m. Gdynia	— 546	pow. Chrzanów	— 469
pow. Wejherowo	— 430	pow. Żywiec	— 421
woj. Katowickie, m. Katowice	— 1.203	pow. Wadowice	— 409
pow. Rybnik	— 1.023	woj. Lubelskie, m. Lublin	— 831
m. Ruda Śląska	— 837	pow. Puławy	— 524
m. Zabrze	— 826	pow. Lublin	— 494
pow. Cieszyn	— 799	pow. Chełm Lub.	— 444

woj. Łódzkie, pow. Łódź	— 405	pow. Konin	— 409
woj. Opolskie, pow. Opole	— 854	woj. Rzeszowskie, m. Rzeszów	— 714
pow. Racibórz	— 478	pow. Przemysł	— 412
pow. Koźle	— 436	woj. Szczecińskie, m. Szczecin	— 1.130
woj. Poznańskie, pow. Poznań	— 575	woj. Wrocławskie,	
pow. Kościan	— 470	pow. Jelenia Góra	— 526
pow. Gniezno	— 409	pow. Swidnica	— 477

Z w/w powiatów zgłoszono łącznie 30.576 zachorowań tj. 32,5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965.

#### Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach w latach 1963—1965

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000
1963	13.537	178,8	10.075	131,7	17.209	222,5	35.123	454,1
1964	30.531	394,1	19.607	253,1	27.141	346,6	47.043	600,7
1965	31.975	412,6	18.279	233,9	17.962	226,2	25.930	326,6

#### Odsetek hospitalizowanych chorych na zakaźne zapalenie wątroby w latach 1963—1965

1963	1964	1965
85,4	81,8	88,9

Najniższe odsetki hospitalizowanych chorych na zakaźne zapalenie wątroby w roku 1965 notuje się w województwach:

Warszawskim	— 75,0 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Poznańskim	— 76,2 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
m. st. Warszawie	— 78,6 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
Rzeszowskim	— 79,5 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>
m. Łodzi	— 79,6 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>

W postępowaniu profilaktycznym przeciwko zakaźnemu zapaleniu wątroby stosuje się między innymi gamma-globulinę dzieciom do lat 14 z kontaktu z chorym. W roku 1965 zużyto 470 024 ml gamma-globuliny.

## 8. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Zachorowania			Zapadalność na 100000 ludności	Zgony			Umieralność na 100000 ludności
	Polio	Parapolio	Razem		Polio	Parapolio	Razem	
1963	27	2	29	0,09	1	1	2	0,007
1964	9	2	11	0,03	2	—	2	0,007
1965	19	—	19	0,06	—	—	—	—

W roku 1965 zanotowano 19 zachorowań w następujących województwach, powiatach i miesiącach

Województwo	Powiat	Liczba zachorowań	Miesiące (wg daty zachorowania)
m. st. Warszawa	dz. Mokotów	1	kwiecień
	dz. Mokotów	1	maj
	dz. Ochota	1	wrzesień
Krakowskie	pow. Nowy Sącz	1	kwiecień
	pow. Oświęcim	1	maj
	pow. Bochnia	1	maj
	pow. Oświęcim	1	czerwiec
Poznańskie	m. Kalisz	1	czerwiec
Rzeszowskie	pow. Nisko	1	sierpień
	pow. Gorlice	1	wrzesień
Warszawskie	pow. Wołomin	1	maj
	pow. Płock	1	maj
	pow. Sierpc	1	czerwiec
	pow. Mława	1	wrzesień
Wrocławskie	pow. Świdnica	1	styczeń
	pow. Lwówek	1	maj
	pow. Wrocław	1	lipiec
Zielonogórskie	pow. Lubsko	1	lutym
	pow. Międzyrzec	1	październik

Liczba zachorowań na poliomyelitis w grupach wieku w latach 1963—1965

Rok	0—3	4—7	8—14	15 i więcej	Razem
1963	12	14	3	—	29
1964	3	2	4	2	11
1965	8	1	4	6	19

Postać choroby chorych na poliomyelitis w roku 1964 i 1965 u szczepionych doustnie i nieszczepionych

Postać choroby	1964		1965	
	szczepieni	nieszczepieni	szczepieni	nieszczepieni
Porażenna ciężka	3	3	2	2
Porażenna średnia	—	—	3	4
Porażenna lekka	1	1	—	2
Nieporażenna	1	—	3	3
Razem	5	4	8	11

Zejście choroby u chorych na poliomyelitis w roku 1964 i 1965 u szczepionych doustnie i nieszczepionych

Zejście choroby	1964		1965	
	szczepieni	nieszczepieni	szczepieni	nieszczepieni
Wyleczeni	4	—	5	4
Małe ograniczenia czynności ruchu	—	—	2	—
Duże ograniczenia czynności ruchu	1	2	1	7
Zgon	—	2	—	—
Razem	5	4	8	11

## Szczepienia przeciwko poliomeylitis w latach 1964—1965

Rok	Szczepienia podskórne (2 wstrzyknięcia)		Szczepienia doustne			
	liczba zaszczipionych	% za- szczep. w stosun- ku do liczby podlega- jących	I typ		II typ	
			liczba zaszczipionych	% za- szczep. w stosun- ku do liczby podlega- jących	liczba zaszczipionych	% za- szczep. w stosun- ku do liczby podlega- jących
1964	572.558	91,5	772.234	85,6	795.381	84,0
1965	508.607	85,7	878.791	97,5	917.326	90,7

## CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ

### 1. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność na 100 000 ludności i śmiertelność

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1963	299.729	604	976,6	0,20
1964	776.663	1.181	2 492,2	0,15
1965	894.028	854*)	2 838,5	0,09

W roku 1965 wskaźniki zapadalności z powodu grypy w poszczególnych województwach kształtowały się następująco:

m. st. Warszawa	— 21 659,1	Łódzkie	— 1 469,8
m. Łódź	— 8 341,2	Kieleckie	— 1 369,4
m. Kraków	— 7 358,5	Opolskie	— 1 308,9
Gdańskie	— 6 972,8	Krakowskie	— 1 224,9
Koszalińskie	— 4 844,2	m. Wrocław	— 1 105,8
Szczecińskie	— 4 146,3	Białostockie	— 1 029,1
Olsztyńskie	— 2 571,1	Rzeszowskie	— 760,6
Bydgoskie	— 2 384,4	Poznańskie	— 559,1
Katowickie	— 2 291,6	Zielonogórskie	— 551,1
Warszawskie	— 2 149,9	Wrocławskie	— 350,4
m. Poznań	— 1 610,8	Lubelskie	— 328,9

## Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1964	509,9	9 144,3	54,9	313,6
1965	9 900,0	696,8	55,9	856,5

Z powyższej tabeli wynika, że epidemiczne nasilenie zachorowań w roku 1965 notowano w I kwartale (styczeń — 7.575; luty — 304.420; marzec — 455.148).

## 2. Błonica

## Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1963	1.579	5,1
1964	749	2,4
1965	414	1,3

W roku 1965 wszystkie województwa notują spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do roku 1964 z wyjątkiem Krakowskiego, Łódzkiego i Olsztyńskiego.

W roku 1965 — 3 i więcej przypadków zachorowań na błonicę zgłoszono z powiatów:

1) m. Kraków, dz. Zwierzyniec	— 5
2) m. Łódź, dz. Bałuty	— 6
dz. Widzew	— 4
3) woj. Białostockie, pow. Elk	— 4
4) woj. Bydgoskie, pow. Wyrzysk	— 6
5) woj. Gdańskie, pow. Wejherowo	— 5
6) woj. Katowickie, pow. Rybnik	— 5
7) woj. Kieleckie, pow. Szydłowiec	— 8
pow. Kielce	— 7
pow. Busko	— 5
pow. Sandomierz	— 4
m. Skarżysko	— 4
m. Radom	— 3
8) woj. Koszalińskie, pow. Wałcz	— 5
9) woj. Krakowskie, m. Tarnów	— 11
pow. Kraków	— 8
pow. Nowy Targ	— 8
pow. Wadowice	— 7
pow. Tarnów	— 6
pow. Bochnia	— 5
pow. Miechów	— 5
pow. Oświęcim	— 5
pow. Żywiec	— 5
m. Zakopane	— 4
pow. Nowy Sącz	— 3



10) woj. Lubelskie, pow. Kraśnik	— 5
pow. Tomaszów	— 4
m. Lublin	— 3
11) woj. Łódzkie, pow. Łask	— 7
m. Tomaszów Mazowiecki	— 6
pow. Łęczyca	— 3
pow. Łódź	— 3
pow. Piotrków Tryb.	— 3
pow. Rawa Mazowiecka	— 3
12) woj. Olsztyńskie, pow. Mrągowo	— 15
pow. Nowe Miasto	— 4
13) woj. Opolskie, pow. Prudnik	— 12
pow. Głubczyce	— 3
14) woj. Rzeszowskie, pow. Jarosław	— 5
15) woj. Szczecińskie, m. Szczecin	— 5
16) woj. Warszawskie, pow. Pruszków	— 3
17) woj. Wrocławskie, pow. Dzierżoniów	— 20
pow. Kłodzko	— 14
pow. Bolesławiec	— 7
pow. Nowa Ruda	— 6
pow. Wałbrzych	— 5
pow. Zgorzelec	— 5
pow. Strzelin	— 4
pow. Jelenia Góra	— 3
pow. Środa Śląska	— 3
m. Wałbrzych	— 3

Z w/w powiatów zgłoszono łącznie 292 zachorowania tj. 70,5% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965.

W roku 1965 zanotowano następujące ogniska błonicy:

- 1) woj. Gdańskie, pow. Wejherowo — 5 zachorowań. Zachorowania wystąpiły w lipcu, dotyczyły osób w wieku 5, 7, 14, 15 i 19 lat. Z tego 3 osoby nieszczepione.  
Zanotowano 1 zgon (wiek 14 lat, dziecko nieszczepione);
- 2) woj. Bydgoskie, pow. Wyrzysk — 6 zachorowań. Zachorowania wystąpiły w przedszkolu w Nakle. Pięć przypadków stwierdzono u dzieci przedszkolnych, nieszczepionych. Jeden u osoby w wieku 17 lat również nieszczepionej;
- 3) woj. Białostockie, pow. Elk — 4 zachorowania w środowisku cygańskim, w tym jeden zgon. Zachorowania w 3 przypadkach dotyczyły dzieci nieszczepionych, 1 dziecko otrzymało 2 wstrzyknięcia szczepienia podstawowego;
- 4) woj. Krakowskie, pow. Nowy Targ (Biały Dunajec) — 5 zachorowań wśród dzieci nieszczepionych. Zanotowano 1 zgon;
  - pow. Bochnia — 4 zachorowania wśród dzieci szkolnych nieszczepionych,
  - pow. Kraków — 5 zachorowań. Pierwsze zachorowanie dotyczyło uczennicy szkoły zawodowej (zgon) dojeżdżającej do szkoły w Giebułtowie. Następne zachorowania pojawiły się wśród dzieci w Giebułtowie,
  - pow. Wadowice — zachorowania zanotowano w trzech sąsiadujących wsiach — Zakrzów, Stronie, Leśnica. Zanotowano łącznie 7 przypadków; w tym 5 przypadków dzieci w wieku szkolnym.
 Zachorowania szerzyły się drogą kontaktu — na skutek zbyt późnego rozpoznania błonicy. Zanotowano 1 zgon.
- 5) woj. Opolskie, pow. Prudnik — 9 zachorowań, w szkole w Luborzu. Zachorowania notowano w okresie od kwietnia do czerwca,
- 6) woj. Olsztyńskie, pow. Mrągowo — 15 zachorowań w Domu Dziecka, wśród dzieci nieszczepionych. Rozpoznanie ustalono bardzo późno, po stwierdzeniu porażen u dzieci. Zanotowano 1 zgon (dziecko 8-letnie).

7) woj. Wrocławskie, pow. Kłodzko w 2 rzutach łącznie 10 przypadków w Prewentorium p/gruźliczym Szczytna-Zamek; w okresie marzec—maj zanotowano 4 przypadki, w tym 1 zgon (dziecko 8-letnie nieszczepione) wśród dzieci szkolnych oraz 1 przypadek w wieku 19 lat (pielęgniarka). W grudniu zanotowano dalsze 5 zachorowań wśród dzieci w wieku szkolnym, w tym 1 zgon (dziecko 11-letnie, nieszczepione). Z w/w chorych 8 osób nie było szczepionych p/łośnicy.

**Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku w latach 1964—1965**

Rok	0—3		4—7		8—14		15—24		25 i więcej		Razem	
	Liczba zach.	zap.	Liczba zach.	zap.	Liczba zach.	zap.	Liczba zach.	zap.	Liczba zach.	zap.	Liczba zach.	zap.
1964	165	7,1	186	6,8	245	5,0	95	2,0	58	0,3	749	2,4
1965	76	3,3	94	3,4	156	3,2	63	1,3	25	0,1	414	1,3

**Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności w miastach i na wsiach w latach 1964—1965**

Podział	1964				1965			
	Liczba zach.	liczba zgonów	zapadalność	umieralność	liczba zach.	liczba zgonów*	zapadalność	umieralność
Miasta i osiedla	431	16	2,8	0,10	238	12	1,5	0,08
Gromady (wsie)	318	39	2,0	0,25	176	17	1,1	0,11
POLSKA	749	55	2,4	0,18	414	29	1,3	0,09

**Szczepienia ochronne przeciwko błonicy w latach 1964—1965**

Rok	Dzieci zaszczone podstawowo (3 wstrzykn.)		Szczepienia powtórne w 4 i 7 roku życia		Liczba zaszczonej dzieci w wieku 8—14 lat wg wskazań epidemicznych
	Liczba zaszczonej	% zaszczonej w stosunku do liczby podlegających	liczba zaszczonej	% zaszczonej w stosunku do liczby podlegających	
1965	686.891	82,1	1.372.630	86,2	154.365
1964	632.592 <sup>4)</sup>	83,6	1.261.536 <sup>5)</sup>	95,9	479.494

- 4) w tym: w roku 1965 zaszczep. podstawowo szczepionkami skojarzonymi (błonica, tężec, krztusiec; błonica, tężec) — 632.124 dzieci;  
 5) powtórnie — 1.187.097 dzieci.

### 3. Płonica

#### Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	liczba zgonów	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności
1963	79.085	28	257,7	0,09
1964	63.815	14	204,8	0,04
1965	41.870	38 <sup>6)</sup> *)	132,9	0,12

6) łącznie z paciorkowcowym zapaleniem gardła.

W roku 1965 najwyższe wskaźniki zanotowano w m. Krakowie — 372,8; m. st. Warszawie — 292,4; m. Łodzi — 256,1; m. Wrocławiu — 254,6; woj. Wrocławskim — 192,2; Szczecińskim — 186,6; Gdańskim — 176,3 i Katowickim — 152,5.

### 4. Odra

#### Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	liczba zgonów	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności
1963	124.492	301	405,6	0,98
1964	131.534	258	422,1	0,83
1965	124.596	198 <sup>*)</sup>	395,6	0,63

W roku 1965 zapadalność 400 i więcej na 100 000 ludności zanotowano w województwach:

m. Krakowie	— 799,8	Gdańskim	— 575,9
Szczecińskim	— 792,9	Katowickim	— 537,4
m. Poznaniu	— 754,3	Zielonogórskim	— 487,6
m. st. Warszawie	— 635,1	Opolskim	— 412,3
m. Łodzi	— 624,2		

### 5. Krztusiec

#### Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	liczba zgonów	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności
1963	44.772	227	145,9	0,74
1964	29.391	134	94,3	0,43
1965	24.109	78 <sup>*)</sup>	76,5	0,25

W roku 1965 wyższe wskaźniki od krajowego (76,5) obserwuje się w województwach:

Gdańskim	— 185,7	Warszawskim	— 91,1
m. Poznaniu	— 176,6	Koszalińskim	— 90,4
m. Krakowie	— 159,7	Szczecińskim	— 87,2
m. st. Warszawie	— 142,7	Lubelskim	— 85,4
Rzeszowskim	— 106,0		

## INNE CHOROBY

### 1. Wąglik

W roku 1965 zgłoszono 8 przypadków z terenu następujących województw i powiatów

Województwo	powiat	liczba zachorowań	miesiąc
Lubelskie	m. Lublin	1	maj
	pow. Włodawa	2	czerwiec
Gdańskie	m. Gdynia	1	kwiecień
	pow. Wejherowo	1	kwiecień
Kieleckie	pow. Przysucha	1	lipiec
Olsztyńskie	pow. Pasłęk	1	sierpień
Warszawskie	pow. Maków Maz.	1	październik

W roku 1964 zgłoszono 5 przypadków.

### 2. Tężec

**Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności**

Rok	Liczba zachorowań	liczba zgonów	zapadalność na 100 000 ludności	umieralność na 100 000 ludności
1963	309	172	1,0	0,56
1964	321	147	1,0	0,47
1965	228	101*)	0,7	0,32

W roku 1965 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Rzeszowskiego	— 46 (2,7 na 100 000 ludności)
Krakowskiego	— 31 (1,5 na 100 000 ludności)
Kieleckiego	— 21 (1,1 na 100 000 ludności)
Wrocławskiego	— 17 (0,9 na 100 000 ludności)
Lubelskiego	— 16 (0,8 na 100 000 ludności).

Z w/w województw zgłoszono łącznie 131 zachorowań tj. 57,4% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965.

Liczba zachorowań na tężec w roku 1965. Dane ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne. Form. — E. II-12.

Lp.	Województwo	Razem	w tym													
			Ogółem	Od 0 do 28 dnia życia				Od 29 dnia życia do 11 miesięcy			Od 1—3 lat	Od 4—7 lat	Od 8—14 lat	15 i więcej lat	brak danych	
				Od 0—7 dnia życia	Od 8—14 dnia życia	Od 15—21 dnia życia	Od 22—28 dnia życia	Ogółem	Od 29 dni do 3 miesięcy	Od 4 do 11 miesięcy						
POLSKA		1964	304	38	20	16	2	—	3	2	1	3	12	34	207	7
		1965	225	17	12	5	—	—	3	2	1	3	6	20	175	1
1.	M. st. W-wa	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
2.	m. Kraków	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3.	m. Łódź	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	m. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	m. Wrocław	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
6.	Białostockie	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
7.	Bydgoskie	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
8.	Gdańskie	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
9.	Katowickie	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—
10.	Kieleckie	19	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	2	12	1
11.	Kozalińskie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
12.	Krakowskie	31	3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	27	—
13.	Lubelskie	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—
14.	Łódzkie	14	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
15.	Olsztyńskie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—
16.	Opolskie	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	—
17.	Poznańskie	12	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—
18.	Rzeszowskie	46	5	4	1	—	—	—	1	1	—	2	1	1	36	—
19.	Szczecińskie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
20.	Warszawskie	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
21.	Wrocławskie	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13	—
22.	Zielonogórskie	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

W roku 1965 zachorowania wśród noworodków stanowią 7,5% w stosunku do ogółem zgłoszonych, a zachorowania w grupie wieku 0—14 lat stanowią 21,8%. Zapadalność w grupie noworodków na 100 000 w stosunku do żywourodzonych w roku 1965 wynosi 3,0.

W roku 1965 — 3 i więcej przypadków tężca zgłoszono z powiatów:

1) woj. Katowickie, pow. Wodzisław	— 3
2) woj. Kieleckie, pow. Busko	— 6
pow. Opatów	— 3
3) woj. Krakowskie, pow. Dąbrowa Tarn.	— 5
pow. Limanowa	— 4
pow. Myślenice	— 3
pow. Nowy Sącz	— 3
pow. Wadowice	— 3
4) woj. Łódzkie, pow. Radomsko	— 3
5) woj. Rzeszowskie, pow. Jarosław	— 6
pow. Rzeszów	— 6
pow. Nisko	— 5
pow. Jasło	— 4
pow. Gorlice	— 4
pow. Krosno	— 3
pow. Łańcut	— 3
pow. Strzyżów	— 3
6) woj. Wrocławskie, pow. Świdnica	— 3

### 3. Wścieklizna.

W roku 1965 zgłoszono 3 przypadki wścieklizny (3 zgony)

- 1) woj. Lubelskie, pow. Łuków — 1 zach. Pokąsanie przez kota,
- 2) woj. Szczecińskie, pow. Łobez — 1 zach. Pokąsanie przez psa,
- 3) woj. Wrocławskie, pow. Milicz — 1 zach. Pokąsanie przez lisa.

### 4. Choroba Brilla i inne riketsjozy

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1963	154	1	0,5
1964	124	3	0,4
1965	115	6*)	0,4

W roku 1965 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Białostockiego	— 14 (1,2 na 100 000 ludności)
Lubelskiego	— 13 (0,7 na 100 000 ludności)
Warszawskiego	— 12 (0,5 na 100 000 ludności)
Wrocławskiego	— 11 (0,6 na 100 000 ludności)
m. st. Warszawy	— 11 (0,9 na 100 000 ludności)

Z w/w 5 województw zgłoszono łącznie 61 zachorowań tj. 53,0% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1965.

U w a g a : liczby zgonów w roku 1964 i w latach poprzednich wg danych GUS.

\*) dane wg formularza L-n-11, dane tymczasowe.

Woje- wództwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A.B.C. Paratyphus A.B.C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokar- mowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria
	040	041	045— 048	571, 746	049	Salmonellozy	Inne	128	092	080	055
Numery kla- syfikacji mię- dzynarcdowej	040	041	045— 048	571, 746	049	042	049	128	092	080	055
POLSKA	1964 1565	136	8463	25205	201	3514	6670	450	124322	11	749
	1965 1040	133	7154	26429	252	6500	6550	279	94146	19	414
M. st. W-wa	41	7	953	537	—	350	320	28	3088	3	—
M. Kraków	15	3	94	331	—	4	191	—	1228	—	11
M. Łódź	26	2	145	925	1	95	383	10	2542	—	13
M. Poznań	6	1	57	97	2	73	60	—	1641	—	1
M. Wrocław	9	2	25	320	1	80	372	—	1486	—	7
Białostockie	50	24	325	1945	8	168	104	63	2908	—	8
Bydgoskie	55	4	249	1751	54	304	379	3	4535	—	8
Gdańskie	44	4	673	1610	15	171	868	35	4714	—	5
Katowickie	66	4	545	3199	6	1110	97	5	14148	—	17
Kieleckie	89	1	477	780	—	149	188	3	3028	—	39
Koszalińskie	31	1	285	1724	8	201	151	15	2760	—	11
Krakowskie	51	1	98	817	2	24	260	—	5801	4	73
Lubelskie	62	8	234	884	1	385	219	1	5337	—	21
Łódzkie	29	14	225	1564	11	445	267	55	4056	—	32
Olsztyńskie	25	1	681	1712	2	325	133	27	3048	—	20
Opolskie	39	1	69	775	12	45	93	—	4590	—	18
Poznańskie	53	7	97	1226	54	742	224	1	7934	1	4
Rzeszowskie	64	12	22	914	2	3	231	—	4350	2	18
Szczecińskie	31	2	305	738	9	355	777	—	2634	—	9
Warszawskie	174	9	683	2364	13	636	142	33	5711	4	19
Wrocławskie	66	19	436	1724	37	448	975	—	6214	3	78
Zielonogórskie	14	6	476	492	14	387	116	—	2393	2	2

Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyusz. nagmin. Parotitis epidemica	Zapalenie opon mózg. rdz. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadycz- ny — Choroba Brilla	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
050	085	056	089	057	480— 483	100— 102	110— 117	094	044	061	052
63815	131534	29391	94195	928	776663	124	12	1	63	321	2393
41870	124596	24109	107155	1011	894028	115	5	3	78	228	1842
3653	7934	1783	11466	173	270566	11	—	—	4	4	136
1926	4132	825	3809	2	38014	—	—	—	—	1	29
1903	4637	181	2497	—	61967	5	1	—	—	—	159
608	3289	770	2583	8	7023	2	—	—	—	—	25
1200	1788	347	3242	2	5213	3	—	—	—	3	89
927	3932	603	2850	47	11930	14	—	—	32	5	33
2553	6810	1343	7067	74	43715	2	—	—	1	10	141
2377	7763	2504	6848	22	93994	4	1	—	3	3	131
5367	18913	2551	12961	34	80659	4	—	—	—	13	65
1364	4362	1058	3477	62	26006	7	—	—	—	21	55
999	1359	681	3198	37	36472	2	—	—	—	2	49
2300	6459	937	6996	107	25996	1	—	—	—	31	72
1407	4969	1623	4521	43	6251	13	—	1	3	16	77
1303	4787	484	4048	33	24459	2	—	—	1	14	77
841	3650	704	3384	86	24575	9	1	—	14	1	97
1421	4156	650	2942	77	13193	4	—	—	1	13	38
1526	5993	1082	2888	22	11870	1	—	—	7	13	82
1302	4755	1793	4466	66	12859	1	—	—	—	46	54
1577	6702	737	3309	45	35045	1	—	1	3	6	117
2413	7154	2234	5788	17	52689	12	2	—	—	8	132
3773	6933	720	6602	40	6876	11	—	1	8	17	148
1130	4119	499	2213	14	4656	6	—	—	1	1	36

\*) Liczby bezwzględne



## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Woje- wództwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rze- kome A.B.C. Paratyphus A.B.C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyeli- tis anter- rior acuta	
	040		041		045—048		080	
Rok	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	5,0	3,3	0,4	0,4	27,1	22,7	0,03	0,06
M. st. Warszawa	4,7	3,3	0,9	0,6	98,7	76,3	—	0,24
M. Kraków	4,1	2,9	0,2	0,6	21,4	18,2	—	—
M. Łódź	4,7	3,5	1,8	0,3	24,7	19,5	—	—
M. Poznań	2,5	1,4	—	0,2	13,7	13,1	—	—
M. Wrocław	2,4	1,9	0,2	0,4	3,2	5,3	—	—
Białostockie	7,6	4,3	2,5	2,1	29,0	28,0	0,09	—
Gdańskie	7,5	3,0	0,2	0,2	31,2	13,6	—	—
Bydgoskie	5,3	3,3	0,7	0,3	46,6	49,9	0,07	—
Katowickie	2,5	1,9	0,1	0,1	16,7	15,5	0,09	—
Kieleckie	6,0	4,7	0,1	0,1	2,5	25,1	—	—
Koszalińskie	2,2	4,1	0,4	0,1	16,6	37,8	0,13	—
Krakowskie	3,5	2,4	0,1	0,1	6,7	4,6	—	0,19
Lubelskie	7,1	3,3	0,7	0,4	14,2	12,3	—	—
Łódzkie	3,9	1,7	0,3	0,8	11,9	13,5	—	—
Olsztyńskie	5,1	2,6	0,1	0,1	99,8	71,2	—	—
Opolskie	6,0	3,9	0,3	0,1	1,9	6,8	—	—
Poznańskie	3,8	2,5	0,3	0,3	14,5	4,6	—	0,05
Rzeszowskie	3,2	3,8	0,5	0,7	0,8	1,3	0,06	0,12
Szczecińskie	4,1	3,7	0,2	0,2	40,1	36,1	0,12	—
Warszawskie	10,3	7,1	0,6	0,4	28,1	27,9	—	0,16
Wrocławskie	4,8	3,4	0,2	1,0	71,4	22,2	0,05	0,15
Zielonogórskie	3,0	1,6	—	0,7	38,1	56,3	0,24	0,24

## CHOROBY ZAKAŻNE

Rok 1964—1965

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epide- mica	
055		050		056		092	
1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
2,4	1,3	204,8	132,9	94,3	76,5	399,0	298,9
0,6	—	628,4	292,4	178,7	142,7	501,2	247,2
9,2	2,1	668,8	372,8	175,6	159,7	337,7	237,7
3,0	1,7	456,3	256,1	118,8	24,4	474,9	342,2
0,7	0,2	305,3	139,4	164,9	176,6	364,8	376,4
1,7	1,5	533,7	254,6	108,2	73,6	425,5	315,2
1,8	0,7	102,2	80,0	57,5	52,0	323,8	250,8
0,4	0,4	171,7	139,2	88,7	73,2	406,4	247,3
1,3	0,4	300,5	176,3	104,0	185,7	428,5	349,7
0,9	0,5	179,4	152,5	96,4	72,5	519,2	401,9
4,5	2,0	83,0	71,8	72,8	55,7	274,5	159,4
7,8	1,5	138,3	132,7	102,9	90,4	377,3	366,6
2,8	3,4	174,8	108,4	66,4	44,1	351,5	273,3
2,7	1,1	125,4	74,0	127,0	85,4	313,5	280,8
1,7	1,9	146,3	78,3	36,8	29,1	293,8	243,7
0,3	2,1	107,2	88,0	85,3	73,6	461,9	318,9
2,5	1,8	182,5	141,0	88,5	64,5	539,2	455,1
0,4	0,2	140,5	71,9	59,3	51,0	323,6	373,7
2,7	1,1	96,0	77,0	89,0	106,0	290,1	257,3
4,7	1,1	272,2	186,6	205,0	87,2	352,8	311,6
1,8	0,8	139,2	98,4	103,4	91,1	441,2	233,0
6,1	4,0	264,7	192,3	71,2	36,7	513,5	316,6
2,2	0,2	213,3	133,7	77,5	59,1	409,3	283,3

\*) Zapadalność na 100 000 ludności

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1965	Rok 1964	Media- na 1961— —1964	Zapadalność na 100 000 ludności	
				1964	1965
Dur brzuszny 040	1.040	1.565	2.569	5,0	3,3
Dury rzekome A.B.C. 041	133	136	332	0,4	0,4
Czerwonka 045—048	7.154	8.463	9.874	27,1	22,7
Biegunki u dzieci do lat 2 571, 764	26.429	25.205	27.946	1447,4*)	1561,1*)
Botulismus 049	252	201	299	0,6	0,8
Zatr. pokar. mowe } Salmonellozy 042	6.500	3.514	2.426	11,3	20,6
	Inne 049	6.550	6.670	6.202	21,4
Włośnica 128	279	450	389	1,4	0,9
Zakaźne zapalenie wątroby 092	94.146	124.322	66.486	399,0	298,9
Porażenie dziecięce nagminne 080	19	11	40	0,03	0,06
Błonica 055	414	749	2.331	2,4	1,3
Płonica 050	41.870	63.815	61.126	204,3	132,9
Odra 085	124.596	131.534	128.013	422,1	395,6
Krzusiec 056	24.109	29.391	46.061	94,3	76,5
Zapalenie przyusznicy nagminne 089	107.155	94.195	66.678	302,3	340,2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne 057	1.011	928	939	3,0	3,2
Grypa 480—483	894.028	776.663	678.443	2492,4	2838,5
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100—102	115	124	154	0,4	0,4
Zimnica 110—117	5	12	13	0,03	0,01
Wścieklizna 094	3	1	1	0,003	0,01
Choroba Banga 044	78	63	64	0,2	0,2
Tężec 061	228	321	323	1,0	0,7
Róża 052	1.842	2.393	2.135	7,7	5,8

\*) Zapadalność w grupie wieku 0—2 lata

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Styczeń 1965 r.

EGZ. NR 000169

Do użytku służbowego

# Sytuacja epidemiologiczna w styczniu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem 1964 r. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 5,3 — I/1964 do 3,0 — I/1965. W styczniu br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Gdańskim — 6,2; Krakowskim — 5,5; Warszawskim — 5,3; m. st. Warszawie — 4,8; woj. Koszalińskim — 4,8 i Kieleckim — 4,4. W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia i woj. Zielonogórskiego.

W styczniu br. ognisk epidemicznych nie zanotowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 4,6 — XII/1964 do 3,0 — I/1965.

### 2. Dury rzekome

W styczniu zgłoszono 10 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 21,9 — I/1964 do 20,6 — I/1965. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Wrocławia, woj. Kieleckiego, Opolskiego, Rzeszowskiego i Lubelskiego. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1964 r. obserwuje się w woj. Bydgoskim, Zielonogórskim, Białostockim, Gdańskim i Olsztyńskim. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (20,6) notuje się w woj. Kieleckim — 130,5; m. st. Warszawie — 56,5; woj. Olsztyńskim — 37,6; Szczecińskim — 32,9; Gdańskim — 25,8; Wrocławskim — 25,0 i Koszalińskim — 20,7.

W grudniu r. ub. krajowy wskaźnik wynosił — 16,0.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W styczniu br. nie zgłoszono zachorowań.

W styczniu 1964 r. nie notowano zachorowań.

W grudniu r. ub. również nie notowano zachorowań.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W styczniu br. zgłoszono z terenu całej Polski 12 570 zachorowań. W tym samym okresie 1964 r. zgłoszono 12 159 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 81,2% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 460,7 — I/1964 do 476,3 — I/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu ze styczniem 1964 r. notuje się w woj. Poznańskim (329,0 — I/1964; 517,7 — I/1965), Opolskim (615,2 — I/1964; 787,1 — I/1965), m. Poznaniu (314,5 — I/1964; 467,7 — I/1965); woj. Warszawskim (389,7 — I/1964; 538,9 — I/1965) i Koszalińskim (389,1 — I/1964; 508,7 — I/1965). W styczniu br. najwyższe wskaźniki obserwuje się w woj. Opolskim — 787,1; Katowickim —

653,3; Gdańskim — 556,3; Warszawskim — 538,9; Poznańskim — 517,7; Kozłowski — 508,7; Wrocławskim — 507,6 i Olsztyńskim — 507,1.

W grudniu 1964 r. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 588,8

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 3,9—I/1964 do 1,7—I/1965. W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z terenu 9 województw. W styczniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Krakowskim — 4,4; Wrocławskim — 4,3; Łódzkim — 3,6; m. Łodzi — 3,2; Lubelskim — 2,5; Katowickim — 2,4; m. Krakowie — 2,3 i woj. Rzeszowskim — 2,1.

W porównaniu z grudniem 1964 r. notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 1,9—XII/1964 do 1,7—I/1965.

### 2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu ze styczniem r. ub. z 273,3—I/1964 do 181,1—I/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem 1964 r. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Kieleckiego. Znaczny spadek obserwuje się w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Łodzi, m. Poznaniu, m. Wrocławiu, woj. Gdańskim, Krakowskim, Poznańskim i Zielonogórskim. Najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 556,7; m. st. Warszawie — 519,4; m. Wrocławiu — 451,3; m. Łodzi — 424,3; woj. Gdańskim — 329,7; Szczecińskim — 278,8; m. Poznaniu — 224,3 i woj. Wrocławskim — 220,2.

W grudniu r. ub. krajowy wskaźnik wynosił — 257,6.

### 3. Krztusiec

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. ze 119,6—I/1964 do 64,1—I/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do grudnia 1964 r. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania i woj. Gdańskiego. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego obserwuje się na terenie 11 województw; w tym najwyższe w m. Poznaniu — 426,1; woj. Szczecińskim — 135,8; Gdańskim — 127,1; m. Krakowie — 118,3 i m. st. Warszawie — 105,1.

W grudniu r. ub. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 64,5.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomyelitis anterior <i>acuta</i>	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
	Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045—048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480— 483	100— 102	110— 117	094	044	061
POLSKA	1964	8	577	1364	1	212	228	125	12 159	—	103	7 214	11 635	3 157	9 325	62	8 794	8	1	—	8	15	271
	1965	10	544	1311	8	183	200	70	12 570	—	45	4 880	10 491	1 691	14 083	79	7 361	8	—	—	6	6	182
M. st. Warszawa	5	1	59	23	—	6	6	9	449	—	—	542	505	110	2410	21	48	2	—	—	—	—	23
M. Kraków	1	1	5	2	—	—	9	—	126	—	1	240	91	51	346	—	117	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	1	1	2	39	—	—	18	8	261	—	2	265	779	30	333	—	550	2	—	—	—	—	14
M. Poznań	1	—	2	5	—	6	—	—	171	—	—	82	52	90	275	1	105	—	—	—	—	—	3
M. Wrocław	—	—	1	10	—	2	13	—	168	—	—	178	132	16	477	—	45	—	—	—	—	—	8
Białostockie	3	2	10	65	—	3	5	10	395	—	1	88	545	30	218	1	72	1	—	—	—	—	2
Bydgoskie	1	—	14	72	—	3	5	—	729	—	—	309	1015	112	1460	10	363	1	—	—	—	—	3
Gdańskie	7	1	29	123	—	5	39	—	626	—	—	371	461	143	1373	—	329	—	—	—	1	—	14
Katowickie	5	1	17	183	—	37	13	4	1926	—	7	517	1528	179	1455	3	1972	—	—	—	—	—	8
Kieleckie	7	—	209	43	—	—	1	—	471	—	1	172	228	53	332	7	325	—	—	—	—	1	6
Koszalińskie	3	—	13	114	—	3	6	4	319	—	—	92	189	50	231	6	120	—	—	—	1	—	2
Krakowskie	10	1	6	34	—	—	10	—	781	—	8	220	665	73	634	3	457	—	—	—	—	2	4
Lubelskie	3	1	25	25	—	61	11	—	598	—	4	140	547	155	735	2	266	—	—	—	—	—	6
Łódzkie	2	—	7	76	—	2	8	1	504	—	5	165	793	73	234	8	720	—	—	—	—	2	13
Olsztyńskie	3	—	30	91	—	2	3	27	404	—	1	105	263	55	358	5	126	1	—	—	1	—	11
Opolskie	1	—	2	48	—	—	3	—	664	—	—	129	291	51	200	1	414	—	—	—	—	—	1
Poznańskie	7	—	3	52	7	1	2	—	922	—	—	179	317	46	391	—	327	—	—	—	1	—	7
Rzeszowskie	4	—	5	17	—	—	—	—	468	—	3	141	353	94	484	5	225	—	—	—	—	1	3
Szczecińskie	1	—	23	36	1	6	33	—	320	—	1	195	119	95	411	6	66	—	—	—	1	—	10
Warszawskie	11	1	29	119	—	14	3	7	1109	—	4	271	628	117	951	—	213	1	—	—	—	—	17
Wrocławskie	3	—	41	89	—	5	7	—	832	—	7	361	715	42	506	—	311	—	—	—	2	—	13
Zielonogórskie	—	—	12	45	—	27	5	—	327	—	—	118	275	26	269	—	190	—	—	—	—	—	11

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA (NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenia wątroby Hepatitis epidemicna							
	040		041		045—048		080					055		050		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965				1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	5,3	3,0	0,3	0,4	21,9	20,6	—	—	3,9	1,7	273,3	181,1	119,6	64,1	460,7	476,3			
M. st. Warszawa	9,6	4,8	—	0,9	67,1	56,5	—	—	—	—	1061,8	519,4	181,1	105,4	467,6	430,3			
M. Kraków	2,3	2,3	—	2,3	25,5	11,6	—	—	4,6	2,3	821,1	556,7	382,7	118,3	480,1	292,2			
M. Łódź	6,4	1,6	—	1,6	19,2	3,2	—	—	9,6	3,2	654,8	424,3	150,5	48,0	533,2	417,9			
M. Poznań	—	2,7	—	—	21,9	5,5	—	—	2,7	—	516,9	224,3	125,8	246,1	314,5	467,7			
M. Wrocław	5,1	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	679,6	451,3	220,6	40,6	484,3	426,0			
Białostockie	5,1	3,1	1,0	2,0	33,9	10,3	—	—	5,1	1,0	116,2	90,5	118,2	30,8	368,1	406,2			
Bydgoskie	7,1	0,6	—	—	33,8	9,1	—	—	—	—	245,2	201,0	81,3	72,8	432,6	474,2			
Gdańskie	5,3	6,2	0,9	0,9	51,5	25,8	—	—	6,2	—	447,0	329,7	90,6	127,1	479,9	556,3			
Katowickie	1,0	1,7	—	0,3	10,8	5,8	—	—	1,3	2,4	251,7	175,4	155,7	60,7	590,9	653,3			
Kieleckie	6,2	4,4	—	—	1,2	130,5	—	—	8,1	0,6	96,8	107,4	74,9	33,1	534,6	294,1			
Koszalińskie	—	4,8	—	—	22,3	20,7	—	—	22,3	—	177,0	146,7	167,4	79,7	389,1	508,7			
Krakowskie	4,4	5,5	0,5	0,5	3,3	3,3	—	—	2,2	4,4	224,5	121,7	83,5	40,4	426,4	431,9			
Lubelskie	8,8	1,9	—	0,6	6,9	15,6	—	—	1,9	2,5	106,4	87,6	120,8	97,0	421,4	374,4			
Łódzkie	2,1	1,4	—	—	13,5	5,0	—	—	2,8	3,6	188,7	117,5	59,8	52,0	334,7	358,9			
Olsztyńskie	11,3	3,8	—	—	107,9	37,6	—	—	—	1,2	149,4	131,8	145,6	69,0	618,8	507,1			
Opolskie	1,2	1,2	—	—	1,2	2,4	—	—	5,9	—	194,4	152,9	126,8	60,4	615,2	787,1			
Poznańskie	4,5	3,9	1,1	—	8,4	1,7	—	—	—	—	189,8	100,5	51,6	25,8	329,0	517,7			
Rzeszowskie	2,1	2,8	0,7	—	0,7	3,5	—	—	1,4	2,1	102,9	99,4	78,9	66,3	375,7	329,9			
Szczecińskie	—	1,4	—	—	50,0	32,9	—	—	17,1	1,4	354,6	278,8	387,5	135,8	364,6	457,6			
Warszawskie	11,2	5,3	1,0	0,5	19,9	14,1	—	—	1,9	1,9	197,3	131,7	80,6	56,8	389,7	538,9			
Wrocławskie	8,5	1,8	—	—	25,0	25,0	—	—	10,4	4,3	262,9	220,2	115,9	25,6	596,1	507,6			
Zielonogórskie	7,1	—	—	—	41,1	17,0	—	—	—	—	272,3	167,4	96,4	36,9	483,7	462,4			

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Styczeń 1965	Styczeń 1964	Mediana 1961—1964	
Dur brzuszny — 040	79	140	147	
Dury rzekome A. B. C. — 041	10	8	12	
Czerwonka 045 — 048	544	577	612	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 311	1 364	1 362	
Botulismus — 049	8	1	9	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonelloza 042	183	212	87
	inne — 049	200	228	237
Włośnica — 128	70	125	46	
Zakaźne zap. wątroby — 092	12 570	12 159	6 053	
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	—	1	
Błonica — 055	45	103	278	
Płonica — 050	4 380	7 214	4 970	
Odra — 085	10 491	11 635	13 217	
Krztusiec — 056	1 691	3 157	3 760	
Zap. przyusz. nagm. — 089	14 083	9 325	7 594	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	79	62	58	
Grypa 480 — 483	7 361	8 794	39 030	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	8	8	15	
Zimnica 110 — 117	—	1	—	
Wścieklizna — 094	—	—	—	
Choroba Banga — 044	6	8	4	
Tężec — 061	6	15	13	
Róża — 052	182	271	190	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny  
CDW Cieszyn 1121/65 260 egz. F-020

UWAGA: W biuletynie za listopad 1964 r. należy wnieść poprawkę w tabeli na str. 4 „Zachorowania na choroby zakaźne” w rubryce włośnica winno być: w woj. warszawskim 43 przypadki, woj. szczecińskim „0”.



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Luty 1965 r.

EGZ. NR

045

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna w lutym 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 4,2—II/1964 do 3,2—II/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w woj. Warszawskim — 6,7; Białostockim — 6,6; Poznańskim — 6,0; Koszalińskim 5,1 i Bydgoskim — 5,0. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, m. Krakowa, m. Wrocławia i woj. Szczecińskiego.

W lutym br. ognisk epidemicznych nie zanotowano.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 3,0.

### 2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 12 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym okresem 1964 r. z 35,9—II/1964 do 16,7—II/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się w woj. Bydgoskim, Katowickim, Olsztyńskim, Wrocławskim, Gdańskim i m. Łodzi. W lutym br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 50,7; Olsztyńskim — 48,3; Białostockim — 45,1; m. st. Warszawie 36,9; woj. Zielonogórskim — 36,4; Szczecińskim — 28,8, Gdańskim — 22,8 i Wrocławskim — 22,2. Nie zgłoszono zachorowań z woj. Opolskiego. Najniższe wskaźniki notuje się w m. Wrocławiu — 2,7; woj. Krakowskim — 3,0; Katowickim — 4,0; m. Poznaniu — 5,8 i m. Łodzi — 6,8.

W lutym br. krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 20,6.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W lutym br. zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Wrocławskiego, pow. Świdnica ze stycznia br.

W analogicznym okresie r. ub. nie notowano zachorowań.

W poprzedzającym miesiącu nie zgłoszono zachorowań.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W lutym br. zgłoszono z terenu całej Polski 10 417 zachorowań.

W tym samym okresie r. ub. zgłoszono 9 832 zachorowania.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 83,2% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 398,2 — II/1964 do 421,9 — II/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności obserwuje się w następujących województwach:

Koszalińskim	— 329,0 — II/1964; 514,8 — II/1965
Poznańskim	— 265,9 — II/1964; 430,3 — II/1965
Opolskim	— 548,6 — II/1964; 669,0 — II/1965
Szczecińskim	— 307,6 — II/1964; 420,3 — II/1965
m. Poznaniu	— 345,0 — II/1964; 456,1 — II/1965

W lutym br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Opolskim — 669,0; Katowickim — 580,0; Olsztyńskim — 526,0; Koszalińskim — 514,8; m. Poznaniu — 456,1 i m. Łodzi — 450,1. Najniższe wskaźniki obserwuje się w m. Kra-

kowie — 240,5; woj. Kieleckim — 250,3; Rzeszowskim — 320,3; Lubelskim — 332,6 i m. st. Warszawie — 347,3.

W styczniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 476,3.

## **II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową**

### **1. Błonica**

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do lutego z 1964 r. z 3,7 — II/1964 do 1,6 — II/1965. W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z terenu 10 województw. W lutym br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Wrocławskim — 7,8; Olsztyńskim — 5,4; Łódzkim — 5,3 i m. Łodzi — 3,4.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem notuje się niewielki spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 1,7 — I/1965 do 1,6 — II/1965.

### **2. Płonica**

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 272,6 — II/1964 do 182,8 — II/1965. Wyższe wskaźniki od krajowego obserwuje się w m. Krakowie — 535,6; m. st. Warszawie — 483,5; m. Wrocławiu — 436,4; woj. Gdańskim — 324,7; m. Łodzi — 323,5; woj. Szczecińskim — 316,8; Wrocławskim — 287,0 i m. Poznaniu — 204,6.

W styczniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 181,1.

### **3. Krztusiec**

W porównaniu z analogicznym okresem 1964 r. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 92,5 — II/1964 do 60,2 — II/1965. W lutym br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 11 województw, w tym najwyższe w m. Poznaniu — 198,8; woj. Koszalińskim — 100,6; Gdańskim — 90,5; m. st. Warszawie — 89,1; woj. Szczecińskim — 83,7 i Rzeszowskim — 80,6.

W styczniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 64,1.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Poliomylitis anterior <i>acuta</i>	Bionica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
	040	041	045—048	571, 764	049	Salmonellozy	Inne	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480—483	100—102	110—117	094	044	061	052	
POLSKA	1964	105	1	886	1358	5	311	253	104	9832	—	91	6730	15733	2285	10014	67	9244	10	1	—	5	10	204
	1965	80	12	413	1169	10	266	341	22	10417	1	40	4514	11805	1486	17147	64	302864	11	1	—	3	11	137
M. st. Warszawa	3	—	36	35	—	3	56	3	339	—	—	472	802	87	2218	17	147661	—	—	—	—	—	—	9
M. Kraków	—	—	5	—	—	—	1	—	97	—	1	216	238	32	393	—	1541	—	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	1	—	4	39	1	4	23	1	263	—	2	189	955	15	355	—	8595	—	—	—	—	—	—	10
M. Poznań	—	—	2	2	—	2	2	—	156	—	—	70	99	68	380	—	355	—	—	—	—	—	—	1
M. Wrocław	—	—	1	25	—	9	14	—	155	—	—	161	132	8	671	—	2362	—	—	—	—	—	—	11
Białostockie	6	1	41	54	—	2	4	10	398	—	—	113	583	39	371	3	190	1	—	—	—	—	1	1
Bydgoskie	7	—	8	72	5	1	10	—	603	—	—	242	921	93	1517	2	10793	—	—	—	—	—	1	11
Gdańskie	3	—	24	75	2	—	14	—	446	—	—	341	550	95	1443	1	64924	2	—	—	—	—	—	14
Katowickie	3	—	11	195	2	29	1	—	1600	—	—	460	1754	163	1747	3	18125	—	—	—	—	—	1	3
Kieleckie	5	1	76	34	—	—	2	—	375	—	4	187	218	103	566	12	2275	2	—	—	—	—	3	3
Koszalińskie	3	—	7	89	—	13	1	7	302	—	—	110	172	59	469	2	5491	—	—	—	—	—	—	6
Krakowskie	2	—	5	52	—	—	95	—	612	—	2	174	405	46	814	3	1323	—	—	—	—	—	1	5
Lubelskie	6	—	17	30	—	45	53	—	497	—	1	197	711	81	817	—	405	—	—	—	—	—	—	5
Łódzkie	4	—	21	65	—	—	8	—	482	—	7	122	807	42	447	3	3694	2	—	—	—	—	—	5
Olsztyńskie	3	—	36	71	—	—	3	—	392	—	4	88	215	42	660	2	2733	2	—	—	—	1	—	8
Opolskie	3	—	—	33	—	—	—	—	528	—	2	133	236	40	259	1	4014	—	—	—	—	—	—	3
Poznańskie	10	—	7	32	—	65	4	—	717	—	—	123	445	106	469	2	1019	—	—	—	—	—	—	3
Rzeszowskie	3	—	2	10	—	—	2	—	425	—	2	131	309	107	865	5	498	1	—	—	—	—	2	4
Szczecińskie	—	—	19	36	—	5	25	—	276	—	1	208	180	55	399	2	8126	—	—	—	—	—	—	10
Warszawskie	13	—	33	107	—	46	3	1	805	—	2	234	717	132	999	2	16838	—	1	—	—	—	—	9
Wrocławskie	3	9	34	79	—	7	16	—	658	1	12	440	945	52	930	3	1431	1	—	—	2	1	11	
Zielonogórskie	2	1	24	34	—	35	4	—	291	—	—	103	411	21	358	1	471	—	—	—	—	—	—	2

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

## CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna							
	040		041		045—048		080					055		050		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965				1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
R o k																			
POLSKA	4,2	3,2	0,04	0,5	35,9	16,7	—	0,04	3,7	1,6	272,6	182,8	92,5	60,2	398,2	421,9			
M. st. Warszawa	3,1	3,1	—	—	65,6	36,9	—	—	1,0	—	960,9	483,5	145,5	89,1	398,5	347,3			
M. Kraków	2,5	—	—	—	19,8	12,4	—	—	4,9	2,5	776,1	535,6	158,7	79,3	297,5	240,5			
M. Łódź	1,7	1,7	—	—	20,5	6,8	—	—	6,8	3,4	676,0	323,5	119,8	25,7	446,7	450,1			
M. Poznań	2,9	—	—	—	5,8	5,8	—	—	—	—	587,6	204,6	61,4	198,8	345,0	456,1			
M. Wrocław	—	—	—	—	—	2,7	—	—	5,4	—	810,5	436,4	94,9	21,7	447,2	420,1			
Białostockie	4,4	6,6	—	1,1	33,0	45,1	—	—	9,9	—	140,7	124,2	52,8	42,9	357,3	437,6			
Bydgoskie	10,1	5,0	0,7	—	32,4	5,8	—	—	—	—	315,4	174,3	79,9	67,0	391,8	434,3			
Gdańskie	4,8	2,8	—	—	49,5	22,8	—	—	—	—	414,2	324,7	61,9	90,5	436,1	424,7			
Katowickie	1,1	1,1	—	—	33,3	4,0	—	—	1,8	—	228,0	166,7	131,9	59,1	503,9	580,0			
Kieleckie	4,7	3,3	—	0,7	4,0	50,7	—	—	8,0	2,7	92,1	124,8	54,1	68,7	410,5	250,3			
Koszalińskie	—	5,1	—	—	11,9	11,9	—	—	8,5	—	233,5	187,5	114,2	100,6	329,0	514,8			
Krakowskie	3,0	1,2	—	—	4,8	3,0	—	—	1,8	1,2	212,5	104,5	53,4	27,6	359,0	367,4			
Lubelskie	3,3	4,0	—	—	12,7	11,4	—	—	2,7	0,7	116,4	131,8	99,7	54,2	352,0	332,6			
Łódzkie	2,3	3,0	—	—	7,6	16,0	—	—	3,0	5,3	182,7	92,9	23,6	32,0	305,3	366,9			
Olsztyńskie	8,0	4,0	—	—	456,2	48,3	—	—	—	5,4	157,0	118,1	140,9	56,3	534,0	526,0			
Opolskie	13,9	3,8	—	—	2,5	—	—	—	7,6	2,5	255,9	168,5	72,2	50,7	548,6	669,0			
Poznańskie	0,6	6,0	—	—	11,4	4,2	—	—	0,6	—	162,6	73,8	66,6	63,6	265,9	430,3			
Rzeszowskie	4,5	2,3	—	—	0,7	1,5	—	—	3,0	1,5	90,4	98,7	56,5	80,6	311,2	320,3			
Szczecińskie	3,0	—	—	—	39,6	28,9	—	—	9,1	1,5	300,0	316,8	333,5	83,7	307,6	420,3			
Warszawskie	7,8	6,7	—	—	23,9	17,1	—	—	2,1	1,0	196,3	121,5	79,5	68,6	342,8	418,1			
Wrocławskie	7,8	1,9	—	5,9	46,3	22,2	—	0,6	11,7	7,8	278,5	287,0	119,5	33,9	579,1	429,1			
Zielonogórskie	—	3,0	—	1,5	39,4	36,4	—	—	1,5	—	301,7	156,2	68,2	31,8	442,7	441,2			

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Luty 1965 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	luty 1965	luty 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—II 1965	Zestawienie kumula- cyjne I—II 1964	
Dur brzuszny — 040	80	105	129	159	245	
Dury rzekome A. B. C. — 041	12	1	12	22	9	
Czerwonka 045 — 048	413	886	664	957	1 463	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 169	1 358	1 271	2 480	2 722	
Botulismus — 049	10	5	6	18	6	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	266	311	66	449	523
		inne — 049	341	253	297	541
Włośnica — 128	22	104	49	92	229	
Zakaźne zap. wątroby — 092	10 417	9 832	5 046	22 987	21 991	
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	—	—	1	—	
Błonica — 055	40	91	237	85	194	
Płonica — 050	4 514	6 730	3 963	9 294	13 944	
Odra — 085	11 805	15 733	13 899	22 296	27 368	
Krzusiec — 056	1 486	2 285	2 879	3 177	5 442	
Zap. przyusz. nagm. — 089	17 147	10 014	7 839	31 230	19 339	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	64	67	65	143	129	
Grypa 480 — 483	302 864	9 244	76 573	310 225	18 038	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	11	10	9	19	18	
Zimnica 110 — 117	1	1	—	1	2	
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—	
Choroba Banga — 044	3	5	5	9	13	
Tężec — 061	11	10	8	17	25	
Róża — 052	137	204	127	319	475	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Marzec 1965 r.

EGZ. NR

000233

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna w marcu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 3,9 — III/1964 do 2,1 — III/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Gdańskim — 5,3; Olsztyńskim — 5,0; Białostockim — 4,1; Warszawskim — 3,9; Bydgoskim — 3,2 i Wrocławskim — 3,0. W marcu br. nie zgłoszono zachorowań z terenu m. st. Warszawy, m. Poznania, woj. Opolskiego i Zielonogórskiego. W marcu br. ognisk epidemicznych nie notowano. W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 3,2 — II/1965 do 2,1 — III/1965.

### 2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 4 zachorowania sporadyczne.

### 3. Czerwonka

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się nieznaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 16,5 — III/1964 do 16,3 — III/1965.

W marcu br. wyższe wskaźniki od krajowego (16,3) wystąpiły na terenie 11 województw; w tym najwyższe w woj. Łódzkim — 60,2; Zielonogórskim — 48,2; Koszalińskim — 47,8; m. st. Warszawie — 41,2 i Szczecińskim — 31,4. W miesiącu sprawozdawczym najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Rzeszowskim — 0,7; Opolskim — 1,2; Poznańskim — 1,4; m. Wrocławiu — 2,5 i woj. Krakowskim — 3,3. W lutym br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 16,7.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań. W marcu 1964 r. miały miejsce 3 zachorowania.

W lutym br. zgłoszono 1 zachorowanie.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W marcu br. zgłoszono z terenu całej Polski 8907 zachorowań. W tym samym okresie r. ub. zgłoszono 8540 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 86,5% chorych. Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z marcem r. ub. z 323,6 — III/1964 do 337,5 — III/1965. Wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do marca 1964 r. notuje się w 13 województwach; w tym znaczny wzrost obserwuje się w m. Poznaniu (213,3 — III/1964; 371,9 — III/1965), woj. Koszalińskim (334,9 — III/1964; 480,0 — III/1965), Poznańskim (240,9 — III/1964; 384,6 — III/1965), Opolskim (419,6 — II/1964; 522,8 — III/1965), Szczecińskim (227,3 — III/1964; 323,1 — III/1965) i Katowickim (365,0 — III/1964; 456,9 — III/1965). W marcu br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Opolskim — 522,8; Koszalińskim — 480,0; Katowickim — 456,9; Olsztyńskim — 426,8; Wrocławskim — 397,2; m. Łodzi — 385,9 i woj. Poznańskim — 384,6. Natomiast najniższe w woj. Kieleckim — 176,7; m. Krakowie — 231,9 i m. st. Warszawie — 237,6.

W lutym br. krajowy wskaźnik wynosił — 421,9.



## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W marcu br. zgłoszono 29 zachorowań; w tym najwyższe liczby przypadków zgłoszono z woj. Krakowskiego — 6 (pow. Bochnia 3, pow. Kraków 1, pow. Nowy Targ 1, miasto Tarnów 1), Szczecińskiego — 5 (miasto Szczecin 4, pow. Pyrzyce 1) i Wrocławskiego — 5 (pow. Kłodzko 2, pow. Dzierżonów 1, pow. Bolesławiec 1, pow. Zgorzelec 1). W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z terenu 10 województw.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do marca 1964 r. z 3,5 — III/1964 do 1,1 — III/1965.

W lutym br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 1,6.

### 2. Płonica

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem 1964 r. z 261,3 — III/1964 do 183,9 — III/1965.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem 1964 r. notuje się w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Łodzi, m. Poznaniu, m. Wrocławiu, woj. Gdańskim, Opolskim, Poznańskim i Zielonogórskim. W marcu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 554,4; m. Wrocławiu — 451,3; m. st. Warszawie — 446,6; m. Łodzi — 312,2; woj. Gdańskim — 293,3; Wrocławskim — 272,1 i Szczecińskim — 266,0.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 182,8.

### 3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do marca 1964 r. z 83,5 — III/1964 do 63,1 — III/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. obserwuje się w woj. Szczecińskim, Wrocławskim, Koszalińskim, Katowickim, m. Łodzi i m. st. Warszawie. W marcu br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 12 województw; w tym najwyższe w m. Poznaniu — 164,1; woj. Gdańskim — 128,9; m. Krakowie — 116,0; woj. Rzeszowskim — 96,6 i Lubelskim — 91,4.

W lutym br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił 60,2.

ZACHOROWANIA N (CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Wiegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicze nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
	Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045-048	571, 754	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	43- 483	103- 102	110- 117	094	044	061
POLSKA	1964	3	436	1329	7	316	350	64	8540	3	92	6897	16911	2205	10458	71	21459	4	—	—	11	10	192
	1965	57	4	431	1325	10	230	294	30	8507	—	29	4854	12793	1666	19403	76	449859	6	—	—	6	5
M. st. Warszawa	—	—	43	23	—	27	29	—	248	—	—	466	1002	88	2484	18	83112	1	—	—	—	—	9
M. Kraków	1	—	5	—	—	—	5	—	100	—	1	239	433	50	586	1	31595	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	1	—	8	64	—	—	22	1	241	—	1	195	814	20	541	—	40956	—	—	—	—	—	14
M. Poznań	—	—	6	6	—	7	1	—	106	—	—	80	344	60	513	3	5030	—	—	—	—	—	—
M. Wrocław	1	—	1	14	1	14	19	—	126	—	—	178	120	26	719	—	2412	—	—	—	—	—	6
Białostockie	4	1	24	61	—	—	2	2	332	—	1	114	617	50	392	2	9624	3	—	—	1	—	5
Bydgoskie	5	—	10	69	2	2	7	—	425	—	—	224	644	90	1358	7	28705	—	—	—	—	—	11
Gdańskie	6	—	32	78	3	2	56	18	416	—	—	330	964	145	1410	—	26062	—	—	—	—	—	20
Katowickie	6	—	20	164	—	37	—	—	1347	—	2	545	2154	131	2263	—	41856	—	—	—	—	—	4
Kieleckie	2	—	23	50	—	1	2	—	283	—	2	168	160	58	573	6	19135	1	—	—	—	—	4
Koszalińskie	1	—	30	105	—	10	2	4	301	—	2	120	171	53	408	4	28279	—	—	—	—	—	8
Krakowskie	2	—	6	63	—	—	3	—	551	—	6	241	534	42	1004	15	14804	—	—	—	—	1	4
Lubelskie	1	1	18	52	—	36	5	—	455	—	1	197	667	146	1051	3	3423	—	—	—	1	—	7
Łódzkie	2	—	10	107	—	1	7	—	396	—	2	162	567	55	794	1	14354	—	—	—	—	—	7
Olsztyńskie	4	—	48	58	—	1	8	—	340	—	—	118	292	53	611	3	19352	—	—	—	2	—	8
Opolskie	—	—	1	49	—	—	—	—	441	—	—	126	341	41	357	—	5699	—	—	—	—	1	5
Poznańskie	4	—	3	38	3	4	10	—	685	—	—	151	532	117	505	2	4921	—	—	—	1	—	2
Rzeszowskie	3	—	1	37	—	—	19	—	376	—	1	175	374	137	703	1	6171	—	—	—	—	1	4
Szczecińskie	1	—	22	32	1	24	18	—	228	—	5	186	361	50	506	3	25433	—	—	—	—	1	7
Warszawskie	8	—	36	139	—	33	4	5	569	—	—	292	661	159	935	3	29803	—	—	—	—	—	5
Wrocławskie	5	2	45	82	—	7	75	—	651	—	5	446	765	65	1385	4	2631	—	—	—	1	1	11
Zielonogórskie	—	—	34	29	—	24	—	—	260	—	—	101	276	30	305	—	1457	1	—	—	—	—	—

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

## CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965			1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	3,9	2,1	0,1	0,1	16,5	16,3	0,1	—	3,5	1,1	261,3	183,9	83,5	63,1	323,6	337,5
M. st. Warszawa	4,8	—	—	—	39,3	41,2	—	—	0,9	—	1000,5	446,6	133,2	84,3	425,5	237,6
M. Kraków	2,3	2,3	—	—	6,9	11,6	—	—	9,3	2,3	932,4	554,4	155,4	116,0	283,0	231,9
M. Łódź	1,6	1,6	—	—	12,8	12,8	—	—	3,2	1,6	595,6	312,2	158,5	32,0	398,7	385,9
M. Poznań	2,7	—	—	—	19,1	16,4	—	—	—	—	492,3	218,8	109,4	164,1	213,3	371,9
M. Wrocław	—	2,5	—	—	2,5	2,5	—	—	2,5	—	745,5	451,3	78,6	65,9	377,8	319,5
Białostockie	7,2	4,1	1,0	1,0	33,9	24,7	1,0	—	4,1	1,0	165,5	117,2	27,8	51,4	286,9	341,4
Bydgoskie	11,7	3,2	—	—	26,7	6,5	—	—	—	—	224,4	145,7	91,7	58,5	314,8	276,5
Gdańskie	5,3	5,3	0,9	—	26,7	28,4	0,9	—	4,4	—	465,7	293,3	66,6	128,9	306,6	369,7
Katowickie	1,3	2,0	—	—	6,8	6,8	—	—	1,0	0,7	219,1	184,9	97,0	44,4	365,0	456,9
Kieleckie	6,2	1,2	—	—	2,5	17,5	—	—	8,7	1,2	89,3	104,9	55,6	36,2	304,7	176,7
Koszalińskie	3,2	1,6	—	—	6,4	47,8	—	—	8,0	3,2	159,5	191,4	132,4	84,5	334,9	480,0
Krakowskie	2,2	1,1	—	—	7,2	3,3	—	—	5,0	3,3	186,4	133,3	48,1	23,2	274,8	304,7
Lubelskie	3,1	0,6	—	0,6	16,3	11,3	—	—	2,5	0,6	108,3	123,3	82,6	91,4	278,0	284,9
Łódzkie	0,7	1,4	0,7	—	9,2	7,1	—	—	2,1	1,4	139,6	115,4	19,9	39,2	219,3	282,0
Olsztyńskie	3,8	5,0	—	—	59,0	60,2	—	—	—	—	111,7	148,1	70,3	66,5	487,0	426,8
Opolskie	7,1	—	—	—	—	1,2	—	—	7,1	—	251,3	149,4	88,9	48,6	419,6	522,8
Poznańskie	3,4	2,2	—	—	4,5	1,4	—	—	0,6	—	195,4	84,8	82,0	65,7	240,9	384,6
Rzeszowskie	1,4	2,1	—	—	1,4	0,7	—	—	4,9	0,7	105,7	123,3	63,4	96,6	234,0	265,0
Szczecińskie	—	1,4	—	—	27,2	31,4	—	—	4,3	7,1	321,7	266,0	201,6	71,5	227,3	323,1
Warszawskie	8,3	3,9	—	—	17,5	17,5	—	—	3,4	—	155,0	141,9	83,6	77,2	354,7	276,5
Wrocławskie	1,2	3,0	—	1,2	34,8	27,4	0,6	—	5,5	3,0	282,5	272,1	91,5	39,6	451,5	397,2
Zielonogórskie	1,4	—	—	—	32,6	48,2	—	—	5,7	—	246,8	143,2	72,3	42,5	327,6	368,9

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.


Marzec 1965 r.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Marzec 1965	Marzec 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—III, 1965	Zestawienie kumula- cyjne I—III, 1964
Dur brzuszny — 040	57	102	155	216	347
Dury rzekome A. B. C. — 041	4	3	10	26	12
Czerwonka 045 — 048	431	436	674	1 388	1 899
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 325	1 329	1 342	3 805	4 051
Botulismus — 049	10	7	11	28	13
Zatrucia pokarmowe {					
Inne — 049	294	390	329	835	871
Włośnica — 128	30	64	52	122	293
Zakaźne zap. wątroby — 092	8 907	8 540	4 413	31 894	30 531
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	3	2	1	3
Błonica — 055	29	92	230	114	286
Płonica — 050	4 854	6 897	5 019	14 248	20 841
Odra — 085	12 793	16 911	29 780	35 039	44 279
Krztusiec — 056	1 666	2 205	2 857	4 843	7 647
Zap. przyusz. nagm. — 089	19 403	10 458	8 894	50 633	29 797
Zapalenie opon mózgo.-rdzen. nagminne — 057	76	71	69	219	200
Grypa 480 — 483	449 859	21 459	82 672	760 084	39 497
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100 — 102	6	4	11	25	22
Zimnica 110 — 117	—	—	—	1	2
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	—
Choroba Banga — 044	6	11	7	15	24
Teżec — 061	5	10	9	22	35
Róża — 052	143	192	165	462	667

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Kwiecień 1965 r.

EGZ. NR 000211

Do użytku służbowego

# Sytuacja epidemiologiczna w kwietniu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 5,0—IV/1964 do 2,1—IV/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w m. Poznaniu — 5,5; woj. Gdańskim — 4,4; Opolskim — 3,5; Warszawskim — 3,4; m. Łodzi — 3,2 i Lubelskim — 3,1. W kwietniu br. nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Krakowa, woj. Koszalińskiego, Olsztyńskiego i Rzeszowskiego.

W marcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 2,1.

### 2. Dury rzekome

W kwietniu br. zgłoszono z terenu całego kraju 10 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem 1964 r. z 19,7—IV/1964 do 21,0—IV/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z kwietniem r. ub. zanotowano w woj. Koszalińskim (17,5—IV/1964; 177,0—IV/1965) i m. st. Warszawie (33,5—IV/1964; 66,1—IV/1965). W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (21,0) wystąpiły w następujących województwach:

Koszalińskim	— 177,0
m. st. Warszawie	— 66,1
Olsztyńskim	— 55,2
Gdańskim	— 53,3
Zielonogórskim	— 41,1
Warszawskim	— 31,1
Wrocławskim	— 26,2

Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia. W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 16,3—III/1965 do 21,0—IV/1965.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań.

W kwietniu 1964 r. nie notowano zachorowań.

W poprzedzającym miesiącu również nie zgłoszono zachorowań.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W kwietniu br. zgłoszono z terenu całej Polski 6 428 zachorowań.

W tym samym okresie r. ub. zgłoszono 7 927 zachorowań.

W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 90,2% chorych.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z kwietniem r. ub. z 300,3—IV/1964 do 243,5—IV/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do kwietnia 1964 r. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, woj. Koszalińskiego, Poznańskiego i Rzeszowskiego. Wyższe wskaźniki od krajowego wystąpiły na terenie 9 województw; z tego najwyższe zanotowano w woj. Katowickim — 374,8; Opolskim — 373,4; Koszalińskim — 334,9 i m. Łodzi — 323,4.

W marcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 337,5.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W kwietniu zgłoszono 36 zachorowań; z tego najwyższe liczby zachorowań zgłoszono z woj. Krakowskiego — 12 (pow. Nowy Targ 3, m. Tarnów 3, m. Zakopane 2, pow. Tarnów 1, m. Jaworzno 1, pow. Brzesko 1, pow. Bochnia 1) i 7 zachorowań z woj. Wrocławskiego (m. Wałbrzych 2, pow. Wałbrzych 1, pow. Kłodzko 1, pow. Dzierżoniów 1, pow. Złotoryja 1, pow. Bolesławiec 1). W miesiącu sprawozdawczym nie zgłoszono zachorowań z terenu 12 województw.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 1,7—IV/1964 do 1,4—IV/1965. W kwietniu br. najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Krakowskim — 6,6; Wrocławskim — 4,3; Opolskim — 3,5 i Szczecińskim — 2,8.

W marcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,1.

### 2. Płonica

W porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 213,2—IV/1964 do 125,1—IV/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności zanotowano w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Łodzi, m. Poznaniu, m. Wrocławiu, woj. Gdańskim i Szczecińskim. W kwietniu br. wyższe wskaźniki od krajowego wystąpiły na terenie 10 województw; z tego najwyższe zanotowano w m. Krakowie — 470,8; m. st. Warszawie — 368,9; m. Wrocławiu — 248,5; m. Łodzi — 204,9; woj. Wrocławskim — 181,2; Szczecińskim — 167,3 i Gdańskim — 157,3. Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Poznańskim — 56,1 i Kieleckim — 58,1.

W marcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 183,9.

### 3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem 1964 r. z 91,7—IV/1964 do 65,2—IV/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się w m. Łodzi, m. Wrocławiu, woj. Koszalińskim, Szczecińskim, Katowickim i Wrocławskim. W kwietniu br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Gdańskim — 191,1; m. st. Warszawie — 164,8; m. Poznaniu — 144,9; m. Krakowie — 120,6 i Szczecińskim — 95,8.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 63,1.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Pollomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045—048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480—483	100—102	110—117	094	044	061	052
POLSKA	1964	131	3	519	1467	10	257	311	29	7927	—	46	5628	16500	2420	9423	86	611113	16	3	1	5	21	198
	1965	57	10	555	1435	16	291	206	39	6428	—	36	3301	11644	1720	14096	95	44700	10	2	—	6	11	142
M. st. Warszawa	3	—	69	23	—	23	16	1	240	—	—	385	1147	172	1684	18	1929	1	—	—	—	—	—	11
M. Kraków	—	—	4	—	—	—	6	—	86	—	—	203	407	52	516	—	4701	—	—	—	—	—	—	—
M. Łódź	2	—	7	57	—	2	13	—	202	—	—	128	517	10	401	—	6572	—	—	—	—	—	—	10
M. Poznań	2	—	1	2	1	7	1	—	84	—	—	40	413	53	350	1	275	2	—	—	—	—	—	2
M. Wrocław	1	—	—	26	—	6	23	—	99	—	—	98	90	18	562	—	49	—	—	—	—	—	—	5
Białostockie	2	2	19	65	—	7	2	25	222	—	2	69	534	45	161	3	961	1	—	—	4	—	—	8
Bydgoskie	3	—	13	65	7	27	19	—	310	—	—	143	665	84	990	8	897	1	—	—	—	—	—	17
Gdańskie	5	—	60	86	—	4	24	12	270	—	—	177	1128	215	868	3	471	—	1	—	—	—	—	7
Katowickie	7	—	12	200	—	42	2	—	1105	—	—	375	1602	148	1418	4	3582	—	—	—	—	—	—	3
Kieleckie	3	—	21	34	—	1	5	—	184	—	—	94	136	53	467	5	2484	1	—	—	—	—	1	6
Koszalińskie	—	—	111	115	—	4	1	—	210	—	1	83	83	46	487	3	717	—	—	—	—	—	—	1
Krakowskie	2	—	6	29	—	—	21	—	348	—	12	180	453	47	604	10	5742	1	—	—	—	—	2	6
Lubelskie	5	—	23	46	—	35	10	—	317	—	3	124	434	83	596	6	790	—	—	—	—	—	1	7
Łódzkie	2	—	8	77	4	2	15	—	290	—	3	127	542	39	782	1	2399	—	—	—	—	—	—	7
Olsztyńskie	—	—	44	117	—	8	9	—	215	—	—	71	221	59	342	12	621	—	1	—	—	—	—	10
Opolskie	3	—	1	41	—	—	—	—	315	—	3	120	401	66	400	6	576	—	—	—	—	—	—	1
Poznańskie	3	3	4	73	—	25	—	1	455	—	—	100	361	85	259	—	1623	—	—	—	1	—	—	10
Rzeszowskie	—	1	2	19	—	—	—	—	309	—	1	112	304	109	641	7	4628	—	—	—	—	—	4	4
Szczecińskie	1	—	14	31	—	15	21	—	171	—	2	117	758	67	486	2	414	—	—	—	—	—	1	6
Warszawskie	7	1	64	188	—	44	4	—	409	—	2	176	545	180	752	3	3877	1	—	—	—	—	—	10
Wrocławskie	4	3	43	105	3	7	14	—	429	—	7	297	677	30	1009	2	482	2	—	—	—	—	1	11
Zielonogórskie	2	—	29	36	1	32	—	—	158	—	—	82	226	59	321	1	910	—	—	—	1	1	—	—

\*) Liczby bezwzględne



## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965			1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	5,0	2,1	0,1	0,4	19,7	21,0	—	—	1,7	1,4	213,2	125,1	91,7	65,2	300,3	243,5
M. st. Warszawa	5,7	2,9	—	—	33,5	66,1	—	—	—	—	818,4	368,9	201,2	164,8	333,5	230,0
M. Kraków	9,3	—	—	—	27,8	9,3	—	—	13,9	—	642,5	470,8	194,8	120,6	187,9	199,5
M. Łódź	6,4	3,2	—	—	22,4	11,2	—	—	—	—	480,3	204,9	203,3	16,0	406,7	323,4
M. Poznań	5,5	5,5	—	—	19,1	2,7	—	—	—	—	355,5	109,4	120,3	144,9	268,0	229,7
M. Wrocław	—	2,5	—	—	2,5	—	—	—	—	—	489,4	248,5	131,8	45,6	314,4	251,0
Białostockie	7,2	2,0	1,0	2,0	30,8	19,5	—	—	—	2,0	146,0	70,9	28,8	46,3	293,1	228,3
Bydgoskie	8,4	1,9	—	—	26,0	8,4	—	—	—	—	137,5	93,0	99,5	54,6	340,9	201,6
Gdańskie	7,1	4,4	0,9	—	44,4	53,3	—	—	0,9	—	363,5	157,3	131,5	191,1	319,9	239,9
Katowickie	2,4	2,4	—	—	4,4	4,1	—	—	0,3	—	166,7	127,2	99,4	50,2	381,3	374,8
Kieleckie	1,9	1,9	—	—	7,5	13,1	—	—	3,7	—	64,3	58,7	66,2	33,1	212,3	114,9
Koszalińskie	1,6	—	—	—	17,5	177,0	—	—	6,4	1,6	151,5	132,4	156,3	73,4	299,8	334,9
Krakowskie	2,2	1,1	—	—	12,3	3,3	—	—	2,2	6,6	182,5	99,5	52,0	26,0	235,0	192,4
Lubelskie	5,0	3,1	—	—	21,9	14,4	—	—	1,9	1,9	110,2	77,6	83,3	52,0	236,7	198,5
Łódzkie	2,1	1,4	—	—	17,1	5,7	—	—	0,7	2,1	135,3	90,4	14,2	27,8	209,4	206,5
Olsztyńskie	7,5	—	—	—	52,7	55,2	—	—	—	—	91,6	89,1	77,8	74,0	367,8	269,9
Opolskie	1,2	3,5	—	—	1,2	1,2	—	—	—	3,5	173,1	142,2	55,7	78,2	394,7	373,4
Poznańskie	1,7	1,7	0,6	1,7	9,0	2,2	—	—	0,6	—	127,5	56,1	53,3	47,7	197,1	255,5
Rzeszowskie	6,3	—	—	0,7	0,7	1,4	—	—	1,4	0,7	93,0	78,9	64,1	76,8	213,6	217,8
Szczecińskie	4,3	1,2	—	—	37,2	20,0	—	—	2,8	2,8	357,5	167,3	268,8	95,8	251,7	244,5
Warszawskie	18,5	3,4	—	0,5	25,3	31,1	—	—	1,9	1,0	150,1	85,5	116,1	87,5	376,1	198,7
Wrocławskie	—	2,4	—	1,8	25,0	26,2	—	—	4,9	4,3	266,0	181,2	45,7	18,3	373,4	261,7
Zielonogórskie	1,4	2,8	—	—	48,2	41,1	—	—	4,2	—	217,0	116,3	46,8	83,7	371,6	224,1

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Kwiecień 1965 r.


Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Kwiecień 1965	Kwiecień 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—IV 1965	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—IV 1964	
Dur brzuszny — 040	57	131	164	273	478	
Dury rzekome A. B. C. — 041	10	3	11	36	15	
Czerwonka 045 — 048	555	519	680	1 943	2 418	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 435	1 467	1 457	5 240	5 518	
Botulismus — 049	16	10	11	44	23	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonelloza 042	291	257	97	970	1 096
		inne — 049	206	311	411	1 041
Włośnica — 128	39	29	31	161	322	
Zakaźne zap. wątroby — 092	6 428	7 927	3 501	38 322	38 458	
Porażenie dziec. nagm. — 080	—	—	5	1	3	
Błonica — 055	36	46	233	150	332	
Płonica — 050	3 301	5 628	4 791	17 549	26 469	
Odra — 085	11 644	16 500	15 792	46 733	60 779	
Krzusiec — 056	1 720	2 420	2 587	6 563	10 067	
Zap. przyusz. nagm. — 089	14 096	9 423	7 180	64 729	39 220	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	95	86	72	314	286	
Grypa 480 — 483	44 700	611 113	60 233	804 784	650 610	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	10	16	12	35	38	
Zimnica 110 — 117	2	3	—	3	5	
Wścieklizna — 094	—	1	—	—	1	
Choroba Banga — 044	6	5	6	21	29	
Tężec — 061	11	21	18	33	56	
Róża — 052	142	198	170	604	865	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

CDW Cieszyn 1504/65 260 egz. F-020

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Maj 1965 r.

EGZ. NR 000023

Do użytku służbowego

# Sytuacja epidemiologiczna w maju 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 3,4—V/1964 do 2,3—V/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Warszawskim — 7,3; m. st. Warszawie — 3,8; Opolskim — 3,5; m. Łodzi — 3,2; i woj. Kieleckim — 3,1. Nie zgłoszono zachorowań z terenu Krakowa, m. Poznania, woj. Olsztyńskiego i Zielonogórskiego.

W maju ognisk epidemicznych nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się niewielki wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 2,1—IV/1965 do 2,3—V/1965.

### 2. Dury rzekome

W maju zgłoszono z terenu całego kraju 17 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 28,3—V/1964 do 19,4—V/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z majem 1964 r. notuje się w następujących województwach:

m. st. Warszawa	200,3—V/1964;	56,5—V/1965
woj. Wrocławskie	59,8—V/1964;	15,2—V/1965
m. Kraków	30,1—V/1964;	9,3—V/1965
woj. Krakowskie	26,5—V/1964;	5,0—V/1965
woj. Białostockie	39,1—V/1964;	15,4—V/1965
m. Łódź	33,6—V/1964;	17,6—V/1965

W maju br. wyższe wskaźniki od krajowego (19,4) wystąpiły w woj. Olsztyńskim — 109,2; Gdańskim — 80,0; m. st. Warszawie — 56,5; woj. Szczecińskim — 40,0; Zielonogórskim — 39,7; Koszalińskim — 22,3 i Warszawskim — 20,4. Natomiast najniższe w woj. Rzeszowskim — 1,4; Poznańskim — 3,9; Katowickim — 3,7 i Krakowskim — 5,0.

### 4. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba ognisk zbiorowych zatruc pokarmowych w maju br. kształtuje się w liczbie — 42, o łącznej liczbie chorych w tych ogniskach 967 osób; z tego do większych ognisk należy zaliczyć: woj. Łódzkie, pow. Radomsko zanotowano 300 przypadków Salmonelloz. Zachorowania wystąpiły po spożyciu kiszki podgarlanej, wyprodukowanej w GS w Kłomnicach. Badania laboratoryjne wykazały, że przyczyną zatruc były pałeczki *Salmonella* *bovis* *morbificans*.

### 5. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Krakowskiego, pow. Oświęcim (data zach. 12. V. 1965 r.).

W maju 1964 miały miejsce 2 zachorowania.

W poprzedzającym miesiącu nie zgłoszono zachorowań.

### 6. Zakaźne zapalenie wątroby

W maju br. zgłoszono 6176 zachorowań. W tym samym okresie 1964 r. zgłoszono 5813 zachorowań. W miesiącu sprawozdawczym hospitalizowano 92,4% chorych.

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z majem 1964 r. z 220,2—V/1964 do 234,0—V/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności obserwuje się w woj. Poznańskim (151,0—V/1964; 263,3—V/1965), Opolskim (267,9—V/1964; 360,4—V/1965), Kaszalińskim (213,7—V/1964; 322,1—V/1965), Łódzkim (136,7—V/1964; 201,5—V/1965), m. Wrocławiu (192,7—V/1964; 253,6—V/1965) i Gdańskim (219,5—V/1964; 271,9—V/1965). Wyższe wskaźniki od krajowego (234,0) notuje się na terenie 12 województw; z tego najwyższe w woj. Opolskim — 360,4; Koszalińskim — 322,1; m. Łodzi — 321,8; woj. Katowickim — 313,4; m. Poznaniu 289,9; woj. Wrocławskim — 275,1; Gdańskim — 271,9 i Poznańskim — 263,3. Najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Kieleckim — 116,1; Białostockim — 163,5; Rzeszowskim — 167,8 i m. st. Wrszawie — 164,8.

W kwietniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 243,5.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W maju zgłoszono 44 zachorowania, z tego najwyższe liczby przypadków zgłoszono z woj. Wrocławskiego — 9 (pow. Dzierżoniów — 4, pow. Kłodzko — 2, pow. Bolesławiec — 1, pow. Nowa Ruda — 1, pow. Wałbrzych — 1), Krakowskiego — 8 (pow. Nowy Targ — 2, pow. Tarnów — 2, pow. Bochnia — 1, pow. Brzesko — 1, pow. Oświęcim — 1, m. Zakopane — 1) Kieleckiego — 5 (pow. Kielce — 2, pow. Szydłowiec — 2, pow. Włoszczowa — 1) i Łódzkiego — 5 (pow. Łask — 4, pow. Łęczyca — 1).

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 2,7—V/1964 do 1,7—V/1965. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 8 województw; z tego najwyższe w woj. Wrocławskim — 5,5; m. Łodzi — 4,8; m. Krakowie — 4,6 i woj. Krakowskim — 4,4.

W kwietniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,4.

### 2. Płonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z majem 1964 r. ze 143,4—V/1964 do 119,4—V/1965. W maju br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 366,5; m. st. Warszawie — 291,3; m. Wrocławiu — 233,3; woj. Zielonogórskim — 218,4, m. Łodzi — 192,1; woj. Gdańskim — 174,2 i Wrocławskim — 166,5.

W kwietniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 125,1.

### 3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 86,3—V/1964 do 74,4—V/1965. Mimo spadku krajowego wskaźnika zapadalności, w 7 województwach notuje się wzrost, z tego znaczny wzrost obserwuje się w woj. Gdańskim (68,4—V/1964; 251,5—V/1965), m. Poznaniu (155,9—V/1964; 259,8—V/1965) i woj. Rzeszowskim (58,5—V/1964; 102,2—V/1965). W maju br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Poznaniu — 259,8; woj. Gdańskim — 251,1; m. Krakowie — 153,1; m. st. Warszawie — 124,6; woj. Szczecińskim — 121,5 i Rzeszowskim — 102,2.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 65,2.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior <i>acuta</i>	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyszcznic nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045-048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480- 483	100- 102	110- 117	094	044	061	052
POLSKA	1964	7	748	1518	35	261	731	4	5813	2	72	3786	13694	2279	6779	68	92868	6	4	—	4	30	163
	1965	61	17	511	1981	656	561	27	6176	1	44	3152	12912	1964	11328	101	7194	10	—	—	14	15	135
M. st. Warszawa	4	—	59	42	—	12	18	1	172	—	—	304	1083	130	981	15	15	—	—	—	1	—	5
M. Kraków	—	—	4	4	—	1	71	—	82	—	2	158	422	66	573	—	6	—	—	—	—	1	2
M. Łódź	2	—	11	71	—	1	18	—	201	—	3	120	482	15	329	—	2280	—	—	—	—	—	13
M. Poznań	—	—	2	8	—	2	7	—	106	—	1	36	604	95	411	—	23	—	—	—	—	—	2
M. Wrocław	1	—	—	6	—	5	23	—	100	—	—	92	133	13	369	—	50	1	—	—	—	—	9
Białostockie	1	5	15	103	—	6	7	5	159	—	1	64	486	30	188	3	184	1	—	—	6	—	—
Bydgoskie	2	1	24	86	4	26	40	—	321	—	—	110	751	73	587	9	169	—	—	—	1	2	7
Gdańskie	2	—	90	94	—	9	93	2	306	—	—	196	1000	283	607	3	65	—	—	—	2	—	15
Katowickie	3	—	11	209	—	59	4	—	924	—	2	411	1780	160	1393	6	1166	2	—	—	—	2	2
Kieleckie	5	1	14	56	—	—	7	1	186	—	5	84	239	53	391	6	327	—	—	—	—	2	4
Koszalińskie	1	—	14	209	3	12	12	—	202	—	—	77	72	26	325	5	146	—	—	—	—	—	1
Krakowskie	5	—	9	40	—	6	6	—	386	1	8	162	431	81	642	12	809	—	—	—	—	1	7
Lubelskie	3	2	19	75	—	30	15	1	357	—	3	136	450	116	443	7	225	4	—	—	1	1	8
Łódzkie	2	3	15	131	1	307	20	17	283	—	5	110	492	39	747	2	398	—	—	—	—	2	5
Olsztyńskie	—	—	87	125	—	6	12	—	204	—	—	59	272	75	321	8	76	—	—	—	—	—	4
Opolskie	3	—	5	68	—	—	4	—	304	—	1	119	414	73	390	6	132	—	—	—	—	—	6
Poznańskie	2	1	7	132	8	3	106	—	469	—	—	103	430	90	191	2	189	—	—	—	3	—	7
Rzeszowskie	4	3	2	82	—	—	—	—	238	—	2	118	362	145	457	9	366	—	—	—	—	3	6
Szczecińskie	2	—	28	26	1	23	32	—	166	—	—	88	1337	85	407	2	42	—	—	—	—	—	9
Warszawskie	15	—	42	218	—	74	12	—	387	—	2	178	614	197	603	—	101	1	—	—	—	—	9
Wrocławskie	4	1	25	165	5	43	47	—	451	—	9	273	671	71	815	5	215	—	—	—	—	1	8
Zielonogórskie	—	—	28	31	1	31	7	—	172	—	—	154	387	48	158	1	210	1	—	—	—	—	6

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA WIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenia wątroby Hepatitis epidemicna		
	040		041		045—048		080			055		056		092		
Numery klasyfik. międzynarodowej	040		041		045—048		080		055		050		056		092	
R o k	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	3,4	2,3	0,3	0,6	28,3	19,4	0,07	0,04	2,7	1,7	143,4	119,4	86,3	74,4	220,2	234,0
M. st. Warszawa	2,9	3,8	0,9	—	200,3	56,5	—	—	—	—	462,8	291,3	156,2	124,6	256,8	164,8
M. Kraków	2,3	—	—	—	30,1	9,3	—	—	2,3	4,6	538,1	366,5	180,9	153,1	153,1	190,2
M. Łódź	1,6	3,2	—	—	33,6	17,6	—	—	—	4,8	294,6	192,1	126,5	24,0	309,0	321,8
M. Poznań	2,7	—	—	—	5,5	5,5	—	—	5,5	2,7	153,1	98,4	155,9	259,8	270,7	289,9
M. Wrocław	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	2,5	—	380,3	233,3	144,5	33,0	192,7	253,6
Białostockie	9,2	1,0	2,0	5,1	39,1	15,4	—	—	1,0	1,0	51,4	65,8	33,9	30,8	151,2	163,5
Bydgoskie	5,2	1,3	—	0,6	22,1	15,6	—	—	0,6	—	90,4	71,5	84,6	47,5	238,1	208,8
Gdańskie	0,9	1,8	—	—	41,8	80,0	—	—	2,7	—	198,2	174,2	68,4	251,5	219,5	271,9
Katowickie	1,0	1,0	—	—	3,4	3,7	0,3	—	—	0,7	117,0	139,4	81,1	54,3	298,8	313,4
Kieleckie	3,1	3,1	—	0,6	1,2	8,7	—	—	5,6	3,1	43,7	52,4	91,2	33,1	136,1	116,1
Koszalińskie	—	1,6	1,6	—	20,7	22,3	—	—	12,7	—	76,5	122,8	95,7	41,5	213,7	322,1
Krakowskie	3,3	2,8	—	—	26,5	5,0	—	0,5	5,5	4,4	137,7	89,6	57,5	47,8	183,0	213,4
Lubelskie	3,1	1,9	—	1,2	15,0	11,9	—	—	3,1	1,9	73,9	85,1	114,6	72,6	182,2	223,5
Łódzkie	2,1	1,4	—	2,1	10,7	10,7	—	—	1,4	3,6	101,1	78,3	21,4	27,8	136,7	201,5
Olsztyńskie	5,0	—	—	—	48,2	109,2	—	—	—	—	60,2	74,0	70,3	94,1	321,3	256,1
Opolskie	—	3,5	—	—	1,2	5,9	—	—	2,4	1,2	126,8	141,1	66,4	86,5	267,9	360,4
Poznańskie	2,2	1,1	1,1	0,6	5,0	3,9	—	—	—	—	79,2	57,8	73,5	50,5	151,0	263,3
Rzeszowskie	1,4	2,8	—	—	0,7	1,4	0,7	—	4,2	1,4	83,9	83,2	58,5	102,2	145,9	167,8
Szczecińskie	4,3	2,8	—	—	54,3	40,0	—	—	1,4	—	258,8	125,8	175,9	121,5	248,8	237,4
Warszawskie	11,7	7,3	0,5	—	28,2	20,4	—	—	1,9	1,0	106,4	86,5	116,1	95,7	253,1	188,0
Wrocławskie	2,4	2,4	—	0,5	59,8	15,2	—	—	8,5	5,5	210,5	166,5	68,3	43,3	292,2	275,1
Zielonogórskie	2,8	—	—	—	39,7	39,7	—	—	2,8	—	194,3	218,4	61,0	68,1	244,0	244,0

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Maj 1965	Maj 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—V 1965	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—V 1964	
Dur brzuszny — 040	61	91	214	334	569	
Dury rzekome A. B. C. — 041	17	7	30	53	22	
Czerwonka 045 — 048	511	748	1 008	2 454	3 166	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1 981	1 518	2 068	7 221	7 036	
Botulismus — 049	23	35	55	67	58	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonelloza 042	656	261	155	1 626	1 357
	inne — 049	561	731	792	1 602	1 913
Włośnica — 128	27	4	16	188	326	
Zakaźne zap. wątroby — 092	6 176	5 813	3 726	44 498	44 271	
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	2	8	2	5	
Błonica — 055	44	72	207	194	404	
Płonica — 050	3 152	3 786	4 413	20 701	30 255	
Odra — 085	12 912	13 694	14 906	59 645	74 473	
Krzusiec — 056	1 964	2 279	3 417	8 527	12 346	
Zap. przyusz. nagm. — 089	11 328	6 779	6 309	76 057	45 999	
Zapalenie opon mózgz.-rdzen. nagminne — 057	101	68	78	415	354	
Grypa 480 — 483	7 194	92 868	17 947	811 978	743 478	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brilla 100 — 102	10	6	14	45	44	
Zimnica 110 — 117	—	4	1	3	9	
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	1	
Choroba Banga — 044	14	4	6	35	33	
Tężec — 061	15	30	31	48	86	
Róża — 052	135	163	157	739	1 028	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

CDW Cieszyn 1684/65 260 egz. F-20



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Czerwiec 1965 r.

EGZ. NR 000215

Do użytku służbowego

# Sytuacja epidemiologiczna w czerwcu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 3,6 — VI/1964 do 2,8 — VI/1965. W czerwcu br. najwyższe wskaźniki i wyższe od krajowego (2,8) notuje się w woj. Kieleckim — 10,0; Koszalińskim — 4,8; Opolskim — 4,7; Wrocławskim — 4,3; Warszawskim — 4,4; Białostockim — 4,1 i m. st. Warszawie — 3,8. Nie zgłoszono zachorowań z m. Łodzi. Natomiast najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Lubelskim — 0,6; Poznańskim — 0,6 i Rzeszowskim — 0,7.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 2,3.

### 2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono z terenu całego kraju 16 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 44,4 — VI/1964 do 21,1 — VI/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do czerwca 1964 r. ilustruje następująca tabela:

województwo	VI/1964	VI/1965
Wrocławskie	299,2	15,2
m. st. Warszawa	125,5	46,9
Warszawskie	79,2	25,3
Gdańskie	64,0	24,0
m. Łódź	48,0	9,6

Mimo znacznego spadku krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z czerwcem r. ub. — w 10 województwach notuje się wzrost; z tego, znaczny wzrost obserwuje się w woj. Opolskim (2,4 — VI/1964; 59,3 — VI/1965), Koszalińskim (20,7 — VI/1964; 68,6 — VI/1965), Zielonogórskim (25,5 — VI/1964; 69,5 — VI/1965) i Olsztyńskim (30,1 — VI/1964; 50,2 — VI/1965). W czerwcu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Zielonogórskim — 69,5; Koszalińskim — 68,6; Opolskim — 59,3; Olsztyńskim — 50,2; m. st. Warszawie — 46,9 i woj. Szczecińskim — 44,3. Natomiast najniższe w woj. Rzeszowskim — 0,7; Krakowskim — 2,8; Kieleckim — 6,2 i Poznańskim — 6,2. Nie zgłoszono zachorowań z m. Wrocławia.

W maju br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 19,4.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W czerwcu zgłoszono 2 zachorowania; z tego 1 zachorowanie z woj. Krakowskiego, pow. Cświęcim (data zach. 9. VI. 1965 r.) i 1 zachorowanie z woj. Wrocławskiego, pow. Lwówek Śląski (data zach. 13. V. 1965 r.).

W analogicznym okresie r. ub. miały miejsce 3 zachorowania.

W maju br. zgłoszono 1 zachorowanie.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się niewielki spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 222,3 — VI/1964 do 212,1 — VI/1965.

Znaczny spadek wskaźnika zapadalności wystąpił na terenie następujących województw: Zielonogórskiego, Bydgoskiego, Warszawskiego, Olsztyńskiego, m. Łodzi, m. Poznania i m. st. Warszawy. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z czerwcem 1964 r. notuje się w 8 województwach; z tego znaczny wzrost w woj. Poznańskim (163,9 — VI/1964; 265,6 — VI/1965), Koszalińskim (188,2 — VI/1964; 275,9 — VI/1965) i Katowickim (276,8 — VI/1964; 329,7 — VI/1965). W czerwcu br. najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Katowickim — 329,7; Opolskim — 307,0; m. Poznaniu — 287,2; woj. Koszalińskim — 275,9; Poznańskim — 265,6 i Wrocławskim — 261,1. Najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Kieleckim — 90,5; Warszawskim — 140,9 i Zielonogórskim — 146,1. W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się również spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 234,0 — V/1965 do 212,1 — VI/1965.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W czerwcu zgłoszono 39 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z 12 województw. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe liczby przypadków zanotowano w woj. Krakowskim — 10 (m. Tarnów — 5, pow. Miechów — 2, pow. Nowy Sącz — 2, pow. Sucha — 1), Opolskiego — 8 (pow. Prudnik — 7, m. Racibórz — 1), Kieleckiego — 5 (m. Ostrowiec — 3, pow. Kielce — 2) i Wrocławskiego — 5 (powiaty: Bolesławiec — 1, Lwówek Śląski — 1, Jelenia Góra — 1, Kłodzko — 1, Wałbrzych — 1).

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z czerwcem 1964 r. z 1,7 — VI/1964 do 1,5 — VI/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki i wyższe od krajowego wystąpiły w województwach: Opolskim — 9,5; Krakowskim — 5,5; Kieleckim — 3,1; Wrocławskim — 3,0 i Łódzkim — 2,1.

W maju br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,7.

### 2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do czerwca r. ub. ze 138,1 — VI/1964 do 106,0 — VI/1965. Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Bydgoskiego, Katowickiego, Koszalińskiego, Olsztyńskiego i Rzeszowskiego. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. Krakowie — 292,2; m. st. Warszawie — 245,1; m. Łodzi — 187,3; woj. Szczecińskim — 178,7; m. Wrocławiu — 157,2; woj. Wrocławskim — 155,0 i Katowickim — 128,2. Najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Kieleckim — 36,8; Poznańskim — 57,3 i Białostockim — 59,6.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik wynosił — 119,4.

### 3. Krztusiec

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem 1964 r. ze 121,8 — VI/1964 do 83,1 — VI/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do czerwca r. ub. zanotowano w m. Łodzi, m. Poznaniu, m. st. Warszawie, m. Wrocławiu, woj. Bydgoskim, Katowickim, Lubelskim i Szczecińskim.

Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. zanotowano tylko w 4 województwach tj. Gdańskim — (104,0 — VI/1964; 248,8 — VI/1965), Olsztyńskim (72,8 — VI/1964; 136,8 — VI/1965), Opolskim (87,7 — VI/1964; 111,4 — VI/1965) i m. Krakowie (167,0 — VI/1964; 190,2 — VI/1965).

W maju br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 74,4.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Potulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagn. Poliomyelitis anterior <i>acute</i>	Błonica Diphtheria	Plonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagn. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas
	Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480- 483	100- 102	110- 117	094	044	061
POLSKA	1964	16	1172	2797	49	410	1121	8	5867	3	45	3645	15091	3216	5973	86	4330	10	1	—	3	40	177
	1965	74	16	557	2814	51	736	535	39	5599	2	39	2799	13120	2193	9157	98	2112	8	2	—	7	17
M. st. Warszawa	4	1	49	62	—	68	10	1	193	—	—	252	982	117	727	14	12	1	—	—	2	—	15
M. Kraków	1	1	7	28	—	—	30	—	66	—	—	126	356	82	552	1	—	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	—	—	6	112	—	—	60	—	151	—	—	117	474	11	260	—	230	—	—	—	—	—	12
M. Poznań	1	—	9	18	—	7	4	—	105	—	—	42	752	94	266	—	10	—	—	—	—	—	2
M. Wrocław	1	—	—	26	—	13	40	—	85	—	—	62	127	15	206	—	9	—	—	—	—	—	14
Białostockie	4	4	28	216	—	22	6	5	169	—	1	58	345	47	230	9	62	—	—	—	5	—	3
Bydgoskie	4	1	28	171	13	75	57	—	235	—	—	123	771	109	446	10	68	—	—	—	—	1	8
Gdańskie	3	1	27	109	2	23	52	—	253	—	—	119	582	280	345	—	37	1	1	—	—	—	5
Katowickie	5	—	33	333	—	141	3	—	972	—	3	378	2236	212	1221	3	554	—	—	—	—	—	4
Kieleckie	16	—	10	90	—	14	8	2	145	—	5	59	222	46	330	7	103	1	—	—	—	1	7
Koszalińskie	3	1	43	187	—	26	18	—	173	—	—	60	79	35	225	1	22	—	1	—	—	—	1
Krakowskie	2	—	5	99	—	17	12	—	372	1	10	156	559	77	722	5	219	—	—	—	—	2	7
Lubelskie	1	2	19	73	1	34	26	—	342	—	2	129	628	148	338	9	63	—	—	—	—	1	8
Łódzkie	2	—	34	166	1	34	19	29	251	—	3	121	441	30	517	3	175	—	—	—	—	2	8
Olsztyńskie	2	—	40	179	—	43	30	—	183	—	—	71	299	100	227	3	28	—	—	—	—	—	12
Opolskie	4	—	50	88	6	5	7	—	259	—	8	74	392	94	407	9	84	—	—	—	—	—	2
Poznańskie	1	—	11	149	5	34	12	—	473	—	—	102	590	119	209	1	120	—	—	—	—	1	4
Rzeszowskie	1	—	1	136	1	—	25	—	217	—	1	105	422	145	279	7	72	—	—	—	—	4	4
Szczecińskie	2	—	31	96	—	26	26	—	134	—	—	125	1117	62	460	5	4	—	—	—	—	1	5
Warszawskie	9	3	52	277	—	78	22	2	290	—	1	190	691	253	522	1	58	4	—	—	—	—	11
Wrocławskie	7	1	25	155	14	37	64	—	428	1	5	254	643	60	501	8	126	1	—	—	—	4	13
Zielonogórskie	1	1	49	44	8	39	4	—	103	—	—	76	412	48	167	2	56	—	—	—	—	—	3

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenia wątroby Hepatitis epidemicna			
	040		041		045—048		080				056		092			
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965			1964	1965	1964	1965		
ROZKŁAD	3,6	2,8	0,6	0,6	44,4	21,1	0,11	0,07	1,7	1,5	138,1	106,0	121,8	83,1	222,3	212,1
M. st. Warszawa	0,9	3,8	1,9	0,9	125,5	46,9	—	—	0,9	—	356,5	245,1	213,7	112,1	230,9	184,9
M. Kraków	9,3	2,3	—	2,3	25,5	16,2	—	—	4,6	—	549,7	292,2	167,0	190,2	162,4	153,1
M. Łódź	—	—	—	—	48,0	9,6	—	—	4,8	—	261,0	187,3	192,1	17,6	326,6	241,8
M. Poznań	—	2,7	—	—	5,5	24,6	—	—	—	—	158,6	114,9	371,9	257,1	347,3	287,2
M. Wrocław	2,5	2,5	—	—	5,1	—	—	—	—	—	349,9	157,2	142,0	38,0	238,3	215,5
Białostockie	7,2	4,1	4,1	4,1	27,8	28,8	—	—	—	1,0	69,9	59,6	58,6	48,3	159,4	173,8
Bydgoskie	4,5	2,6	—	0,6	32,5	18,2	—	—	0,6	—	76,1	80,0	158,7	70,9	247,8	152,9
Gdańskie	1,8	2,7	0,9	0,9	64,0	24,0	—	—	—	—	179,5	105,7	104,0	248,8	223,9	224,8
Katowickie	1,0	1,7	0,3	—	10,2	11,2	0,3	—	—	1,0	117,0	128,2	121,4	71,9	276,8	329,7
Kieleckie	3,7	10,0	0,6	—	2,5	6,2	—	—	3,7	3,1	48,1	36,8	97,4	28,7	116,1	90,5
Koszalińskie	—	4,8	1,6	1,6	20,7	68,6	—	—	14,3	—	54,2	95,7	90,9	55,8	188,2	275,9
Krakowskie	2,2	1,1	—	—	5,5	2,8	—	0,5	4,4	5,5	133,8	86,3	61,9	42,6	224,0	205,7
Lubelskie	4,4	0,6	1,2	1,2	13,1	11,9	—	—	1,9	1,2	101,4	80,8	159,0	92,7	172,8	214,1
Łódzkie	2,1	1,4	—	—	13,5	24,2	—	—	2,8	2,1	106,8	86,2	52,0	21,4	142,4	178,8
Olsztyńskie	3,8	2,5	—	—	30,1	50,2	—	—	—	—	61,5	89,1	72,8	136,8	307,5	229,7
Opolskie	14,2	4,7	—	—	2,4	59,3	—	—	2,4	9,5	118,5	87,7	87,7	111,4	331,9	307,0
Poznańskie	1,1	0,6	—	—	5,6	6,2	—	—	—	—	123,5	57,3	112,9	66,8	163,9	265,6
Rzeszowskie	1,4	0,7	0,7	—	0,7	0,7	—	—	—	0,7	65,5	74,0	107,8	102,2	150,1	153,0
Szczecińskie	2,8	2,8	—	—	58,6	44,3	1,4	—	1,4	—	187,3	178,7	183,0	88,6	231,6	191,6
Warszawskie	7,8	4,4	1,4	1,4	79,2	25,3	—	—	1,4	0,5	98,1	92,3	167,6	122,9	224,0	140,9
Wrocławskie	7,3	4,3	—	0,6	299,2	15,2	—	0,6	1,2	3,0	217,2	155,0	97,0	36,6	315,4	261,1
Zielonogórskie	—	1,4	—	1,4	25,5	69,5	1,4	—	—	—	183,0	107,8	89,3	68,1	244,0	146,1

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

**Czerwiec 1964—1965**


Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Czerwiec 1965	Czerwiec 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VI. 1965	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VI. 1964
Dur brzuszny — 040	74	94	206	408	663
Dury rzekome A. B. C. — 041	16	16	39	69	38
Czerwonka 045 — 048	557	1172	1 066	3 011	4 338
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	2814	2797	3 029	10 035	9 833
Botulismus — 049	51	49	57	118	107
Zatrucia pokarmowe { Salmonelloza 042 inne — 049	736	410	250	2 362	1 767
	535	1121	599	2 137	3 034
Włośnica — 128	39	8	8	227	334
Zakaźne zap. wątroby — 092	5599	5867	3 087	50 097	50 138
Porażenie dziec. nagm. — 080	2	3	6	4	8
Błonica — 055	39	45	139	233	449
Plonica — 050	2799	3645	4 144	23 500	33 900
Odra — 085	13120	15091	13 894	72 765	89 564
Krztusiec — 056	2193	3216	3 531	10 720	15 562
Zap. przyusz. nagm. — 089	9157	5973	4 769	85 214	51 972
Zapalenie opon mózgz.-rdzen. nagminne — 057	98	86	73	513	440
Grypa 480 — 483	2112	4330	7 007	814 090	747 808
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	8	10	14	53	54
Zimnica 110 — 117	2	1	—	5	10
Wścieklizna — 094	—	—	—	—	1
Choroba Banga — 044	7	3	5	42	36
Tężec — 061	17	40	36	65	126
Róża — 052	150	177	132	889	1 205

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

CDW Cieszyn 1921/65 260 egz. F-021

POŁSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY

WARSZAWA 55, ul. Miodowa 15 TEL. 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Lipiec 1965

EGZ. NR 000028

Do użytku służbowego

# Sytuacja epidemiologiczna w lipcu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z lipcem r. ub. z 6,0—VII/1964 do 3,5—VII/1965. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 9 województw; z tego najwyższe w woj. Koszalińskim — 11,2; Wrocławskim — 8,5; m. Łodzi — 6,4; woj. Warszawskim — 6,3 i Lubelskim — 5,6. Natomiast najniższe wskaźniki notuje się w woj. Gdańskim — 0,9; Katowickim — 1,3; Zielonogórskim — 1,4; Łódzkim — 1,4 i Bydgoskim — 1,9. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Poznania, m. Wrocławia i woj. Olsztyńskiego.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 2,8—VI/1965 do 3,5—VII/1965.

### 2. Dury rzekome

W lipcu zgłoszono 16 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. z 35,7—VII/1964 do 19,0—VII/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności notuje się w woj. Wrocławskim (158,0—VII/1964; 12,8—VII/1965), m. st. Warszawie (137,0—VII/1964; 59,4—VII/1965), Bydgoskim (74,1—VII/1964; 10,4—VII/1965) i Białostockim (45,2—VII/1964; 17,5—VII/1965). W lipcu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Gdańskim — 82,6; Olsztyńskim — 65,3; m. st. Warszawie — 59,4; woj. Szczecińskim — 57,2; Zielonogórskim — 31,2 i m. Krakowie — 30,1. Wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do lipca 1964 r. obserwuje się na terenie 9 województw; z tego znaczny wzrost w woj. Gdańskim (58,6—VII/1964; 82,6—VII/1965), Koszalińskim (4,8—VII/1964; 20,7—VII/1965), m. Poznaniu (5,5—VII/1964; 24,6—VII/1965) i m. Krakowie (13,9—VII/1964; 30,1—VII/1965).

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 21,1.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 2 zachorowania z woj. Warszawskiego; w tym: pow. Płock — 1 zach. (data zach. 4. V. 1965 r.) i pow. Wołomin — 1 zach. (data zach. 20. V. 1965 r.).

W lipcu 1964 r. miało miejsce 1 zachorowanie.

W czerwcu br. zgłoszono 2 zachorowania.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 237,5—VII/1964 do 198,9—VII/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, m. Wrocławia, woj. Lubelskiego, Opolskiego i Poznańskiego. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem 1964 r. notuje się w następujących województwach:



Bydgoskim	268,6 — VII/1964;	134,4 — VII/1965
Zielonogórkim	303,5 — VII/1964;	174,5 — VII/1965
Warszawskim	248,8 — VII/1964;	142,4 — VII/1965
Olsztyńskim	272,4 — VII/1964;	169,4 — VII/1965
m. st. Warszawie	242,4 — VII/1964;	142,8 — VII/1965
Wrocławskim	316,6 — VII/1964;	220,8 — VII/1965

W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw; z tego najwyższe w woj. Opolskim — 350,9; Katowickim — 302,2; m. Łodzi — 269,0; m. Poznaniu — 262,5 i woj. Gdańskim — 255,9. Natomiast najniższe w woj. Kieleckim — 98,0; Bydgoskim — 134,4; Białostockim — 136,8; m. st. Warszawie — 142,8; woj. Warszawskim — 142,4 i Rzeszowskim — 148,7.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 212,1.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W lipcu zgłoszono 30 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z 9 województw. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe liczby przypadków zgłoszono z woj. Wrocławskiego — 6 (powiaty: Oława — 2, Wołów — 2, Strzeżelin — 1, m. Wałbrzych — 1), Gdańskiego — 5 (pow. Wejherowo — 5) i Rzeszowskiego — 4 (powiaty: Jarosław — 2, Brzozów — 1, Strzyżów — 1).

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z lipcem r. ub. z 1,8 — VII/1964 do 1,1 — VII/1965. W lipcu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Gdańskim — 4,4; Wrocławskim — 3,7; m. Łodzi — 3,2; woj. Rzeszowskim — 2,8 i Łódzkim — 2,1.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,5.

### 2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z lipcem r. ub. ze 112,0 — VII/1964 do 75,2 — VII/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się w m. st. Warszawie, m. Krakowie, woj. Szczecińskim, Gdańskim, Wrocławskim i Zielonogórkim. W lipcu br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 13 województw; z tego najwyższe w m. Krakowie — 150,8; m. Wrocławiu — 131,8; m. Łodzi — 129,7; m. st. Warszawie — 115,0; woj. Wrocławskim — 112,2 i Katowickim — 103,4.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 106,0.

### 3. Krztusiec

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 118,4 — VII/1964 do 97,1 — VII/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Gdańskim — 257,7; m. Poznaniu — 205,1; m. Krakowie — 171,6; m. st. Warszawie — 170,6; woj. Rzeszowskim — 151,5; Warszawskim — 144,8; Lubelskim — 142,7 i Olsztyńskim — 130,5. Najniższe wskaźniki wystąpiły w m. Łodzi — 6,4; woj. Łódzkim — 19,2; Zielonogórkim — 38,3; Wrocławskim — 43,9 i Białostockim — 47,3.

W czerwcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 83,1.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Polioomyelitis anterior	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Teżec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	045-048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480- 483	100- 102	110- 117	094	044	061	052
POLSKA	1964	159	27	942	3438	24	359	703	2	6269	1	47	2957	8972	3125	4035	110	1324	10	—	—	4	44	177
	1965	93	16	501	3152	34	902	682	5	5250	2	30	1986	8689	2562	4640	72	1207	9	—	2	5	36	156
M. st. Warszawa	3	1	62	52	—	53	33	2	149	—	—	120	610	178	313	13	—	2	—	—	—	2	15	
M. Kraków	2	1	13	174	—	—	16	—	73	—	—	65	330	74	245	—	—	—	—	—	—	—	3	
M. Łódź	4	—	17	92	—	48	35	1	168	—	2	81	91	4	87	—	207	—	—	—	—	—	16	
M. Poznań	—	1	9	7	—	2	2	—	96	—	—	30	302	75	113	—	—	—	—	—	—	—	—	
M. Wrocław	—	1	1	35	—	1	43	—	87	—	—	52	61	23	126	—	35	—	—	—	—	1	7	
Białostockie	2	5	17	287	—	27	7	—	133	—	—	48	139	46	188	2	32	2	—	—	1	2	1	
Bydgoskie	3	—	16	223	4	63	26	—	207	—	1	90	534	119	158	2	85	—	—	—	—	—	13	
Gdańskie	1	2	93	196	6	16	151	—	288	—	5	87	447	290	189	2	66	—	—	—	—	—	9	
Katowickie	4	2	12	279	—	209	41	—	891	—	—	305	1196	288	577	2	255	1	—	—	—	3	4	
Kieleckie	7	—	8	118	—	66	1	—	157	—	2	47	357	126	201	6	39	—	—	—	—	2	1	
Koszalińskie	7	—	13	138	—	17	7	—	149	—	1	51	127	38	175	2	21	—	—	—	—	1	4	
Krakowskie	5	—	5	114	1	1	50	—	337	—	1	162	484	99	416	9	69	—	—	—	—	6	5	
Lubelskie	9	—	16	88	—	23	20	—	303	—	1	81	441	228	148	—	37	—	—	1	—	2	7	
Łódzkie	2	1	30	197	—	33	46	—	224	—	3	44	237	27	140	3	72	—	—	—	1	5	4	
Olsztyńskie	—	—	52	184	—	46	7	—	135	—	—	48	267	104	139	9	20	1	—	—	2	—	11	
Opolskie	4	—	2	77	2	10	2	—	296	—	1	73	243	47	250	9	53	—	—	—	—	1	—	
Poznańskie	4	—	14	214	9	88	16	—	412	—	—	93	447	117	139	3	83	—	—	—	—	1	4	
Rzeszowskie	6	1	—	145	—	—	24	—	211	—	4	74	277	215	196	2	18	—	—	—	—	5	4	
Szczecińskie	2	—	40	45	2	41	63	—	156	—	—	58	801	67	125	4	3	—	—	1	—	2	13	
Warszawskie	13	—	38	260	1	66	21	2	293	2	2	137	591	298	298	—	36	1	—	—	—	1	16	
Wrocławskie	14	1	21	172	8	52	58	—	362	—	6	184	446	72	341	1	44	1	—	—	1	2	16	
Zielonogórskie	1	—	22	55	1	40	13	—	123	—	1	56	261	27	76	3	32	1	—	—	—	—	3	

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965			1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	6,0	3,5	1,0	0,6	35,7	19,0	0,04	0,07	1,8	1,1	112,0	75,2	118,4	97,1	237,5	198,9
M. st. Warszawa	2,9	2,9	3,8	0,9	137,0	59,4	—	—	—	—	242,4	115,0	228,1	170,6	242,4	142,8
M. Kraków	2,3	4,6	2,3	2,3	13,9	30,1	—	—	4,6	—	285,3	150,8	141,5	171,6	164,7	169,3
M. Łódź	4,8	6,4	1,6	—	41,6	27,2	—	—	—	3,2	160,1	129,7	105,7	6,4	299,4	269,0
M. Poznań	—	—	—	2,7	5,5	24,6	—	—	—	—	139,5	82,0	311,8	205,1	278,9	262,5
M. Wrocław	—	—	—	2,5	2,5	2,5	—	—	—	—	121,7	131,8	93,8	58,3	175,0	220,6
Białostockie	5,1	2,0	6,2	5,1	45,2	17,5	—	—	—	—	41,1	49,3	48,3	47,3	178,9	136,8
Bydgoskie	7,8	1,9	1,3	—	74,1	10,4	—	—	—	0,6	90,4	58,5	117,1	77,4	268,6	134,4
Gdańskie	5,3	0,9	0,9	1,8	58,6	82,6	—	—	—	4,4	165,3	77,3	155,5	257,7	311,0	255,9
Katowickie	4,7	1,3	—	0,7	11,2	4,1	—	—	1,3	—	92,6	103,4	94,6	97,7	305,3	302,2
Kieleckie	10,0	4,4	0,6	—	1,9	5,0	—	—	2,5	1,2	28,1	29,3	92,4	78,7	131,1	98,0
Koszalińskie	6,4	11,2	—	—	4,8	20,7	—	—	1,6	1,6	73,4	81,3	100,5	60,6	301,4	237,6
Krakowskie	2,2	2,8	0,5	—	5,5	2,8	—	—	3,3	0,5	144,3	89,6	78,5	54,7	209,6	186,4
Lubelskie	15,0	5,6	0,6	—	13,1	10,0	—	—	1,9	0,6	70,1	50,7	214,7	142,7	175,3	189,7
Łódzkie	10,0	1,4	0,7	0,7	12,8	21,4	—	—	1,4	2,1	80,5	31,3	37,0	19,2	166,6	159,5
Olsztyńskie	1,2	—	—	—	72,8	65,3	—	—	—	—	55,2	60,2	92,9	130,5	272,4	169,4
Opolskie	5,9	4,7	—	—	—	2,4	—	—	2,4	1,2	91,3	86,5	84,2	55,7	302,3	350,9
Poznańskie	3,9	2,2	—	—	6,7	7,9	—	—	1,7	—	111,2	52,2	81,4	65,7	197,1	231,3
Rzeszowskie	4,2	4,2	0,7	0,7	1,4	—	—	—	2,1	2,8	57,8	52,2	141,7	151,5	148,7	148,7
Szczecińskie	5,7	2,8	1,4	—	57,2	57,2	—	—	7,1	—	211,6	82,9	167,3	95,8	255,9	223,1
Warszawskie	9,2	6,3	1,4	—	29,6	18,5	—	1,0	0,5	1,0	84,1	66,6	190,0	144,8	248,8	142,4
Wrocławskie	5,5	8,5	1,8	0,6	158,0	12,8	—	—	4,9	3,7	195,2	112,2	70,8	43,9	316,6	220,8
Zielonogórskie	2,8	1,4	—	—	28,4	31,2	1,4	—	4,2	1,4	177,3	79,4	92,2	38,3	303,5	174,5


\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Lipiec 1965	Lipiec 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VII. 1965	Zestawie- nie kumu- lacyjne I—VII. 1964	
Dur brzuszny — 040	93	159	215	501	822	
Dury rzekome A. B. C. — 041	16	27	38	85	65	
Czerwonka 045 — 048	501	942	1.017	3.512	5.280	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	3.152	3.438	3.776	13.187	13.271	
Botulismus — 049	34	24	33	152	131	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	902	359	317	3.264	2.126
		inne — 049	682	703	623	2.819
Włośnica — 128	5	2	9	232	336	
Zakaźne zap. wątroby — 092	5.250	6.269	3.564	55.347	56.407	
Porażenie dziec. nagm. — 080	2	1	6	6	9	
Błonica — 055	30	47	145	263	496	
Płonica — 050	1.986	2.957	3.372	25.486	36.857	
Odra — 085	8.689	8.972	8.809	81.454	98.536	
Krztusiec — 056	2.562	3.125	4.650	13.282	18.687	
Zap. przyusz. nagm. — 089	4.640	4.035	2.898	89.854	56.007	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	72	110	107	585	550	
Grypa 480 — 483	1.207	1.324	4.248	815.297	749.132	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	9	10	13	62	64	
Zimnica 110 — 117	—	—	1	5	10	
Wścieklizna — 094	2	—	—	2	1	
Choroba Banga — 044	5	4	4	47	40	
Tężec — 061	36	44	44	101	170	
Róża — 052	156	177	156	1.045	1.382	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

CDW Cieszyn 2111/65 260 egz. F-021

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Sierpień 1965

EGZ. NR 000183

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna w sierpniu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do tego samego okresu r. ub. z 6,0—VIII/1964 do 3,6—VIII/1965. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się w woj. Warszawskim — 9,2; Koszalińskim — 8,0; Szczecińskim — 7,1; Lubelskim — 5,0; Rzeszowskim — 4,9; m. st. Warszawie — 4,8; woj. Opolskim — 4,7; Krakowskim — 4,4; Zielonogórskim — 4,2 i Wrocławskim — 3,7. Nie zgłoszono zachorowań z m. Poznania, m. Wrocławia i woj. Olsztyńskiego.

W sierpniu br. ognisk epidemicznych nie notowano.

W stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się nieznaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 3,5—VII/1965 do 3,6—VIII/1965.

### 2. Dury rzekome

W sierpniu zgłoszono 23 zachorowania sporadyczne.

### 3. Czerwonka

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 26,6—VIII/1964 do 15,5—VIII/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem 1964 r. notuje się w m. st. Warszawie (121,7—VIII/1964; 39,3—VIII/1965), woj. Wrocławskim (61,0—VIII/1964; 21,3—VIII/1965), Poznańskim (33,1—VIII/1964; 2,8—VIII/1965); Bydgoskim (42,6—VIII/1964; 7,8—VIII/1965) i m. Krakowie (46,4—VIII/1964; 20,9—VIII/1965). W sierpniu br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 12 województw; z tego najwyższe w m. Łodzi — 48,0; woj. Gdańskim — 45,3; m. st. Warszawie — 39,3; woj. Olsztyńskim — 33,9; Szczecińskim — 32,9 i Zielonogórskim — 32,6. Natomiast najniższe w woj. Rzeszowskim — 0,7; Opolskim — 1,2; Poznańskim — 2,8 i Krakowskim 3,9.

W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 19,0.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Wrocławskiego, pow. Wrocław (data zach. 31. VII. 1965 r.).

W lipcu br. zgłoszono 1 zachorowanie. W sierpniu r. ub. miało miejsce 1 zachorowanie.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 296,8—VIII/1964 do 214,0—VIII/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem 1964 r. obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Poznańskiego i Koszalińskiego. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się w następujących województwach.

Zielonogórskim	— 391,5—VIII/1964;	188,4—VIII/1965
Warszawskim	— 311,5—VIII/1964;	144,8—VIII/1965
Wrocławskim	— 415,5—VIII/1964;	250,7—VIII/1965
Olsztyńskim	— 375,3—VIII/1964;	218,4—VIII/1965
Bydgoskim	— 276,9—VIII/1964;	137,9—VIII/1965
m. Łodzi	— 422,7—VIII/1964;	301,0—VIII/1965
m. st. Warszawie	— 297,1—VIII/1964;	186,9—VIII/1965

W sierpniu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Opolskim — 310,6; m. Łodzi — 301,0; woj. Koszalińskim — 280,7; Katowickim — 274,1; Gdańskim — 271,9; woj. Poznańskim — 269,5; m. Poznaniu — 254,3; i Wrocławskim — 250,7.

W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 198,9.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W sierpniu zgłoszono 21 zachorowań. Nie zgłoszono zachorowań z terenu 12 województw. Zgłoszone zachorowania zanotowano w następujących powiatach:

- 1). woj. Wrocławskie — pow. Kłodzko, — 1, pow. Zgorzelec — 1, miasto Wałbrzych — 1;
- 2). woj. Krakowskie — pow. Kraków — 1, pow. Miechów — 1;
- 3). woj. Kieleckie — pow. Kielce — 1, miasto Skarżysko — 2;
- 4). woj. Rzeszowskie — pow. Sanok — 1;
- 5). woj. Warszawskie — pow. Grodzisk Mazow. — 1; pow. Ostrołęka — 1;
- 6). woj. Katowickie — miasto Częstochowa — 1;
- 7). woj. Koszalińskie — pow. Koszalin — 1, pow. Wałcz — 1;
- 8). woj. Opolskie — pow. Prudnik — 1;
- 9). woj. Łódzkie — pow. Brzeziny — 1; pow. Rawa Mazow. — 1, miasto Tomaszów Mazow. — 1;
- 10). woj. Lubelskie — pow. Lublin — 1, pow. Tomaszów — 2.

W 15 przypadkach zachorowania dotyczą dzieci w grupie wieku 0—14 lat, zaś w 6 przypadkach powyżej lat 15.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z sierpniem r. ub. z 2,1—VIII/1964 do 0,8—VIII/1965. W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 1,1.

### 2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 93,1—VIII/1964 do 67,1—VIII/1965. W sierpniu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 146,1; m. Wrocławiu — 129,3; woj. Wrocławskim — 118,3; m. Łodzi — 96,1; woj. Koszalińskim — 94,1; Szczecińskim — 88,6; Katowickim — 88,5; m. st. Warszawie — 87,2 i woj. Opolskim — 84,2.

W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 75,2.

### 3. Krztusiec

Notuje się niewielki wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z sierpniem r. ub. z 97,4—VIII/1964 do 101,5—VIII/1965. Wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się na terenie 12 województw; z tego znaczny wzrost zanotowano w:

m. Wrocławiu	— 48,2—VIII/1964; 144,5—VIII/1965
woj. Gdańskim	— 199,1—VIII/1964; 271,0—VIII/1965
m. st. Warszawie	— 154,3—VIII/1964; 216,6—VIII/1965
m. Poznaniu	— 158,6—VIII/1964; 210,3—VIII/1965
woj. Koszalińskim	— 74,9—VIII/1964; 110,0—VIII/1965
woj. Opolskim	— 79,4—VIII/1964; 107,9—VIII/1965

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Gdańskim — 271,0; m. st. Warszawie — 216,6; m. Poznaniu — 210,3; m. Krakowie — 197,1; m. Wrocławiu — 144,5 i woj. Rzeszowskim — 143,8.

W lipcu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 97,1.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichomosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Poliomyelitis anterior	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045—048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480—483	100—102	110—117	094	044	061	052
POLSKA	1964	158	25	702	3692	17	478	945	—	7833	1	56	2458	3411	2572	2511	95	1007	11	—	—	8	42	187
	1965	96	23	410	3203	32	700	906	9	5649	1	21	1772	3639	2680	2286	101	957	9	—	—	5	35	131
M. st. Warszawa	5	3	41	67	—	31	64	8	195	—	—	91	176	226	132	12	6	—	—	—	1	—	—	9
M. Kraków	1	—	9	114	—	—	5	—	82	—	—	63	151	85	112	1	2	—	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	2	—	30	129	—	7	41	—	188	—	—	60	27	15	34	—	173	1	—	—	—	—	—	13
M. Poznań	—	—	6	9	1	28	13	—	93	—	—	25	100	77	39	1	—	—	—	—	—	—	—	3
M. Wrocław	—	—	5	35	—	3	54	—	91	—	—	51	35	57	50	1	2	—	—	—	—	—	—	4
Białostockie	3	6	20	254	—	20	12	—	151	—	—	31	54	72	90	6	12	3	—	—	—	—	2	—
Bydgoskie	1	—	14	271	9	35	65	—	246	—	—	119	163	141	61	5	62	—	—	—	—	—	3	6
Gdańskie	2	—	51	213	—	18	95	—	306	—	—	88	231	305	103	4	27	1	—	—	—	—	3	10
Katowickie	8	—	31	303	—	150	8	—	808	—	1	261	527	296	316	4	192	—	—	—	—	—	2	8
Kieleckie	2	—	13	91	—	13	64	—	173	—	3	71	144	142	78	7	46	1	—	—	—	—	6	2
Koszalińskie	5	—	14	120	—	39	10	—	176	—	2	59	51	69	110	2	23	—	—	—	—	—	—	6
Krakowskie	8	—	7	112	1	—	18	—	349	—	2	123	244	146	201	12	59	—	—	—	—	—	4	8
Lubelskie	8	1	25	118	—	26	27	—	343	—	3	44	154	190	65	4	12	—	—	—	—	1	3	3
Łódzkie	4	7	9	167	3	21	57	—	247	—	3	44	127	36	77	2	41	—	—	—	—	—	—	5
Olsztyńskie	—	—	27	202	2	36	23	—	174	—	—	25	166	57	88	9	42	—	—	—	—	1	—	7
Opolskie	4	—	1	91	1	3	1	—	262	—	1	71	130	91	117	14	34	—	—	—	—	1	2	3
Poznańskie	3	—	5	186	5	17	45	—	480	—	—	89	212	96	57	3	42	—	—	—	—	—	1	5
Rzeszowskie	7	3	1	115	1	—	88	—	284	—	1	54	137	204	72	3	17	—	—	—	—	—	5	9
Szczecińskie	5	2	23	116	2	93	85	—	159	—	—	62	251	30	88	3	13	—	—	—	—	—	—	3
Warszawskie	19	—	20	264	3	46	14	1	298	—	2	91	204	219	121	2	25	1	—	—	—	—	1	7
Wrocławskie	6	—	35	173	4	83	106	—	411	1	3	194	209	86	204	6	92	1	—	—	—	1	3	15
Zielonogórskie	3	1	23	53	—	31	11	—	133	—	—	56	146	40	71	—	35	1	—	—	—	—	—	2

\*) Liczby bezwzględne



## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

## CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	6,0	3,6	0,9	0,9	26,6	15,5	0,04	0,04
M. st. Warszawa	3,8	4,8	0,9	2,9	121,7	39,3	—	—
M. Kraków	—	2,3	—	—	46,4	20,9	—	—
M. Łódź	11,2	3,2	19,2	—	20,8	48,0	—	—
M. Poznań	2,7	—	—	—	8,2	16,4	—	—
M. Wrocław	—	—	—	—	5,1	12,7	—	—
Białostockie	4,1	3,1	3,1	6,2	27,8	20,6	—	—
Bydgoskie	7,3	0,6	—	—	42,6	7,8	—	—
Gdańskie	11,5	1,8	—	—	60,4	45,3	—	—
Katowickie	2,4	2,7	—	—	12,2	10,5	—	—
Kieleckie	6,9	1,2	—	—	2,5	8,1	—	—
Koszalińskie	4,8	8,0	—	—	8,0	22,3	1,6	—
Krakowskie	5,5	4,4	—	—	3,3	3,9	—	—
Lubelskie	10,6	5,0	1,9	0,6	13,1	15,6	—	—
Łódzkie	6,4	2,8	0,7	5,0	7,8	6,4	—	—
Olsztyńskie	3,8	—	—	—	55,2	33,9	—	—
Opolskie	5,9	4,7	1,2	—	1,2	1,2	—	—
Poznańskie	5,0	1,7	—	—	33,1	2,8	—	—
Rzeszowskie	4,9	4,9	0,7	2,1	0,7	0,7	—	—
Szczecińskie	8,6	7,1	—	2,8	27,2	32,9	—	—
Warszawskie	11,7	9,2	1,0	—	23,3	9,7	—	—
Wrocławskie	3,0	3,7	0,6	—	61,0	21,3	—	0,6
Zielonogórskie	—	4,2	—	1,4	15,6	32,6	—	—


Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		050		056		092	
1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
2,1	0,8	93,1	67,1	97,4	101,5	296,8	214,0
—	—	176,3	87,2	154,3	216,6	297,1	186,9
9,3	—	245,9	146,1	208,7	197,1	271,4	190,2
3,2	—	190,5	96,1	116,9	24,0	422,7	301,0
—	—	93,0	68,4	158,6	210,3	289,9	254,3
—	—	114,1	129,3	48,2	144,5	289,1	230,7
—	—	49,3	31,9	54,5	74,0	209,8	155,3
2,2	—	54,4	66,7	77,3	79,0	276,9	137,9
—	—	143,1	78,2	199,1	271,0	345,7	271,9
0,3	0,3	81,4	88,5	82,1	100,4	343,6	274,1
2,5	1,9	43,1	44,3	89,9	88,7	170,5	108,0
4,8	3,2	71,8	94,1	74,9	110,0	272,7	280,7
3,3	1,1	112,2	68,0	71,9	80,7	272,6	193,0
3,1	1,9	51,3	27,5	162,8	118,9	268,0	214,7
1,4	2,1	84,0	31,3	44,9	25,6	204,4	175,9
—	—	37,6	31,4	96,6	71,5	375,3	218,4
—	1,2	130,4	84,2	79,4	107,9	393,5	310,6
0,6	—	82,5	50,0	61,8	53,9	242,6	269,5
7,0	0,7	67,0	38,1	137,4	143,8	210,1	200,2
2,8	—	127,3	88,6	110,1	42,9	301,7	227,3
1,4	1,0	46,2	44,2	90,9	106,4	311,5	144,8
5,5	1,8	151,3	118,3	71,4	52,5	415,5	250,7
—	—	131,9	79,4	56,7	56,7	391,5	188,4

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Sierpień 1965	Sierpień 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I-VIII/1965	Zestawienie kumula- cyjne I-VIII/1964		
Dur brzuszny — 040	96	158	266	597	980		
Dury rzekome A. B. C. — 041	23	25	33	103	90		
Czerwonka 045 — 048	410	702	913	3.922	5.982		
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	3.203	3.692	4.289	16.390	16.963		
Botulismus — 049	32	17	28	184	148		
Zatrucia pokarmowe {		Salmonellozy 042	700	478	279	3.964	2.604
		Inne — 049	906	945	876	3.725	4.682
Włośnica — 128	9	—	7	241	336		
Zakaźne zap. wątroby — 092	5.649	7.833	4.641	60.996	64.240		
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	1	2	7	10		
Błonica — 055	21	56	127	284	552		
Płonica — 050	1.772	2.458	2.694	27.258	39.315		
Odra — 085	3.639	3.411	3.596	85.093	101.947		
Krzyszec — 056	2.680	2.572	4.335	15.962	21.259		
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.286	2.511	1.889	92.140	58.518		
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	101	95	104	686	645		
Crypa 480 — 483	957	1.007	3.698	816.254	750.139		
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillla 100 — 102	9	11	14	71	75		
Zimnica 110 — 117	—	—	—	5	10		
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	1		
Choroba Banga — 044	5	8	4	52	48		
Tężec — 061	35	42	46	136	212		
Róża — 052	131	187	163	1.176	1.569		

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

wrzesień 1965

EGZ. NR 000214

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna we wrześniu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 7,6—IX/1964 do 5,0—IX/1965. We wrześniu br. wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 9 województw; z tego najwyższe w woj. Warszawskim — 10,2; Szczecińskim — 10,0; Białostockim — 8,2; m. Wrocławiu — 7,6 i woj. Opolskim — 7,1. W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W porównaniu z sierpniem br. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 3,6—VIII/1965 do 5,0—IX/1965.

### 2. Dury rzekome

We wrześniu zgłoszono z terenu całego kraju 6 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. z 24,8—IX/1964 do 28,0—IX/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem 1964 r. obserwuje się w m. st. Warszawie (85,3—IX/1964; 132,2—IX/1965), woj. Białostockim (14,4—IX/1964; 70,9—IX/1965), Olsztyńskim (55,2—IX/1964; 90,4—IX/1965) i Szczecińskim (30,0—IX/1964; 52,9—IX/1965). We wrześniu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. st. Warszawie — 132,2; woj. Olsztyńskim — 90,4; Białostockim — 70,9; Gdańskim — 59,3; Szczecińskim — 52,9 i Zielonogórskim — 42,5. Natomiast najniższe w województwie Rzeszowskim — 2,8; Opolskim — 3,5; Poznańskim — 5,6; Koszalińskim — 8,0 i Krakowskim — 8,3.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 15,5.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Poznańskiego, miasta Kalisza (data zachorowania 20. VI. 1965 r.).

W roku 1964, w miesiącu wrześniu miało miejsce 1 zachorowanie.

W sierpniu br. zgłoszono 1 zachorowanie.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w stosunku do tego samego okresu 1964 r. z 494,0—IX/1964 do 264,8—IX/1965, natomiast wzrósł w porównaniu z poprzedzającym miesiącem z 214,0—VIII/1965 do 264,8—IX/1965.

Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem r. ub. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Poznania. Znaczny spadek w stosunku do września 1964 r. przedstawia następująca tabela:

województwo	IX/1964	IX/1965
m. st. Warszawa	843,3	246,3
Warszawskie	577,2	175,4
Bydgoskie	530,8	178,2
Wrocławskie	633,9	285,5
m. Kraków	626,3	278,3
m. Wrocław	628,8	299,2
m. Łódź	608,4	318,6
Katowickie	616,7	340,9

W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Poznaniu — 503,2; woj. Opolskim — 373,4; Poznańskim — 362,3; Katowickim — 340,9; m. Łodzi — 318,6 i Koszalińskim — 317,4. Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 130,5; Warszawskim — 175,4; Bydgoskim — 178,2 i Białostockim — 187,1.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

We wrześniu zgłoszono 24 zachorowania; z tego: 1 zach. miało miejsce w maju br., 1 zach. w lipcu br. 4 zach. w sierpniu br., 18 zach. we wrześniu br. W 10 przypadkach zachorowania dotyczyły osób w wieku powyżej lat 15.

W miesiącu sprawozdawczym zachorowania zgłoszono z następujących powiatów:

- 1) m. Kraków, dzielnica Zwierzyniec — 1 zach.,
- 2) m. Łódź, dzielnica Bałuty — 1 zach.,
- 3) woj. Bydgoskie, pow. Chojnice — 1 zach.,
- 4) woj. Kieleckie, pow. Kielce — 2 zach., pow. Kozienice — 1 zach., pow. Sandomierz — 2 zach., pow. Szydłowiec — 1 zach., m. Skarżysko — 1 zach.,
- 5) woj. Koszalińskie, pow. Kołobrzeg — 1 zach.,
- 6) woj. Krakowskie, pow. Kraków — 1 zach., pow. Nowy Sącz — 1 zach., pow. Oświęcim — 2 zach., pow. Wadowice — 1 zach., m. Tarnów — 1 zach.,
- 7) woj. Łódzkie, pow. Kutno — 1 zach., m. Zduńska Wola — 1 zach.,
- 8) woj. Olsztyńskie, pow. Mrągowo — 1 zach.,
- 9) woj. Rzeszowskie, pow. Krosno — 1 zach.,
- 10) woj. Wrocławskie, pow. Strzelin — 2 zach.,
- 11) woj. Zielonogórskie, m. Zielona Góra — 1 zach.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z wrześniem 1964 r. z 1,6 — IX/1964 do 0,9 — IX/1965. Natomiast w stosunku do poprzedzającego miesiąca notuje się nieznaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 0,8 — VIII/1965 do 0,9 — IX/1965.

### 2. Płonica

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności ze 151,9 — IX/1964 do 94,7 — IX/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do września r. ub. notuje się we wszystkich województwach. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 13 województw; z tego najwyższe w m. Krakowie — 299,2; m. Łodzi — 156,9; m. Wrocławiu — 154,7; woj. Opolskim — 144,6; Wrocławskim — 139,7; Katowickim — 135,3 i Szczecińskim — 133,0.

W sierpniu br. krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 67,1.

### 3. Krztusiec

Notuje się niewielki wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z wrześniem 1964 r. z 89,0 — IX/1964 do 91,4 — IX/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. obserwuje się w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Poznaniu, woj. Bydgoskim, Gdańskim i Warszawskim. We wrześniu br. najwyższe wskaźniki wystąpiły w m. Krakowie — 229,6; m. st. Warszawie — 214,6; m. Poznaniu — 186,0; woj. Gdańskim — 159,4 i Rzeszowskim — 126,9.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się ze 101,5 — VIII/1965 do 91,4 — IX/1965.

ZACHOROWANIA N<sub>2</sub> CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. negm. Poliomyelitis anterior <i>oculata</i>	Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krztusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zapał. opon mózgj. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekliczna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045—048	571, 754	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480—483	100—132	110—117	094	044	061	052
NUMERY KLASYFIK. MIĘDZYNARODOWEJ	202	21	654	3080	19	267	762	13	13039	1	43	4010	2998	2348	2938	85	1968	17	—	—	5	45	219
POLSKA	1964	1965	1964	1965	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964	1964
	132	6	740	3390	14	545	821	2	6988	1	24	2499	3614	2413	2179	102	2104	13	1	—	9	38	152
M. st. Warszawa	5	—	138	92	—	22	23	—	257	—	—	114	111	224	94	15	17	—	—	—	—	—	14
M. Kraków	2	—	8	21	—	1	59	—	120	—	1	129	159	99	87	—	2	—	—	—	—	—	1
M. Łódź	3	1	15	89	—	2	34	—	199	—	1	98	19	21	28	—	398	1	1	—	—	—	15
M. Poznań	—	—	10	8	—	8	12	—	184	—	—	42	41	68	42	2	12	—	—	—	—	—	4
M. Wrocław	3	—	5	53	—	9	51	—	118	—	—	61	76	41	42	—	36	—	—	—	—	—	8
Białostockie	8	2	69	290	6	26	24	—	182	—	—	53	38	61	73	5	44	1	—	—	—	—	5
Bydgoskie	7	—	40	250	4	23	42	—	274	—	1	165	116	165	76	4	116	—	—	—	—	2	18
Gdańskie	6	—	67	179	1	46	152	—	322	—	—	83	223	180	103	—	68	—	—	—	1	—	12
Katowickie	6	—	54	358	—	126	9	—	1005	—	—	399	539	272	375	4	357	—	—	—	—	3	6
Kieleckie	10	—	17	98	—	10	4	—	209	—	7	93	145	95	64	4	61	1	—	—	—	2	5
Koszalińskie	3	—	5	145	1	7	74	—	199	—	1	73	37	61	121	1	46	—	—	—	—	1	3
Krakowskie	8	—	15	141	—	—	5	—	460	—	6	173	335	105	145	8	115	—	—	—	—	5	6
Lubelskie	8	—	22	137	—	26	13	—	440	—	—	71	115	175	65	7	38	4	—	—	—	3	5
Łódzkie	2	—	19	225	—	13	32	1	317	—	2	83	68	40	50	1	239	—	—	—	—	1	4
Olsztyńskie	2	—	72	203	—	48	8	—	177	—	1	43	138	60	113	21	31	2	—	—	5	1	2
Opolskie	6	—	3	131	—	5	9	—	315	—	—	122	116	52	106	9	116	1	—	—	—	2	3
Poznańskie	11	—	10	106	1	20	10	—	647	1	—	107	185	103	63	2	131	—	—	—	—	3	7
Rzeszowskie	5	2	4	132	—	—	8	—	377	—	1	87	280	180	95	10	43	—	—	—	—	11	9
Szczecińskie	7	1	37	128	—	22	84	—	196	—	—	93	269	53	75	5	19	1	—	—	2	1	10
Warszawskie	21	—	49	352	—	55	25	1	361	—	—	111	173	227	120	2	40	2	—	—	—	3	6
Wrocławskie	9	—	51	216	—	45	131	—	468	—	2	229	248	81	157	1	120	—	—	—	1	—	8
Zielonogórskie	—	—	30	36	1	31	12	—	161	—	1	70	183	50	85	1	55	—	—	—	—	—	1

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta	
	040		041		045—048		080	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
<b>R o k</b>								
<b>POLSKA</b>	7,6	5,0	0,8	0,2	24,8	28,0	0,04	0,04
M. st. Warszawa	3,8	4,8	1,9	—	85,3	132,2	—	—
M. Kraków	6,9	4,6	—	—	25,5	18,5	—	—
M. Łódź	9,6	4,8	—	1,6	25,6	24,0	—	—
M. Poznań	—	—	—	—	16,4	27,3	—	—
M. Wrocław	10,1	7,6	—	—	10,1	12,7	—	—
Białostockie	9,2	8,2	5,1	2,0	14,4	70,9	—	—
Bydgoskie	11,0	4,5	—	—	22,1	26,0	—	—
Gdańskie	10,6	5,3	1,8	—	47,8	59,3	—	—
Katowickie	5,8	2,0	0,7	—	14,2	18,3	0,3	—
Kieleckie	8,1	6,2	0,6	—	0,6	10,6	—	—
Koszalińskie	3,2	4,8	—	—	46,2	8,0	—	—
Krakowskie	5,5	4,4	—	—	3,8	8,3	—	—
Lubelskie	10,0	5,0	2,5	—	11,9	13,8	—	—
Łódzkie	7,8	1,4	—	—	11,4	13,5	—	—
Olsztyńskie	3,8	2,5	—	—	55,2	90,4	—	—
Opolskie	5,9	7,1	1,2	—	4,2	3,5	—	—
Poznańskie	5,6	6,2	—	—	6,2	5,6	—	0,6
Rzeszowskie	6,3	3,5	2,1	1,4	2,1	2,8	—	—
Szczecińskie	10,0	10,0	—	1,4	30,0	52,9	—	—
Warszawskie	10,7	10,2	0,5	—	23,8	23,8	—	—
Wrocławskie	10,4	5,5	—	—	83,6	31,1	—	—
Zielonogórskie	7,1	—	—	—	63,8	42,5	—	—

## CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemic	
055		050		056		092	
1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
1,6	0,9	151,9	94,7	89,0	91,4	494,0	264,8
—	—	282,7	109,2	174,4	214,6	843,3	246,3
11,6	2,3	496,4	299,2	199,5	229,6	626,3	278,3
—	1,6	326,6	156,9	72,0	33,6	608,4	318,6
—	—	147,7	114,9	142,2	186,0	473,1	503,2
—	—	395,6	154,7	101,4	104,0	628,8	299,2
—	—	79,2	54,5	73,0	62,7	257,1	187,1
—	0,6	135,3	107,3	54,6	107,3	530,8	178,2
—	—	183,3	73,5	116,0	159,4	566,8	285,2
0,7	—	152,6	135,3	81,4	92,3	616,7	340,9
2,5	4,4	60,6	58,1	56,2	59,3	264,2	130,5
6,4	1,6	153,1	116,4	86,1	97,3	403,5	317,4
1,6	3,3	149,3	95,7	121,1	58,1	429,7	254,4
1,9	—	101,4	44,4	144,0	109,6	360,0	275,5
—	1,4	105,4	59,1	30,6	28,5	389,6	225,8
—	1,2	87,9	54,0	71,5	75,3	451,9	222,2
2,4	—	157,6	144,6	111,4	61,6	542,9	373,4
—	—	125,8	60,1	34,2	57,8	429,0	362,3
1,4	0,7	88,1	61,3	114,2	126,9	361,6	265,7
5,7	—	233,1	133,0	140,1	75,8	489,0	280,3
2,9	—	89,4	53,9	87,5	110,3	577,2	175,4
3,7	1,2	223,9	139,7	45,7	49,4	633,9	285,5
2,8	1,4	150,3	99,3	76,6	70,9	461,0	228,4

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Wrze- sień 1965	Wrzesień 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—IX/1965	Zestawienie kumula- cyjne I—IX/1964	
Dur brzuszny — 040	132	202	291	729	1.182	
Dury rzekome A. B. C. — 041	6	21	30	114	111	
Czerwonka 045 — 048	740	654	1.026	4.662	6.636	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	3.390	3.080	3.526	19.780	20.043	
Botulismus — 049	14	19	16	198	167	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	545	267	192	4.509	2.871
		Inne — 049	821	762	591	4.546
Włośnica — 128	2	13	13	243	349	
Zakaźne zap. wątroby — 092	6.988	13.039	6.378	67.984	77.279	
Porażenie dziec. nagm. — 080	1	1	2	8	11	
Błonica — 055	24	43	152	308	595	
Płonica — 050	2.499	4.010	3.829	29.757	43.325	
Odra — 085	3.614	2.998	2.875	88.707	104.945	
Krzusiec — 056	2.413	2.348	3.593	18.375	23.607	
Zap. przyusz. nagm. — 089	2.179	2.938	2.098	94.319	61.456	
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	102	85	90	788	730	
Grypa 480 — 483	2.104	1.968	6.032	818.358	752.107	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill'a 100 — 102	13	17	17	84	92	
Zimnica 110 — 117	1	—	1	6	10	
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	1	
Choroba Banga — 044	9	5	4	61	53	
Tężec — 061	38	45	42	174	257	
Róża — 052	152	219	187	1.328	1.788	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

październik 1965

EGZ. NR 000214

# Sytuacja epidemiologiczna w październiku 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 5,2—X/64 do 4,7—X/1965. W październiku br najwyższe wskaźniki notuje się w m. Krakowie — 13,9; woj. Rzeszowskim — 12,7; Warszawskim — 12,6; Kieleckim — 6,2; Bydgoskim — 5,2 i Białostockim — 5,1. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Wrocławia i woj. Zielonogórskiego

W stosunku do poprzedzającego miesiąca obserwuje się niewielki spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 5,0—IX/1965 do 4,7—X/1965.

### 2. Dury rzekome

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 11 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z tym samym okresem z r. ub. z 25,7—X/1964 do 33,4—X/1965. Wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z październikiem 1964 r. notuje się na terenie 14 województw; z tego znaczny wzrost zanotowano w m. st. Warszawie, woj. Gdańskim, Katowickim i Zielonogórskim. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego wystąpiły w m. st. Warszawie — 136,1; woj. Zielonogórskim — 107,8; Olsztyńskim — 87,9; Gdańskim — 68,4; Katowickim — 60,7; m. Łodzi — 38,4; woj. Warszawskim — 36,4; Białostockim — 33,9 i Wrocławskim — 33,5. Natomiast najniższe wskaźniki obserwuje się w woj. Opolskim — 3,5; Poznańskim — 5,6; Krakowskim — 6,6; Lubelskim — 7,5; i m. Krakowie — 9,3. Nie zgłoszono zachorowań z terenu woj. Rzeszowskiego.

We wrześniu br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 28,0.

### 4. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba zgłoszonych przypadków zatruc pokarmowych w październiku br wynosi 1343. Z tego 445 przypadków Salmonelloz zgłoszono z woj. Poznańskiego, pow. Poznań. Zachorowania wystąpiły po spożyciu metki wyprodukowanej w masarni GS w Dopiewie. Badania laboratoryjne wykazały, że przyczyną zatruc były pałeczki Salmonella enteritidis Gartnera.

### 5. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W październiku zgłoszono 2 zachorowania z woj. Rzeszowskiego, pow. Nisko — 1 zach. (data zach. 3. VIII. 1965 r.), pow. Gorlice — 1 zach. (data zach. 3. IX. 1965 r.).

We wrześniu br zgłoszono 1 zachorowanie. W październiku 1964 r. nie notowano zachorowań.

### 6. Zakaźne zapalenie wątroby

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 7864 zachorowania.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 583,7—X/1964 do 298,0—X/1965. Spadek wskaźnika zapa-

dalności w stosunku do października r. ub. notuje się we wszystkich województwach; z tego znaczny spadek zanotowano:

województwo:	X/1964	X/1965
m. st. Warszawa	1 103,7	313,4
woj. Warszawskie	713,3	171,5
woj. Wrocławskie	681,5	273,3
woj. Katowickie	795,8	391,8
woj. Bydgoskie	599,1	196,4

Wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 13 województw; z tego najwyższe w m. Poznaniu — 497,7; woj. Poznańskim — 429,5; Opolskim — 423,2; Katowickim — 391,8; m. Wrocławiu — 390,5 i woj. Koszalińskim — 355,6. W październiku br najniższe wskaźniki wystąpiły w woj. Kieleckim — 146,1; Warszawskim — 171,5 i Bydgoskim — 196,4.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 264,8.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W październiku zgłoszono 41 zachorowań z 12 województw; z tego najwyższe liczby przypadków zgłoszono z woj. Krakowskiego — 10 (pow. Kraków — 4, pow. Miechów — 2, pow. Oświęcim — 2, pow. Tarnów — 1, m. Tarnów — 1), Wrocławskiego — 6 (pow. Dzierżoniów — 4, pow. Kłodzko — 1, pow. Lubań — 1), i Kieleckiego — 6 (pow. Szydłowiec — 3, pow. Sandomierz — 1, m. Radom — 1, m. Skarżysko — 1). Nie zgłoszono zachorowań z terenu 10 województw.

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z październikiem r. ub. z 1,3—X/1964 do 1,5—X/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Koszalińskim — 6,4; Krakowskim — 5,5; Kieleckim — 3,7; Wrocławskim — 3,7 i Bydgoskim 3,2.

We wrześniu br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 0,9.

### 2. Płonica

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 255,7—X/1964 do 133,1—X/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z październikiem 1964 r. notuje się we wszystkich województwach. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw; z tego najwyższe w m. Krakowie — 345,6; m. Łodzi — 269,0; m. st. Warszawie — 229,0; woj. Katowickim — 196,7; woj. Wrocławskim — 191,6; m. Wrocławiu — 180,0 i woj. Bydgoskim — 176,9.

We wrześniu br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 94,7.

### 3. Krztusiec

W porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności z 73,6—X/1964 do 78,7—X/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do października r. ub. obserwuje się w m. Krakowie, woj. Bydgoskim, Gdańskim, Koszalińskim i Rzeszowskim. Najwyższe wskaźniki w październiku br wystąpiły w m. Krakowie — 201,8; m. st. Warszawie — 164,8; woj. Koszalińskim — 145,1; Gdańskim — 144,0; Rzeszowskim — 133,9 i m. Wrocławiu — 129,3.

We wrześniu br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 91,4.

## ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dzieci. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Ebonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyusznicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzen. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wściekliwość Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas	
	Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045-048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	085	056	089	057	480-483	100-132	110-117	094	044	061	052
POLSKA	1964	12	678	2287	9	258	501	19	15406	—	36	6750	6470	1943	7366	71	5253	12	1	1	2	30	233	
	1965	11	833	2808	24	897	422	18	7864	2	41	3513	7379	2077	3550	66	4604	10	—	—	—	21	199	
M. st. Warszawa	5	1	142	39	—	27	30	—	327	—	—	239	242	172	135	13	63	2	—	—	—	—	1	11
M. Kraków	6	—	4	17	—	—	5	—	136	—	1	149	256	87	103	—	9	—	—	—	—	—	—	2
M. Łódź	2	—	24	107	—	1	30	—	215	—	1	168	54	14	37	—	603	1	—	—	—	—	—	15
M. Poznań	1	—	4	16	—	—	15	—	182	—	—	48	81	31	70	—	32	—	—	—	—	—	—	4
M. Wrocław	—	1	5	38	—	6	43	—	154	—	—	71	153	51	46	—	34	—	—	—	—	—	—	6
Białostockie	5	3	33	246	1	14	16	3	213	—	1	72	108	60	217	2	129	1	—	—	—	—	—	4
Bydgoskie	8	—	16	174	1	26	19	1	302	—	5	272	267	133	100	3	376	—	—	—	—	—	—	18
Gdańskie	3	—	77	200	1	22	76	3	362	—	—	163	440	162	179	—	167	—	—	—	—	—	—	13
Katowickie	12	1	179	403	—	93	5	1	1155	—	1	580	1168	191	642	3	624	—	—	—	—	—	—	10
Kieleckie	10	—	29	88	—	9	3	—	234	—	6	111	429	122	103	2	194	—	—	—	—	—	—	9
Koszalińskie	3	—	11	167	4	17	8	—	223	—	4	73	39	91	193	4	101	—	—	—	—	—	—	6
Krakowskie	5	—	12	76	—	—	8	—	483	—	10	203	559	119	342	15	245	—	—	—	—	—	4	10
Lubelskie	4	1	12	105	—	18	3	—	506	—	—	86	172	99	55	—	147	2	—	—	—	—	—	4
Łódzkie	5	1	29	158	—	12	20	6	339	—	—	105	268	28	81	2	586	—	—	—	—	—	—	7
Olsztyńskie	2	—	70	195	—	27	11	—	218	—	1	72	307	37	160	4	133	—	—	—	—	—	—	7
Opolskie	4	1	3	71	—	12	2	—	357	—	2	137	242	52	142	6	178	1	—	—	—	—	—	4
Poznańskie	1	—	10	112	15	466	6	—	765	—	3	158	497	88	137	3	253	—	—	—	—	—	—	14
Rzeszowskie	18	—	—	68	—	1	4	—	459	2	—	87	347	190	173	4	94	—	—	—	—	—	—	3
Szczecińskie	1	—	17	60	—	22	33	—	229	—	—	105	440	52	106	2	144	—	—	—	—	—	—	10
Warszawskie	26	2	75	182	1	48	9	4	353	—	—	210	492	157	151	1	104	1	—	—	—	—	—	18
Wrocławskie	3	—	55	229	—	23	73	—	448	—	6	314	428	71	235	1	256	2	—	—	—	—	—	20
Zielonogórskie	—	—	76	51	1	53	3	—	204	—	—	90	390	70	143	1	132	—	—	—	—	—	—	4

\*) Liczby bezwzględne

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Polioomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna		
	040		041		045—048		080			055		056		092		
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965		1964	1965	1964	1965	1964	1965	
R o k																
POLSKA	5,2	4,7	0,4	0,4	25,7	33,4	—	0,07	1,3	1,5	255,7	133,1	73,6	78,7	583,7	298,0
M. st. Warszawa	5,7	4,8	—	0,9	116,9	136,1	—	—	—	—	547,2	229,0	197,4	164,8	1109,7	313,4
M. Kraków	4,6	13,9	—	—	6,9	9,3	—	—	11,6	2,3	920,8	345,6	122,9	201,8	572,9	315,4
M. Łódź	1,6	3,2	—	—	33,6	38,4	—	—	3,2	1,6	563,6	269,0	56,0	22,4	627,6	344,2
M. Poznań	—	2,7	—	—	16,4	10,9	—	—	—	—	369,2	131,3	114,9	84,8	640,0	497,7
M. Wrocław	2,5	—	—	2,5	5,1	12,7	—	—	—	—	763,2	180,0	98,9	129,3	639,0	390,5
Białostockie	15,4	5,1	3,1	3,1	36,0	33,9	—	—	—	1,0	103,8	74,0	53,5	61,7	442,2	219,0
Bydgoskie	4,5	5,2	—	—	24,1	10,4	—	—	—	3,2	242,0	176,9	46,2	86,5	599,1	196,4
Gdańskie	6,2	2,7	1,8	—	44,4	63,4	—	—	—	—	289,7	144,8	80,9	144,0	639,0	321,7
Katowickie	1,7	4,1	—	0,3	16,3	60,7	—	—	0,7	0,3	246,6	196,7	68,8	64,8	795,8	391,8
Kieleckie	5,6	6,2	—	—	2,5	18,1	—	—	3,7	3,7	121,8	69,3	63,1	76,2	297,9	146,1
Koszalińskie	—	4,8	1,6	—	22,3	17,5	—	—	—	6,4	165,8	116,4	51,0	145,1	532,7	355,6
Krakowskie	4,4	2,8	—	—	1,6	6,6	—	—	1,6	5,5	201,3	112,2	48,7	65,8	479,4	267,1
Lubelskie	11,3	2,5	0,6	0,6	10,6	7,5	—	—	2,5	—	221,0	53,8	100,2	62,0	422,6	316,8
Łódzkie	5,0	3,6	0,7	0,7	15,7	20,6	—	—	0,7	—	230,7	74,0	39,9	19,9	422,3	241,4
Olsztyńskie	—	2,5	—	—	150,6	87,9	—	—	1,2	1,2	149,4	90,4	69,0	46,4	499,5	273,6
Opolskie	5,9	4,7	1,2	1,2	3,4	3,5	—	—	—	2,4	247,7	162,4	80,6	61,6	721,9	423,2
Poznańskie	8,4	0,6	0,6	—	3,9	5,6	—	—	—	1,7	194,8	88,7	29,2	49,4	513,2	429,5
Rzeszowskie	0,7	12,7	—	—	—	—	—	1,4	2,8	—	131,1	61,3	88,8	133,9	401,8	323,5
Szczecińskie	8,6	1,4	—	—	31,4	24,3	—	—	—	—	263,1	150,1	175,9	74,3	473,3	327,4
Warszawskie	8,6	12,6	1,0	1,0	32,5	36,4	—	—	0,5	—	191,4	102,0	68,5	76,3	713,3	171,5
Wrocławskie	2,4	1,8	—	—	25,6	33,5	—	—	3,7	3,7	335,5	191,6	48,8	43,3	681,5	273,3
Zielonogórskie	2,8	—	—	—	48,2	107,8	—	—	1,4	—	197,1	127,6	97,9	99,3	513,5	289,3

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

## Październik — 1964—1965 rok

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Paździer- nik 1965	Paździer- nik 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—X/1965	Zestawienie kumula- cyjne I—X/1964
Dur brzuszny — 040	124	137	269	853	1.319
Dury rzekome A. B. C. — 041	11	12	24	125	123
Czerwonka 045 — 048	883	678	947	5.545	7.314
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	2.808	2.287	2.710	22.588	22.330
Botulismus — 049	24	9	17	222	176
Zatrucia pokarmowe {					
Inne — 049	422	501	481	4.968	5.945
Włośnica — 123	18	19	18	261	368
Zakaźne zap. wątroby — 092	7.864	15.406	8.356	75.848	92.685
Porażenie dziec. nagm. — 080	2	—	1	10	11
Błonica — 055	41	36	209	349	631
Plonica — 050	3.513	6.750	6.543	33.270	50.075
Odra — 085	7.379	6.470	6.018	96.036	111.415
Krztusiec — 056	2.077	1.943	3.400	20.452	25.550
Zap. przyusz. nagm. — 089	3.550	7.366	4.501	97.869	68.822
Zapalenie opon mózg.-rdzen. nagminne — 057	66	71	84	854	801
Grypa 480 — 483	4.604	5.253	10.458	822.962	757.360
Dur wysypkowy sporadyczny					
Choroba Brillla 100 — 102	10	12	14	94	104
Zimnica 110 — 117	—	1	1	6	11
Wścieklizna — 094	—	1	—	2	2
Choroba Banga — 044	—	2	2	61	55
Tężec — 061	21	30	35	195	237
Róża — 052	199	233	230	1.527	2.021

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Listopad 1965

EGZ. NR 000057

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna w listopadzie 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Notuje się nieznaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 4,6—XI/1964 do 4,4—XI/1965. W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (4,4) natuje się w następujących województwach: Warszawskim — 11,2; m. Łodzi — 8,0; Białostockim — 7,2; Opolskim — 7,1; Rzeszowskim — 6,3; Kieleckim — 6,2; Bydgoskim — 5,8; Lubelskim — 5,6 i Poznańskim — 5,6.

W październiku br krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 4,7.

### 2. Dury rzekome

W listopadzie zgłoszono 5 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 27,6—XI/1964 do 29,2—XI/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do listopada 1964 r. notuje się w woj. Zielonogórskim (28,4—XI/1964; 90,8—XI/1965), Olsztyńskim (69,0—XI/1964; 107,9—XI/1965), Gdańskim (24,9—XI/1964; 63,9—XI/1965), m. st. Warszawie (92,9—XI/1964; 109,2—XI/1965) i Bydgoskim (15,4—XI/1964; 36,0—XI/1965). Natomiast znaczny spadek notuje się w woj. Poznańskim (74,7—XI/1964; 5,0—XI/1965) i Katowickim (64,0—XI/1964; 35,9—XI/1965). W listopadzie br najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. st. Warszawie — 109,2; woj. Olsztyńskim — 107,9; Zielonogórskim — 90,8; Gdańskim — 69,3; Białostockim — 36,0; Katowickim — 35,9 i Szczecińskim — 34,3.

W porównaniu z październikiem br notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 33,4—X/1965 do 29,2—XI/1965.

### 4. Zatrucia pokarmowe

Ogólna liczba zgłoszonych przypadków zatruc pokarmowych w listopadzie br wynosi 1191. Z tego 313 przypadków zatruc pokarmowych zanotowano w Technikum Rolnym w Wołowie (woj. Wrocławskie). Zachorowania zostały wywołane przez beztlenowce.

W listopadzie 1964 r. ogólna liczba zgłoszonych przypadków zatruc pokarmowych stanowi 406.

### 5. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W listopadzie br zgłoszono 1 zachorowanie z woj. Zielonogórskiego, pow. Międzyrzecz, (data zachorowania 22. X. 1965 r.).

W listopadzie 1964 r. nie notowano zachorowań.

W październiku br zgłoszono 2 zachorowania.

### 6. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 615,5—XI/1964 do 342,4—XI/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. notuje się we wszystkich województwach. Natomiast znaczny spadek obserwuje się w województwach:

Warszawskim	— 719,7—XI/1964; 249,1—XI/1965
m. st. Łodzi	— 741,0—XI/1964; 191,9—XI/1965
Opolskim	— 886,7—XI/1964; 429,1—XI/1965
Katowickim	— 866,3—XI/1964; 403,0—XI/1965



Wrocławskim	— 749,8—XI/1964; 323,3—XI/1965
Bydgoskim	— 603,0—XI/1964; 279,7—XI/1965
m. Łodzi	— 731,7—XI/1964; 416,3—XI/1965

W miesiącu sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (342,4), notuje się na terenie 12 województw; z tego najwyższe w woj. Poznańskim — 538,5; Gdańskim — 492,3; Opolskim — 429,1; m. Wrocławiu — 426,0; m. Łodzi — 416,6; m. Poznaniu — 410,2 i woj. Katowickim — 403,0.

W październiku br krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 298,0.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W miesiącu sprawozdawczym zgłoszono 41 zachorowań z terenu 12 województw (nie zgłoszono zachorowań z 10 województw). W listopadzie br najwyższe liczby przypadków zgłoszono z woj. Olsztyńskiego — 13 (pow. Mrągowo — 13), Wrocławskiego — 9 (pow. Dzierżonów — 2, pow. Kłodzko — 2, pow. Środa Śląska — 2, pow. Bolesławiec — 1, pow. Milicz — 1, pow. Strzelin — 1) i Krakowskiego — 4 (m. Nowy Sącz — 1, m. Zakopane — 1, pow. Nowy Targ — 1, pow. Żywiec — 1).

W woj. Olsztyńskim, pow. Mrągowo w Państwowym Domu Dużych Dzieci zanotowano epidemię błonicy — 15 zachorowań. Pierwszy przypadek stwierdzono w sierpniu br, następnych 5 przypadków we wrześniu i 9 przypadków w październiku.

W 10 przypadkach wyhodowano maczugowca błonicy typu gravis, zaś w 5 przypadkach potwierdzono błonicę na podstawie badań klinicznych. W 13 przypadkach zachorowania dotyczyły dzieci w wieku szkolnym, w 2 przypadkach w wieku przedszkolnym.

Epidemia szerzyła się na skutek późnego rozpoznania błonicy.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z listopadem r. ub. z 2,5—XI/1964 do 1,5—XI/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Olsztyńskim — 16,3; Wrocławskim — 5,5; m. Wrocławiu — 5,1 i m. Krakowie — 4,6.

W październiku br krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 1,5.

### 2. Płonica

Notuje się znaczny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 266,2—XI/1964 do 156,5—XI/1965. Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu 1964 r. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Bydgoskiego. W listopadzie br wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw; z tego najwyższe w m. Krakowie, m. Łodzi, m. st. Warszawie, m. Wrocławiu, woj. Bydgoskim, Wrocławskim, Opolskim, Gdańskim, Szczecińskim i Katowickim.

W porównaniu z poprzedzającym miesiącem krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł ze 133,1—X/1965 do 156,5—XI/1965.

### 3. Krztusiec

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z listopadem 1964 r. z 81,9—XI/1964 do 73,2—XI/1965. Znaczny spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. notuje się w m. st. Warszawie, m. Poznaniu, woj. Lubelskim, Opolskim, Szczecińskim i Zielonogórskim. Natomiast znaczny wzrost w woj. Kieleckim, Gdańskim i Koszalińskim.

W listopadzie br najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. Krakowie — 213,4; woj. Gdańskim — 188,4; m. st. Warszawie — 133,2; m. Wrocławiu — 116,6; woj. Koszalińskim — 105,2 i Bydgoskim — 93,6.

W październiku br krajowy wskaźnik zapadalności wyniósł — 78,7.

## ZACHOROWANIA N. (CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dziec. nagm. Polioomyelitis anterior <i>acuta</i>	Błonica Diphtheria	Łonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyszynicy nagminne Parotitis epidemica	Zapal. opon mózg. -rdzeń, nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	Numery klasyfik. międzynarodowej	040	041	045—048	571, 764	049	042	049	128	092	080	055	050	035	056	089	057	480—483	100—102	110—117	094	044	061
POLSKA	1964	6	729	1.636	15	182	209	52	16.244	—	65	7.027	9.176	2.162	11.477	66	9.104	10	1	—	2	16	207
	1965	5	770	2.148	5	489	697	3	9.036	1	41	4.131	10.963	1.933	4.542	73	19.032	8	1	—	1	16	165
M. st. Warszawa	3	1	114	43	—	28	23	—	260	—	—	317	450	139	127	11	9.220	1	—	—	—	—	12
M. Kraków	1	—	7	2	—	—	8	—	120	—	2	176	447	92	121	—	15	—	—	—	—	—	5
M. Łódź	5	—	15	108	—	82	27	—	260	—	—	225	149	14	60	—	723	—	—	—	—	—	11
M. Poznań	1	—	3	7	—	—	2	—	150	—	—	49	177	27	45	—	85	—	—	—	—	—	3
M. Wrocław	1	—	3	27	—	3	24	—	168	—	2	101	288	46	38	—	93	—	—	—	—	—	6
Białostockie	7	—	35	181	—	22	4	2	256	—	1	90	255	59	343	4	229	—	—	—	—	1	3
Bydgoskie	9	1	43	127	—	5	17	—	430	—	1	378	473	148	125	8	763	—	—	—	—	—	13
Gdańskie	5	—	78	149	—	17	68	—	554	—	—	223	821	212	137	3	327	—	—	—	—	—	8
Katowickie	3	—	106	334	—	76	—	—	1.188	—	1	571	207	224	823	—	1.925	—	—	—	—	—	5
Kieleckie	10	—	27	43	—	16	—	—	322	—	2	107	944	129	147	4	526	—	—	—	—	1	4
Koszalińskie	2	—	12	154	—	35	1	—	234	—	—	84	143	66	177	2	172	—	—	—	—	—	6
Krakowskie	3	—	10	36	—	—	3	—	562	—	4	246	907	63	654	9	541	—	—	—	—	2	8
Lubelskie	9	—	17	80	—	29	32	—	588	—	2	108	212	100	102	2	233	2	—	—	—	—	9
Łódzkie	1	1	17	105	2	2	29	—	353	—	—	118	203	50	107	3	911	—	—	—	—	—	5
Olsztyńskie	2	—	86	135	—	53	15	—	288	—	13	44	434	32	208	5	282	2	—	—	—	—	6
Opolskie	6	—	1	52	—	4	—	—	362	—	—	169	562	25	167	9	541	—	—	—	—	3	5
Poznańskie	10	2	9	75	—	2	3	—	959	—	2	154	1.037	85	264	1	883	—	—	—	—	2	9
Rzeszowskie	9	—	—	97	—	7	23	—	549	—	—	103	756	118	230	3	175	—	—	—	—	6	—
Szczecińskie	2	—	24	81	—	18	51	—	272	—	—	127	541	60	135	5	206	—	—	—	—	—	21
Warszawskie	23	—	58	118	2	53	14	1	395	—	2	251	902	158	170	2	272	—	1	—	—	—	13
Wrocławskie	4	—	41	153	1	23	352	—	530	—	9	383	542	43	238	1	539	1	—	—	—	1	10
Zielonogórskie	1	—	64	41	—	21	1	—	236	1	—	107	513	43	124	1	421	2	—	—	—	—	3

\*) Liczby bezwzględne

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria	Płonica Scarlatina	Krzusiec Pertussis		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica			
	040		041		045—048		080				055		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965			1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	4,6	4,4	0,2	0,2	27,6	29,2	—	0,04	2,5	1,5	266,2	156,5	81,9	73,2	615,5	342,4
M. st. Warszawa	9,6	2,9	0,9	0,9	92,9	109,2	—	—	1,9	—	698,6	303,8	173,4	133,2	719,7	249,1
M. Kraków	4,6	2,3	—	—	13,9	16,2	—	—	13,9	4,6	941,7	408,2	99,7	213,4	468,5	278,3
M. Łódź	6,4	8,0	—	—	9,6	24,0	—	—	3,2	—	637,2	360,2	52,8	22,4	731,7	416,3
M. Poznań	13,7	2,7	—	—	21,9	8,2	—	—	—	—	292,6	134,0	139,5	73,8	423,9	410,2
M. Wrocław	2,5	2,5	—	—	5,1	7,6	—	—	7,6	5,1	783,5	256,1	93,8	116,6	677,0	426,0
Białostockie	2,0	7,2	3,1	—	15,4	36,0	—	—	1,0	1,0	125,4	92,5	72,0	60,7	552,2	263,2
Bydgoskie	6,5	5,8	—	0,6	15,6	28,0	—	—	—	0,6	235,5	245,9	80,7	96,3	603,0	279,7
Gdańskie	1,8	4,4	—	—	24,9	69,3	—	—	0,9	—	353,7	198,2	73,8	188,4	569,6	492,3
Katowickie	1,7	1,0	—	—	60,4	35,9	—	—	1,7	0,3	236,1	193,7	78,0	76,0	866,3	403,0
Kieleckie	8,1	6,2	—	—	1,9	16,9	—	—	2,5	1,2	151,1	66,8	68,1	80,6	350,3	201,1
Koszalińskie	4,8	3,2	—	—	6,4	19,1	—	—	4,8	—	173,8	134,0	73,4	105,2	542,2	373,2
Krakowskie	1,1	1,6	—	—	3,9	5,5	—	—	1,1	2,2	207,9	136,0	66,4	34,8	549,7	310,8
Lubelskie	5,0	5,6	0,6	—	21,9	10,6	—	—	7,5	1,2	221,6	67,6	118,3	62,6	435,1	368,1
Łódzkie	2,8	0,7	—	0,7	12,8	12,1	—	—	1,4	—	202,3	84,0	52,0	35,6	490,7	251,4
Olsztyńskie	5,0	2,5	—	—	69,0	107,9	—	—	1,2	16,3	146,8	55,2	61,5	40,2	605,0	361,5
Opolskie	5,9	7,1	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	234,7	200,3	104,3	29,6	886,7	429,1
Poznańskie	4,5	5,6	—	1,1	74,7	5,0	—	—	—	1,1	157,2	86,5	32,0	47,7	598,0	538,5
Rzeszowskie	4,2	6,3	0,7	—	0,7	—	—	—	2,1	—	137,4	72,6	83,2	83,2	450,4	387,0
Szczecińskie	1,4	2,8	—	—	25,7	34,3	—	—	1,4	—	320,3	181,6	188,7	85,8	523,3	388,9
Warszawskie	7,3	11,2	—	—	21,4	28,2	—	—	1,9	1,0	160,8	122,0	85,5	76,8	741,0	191,9
Wrocławskie	3,7	2,4	—	—	15,2	25,0	—	—	6,7	5,5	366,7	233,7	42,1	26,2	749,8	323,3
Zielonogórskie	7,1	1,4	—	—	28,4	90,8	—	1,4	2,8	—	268,1	151,8	119,1	61,0	595,7	334,7

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

**Listopad 1964—1965**

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Listopad 1965	Listopad 1964	Mediana 1961-- 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—XI/1965	Zestawienie kumula- cyjne I—XI/1964	
Dur brzuszny — 040	117	121	240	970	1.440	
Duży rzekome A. B. C. — 041	5	6	17	130	129	
Czerwonka 045 — 048	770	729	734	6.315	8.043	
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	2.148	1.636	1.697	24.736	23.966	
Botulismus — 049	5	15	13	227	191	
Zatrucia pokarmowe {	Salmonellozy 042	489	182	128	5.895	3.311
		Inne — 049	697	209	319	5.665
Włośnica — 128	3	52	20	264	420	
Zakaźne zap. wątroby — 092	9.036	16.244	9.386	84.884	108.929	
Porażenie dziec. naqm. — 080	1	—	2	11	11	
Błonica — 055	41	65	192	390	696	
Płonica — 050	4.131	7.027	7.011	37.401	57.102	
Odra — 035	10.968	9.176	9.508	107.054	120.591	
Krztusiec — 056	1803	2.162	3.974	22.385	27.712	
Zap. przyusz. nagm. — 089	4512	11.477	7.234	102.411	80.299	
Zapalenie opon mózgo-rdzen. nagminne — 057	73	66	66	927	867	
Grypa 480 — 483	19.082	9.104	13.961	842.044	766.464	
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100 — 102	8	10	10	102	114	
Zimnica 110 — 117	1	1	1	7	12	
Wścieklizna — 094	—	—	—	2	2	
Choroba Banga — 044	1	2	5	62	57	
Tężec — 061	16	16	28	211	303	
Róża — 052	165	207	197	1.692	2.228	

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA  
MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY  
WARSZAWA 55, MIODOWA 15, TEL.: 313-441 w. 294



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Grudzień 1965

212

EGZ. NR

Do użytku służbowego.

# Sytuacja epidemiologiczna w grudniu 1965 r.

## I. Schorzenia szerzące się drogą pokarmową

### 1. Dur brzuszny

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z 4,7—XII/1964 do 2,7—XII/1965. W grudniu br wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 10 województw, z tego najwyższe w woj. Kieleckim — 7,5; Olsztyńskim — 7,5; Szczecińskim — 5,7; m. Łodzi — 4,8; woj. Warszawskim — 4,4; Białostockim — 4,1 i Rzeszowskim — 3,5. Nie zgłoszono zachorowań z terenu m. Krakowa, m. Poznania, woj. Koszalińskiego i Poznańskiego.

W miesiącu sprawozdawczym większych ognisk epidemicznych nie notowano.

W poprzedzającym miesiącu krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 4,4.

### 2. Dury rzekome

W grudniu zgłoszono 9 zachorowań sporadycznych.

### 3. Czerwonka

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności, w stosunku do analogicznego okresu r. ub. z 15,9—XII/1964 do 22,7—XII/1965. Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w porównaniu z grudniem 1964 r. notuje się w woj. Zielonogórskim (41,1—XII/1964; 120,6—XII/1965), Olsztyńskim (50,2—XII/1964; 110,4—XII/1965) i m. Krakowie (11,6—XII/1964; 53,3—XII/1965). W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w woj. Zielonogórskim — 120,6; Olsztyńskim — 110,4; m. st. Warszawie — 91,0; m. Krakowie — 53,3; woj. Gdańskim — 32,9; Warszawskim — 27,2 i Szczecińskim — 22,9. Natomiast najniższe w woj. Rzeszowskim — 2,1; m. Wrocławiu 2,5; woj. Poznańskim — 5,0 i m. Poznaniu — 5,5. Nie zgłoszono zachorowań z woj. Opolskiego.

W listopadzie br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 29,2.

### 4. Porażenie dziecięce nagminne (poliomyelitis anterior acuta)

W grudniu zgłoszono 2 zachorowania; w tym:

1 — zachorowanie z m. st. Warszawy, dzielnica Ochota z października 1965 r. i 1 zachorowanie z woj. Zielonogórskiego, pow. Lubsko z lutego 1965 r.

W grudniu 1964 r. nie notowano zachorowań.

W listopadzie br zgłoszono 1 zachorowanie.

### 5. Zakaźne zapalenie wątroby

W porównaniu z analogicznym okresem r. ub. notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności z 583,2—XII/1964 do 339,1—XII/1965. Spadek wskaźnika zapadalności obserwuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. Poznańskiego. Z tego znaczny spadek zanotowano w województwach:

Warszawskim	— 698,7—XII/1964;	199,2—XII/1965
Opolskim	— 976,8—XII/1964;	558,3—XII/1965
Katowickim	— 818,8—XII/1964;	414,8—XII/1965
m. st. Warszawie	— 618,1—XII/1964;	229,0—XII/1965
Wrocławskim	— 692,5—XII/1964;	318,5—XII/1965
Koszalińskim	— 668,2—XII/1964;	342,9—XII/1965
Olsztyńskim	— 657,7—XII/1964;	356,5—XII/1965

W grudniu br najwyższe wskaźniki zanotowano w woj. Opolskim — 558,3; Poznańskim — 519,9; Gdańskim — 469,2; m. Poznaniu — 459,5; Szczecińskim — 431,8 i Katowickim — 414,8.

W listopadzie br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 342,4.

## II. Schorzenia szerzące się drogą kropelkową

### 1. Błonica

W grudniu zgłoszono 29 zachorowań; z tego najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw: Krakowskiego — 9 (pow. Wadowice — 7, pow. Jaworzno — 1, pow. Kraków — 1), Wrocławskiego — 8, (pow. Kłodzko — 3, pow. Dzierżoniów — 2, pow. Nowa Ruda — 2, pow. Zgorzelec — 1), i Kieleckiego — 4, (pow. Busko — 1, pow. Sandomierz — 1, pow. Szydłowice — 1, m. Ostrowiec — 1). W woj. Krakowskim, pow. Wadowickim zanotowano epidemię błonicy. Zachorowania wystąpiły w trzech wsiach sąsiadujących — Zakrzów, Stronie, Leśnica. Zachorowania dotyczyły dzieci szkolnych. Szerzyły się prawdopodobnie drogą kontaktu — zbyt późnego rozpoznania błonicy.

W grudniu br nie zgłoszono zachorowań z terenu 14 województw.

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 2,0—XII/1964 do 1,1—XII/1965; obniżył się również w stosunku do poprzedzającego miesiąca z 1,5—XI/1965 do 1,1—XII/1965.

### 2. Płonica

Krajowy wskaźnik zapadalności obniżył się w porównaniu z grudniem 1964 r. z 254,3—XII/1964 do 170,0—XII/1965.

Spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Białostockiego, Bydgoskiego, Koszalińskiego i Opolskiego. W grudniu br najwyższe wskaźniki zapadalności notuje się w m. Łodzi — 411,5; m. Krakowie — 368,8; m. st. Warszawie — 335,4; woj. Szczecińskim — 304,6; Bydgoskim — 241,3; m. Wrocławiu — 240,9 i woj. Wrocławskim — 236,1.

W listopadzie br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 156,5.

### 3. Krztusiec

Notuje się niewielki wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z grudniem 1964 r. z 63,6—XII/1964 do 65,4—XII/1965. W miesiącu sprawozdawczym najwyższe wskaźniki notuje się w woj. Gdańskim — 172,4; m. st. Warszawie — 134,2; woj. Koszalińskim — 129,2; m. Krakowie — 127,6; woj. Rzeszowskim — 105,0; Katowickim — 97,7 i m. Poznaniu — 95,7. Najniższe wskaźniki wystąpiły w m. Łodzi — 19,2; woj. Krakowskim — 21,6; Olsztyńskim — 25,1; Poznańskim — 25,8; Wrocławskim — 28,1 i Opolskim — 28,4.

W listopadzie br krajowy wskaźnik zapadalności wynosił — 73,2.

ZACHOROWANIA NA CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis	Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.	Czerwonka Dysenteria	Biegunki u dzieci do lat 2 Enterocolitis infantum	Botulismus	Zatrucia pokarmowe		Włośnica Trichinosis	Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	Porażenie dżecz. nagm. Polioomyelitis anterior acuta	Błonica Diphtheria	Plonica Scarlatina	Odra Morbilli	Krzusiec Pertussis	Zapalenie przyuszniczy nagminne Parotitis epidemica	Zępal. opon mózgz. -rdzeń. nagm. Meningitis epidemica	Grypa Influenza	Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brillia	Zimnica Malaria	Wścieklizna Rabies	Choroba Banga Brucellosis	Tężec Tetanus	Róża Erysipelas
	040	041	045—048	571, 754	049	Salmonellozy	Inne	123	092	080	055	050	085	056	089	057	480—483	100—132	110—117	094	044	061	052
Numery klasyfik. międzynarodowej																							
POLSKA	125	7	420	1239	10	203	516	30	15393	—	53	6713	10943	1679	13896	61	10199	10	—	—	6	18	165
1964	125	7	420	1239	10	203	516	30	15393	—	53	6713	10943	1679	13896	61	10199	10	—	—	6	18	165
1965	72	9	600	1803	16	545	552	14	8951	2	29	4486	15552	1725	4785	76	43419	8	—	1	17	14	155
M. st. Warszawa	2	—	95	36	—	52	12	2	239	1	—	350	822	140	148	7	22507	1	—	—	—	—	3
M. Kraków	—	—	23	—	—	2	9	—	128	—	2	159	842	55	172	2	22	—	—	—	—	—	3
M. Łódź	3	—	6	84	—	—	61	—	190	—	1	257	276	12	31	—	690	—	—	—	—	—	16
M. Poznań	—	—	2	9	—	4	1	—	168	—	—	63	304	35	69	—	942	—	—	—	—	—	1
M. Wrocław	1	—	1	25	—	9	24	—	144	—	—	95	441	33	29	—	44	—	—	—	—	—	5
Białostockie	4	—	15	112	—	9	12	3	299	—	—	129	244	49	377	3	220	—	—	—	15	—	1
Bydgoskie	4	1	16	151	5	10	72	—	424	—	—	371	489	76	186	6	790	—	—	—	—	2	16
Gdańskie	1	—	37	108	—	9	71	—	528	—	—	198	924	194	129	6	557	—	—	—	—	—	8
Katowickie	6	—	30	243	4	110	10	—	1223	—	—	578	2358	288	729	2	9946	1	—	—	—	1	8
Kieleckie	12	—	27	30	—	15	1	—	304	—	4	170	1121	74	232	2	370	—	—	—	—	2	4
Koszalińskie	—	—	5	184	—	18	10	—	215	—	—	117	184	81	267	5	217	2	—	—	—	—	5
Krakowskie	1	—	11	15	—	—	29	—	563	—	9	256	862	39	818	7	1245	—	—	—	—	1	2
Lubelskie	5	—	20	55	—	22	4	—	582	—	1	94	438	102	102	2	491	1	—	—	—	1	8
Łódzkie	1	1	28	84	—	18	13	—	379	—	—	103	233	25	72	3	758	—	—	—	—	1	7
Olsztyńskie	6	—	88	151	—	52	4	—	284	—	—	97	775	20	150	4	288	—	—	—	1	—	11
Opolskie	1	—	—	24	3	4	8	—	471	—	—	168	788	24	142	6	1318	1	—	—	—	3	5
Poznańskie	—	1	9	55	1	10	26	—	926	—	—	180	882	46	232	1	1044	1	—	—	1	3	10
Rzeszowskie	5	1	3	56	—	2	38	—	446	—	2	115	834	149	266	11	219	—	—	—	—	—	—
Szczecińskie	4	—	16	54	—	58	52	—	302	—	—	213	529	61	119	4	198	—	—	—	—	—	13
Warszawskie	9	1	56	140	2	84	15	9	410	—	2	268	934	137	164	1	428	—	—	—	—	—	11
Wrocławskie	5	1	27	139	—	24	32	—	522	—	8	387	630	46	220	2	567	1	—	1	—	—	12
Zielonogórskie	2	3	85	48	1	33	48	—	204	—	—	118	642	39	131	2	558	—	—	—	—	—	7

\*) Liczby bezwzględne



## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRI CHOROBY ZAKAŻNE\*)

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Błonica Diphtheria		Płonica Scarlatina		Krzusiec Pertussis		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
	040		041		045—048		080		055		050		056		092	
	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965
POLSKA	4,7	2,7	0,3	0,3	15,9	22,7	—	0,07	2,0	1,1	254,3	170,0	63,6	65,4	583,2	339,1
M. st. Warszawa	2,9	1,9	—	—	84,3	91,0	—	0,9	1,9	—	873,0	335,4	161,0	134,2	618,1	229,0
M. Kraków	2,3	—	—	—	11,6	53,3	—	—	18,5	4,6	795,6	368,8	71,9	127,6	338,6	296,9
M. Łódź	4,8	4,8	—	—	4,8	9,6	—	—	1,6	1,6	590,8	411,5	56,0	19,2	525,2	304,2
M. Poznań	—	—	—	—	16,4	5,5	—	—	—	—	336,4	172,3	139,5	95,7	464,9	459,5
M. Wrocław	2,5	2,5	2,5	—	—	2,5	—	—	2,5	—	720,1	240,9	35,5	83,7	588,3	365,1
Białostockie	13,4	4,1	—	—	7,2	15,4	—	—	1,0	—	126,5	132,6	60,7	50,4	590,2	307,5
Bydgoskie	4,5	2,6	—	0,6	12,3	10,4	—	—	1,3	—	202,3	241,3	70,9	49,4	547,7	275,8
Gdańskie	2,7	0,9	—	—	38,2	32,9	—	—	—	—	363,5	176,0	80,0	172,4	655,9	469,2
Katowickie	6,1	2,0	0,3	—	15,6	10,2	—	—	1,3	—	224,5	196,0	54,9	97,7	818,8	414,8
Kieleckie	6,9	7,5	—	—	1,9	16,9	—	—	2,5	2,5	147,4	106,2	53,7	46,2	339,1	189,8
Koszalińskie	1,6	—	—	—	9,6	8,0	—	—	3,2	—	159,5	186,6	79,7	129,2	668,2	342,9
Krakowskie	4,4	0,5	—	—	1,1	6,1	—	—	1,1	5,0	155,9	141,6	33,7	21,6	471,7	311,3
Lubelskie	4,4	3,1	0,6	—	11,9	12,5	—	—	1,9	0,6	206,0	58,8	106,4	63,9	420,1	364,4
Łódzkie	2,8	0,7	0,7	0,7	9,2	19,9	—	—	2,1	—	181,6	73,3	41,3	17,8	467,2	269,9
Olsztyńskie	7,5	7,5	1,2	—	50,2	110,4	—	—	1,2	—	166,9	121,7	46,4	25,1	657,7	356,6
Opolskie	4,7	1,2	—	—	5,9	—	—	—	—	—	189,7	199,1	92,5	28,4	976,8	558,3
Poznańskie	3,9	—	—	0,6	3,4	5,0	—	—	0,6	—	119,6	101,1	26,4	25,8	509,8	519,9
Rzeszowskie	0,7	3,5	—	0,7	—	2,1	—	—	2,1	1,4	116,3	81,1	59,9	105,0	441,3	314,4
Szczecińskie	—	5,7	1,4	—	38,6	22,9	—	—	2,8	—	308,8	304,6	117,2	87,2	524,8	431,8
Warszawskie	9,2	4,4	0,5	0,5	16,0	27,2	—	—	1,4	1,0	181,2	130,2	60,2	66,6	698,7	199,2
Wrocławskie	3,7	3,0	—	1,6	12,2	16,5	—	—	6,1	4,9	352,6	236,1	31,7	28,1	692,5	318,5
Zielonogórskie	2,8	2,8	—	4,2	41,1	120,6	—	1,4	—	—	195,7	167,4	42,2	55,3	482,2	289,3

\*) Zapadalność miesięczna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

## Grudzień 1964—1965

Jednostka chorobowa i Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Grudzień 1965	Grudzień 1964	Mediana 1961— 1964	Zestawienie kumula- cyjne I—XII/1965	Zestawienie kumula- cyjne I—XII/1964
Dur brzuszny — 040	72	125	177	1.042	1.565
Dury rzekome A. B. C. — 041	9	7	14	139	136
Czerwonka 045 — 048	600	420	570	6.915	8.463
Biegunki u dzieci do lat 2 571,764	1.803	1.239	1.299	26.539	25.205
Botulismus — 049	16	10	9	243	201
Zatrucia pokarmowe { Salmonellozy 042 Inne — 049	545	203	128	6.440	3.514
	552	516	577	6.217	6.670
Włośnica — 128	14	30	32	278	450
Zakaźne zap. wątroby — 092	8.951	15.393	8.338	93.835	124.322
Porażenie dziec. nagm. — 080	2	—	1	13	11
Błonica — 055	29	53	174	419	749
Płonica — 050	4.486	6.713	6.579	41.887	63.815
Odra — 085	15.552	10.943	10.420	124.470	131.534
Krzusiec — 056	1.725	1.679	2.640	24.110	29.391
Zap. przyusz. nagm. — 089	4.785	13.896	7.058	107.196	94.195
Zapalenie opon mózgo-rdzen. nagminne — 057	76	61	54	1.003	928
Grypa 480 — 483	43.419	10.199	19.879	885.463	776.663
Dur wysypkowy sporadyczny Choroba Brill 100 — 102	8	10	14	110	124
Zimnica 110 — 117	—	—	1	7	12
Wścieklizna — 094	1	—	—	3	2
Choroba Banga — 044	17	6	5	79	63
Tężec — 061	14	18	18	225	321
Róża — 052	155	165	171	1.847	2.393

Zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej —  
Departament Sanitarno-Epidemiologiczny