

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

ROK 1966 000143

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POLSKI W ROKU 1966

CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ POKARMOWĄ

1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	1 565	29	5,0	0,09
1965	1 040	24	3,3	0,08
1966	1 074	23	3,4	0,07

W roku 1966 wyższe wskaźniki od krajowego (3,4) zanotowano w następujących województwach:

Warszawskim	— 6,8
m. Łodzi	— 6,4
Kieleckim	— 6,3
Opolskim	— 5,3
Białostockim	— 4,3
Lubelskim	— 4,3

W roku 1966 zanotowano następujące większe ogniska duru brzuszno:

1. woj. Kieleckie, pow. Kielce, w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy w okresie luty — kwiecień zanotowano 20 przypadków; z tego 17 wśród pacjentów szpitala, 3 z personelu. Zachorowania dotyczyły osób nieszczepionych p/durowi brzuszno. Przyczyną zachorowań była woda ze studni, zakażona ściekami;

2. woj. Opolskie, m. Opole — 9 zachorowań w Internacie Technikum Materiałów Wiązających. Źródłem zakażenia była nosicielka pracująca w kuchni internatu;

3. woj. Lubelskie, pow. Kraśnik, osada Zaklinów — 8 przypadków; z tego 5 stanowiły dzieci w wieku 3—14 lat. W otoczeniu chorych wykryto nosiciela;

4. woj. Bydgoskie, m. Aleksandrów Kujawski — 7 zachorowań rodzinnych. Źródłem zakażenia była nosicielka dostarczająca mleko z własnego gospodarstwa.

Zachorowania na dur brzuszny wg grup wieku w odsetkach

Rok	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25 i więcej	Razem
1965	8,1	14,6	13,6	13,7	12,3	37,7	100,0
1966	8,2	13,9	12,8	12,3	10,2	42,6	100,0

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Podział	1965		1966	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
Miasta i osiedla	541	3,5	524	3,3
Gromady	499	3,1	550	3,4
Polska	1 040	3,3	1 074	3,4

Wzrost wskaźnika zapadalności w środowisku wiejskim w większości województw spowodowany został występowaniem ognisk rodzinnych.

W roku 1966 zaszczepiono przeciwko durowi brzusznemu

Rodzaj stosowanej szczepionki	I wstrzyknięcie		II wstrzyknięcie		III wstrzyknięcie	
	Liczba zaszczepionych	% ¹⁾	Liczba zaszczepionych	% ²⁾	Liczba zaszczepionych	% ³⁾
formolowo-fenolowa	699 741	87,7	604 654	86,4	596 017	84,4
formolowo-fenolowa z tężcem	1 605 457	54,0	1 295 378	80,7	2 035 477	84,4
R a z e m	2 305 198	61,1	1 900 032	82,4	2 631 494	84,4

¹⁾ odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób podlegających szczepieniu;

²⁾ odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób, które otrzymały I wstrzyknięcie;

³⁾ odsetek zaszczepionych w stosunku do liczby osób, które otrzymały II wstrzyknięcie w roku 1965.

Na dzień 31. XII. 1966 r. zarejestrowanych było 4 719 nosicieli S. typhi.

Z 2 762 typowych nosicieli S. typhi w roku 1966 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
E 1 a	619	22,4
F 1	388	14,0
A	272	9,8
D 1	195	7,1
C 1	143	5,2
E 1 b	93	3,4
F 4	50	1,8
D 4	45	1,6
Szczepki zdegradowane	329	11,9
Szczepki nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	217	7,8

W roku 1966 u 811 zbadanych chorych na dur brzuszny (tj. 75,5% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1966) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
E 1 a	181	22,3
F 1	122	15,0
A	108	13,3
D 1	47	5,8
C 1	39	4,8
E 1 b	34	4,2
F 5	16	2,0
Szczepy zdegradowane	91	11,2
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	53	6,5

2. Dury rzekome

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	136	0,4
1965	133	0,4
1966	205	0,6

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Krakowskiego	— 37
Warszawskiego	— 24 35
Białostockiego	— 24
m. st. Warszawy	— 35 24
Katowickiego	— 21
Gdańskiego	— 15

z w/w 6 województw zgłoszono łącznie 156 zachorowań, co stanowi 76,1% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1966.

W 1966 r. zbadano 472 stałych nosicieli S. paratyphi B. Wśród tych nosicieli w roku 1966 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
Taunton	143	30,3
1	83	17,6
3 a	62	13,1
BAOR	54	11,4
3 a I war. 1,2	49	10,4
3 a I	23	4,9
Dundee	17	3,6
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	17	3,6

W roku 1966 u 197 zbadanych chorych na dury rzekome (tj. 96,1% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1966) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
Taunton	73	37,0
BAOR	63	32,0
1	32	16,2
3 a	7	3,5
3 a I war. 1,2	5	2,5
Szczepki nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	11	5,6

3. Czerwonka

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	8 463	27	27,1	0,09
1965	7 154	18	22,7	0,06
1966	8 805	7	27,8	0,02

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności kwartałami

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1964	1 899	24,7	2 439	31,4	2 298	29,2	1 827	23,0
1965	1 528	19,7	1 623	20,8	1 734	21,8	2 269	28,5
1966	1 642	21,0	1 931	24,4	2 831	35,4	2 401	30,1

Wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do roku 1965 notuje się na terenie 16 województw; z tego znaczny wzrost zanotowano w województwach:

m. st. Warszawie	— 76,3/1965;	154,7/1966
Białostockim	— 28,0/1965;	47,0/1966
Wrocławskim	— 22,2/1965;	36,4/1966
m. Krakowie	— 18,2/1965;	39,0/1966
m. Łodzi	— 19,5/1965;	39,7/1966

W roku 1966 najwyższe wskaźniki obserwowano w województwach

m. st. Warszawie	— 154,7	m. Krakowie	— 39,0
Olsztyńskim	— 75,1	Szczecińskim	— 37,0
Zielonogórskim	— 69,0	Wrocławskim	— 36,4
Białostockim	— 47,0	Warszawskim	— 31,1
m. Łodzi	— 39,7		

W roku 1966 na terenie kraju notowano liczne ogniska czerwonki w większości województw. Ogniska te dotyczyły przede wszystkim zakładów dziecięcych i młodzieżowych w m. st. Warszawie, m. Krakowie, Olsztyńskim, m. Łodzi, Koszalińskim i Wrocławskim oraz Szpitali dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w m. Krakowie, m. Łodzi, m. st. Warszawie i woj. Gdańskim.

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata
1964	25 205	1 447,4
1965	26 429	1 561,1
1966	32 896	2 006,4

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność na 10 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata i śmiertelność

Województwo	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 10 000 dzieci	Śmiertelność	
Polska	1965 r.	26 429	2 675	156,1	10,1
	1966 r.	32 896	1 051	200,6	3,2
m. Warszawa	561	13	154,2	2,3	
m. Kraków	385	5	199,6	1,3	
m. Łódź	716	40	317,6	5,6	
m. Poznań	178	—	115,5	—	
m. Wrocław	241	1	128,5	0,4	
Białostockie	3 017	61	445,2	2,0	
Bydgoskie	2 035	61	203,6	3,0	
Gdańskie	1 603	29	214,3	1,8	
Katowickie	3 395	41	204,7	1,2	
Kieleckie	712	78	73,2	10,9	
Koszalińskie	2 015	47	433,5	2,3	
Krakowskie	1 041	16	81,4	1,5	
Lubelskie	1 407	27	142,4	1,9	
Łódzkie	1 726	133	216,4	7,7	
Olsztyńskie	2 426	93	374,7	3,8	
Opolskie	1 117	10	178,0	0,9	
Poznańskie	1 619	113	139,5	7,0	
Rzeszowskie	1 071	19	108,2	1,8	
Szczecińskie	1 167	39	254,0	3,3	
Warszawskie	3 246	140	252,8	4,3	
Wrocławskie	2 318	28	222,1	1,2	
Zielonogórskie	900	57	189,8	6,3	

5. Zatrucia pokarmowe

Procentowy udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych w roku 1966

Produkty żywnościowe	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	% ognisk	% zachorowań	Salmonella		Gronkowce		Cl. perfringens		Cl. Botulinum		Inne drobno-ustroje		Czynnik nie-ustalony	
					Liczba ognisk	Liczba zachorowań	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	Liczba ognisk	Liczba zachorowań
Mięso i przetwory	104	2 716	64,3	57,5	11	281	44	1 339	6	399	8	34	12	308	23	355
Ryby i przetwory	8	126	4,9	2,7	1	69	3	38	—	—	1	4	1	5	2	10
Mleko i przetwory	13	734	8,0	15,6	—	—	12	723	—	—	—	—	—	—	1	11
Inne	37	1 141	22,8	24,2	4	278	11	271	1	16	—	—	6	349	15	227
Razem	162	4 717	100%	100%	16	628	70	2 371	7	415	9	38	19	662	41	603

Ogólna liczba ognisk zbiorowych zatruc pokarmowych zarejestrowanych w roku 1966 wynosi 212 o łącznej liczbie zachorowań 5 085 chorych, w tym:

- 1) o ustalonym czynniku bakteryjnym — 121 ognisk — 4114 chorych,
- 2) niestalonym czynnikiem bakteryjnym — 41 ognisk — 603 chorych,
- 3) spowodowanych spożyciem trujących grzybów — 49 ognisk — 320 chorych,
- 4) spowodowanych spożyciem żywności zanieczyszczonej związkami chemicznymi — 1 ognisko — 48 chorych.

W stosunku do roku 1965 liczba ognisk wzrosła o 9, a liczba zachorowań o 274.

6. Włośnica

Liczba zachorowań

1964	1965	1966
450	279	404

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Katowickiego	— 141 (hosp. 139)
Białostockiego	— 109 (hosp. 83)
Warszawskiego	— 37 (hosp. 30)
Wrocławskiego	— 27 (hosp. 23)
Gdańskiego	— 23 (hosp. 23)
Olsztyńskiego	— 17 (hosp. 10)
m. Łodzi	— 17 (hosp. 15)

Z w/w województw zgłoszono łącznie 371 zachorowań tj. 91,8% w stosunku do ogółem zgłoszonych.

W roku 1966 następujące większe ogniska miały miejsce:

1) woj. Katowickie

- m. i pow. Gliwice 1 ognisko — 42 zachorowania. Zachorowania wystąpiły po spożyciu mięsa świni na przyjęciu weselnym w Łabędach. Mięso pochodziło z uboju domowego niedokładnie zbadane na obecność włośni;
- m. Świętochłowice — 1 ognisko — 23 zachorowania. Źródłem zakażenia było mięso pochodzące z uboju niekontrolowanego (ubój domowy);
- m. Bytom — 1 ognisko — 31 zachorowań. Źródła zakażenia nie ustalono. Przypuszczalnym źródłem zakażenia były przetwory z mięsa świni poddanej ubojowi domowemu — handel pokątny.

2) woj. Białostockie

- m. Łomża — 1 ognisko — 76 zachorowań. Nie ustalono źródła zakażenia. Przypuszczalnym źródłem zakażenia była kiełbasa zakupiona w sklepie PSS.
- pow. Siemiatycze, wieś Leśniki — 1 ognisko — 29 zachorowań. Źródłem zakażenia było mięso wieprzowe i jego przetwory pochodzące z uboju niekontrolowanego (ubój domowy);

3) woj. Warszawskie

- pow. Grodzisk Mazowiecki — (gr. Gole) — 1 ognisko — 12 zachorowań. Zachorowania wystąpiły po spożyciu mięsa pochodzącego z uboju domowego;
- pow. Sokołów Podlaski — wieś Zembrów, Hołowienka — 1 ognisko — 8 zachorowań. Zachorowania wystąpiły po spożyciu mięsa świni z uboju niekontrolowanego (ubój domowy).

4) woj. Wrocławskie

— pow. Jelenia Góra, m. Cieplice Śląskie — 1 ognisko 12 zachorowań. Źródłem zakażenia było mięso świni pochodzące z uboju niekontrolowanego (ubój domowy);

5) woj. Gdańskie

— pow. Wejherowo — 1 ognisko — 18 zachorowań. Mięso świni pochodziło z uboju domowego, było badane;

6) woj. Olsztyńskie

— pow. Iława — 1 ognisko — 17 zachorowań. Źródła zakażenia nie ustalono. Prawdopodobnie zarażone mięso pochodziło z handlu uspołecznionego.

7. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	124 322	315	399,0	1,01
1965	94 146	293	298,9	0,92
1966	77 068	236	243,1	0,74

W roku 1966 najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach:

m. Poznaniu	— 371,2
m. Łodzi	— 354,8
Katowickim	— 323,6
Opolskim	— 319,6
Poznańskim	— 313,6
Szczecińskim	— 299,1
Rzeszowskim	— 273,5
Zielonogórskim	— 261,7

Spadek wskaźnika zapadalności w stosunku do roku 1965 notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem m. Krakowa, m. Łodzi i woj. Rzeszowskiego.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	30 531	394,1	19 607	253,1	27 141	346,6	47 043	600,7
1965	31 975	412,6	18 279	233,9	17 962	226,2	25 930	326,6
1966	20 353	260,3	13 863	175,4	17 230	215,7	25 622	320,8

Odsetek hospitalizowanych chorych na zakaźne zapalenie wątroby

1964	1965	1966
81,8	88,9	92,9

8. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Zachorowania			Zapadalność na 100 000 ludności	Zgony			Umieralność na 100 000 ludności
	Polio-myelitis	Parapolio-myelitis	Razem		Polio-myelitis	Parapolio-myelitis	Razem	
1964	9	2	11	0,03	2	—	2	0,007
1965	19	—	19	0,06	—	—	—	—
1966	7 ^{*)}	—	7	0,02	1	—	1	0,003

^{*)} przypadki niezwyfikowane

W roku 1966 zanotowano 7 zachorowań w następujących województwach, powiatach i miesiącach

Województwo	Powiat	Liczba zachorowań ^{*)}	Miesiące (wg daty zachorowania)
m. st. Warszawa	dz. Wola	1	listopad
Gdańskie	pow. Wejherowo	1 (zgon)	czerwiec
Katowickie	m. Chorzów	1	czerwiec
Krakowskie	pow. Nowy Sącz	1	kwiecień
Opolskie	pow. Namysłów	1	lipiec
Rzeszowskie	m. Stalowa Wola	1	lipiec
Wrocławskie	pow. Nowa Ruda	1	październik

Liczba zachorowań na poliomyelitis w grupach wieku

Rok	0—3	4—7	8—14	15 i więcej	Razem
1964	3	2	4	2	11
1965	8	1	4	6	19
1966	4	2	—	1	7

Szczepienia przeciwko poliomyelitis

Rok	Szczepienia pod- skórne (2 wstrzyk- nięcia)		Szczepienia doustne			
	Liczba zaszcze- pionych	% za- szczepio- nych w sto- sunku do licz- by pod- lega- jących	I typ		II typ	
			Liczba zaszcze- pionych	% za- szczepio- nych w sto- sunku do licz- by pod- lega- jących	Liczba zaszcze- pionych	% za- szczepio- nych w sto- sunku do licz- by pod- lega- jących
1965	508 607	85,7	878 791	97,5	917 326	90,7
1966	243 873**	51,6	797 643	96,1	834 318	97,1

**) szczepienia były prowadzone do wyczerpania rezerw szczepionki Salka

CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ

1. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność na 100 000 ludności i śmiertelność

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1964	776 663	1 181	2 492,2	0,15
1965	894 028	827	2 838,5	0,09
1966	645 170	79	2 035,4	0,01

W roku 1966 wskaźniki zapadalności z powodu zachorowań grypopochodnych w poszczególnych województwach kształtowały się następująco:

- 1) m. Wrocław — 12 503,9
- 2) m. Łódź — 9 459,6
- 3) m. Warszawa — 8 779,9
- 4) m. Kraków — 5 031,6
- 5) Gdańskie — 4 945,1
- 6) m. Poznań — 3 434,5
- 7) Katowickie — 2 695,0
- 8) Szczecińskie — 1 970,7
- 9) Wrocławskie — 1 393,6
- 10) Zielonogórskie — 1 335,4
- 11) Łódzkie — 1 221,7
- 12) Bydgoskie — 1 133,9
- 13) Krakowskie — 1 116,6
- 14) Opolskie — 997,6
- 15) Poznańskie — 811,7
- 16) Kieleckie — 740,0
- 17) Koszalińskie — 725,4
- 18) Olsztyńskie — 642,6
- 19) Białostockie — 419,4
- 20) Warszawskie — 383,8
- 21) Rzeszowskie — 350,6
- 22) Lubelskie — 282,1

Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1965	9 900,0	696,8	55,9	856,5
1966	7 264,2	206,8	68,1	693,9

W roku 1966 nasilenie zachorowań notowano w I kwartale (567 959 przypadków).

Pracownie wirusologiczne wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (w liczbie 12) przeprowadziły badania diagnostyczno-serologiczne materiału pobranego od osób podejrzanych o zachorowanie na grypę i wykazały w surowicach krwi wzrost 4-krotny przeciwciał w stosunku dla wirusa grypy B.

Pracownie wirusologiczne woj. stacji san.-epid. w Białymstoku, Katowicach i Krakowie izolowały:

- 1) prac. w Białymstoku — 1 szczep wirusa grypy A2
— 1 szczep wirusa grypy B
- 2) prac. w Katowicach — 2 szczepy wirusa grypy B
- 3) prac. w Krakowie — 3 szczepy wirusa grypy B

Równocześnie na terenie kraju 10 pracowni wirusologicznych przeprowadziło przegląd serologiczny w kierunku grypy z prób krwi pobranych losowo u ludzi zdrowych. Wyniki tych prób przedstawia poniższa tabela:

Województwo	Liczba zbadanych prób	Odsetki wyników	
		dodatnich A	dodatnich B
R a z e m	8 587	44,3	86,5
Białystok	1 409	76,4	76,3
Bydgoszcz	1 024	79,3	94,1
Gdańsk	487	5,7	72,5
Katowice	840	10,5	91,9
Kraków	720	97,1	99,3
Łódź	703	26,7	85,6
Opole	742	64,0	90,3
Rzeszów	1 078	8,3	73,7
Warszawa	682	8,2	90,6
Wrocław	902	32,3	95,3

2. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	749	55	2,4	0,18
1965	414	29	1,3	0,09
1966	248	15	0,8	0,05

W roku 1966 nie notowano zachorowań na terenie m. Poznania i woj. Gdańskiego.

W roku 1966 wyższe wskaźniki od krajowego (0,8) notuje się na terenie 7 następujących województw:

m. Krakowa	— 2,7
Kieleckiego	— 2,5
Koszalińskiego	— 1,7
Warszawskiego	— 1,5
Wrocławskiego	— 1,4
m. Wrocławia	— 1,0
Krakowskiego	— 0,9

W roku 1966 notowano następujące ogniska błonicy:

1) woj. Kieleckie, pow. Szydłowiec — 1 ognisko w czasie od 1. XI. 1966 r. do 20. I. 1967 r. Łącznie zanotowano 27 zachorowań; w tym w grupie wieku 0—7 lat — 4 przypadki, 8—14 lat — 16 przypadków, 15 i więcej lat — 7 przypadków. U 13 chorych rozpoznanie zostało potwierdzone hodowlą maczugowca błonicy typu gravis.

2) woj. Warszawskie, pow. Płońsk — 24 zachorowania; z tego 20 zachorowań w Domu Dziecka. 3 zachorowania z terenu m. Płońska, 1 zachorowanie z terenu Gromadzkiej Rady Narodowej — Płońsk. Zachorowania wystąpiły w okresie od 23. IX. — 7. X. 1966 r. Z w/w chorych 21 przypadków dotyczyło dzieci w wieku do lat 14, pozostałe 3 przypadki powyżej lat 14. Zanotowano — 1 zgon (dziecko — 7-letnie, nieszczepione).

3) woj. Wrocławskie, pow. Kłodzko — Prewentorium Przeciwgruźlicze Szczyt-na-Zamek, w styczniu i lutym zanotowano 13 przypadków, z tego 9 przypadków dzieci w wieku szkolnym oraz 4 przypadki w wieku 14 mies., 14 mies., 2 lata i 20 lat. Wszystkie w/w przypadki potwierdzone bakteriologicznie.

4) woj. Wrocławskie, pow. Jelenia Góra — 6 przypadków. Notowane zachorowania w 3 przypadkach dotyczyły dzieci w wieku przedszkolnym, w 2 w wieku szkolnym oraz w jednym osoby w wieku 43 lat.

Liczba zachorowań wśród szczepionych i nieszczepionych w grupach wieku w roku 1966

Woje- wództwo	Razem		0—2		3—6		7—14		15 i więcej lat	
	szcze- pieni	nie- szcze- pieni	szcze- pieni	nie- szcze- pieni	szcze- pieni	nie- szcze- pieni	szcze- pieni	nie- szcze- pieni	szcze- pieni	nie- szcze- pieni
POLSKA	85	163	26	11	20	22	38	81	1	49
m. st. Warszawa	—	3	—	1	—	2	—	—	—	—
m. Kraków	7	8	2	1	3	—	2	1	—	6
m. Łódź	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
m. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
m. Wrocław	4	1	1	—	1	—	2	—	—	1
Białostockie	1	2	—	1	—	—	1	—	—	1
Bydgoskie	—	4	—	—	—	2	—	—	—	2
Gdańskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Katowickie	7	15	1	1	4	2	2	7	—	5
Kieleckie	9	38	4	2	4	6	1	21	—	9
Koszalińskie	3	10	1	2	1	—	1	6	—	2
Krakowskie	8	12	6	1	1	1	1	5	—	5
Lubelskie	5	9	2	1	—	1	3	7	—	—
Łódzkie	5	4	1	—	1	—	3	1	—	3
Olsztyńskie	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—
Opolskie	1	2	—	—	1	1	—	1	—	—
Poznańskie	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Rzeszowskie	4	6	2	—	2	2	—	2	—	2
Szczecińskie	1	3	—	—	—	1	1	—	—	2
Warszawskie	10	28	—	—	1	2	8	21	1	5
Wrocławskie	17	11	5	—	1	1	11	7	—	3
Zielonogórskie	1	4	—	—	—	1	1	1	—	2

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku

Rok	0—3		4—7		8—14		15—24		25 i więcej		Razem	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1965	76	3,3	94	3,4	156	3,2	63	1,3	25	0,15	414	1,3
1966	49	2,3	49	1,9	100	2,7	36	0,7	14	0,08	248	0,8

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Podział	1965		1966	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
Miasta i osiedla	238	1,5	110	0,7
Gromady	176	1,1	138	0,9
POLSKA	414	1,3	248	0,8

Szczepienia ochronne przeciwko błonicy

Rok	Dzieci zaszczepione podstawowo (3 wstrzykn.)		Szczepienia powtórne		Liczba zaszczepionych dzieci w wieku 8—14 lat wg wskazań epidemicznych
	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	
1965	632 592	83,6	1 261 536	95,9	479 494
1966	584 237 ¹⁾	86,9	1 404 390 ²⁾	97,0	187 224

¹⁾ w tym: w roku 1966 zaszczepiono podstawowo szczepionkami skojarzonymi (błonica-tężec-krztusiec, błonica-tężec) — 581 040 dzieci;

²⁾ powtórnie — 1 368 823 dzieci.

3. Płonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	63 815	14	204,8	0,04
1965	41 870	19	132,9	0,06
1966	49 695	10	156,8	0,03

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1964	20 841	265,6	13 059	168,1	9 425	120,0	20 490	258,2
1965	14 221	183,5	9 254	118,4	6 260	78,8	12 135	152,5
1966	12 777	163,4	10 280	130,0	8 143	101,9	18 495	231,5

W roku 1966 najwyższe wskaźniki zapadalności notowano w województwach:

m. Łodzi	— 368,9
m. Krakowie	— 316,6
m. st. Warszawie	— 295,5
Szczecińskim	— 208,7
Gdańskim	— 206,2
Opolskim	— 196,2
Bydgoskim	— 189,0
Katowickim	— 185,8
Wrocławskim	— 184,5
Zielonogórskim	— 180,0

4. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	131 534	258	422,1	0,83
1965	124 596	201	395,6	0,63
1966	134 442	63	424,1	0,20

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1964	44 279	576,3	45 285	582,9	15 381	195,8	26 589	335,0
1965	35 089	452,8	37 773	483,4	15 959	201,0	35 775	449,7
1966	45 261	578,9	45 214	571,9	13 920	174,3	30 047	376,2

W roku 1966 notuje się najwyższą zapadalność w okresie powojennym z wyjątkiem roku 1961 (1961 r. — 464,3 na 100 000; 1966 r. — 424,1 na 100 000).

Wyższą zapadalność od średniej krajowej w roku 1965 i 1966 notują następujące województwa: m. st. Warszawa, m. Kraków, m. Poznań, woj. Gdańskie, Katowickie, Opolskie, Szczecińskie i Zielonogórskie.

5. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1964	29 391	134	94,3	0,43
1965	24 109	80	76,5	0,25
1966	31 114	39	98,1	0,12

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Rok	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1964	7 647	99,5	7 915	101,9	8 045	102,4	5 784	72,9
1965	4 846	62,5	5 871	75,1	7 666	96,6	5 726	72,0
1966	4 803	61,4	6 581	83,2	10 968	137,3	8 762	109,7

W roku 1966 wyższe wskaźniki od krajowego (98,1) notowano na terenie 10 następujących województw:

m. Krakowie	— 319,0	Szczecińskim	— 128,1
m. Wrocławiu	— 203,8	Katowickim	— 125,4
m. Łodzi	— 178,1	Koszalińskim	— 125,4
m. Warszawie	— 142,9	Bydgoskim	— 110,4
Gdańskim	— 141,0	Zielonogórskim	— 100,9

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do roku 1965 zanotowano w m. Krakowie, m. Łodzi, m. Wrocławiu, woj. Krakowskim, Łódzkim i Wrocławskim.

INNE CHOROBY

1. Wąglik

W roku 1966 zgłoszono 4 przypadki z terenu następujących województw:

- 1) Rzeszowskiego — 2 (pow.: Lubaczów, Przeworsk)
- 2) Opolskiego — 1 (pow. Oleśno)
- 3) Szczecińskiego — 1 (pow. Goleniów)

W roku 1965 zgłoszono 8 przypadków.

2. Tężec

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności, i śmiertelność

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1964	321	147	1,0	0,47	45,8
1965	228	101	0,7	0,32	44,3
1966	199	67	0,6	0,21	33,7

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Rzeszowskiego	— 38 (2,2 na 100 000 ludn.)
Krakowskiego	— 37 (1,7 na 100 000 ludn.)
Kieleckiego	— 20 (1,0 na 100 000 ludn.)
Katowickiego	— 16 (0,4 na 100 000 ludn.)
Lubelskiego	— 15 (0,8 na 100 000 ludn.)
Warszawskiego	— 12 (0,5 na 100 000 ludn.)

Z w/w 5 województw zgłoszono łącznie 138 przypadki tężca, co stanowi 69,3% w stosunku do ogółem zgłoszonych.

W roku 1966 zanotowano 67 (100%) zgonów; w tym:

- 1) 14 zgonów dotyczyło noworodków (20,9%)
- 2) 1 zgon w wieku — 4 lata (1,5%)
- 3) 3 zgony w grupie wieku 8—14 lat (4,5%)
- 4) 49 zgonów powyżej lat 15 (73,1%)

Zgony wśród noworodków zanotowano w województwach:

- 1) Krakowskim 5 (pow.: Limanowa — 2, Nowy Sącz — 2, Myślenice — 1)
- 2) Kieleckim 3 (pow.: Lipno — 1, Opatów — 1, Radom — 1)
- 3) Rzeszowskim 2 (pow.: Dębica — 1, Jarosław — 1)
- 4) Białostockim 2 (pow. Sokółka — 2)
- 5) Łódzkim 1 (pow. Piotrków Trybunalski — 1)
- 6) Warszawskim 1 (pow. Płock — 1).

W roku 1966 zachorowania wśród noworodków stanowią 10,5% w stosunku do ogółem zgłoszonych, a zachorowania w grupie wieku 0—14 lat 24,6%.

Zapadalność w grupie noworodków na 100 000 w stosunku do żywourodzonych w roku 1966 wynosi 4,0.

Liczba zachorowań na tężec w roku 1966

Dane ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne — form. E. II. 12.

Województwo	Ogółem	w t y m :														
		Od 0 do 28 dnia życia						Od 29 dnia życia do 11 m-cy								
		Razem	w tym:				Razem	w tym:				od 1—3 lat	od 4—7 lat	od 8—14 lat	15 i więcej lat	Brak danych
			od 0—7 dnia życia	od 8—14 dnia życia	od 15—21 dnia życia	od 22—28 dnia życia		od 29 dni do 3 miesięcy	od 4—11 miesięcy							
POLSKA	1965	225	17	12	5	—	—	3	2	1	3	6	20	175	1	
	1966	199	21	12	9	—	—	2	2	—	1	6	19	150	—	
M. st. Warszawa		3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	
M. Kraków		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
M. Łódź		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
M. Poznań		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
M. Wrocław		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
Białostockie		6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	
Bydgoskie		7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	
Gdańskie		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Katowickie		16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	—	
Kieleckie		20	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	
Koszalińskie		7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	
Krakowskie		37	6	4	2	—	—	1	1	—	1	—	—	29	—	
Lubelskie		15	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	
Łódzkie		2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
Olsztyńskie		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Opolskie		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	
Poznańskie		5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
Rzeszowskie		38	3	2	1	—	—	—	—	—	—	4	3	28	—	
Szczecińskie		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
Warszawskie		12	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	
Wrocławskie		9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	—	
Zielonogórskie		5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	

3. Brucelozą

Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności, odsetek hospitalizowanych chorych

Rok	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Odsetek hospitalizowanych chorych
1964	63	0,19	87,3
1965	78	0,25	92,3
1966	135	0,42	66,4

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zanotowano w województwach:

Białostockim	— 37	(zap. 3,2 na 100 000 ludn.)
Olsztyńskim	— 30	(zap. 3,1 na 100 000 ludn.)
Poznańskim	— 17	(zap. 0,8 na 100 000 ludn.)
Wrocławskim	— 13	(zap. 0,6 na 100 000 ludn.)
Szczecińskim	— 7	(zap. 0,8 na 100 000 ludn.)
Bydgoskim	— 7	(zap. 0,4 na 100 000 ludn.)

Z w/w 6 województw zgłoszono łącznie 111 zachorowań, tj. 82,2% w stosunku do ogółem zgłoszonych.

4. Choroba Brillą i inne riketsjozy

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	124	3	0,4
1965	115	4	0,4
1966	110	3	0,3

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Lubelskiego	— 27	(1,4 na 100 000 ludności)
Białostockiego	— 20	(1,7 na 100 000 ludności)
Warszawskiego	— 17	(0,7 na 100 000 ludności)
Wrocławskiego	— 11	(0,5 na 100 000 ludności)

Z w/w województw zgłoszono łącznie 75 zachorowań.

U w a g a

- 1) liczby zgonów w latach 1964—1965 wg danych GUS
- 2) liczby zgonów w r. 1966 — wg danych stacji sanitarno-epidemiologicznych

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dury brzuszy	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe	
					Botulismus	Inne
1	2	3	4	5	6	7
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045— 048	049	
Polska	1 040	133	6 500	7 154	252	6 550
1965	1 040	133	6 500	7 154	252	6 550
1966	1 074	205	6 343	8 805	428	8 498
M. st. Warszawa	33	24	418	1 951	5	238
M. Kraków	12	3	42	205	1	182
M. Łódź	48	2	209	296	1	413
M. Poznań	7	—	69	73	5	43
M. Wrocław	12	—	79	24	4	474
Białostockie	50	24	184	548	18	380
Bydgoskie	47	1	614	256	100	816
Gdańskie	47	15	358	379	15	832
Katowickie	71	21	1 031	344	6	177
Kieleckie	121	3	126	260	4	104
Koszalińskie	18	1	204	213	10	179
Krakowskie	51	37	35	312	—	285
Lubelskie	82	6	210	365	15	451
Łódzkie	44	11	297	262	13	416
Olsztyńskie	18	1	553	722	13	348
Opolskie	54	1	100	36	21	332
Poznańskie	53	2	123	117	113	326
Rzeszowskie	43	8	70	51	3	174
Szczecińskie	16	2	205	316	22	875
Warszawskie	167	35	725	767	14	419
Wrocławskie	65	8	312	720	21	872
Zielonogórskie	15	—	379	588	24	162

*) Liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Rok 1965—1966

Płonica	Róża	Błonica	Krzusiec	Zapalenie opon mózgowo-rdzenio- wych nagninne	Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyusz- nicy nagninne
8	9	10	11	12	13	14	15	17	16
050	052	055	056	057	061	085	086	087	089
41 870	1 842	414	24 109	1 011	228	124 596	.	.	107 155
49 695	2 570	248	31 114	915	199	134 442	20 744	77 568	34 409
3 727	129	3	1 802	58	3	12 781	2 559	7 137	964
1 662	27	14	1 675	5	3	4 728	245	2 637	1 447
2 750	173	1	1 328	10	1	3 142	616	3 324	489
683	29	—	363	1	—	3 180	1 415	2 285	1 143
858	84	5	973	2	3	2 483	779	1 574	211
1 330	70	3	1 057	46	6	3 650	573	2 661	1 403
3 488	213	4	2 038	63	7	10 703	1 300	4 260	1 373
2 811	152	—	1 923	16	—	9 345	712	6 244	1 906
6 579	165	22	4 441	54	16	15 069	3 957	9 951	4 726
1 703	73	47	1 563	45	20	5 197	232	3 489	1 448
1 327	120	13	954	26	7	4 803	418	1 802	1 731
2 585	120	20	1 953	114	37	7 532	502	4 371	2 692
1 295	91	14	1 367	30	15	3 987	495	2 896	771
2 107	125	9	1 342	23	2	2 679	142	1 997	793
1 125	123	4	667	106	2	4 358	814	2 891	1 254
1 990	90	3	721	101	6	4 546	656	1 552	1 248
2 107	111	1	1 088	65	5	6 961	748	1 797	1 911
1 694	81	10	1 066	55	38	5 796	281	2 580	1 880
1 783	167	4	1 094	26	2	3 959	641	3 064	1 823
2 911	185	38	1 580	16	12	6 560	1 379	3 505	1 129
3 646	177	28	1 259	43	9	8 267	1 290	4 890	2 508
1 534	65	5	860	10	5	4 716	990	2 661	1 559

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakaźne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Bruceleza	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Tularemia	Wąglik
18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480—483	571, 764	044	051	059	062
Polska 1965	94 146	1 965	894 028	26 429	78	.	.	8
1966	77 068	2 745	645 170	32 896	135	25 103	1	4
M. st. Warszawa	2 165	71	110 741	561	2	727	—	—
M. Kraków	1 295	87	26 416	385	—	149	—	—
M. Łódź	2 645	380	70 512	716	—	60	—	—
M. Poznań	1 636	175	15 136	178	1	90	—	—
M. Wrocław	1 231	12	59 681	241	1	392	—	—
Białostockie	2 272	75	4 888	3 017	37	279	1	—
Bydgoskie	3 178	207	20 930	2 035	7	4 992	—	—
Gdańskie	3 429	302	67 426	1 603	3	4 324	—	—
Katowickie	11 457	477	95 412	3 395	—	897	—	—
Kieleckie	2 718	33	14 086	712	—	273	—	—
Koszalińskie	1 938	21	5 519	2 015	4	326	—	—
Krakowskie	4 455	56	23 856	1 041	—	558	—	—
Lubelskie	4 806	39	5 381	1 407	1	511	—	—
Łódzkie	3 982	139	20 391	1 726	2	1 217	—	—
Olsztyńskie	2 089	82	6 181	2 426	30	3 289	—	—
Opolskie	3 241	34	10 116	1 117	3	1 043	—	1
Poznańskie	6 698	95	17 334	1 619	17	275	—	—
Rzeszowskie	4 651	26	5 963	1 071	—	295	—	2
Szczecińskie	2 555	180	16 834	1 167	7	1 037	—	1
Warszawskie	3 606	49	9 448	3 246	3	1 727	—	—
Wrocławskie	4 791	169	27 540	2 318	13	2 099	—	—
Zielonogórskie	2 230	36	11 379	900	4	543	—	—

*) Liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Rok 1965—1966

Listerioza	Różyczka	Żółtaczką zakaźną krętkowa	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Wścieklizna	Jaglica	Pryszczycza	Dur wyspkowy sporadyczny (Choroba Brill)	Zimnica	Toksoplazmoza	Włośnica	Grzybica	Świerzb
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
064	064.4	072, 074	080	082—083	094	095	096.6	100—102, 108	110—117	122.1	128	131	135
.	.	.	19	.	3	.	.	115	3	.	279	.	.
9	398	119	7**)	152	—	22	1	110	11	3	404	1 852	104012
—	2	—	1	7	—	—	—	7	1	1	11	13	1 150
—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	10	667
—	3	—	—	3	—	—	—	2	—	—	17	94	3 973
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2 385
—	—	19	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	485
2	15	—	—	7	—	8	—	20	—	—	109	49	1 603
—	58	3	—	10	—	—	—	—	1	—	2	290	10 913
—	10	—	1	1	—	—	—	6	—	—	23	88	8 534
—	34	1	1	4	—	3	—	3	1	1	141	12	10 431
—	31	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4	40	2 665
—	45	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	212	7 867
—	43	5	1	—	—	5	—	2	—	—	—	43	2 390
—	13	1	—	2	—	—	—	27	—	—	7	71	1 117
—	15	1	—	21	—	—	—	1	—	—	1	200	3 134
—	16	2	—	5	—	—	—	3	1	—	17	152	4 554
7	8	28	1	2	—	2	—	1	1	—	4	4	3 754
—	7	1	—	15	—	—	—	2	—	1	4	88	4 809
—	11	1	1	6	—	—	1	3	—	—	—	38	2 119
—	25	10	—	7	—	—	—	2	3	—	—	184	12 217
—	16	3	—	12	—	3	—	17	1	—	37	130	2 707
—	22	40	1	7	—	—	—	11	1	—	27	56	7 627
—	23	3	—	27	—	—	—	2	1	—	—	73	8 911

**) przypadki niezwerfikowane

ZGONY NA

Województwo	Dur brzusny	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonełły	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica	Róża	Błonica	Krzusiec	Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych nagminne	Tężec	Odra	
					Botulismus	Inne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045— 048	049		050	052	055	056	057	061	085	
POLSKA	1965	24	24	73	18	176		19	17	29	80	42	101	201
	1966	23	2	129	7	7	77	10	7	15	39	53	67	63
M. st. Warszawa	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	
M. Kraków	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	
M. Łódź	1	—	1	—	—	2	—	1	—	4	—	—	3	
M. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
M. Wrocław	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
Białostockie	2	1	6	—	1	2	—	—	1	4	3	2	1	
Bydgoskie	—	—	6	—	1	9	3	1	3	1	7	3	1	
Gdańskie	1	1	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
Katowickie	1	—	15	—	—	1	1	—	—	5	4	5	3	
Kieleckie	1	—	1	—	—	1	1	—	3	4	2	6	7	
Koszalińskie	1	—	1	—	—	4	—	—	1	1	—	4	2	
Krakowskie	2	—	—	1	—	4	2	2	—	—	7	11	5	
Lubelskie	1	—	16	—	—	2	—	—	—	1	1	7	—	
Łódzkie	1	—	9	—	—	5	1	—	2	4	1	1	1	
Olsztyńskie	—	—	20	1	2	1	—	1	—	4	11	1	9	
Opolskie	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	
Poznańskie	3	—	3	—	1	9	—	—	—	—	3	1	5	
Rzeszowskie	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	4	13	6	
Szczecińskie	—	—	7	—	—	9	—	1	1	6	5	1	6	
Warszawskie	4	—	15	—	—	4	1	—	2	2	—	3	4	
Wrocławskie	1	—	7	1	1	13	—	1	2	1	2	3	5	
Zielonogórskie	2	—	10	—	1	5	—	—	—	—	1	2	—	

*) liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyusznic nagminne	Zakażne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Brucelozą	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Dur wysypkowy spora- dyczny (Choroba Brill)	Włośnica
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
086	087	089	092	125, 126	480— 483	571, 764	044	051	080	082 —083	100— 102, 108	128
4	11	2	293	9	827	2675	1	17	—	35	4	3
1	8	3	236	1	79	1051	1	1	1	18	3	2
—	—	—	32	—	5	13	—	—	—	1	—	—
—	—	—	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—
—	1	—	20	—	—	40	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	7	—	1	61	—	—	—	3	2	—
—	1	—	4	1	4	61	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	—	2	29	—	—	1	—	—	—
1	—	—	35	—	—	41	—	—	—	—	—	—
—	—	—	8	—	8	78	—	—	—	1	—	—
—	—	—	6	—	—	47	—	—	—	1	—	—
—	—	1	9	—	3	16	—	—	—	—	—	—
—	—	—	13	—	—	27	—	—	—	1	1	—
—	—	—	4	—	15	133	—	—	—	4	—	—
—	2	—	10	—	1	93	1	—	—	3	—	—
—	—	2	5	—	1	10	—	1	—	—	—	—
—	2	—	16	—	13	113	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3	—	2	19	—	—	—	—	—	—
—	—	—	12	—	—	39	—	—	—	1	—	—
—	1	—	11	—	17	140	—	—	—	—	—	1
—	1	—	24	—	6	28	—	—	—	2	—	—
—	—	—	4	—	1	57	—	—	—	1	—	—

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040		041		045—048		050	
Rok	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
Polska	3,3	3,4	0,4	0,6	22,7	27,8	132,9	156,8
M. Warszawa	3,3	2,6	0,6	1,9	76,3	154,7	292,4	295,5
M. Kraków	2,9	2,3	0,6	0,6	18,2	39,0	372,8	316,6
M. Łódź	3,5	6,4	0,3	0,3	19,5	39,7	256,1	368,9
M. Poznań	1,4	1,6	0,2	—	13,1	16,6	139,4	155,0
M. Wrocław	1,9	2,5	0,4	—	5,3	5,0	254,6	179,8
Białostockie	4,3	4,3	2,1	2,0	28,0	47,0	80,0	114,1
Bydgoskie	3,0	2,5	0,2	0,05	13,6	13,9	139,2	189,0
Gdańskie	3,3	3,4	0,3	1,1	49,9	27,8	176,3	206,2
Katowickie	1,9	2,0	0,1	0,6	15,5	9,7	152,5	185,8
Kieleckie	4,7	6,3	0,1	0,1	25,1	13,6	71,8	89,5
Koszalińskie	4,1	2,4	0,1	0,1	37,8	28,0	132,7	174,4
Krakowskie	2,4	2,4	0,1	1,7	4,6	14,6	108,4	121,0
Lubelskie	3,3	4,3	0,4	0,3	12,3	19,1	74,0	67,9
Łódzkie	1,7	2,6	0,8	0,6	13,5	15,7	78,3	126,2
Olsztyńskie	2,6	1,9	0,1	0,1	71,2	75,1	88,0	117,0
Opolskie	3,9	5,3	0,1	0,1	6,8	3,5	141,0	196,2
Poznańskie	2,5	2,5	0,3	0,1	4,6	5,3	71,9	98,7
Rzeszowskie	3,8	2,5	0,7	0,5	1,3	3,0	77,0	99,6
Szczecińskie	3,7	1,9	0,2	0,2	36,1	37,0	186,6	208,7
Warszawskie	7,1	6,8	0,4	1,4	27,9	31,1	98,4	118,3
Wrocławskie	3,4	3,3	1,0	0,4	22,2	36,4	192,3	184,5
Zielonogórskie	1,6	1,8	0,7	—	56,3	69,0	133,7	180,0

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne — Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		056		080		085		092	
1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
1,3	0,8	76,5	98,1	0,06	0,02	395,6	424,1	298,9	243,1
—	0,2	142,7	142,9	0,24	0,08	635,1	1013,3	247,2	171,6
2,1	2,7	159,7	319,0	—	—	799,8	900,6	237,7	246,7
1,7	0,1	24,4	178,1	—	—	624,2	421,5	342,2	354,8
0,2	—	176,6	82,4	—	—	754,3	721,6	376,4	371,2
1,5	1,0	73,6	203,8	—	—	379,3	520,2	315,2	257,9
0,7	0,2	52,0	90,7	—	—	339,2	313,2	250,8	194,9
0,4	0,2	73,2	110,4	—	—	371,4	579,8	247,3	172,2
0,4	—	185,7	141,0	—	0,07	575,9	685,4	349,7	251,5
0,5	0,6	72,5	125,4	—	0,03	537,3	425,6	401,9	323,6
2,0	2,5	55,7	82,1	—	—	229,7	273,0	159,4	142,8
1,5	1,7	90,4	125,4	—	—	180,5	631,3	366,6	254,7
3,4	0,9	44,1	91,4	0,19	0,05	304,3	352,5	273,3	208,5
1,1	0,7	85,4	71,7	—	—	261,5	209,0	280,8	252,0
1,9	0,5	29,1	80,4	—	—	287,7	160,5	243,7	238,6
2,1	0,4	73,6	69,3	—	—	381,9	453,1	318,9	217,2
1,8	0,3	64,5	71,1	—	0,10	412,3	448,3	455,1	319,6
0,2	0,04	51,0	50,9	0,05	—	282,3	325,9	373,7	313,6
1,1	0,6	106,0	62,7	0,12	0,06	281,3	340,8	257,3	273,5
1,1	0,5	87,2	128,1	—	—	792,9	463,5	311,6	299,1
0,8	1,5	91,1	64,2	0,16	—	291,9	266,5	233,0	146,5
4,0	1,4	36,7	63,7	0,15	0,05	353,3	418,3	316,6	242,4
0,2	0,6	59,1	100,9	0,24	—	487,6	553,4	283,3	261,7

*) Zapadalność roczna na 100 000 ludności

LICZBA ZACHOROWAŃ WEDŁUG KWARTAŁÓW*)

Jednostka chorobowa	Nr Nr według klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1966				Rok 1965				
		1. I.—2. IV. 1966	3. IV.—2. VII. 1966	3. VII.—1. X. 1966	2. X.—31. XII. 1966	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		Dur brzuszny	040	173	232	357	312	213	186	327
Dury rzekome A.B.C.	041	15	41	84	65	25	38	43	27	
Inne Salmonellozy	042	1 773	1 820	1 472	1 278	728	1 724	2 117	1 931	
Czerwonka	045—048	1 642	1 931	2 831	2 401	1 528	1 623	1 734	2 269	
Zatrucia pokarmowe	Botulismus Inne	049	44	141	164	79	29	93	84	46
			1 482	2 397	3 231	1 388	853	1 308	2 458	1 931
Płonica	050	12 777	10 280	8 143	18 495	14 221	9 254	6 260	12 135	
Róża	052	467	576	751	776	456	423	439	524	
Błonica	055	85	54	37	72	116	114	73	111	
Krzusiec	056	4 803	6 581	10 968	8 762	4 846	5 871	7 666	5 726	
Zapalenie opon mózgo-rdzen. nagm.	057	189	210	318	198	220	294	279	218	
Tężec	061	20	47	80	52	24	43	108	53	
Odra	085	45 261	45 214	13 920	30 047	35 089	37 773	15 959	35 775	
Zakaźne zapalenie wątroby	092	20 353	13 863	17 230	25 622	31 975	18 279	17 962	25 930	
Tasiemczyce	125, 126	765	787	551	642	547	532	464	452	
Grypa	480—483	567959	16 352	5 437	55 422	767143	54 449	4 438	67 998	
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	4 967	7 283	13 181	7 465	3 809	6 170	9 742	6 708	

*) Liczby bezwzględne

Rok 1965—1966

LICZBA ZACHOROWAŃ WEDŁUG KWARTAŁÓW*)

Jednostka chorobowa	Nr Nr według klasyfikacji międzynarodowej	Rok 1966				Rok 1965			
		1. I.—2. IV. 1966	3. IV.—2. VII. 1966	3. VII.—1. X. 1966	2. X.—31. XII. 1966	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
Brucelozą	044	47	29	17	42	14	23	23	18
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	3	3	1	2	11	5	1
Nagminne zapalenie mózgu	082, 083	39	44	29	40
Dur wysypkowy sporadyczny (Choroba Brilla)	100— 102, 108,	36	15	24	35	26	31	32	26
Włośnica	128	196	137	44	27	121	107	16	35
Świerzb	135	15 032	11 136	14 020	63 824

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW, ZAPADALNOŚĆ

Jednostka chorobowa	Nr Nr według klasyfikacji międzynarodowej	Mediana 1962—1965	Rok 1965		Rok 1966			
			Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
Dur brzuszny	040	1 966	1 040	3,3	1 074	23	3,4	0,07
Dury rzekome A.B.C.	041	200	133	0,4	205	2	0,6	0,006
Inne Salmonellozy	042	3 088	6 500	20,6	6 343	129	20,0	0,41
Czerwonka	045—048	9 089	7 154	22,7	8 805	7	27,8	0,02
Zatrucia pokarmowe	Botulismus Inne	049	273	0,8	428	7	1,3	0,02
			6 610	20,8	8 498	77	26,8	0,24
Płonica	050	61 126	41 870	132,9	49 695	10	156,8	0,03
Róża	052	2 135	1 842	5,8	2 570	7	8,1	0,02
Błonica	055	1 164	414	1,3	248	15	0,8	0,05
Krztusiec	056	37 081	24 109	76,5	31 114	39	98,1	0,12
Zapalenie opon mózgowo-rdzen. nagminne	057	951	1 011	3,2	915	53	2,9	0,17
Tężec	061	315	228	0,7	199	67	0,6	0,21
Odra	085	124544	124596	395,6	134442	63	424,1	0,20
Różyczka	086	·	107155 ·	·	20 744	1	65,4	0,003
Ospa wietrzna	087	·	·	·	77 568	8	244,7	0,02
Zapalenie przyusznic nagminne	089	79 247	107155 340,2	340,2	34 409	3	108,5	0,01
Zakaźne zapalenie wątroby	092	85 045	94 146	298,9	77 068	236	243,1	0,74
Tasiemczyce	125, 126	·	1995	6,3	2 745	1	8,6	0,003
Grypa	480—483	835345	894028	2838,5	645170	79	2035,4	0,25

*) Zapadalność w grupie wieku 0—2 lata

I UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr Nr według klasyfikacji międzynarodowej	Mediana 1962—1965	Rok 1965		Rok 1966			
			Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	26 330	26 429	*) 1561,1	32 896	1 051	*) 2006,4	6,4 64,8
Bruceleza	044	71	78	0,2	135	1	0,4	0,003
Paciorkowcowe zapalenie gardła	051	·	·	·	25 103	1	79,2	0,003
Tularemia	059	·	·	·	1	—	0,003	—
Wąglik	062	·	8	0,02	4	—	0,01	—
Listerioza	064	·	·	·	9	—	0,03	—
Różycza	064.4	·	·	·	398	—	1,2	—
Żółtaczką zakaźną krętkową	072, 074	·	·	·	119	—	0,4	—
Porażenie dziecięce nagminne	080	24	19	0,06	7	1	0,02	0,003
Nagminne zapalenie mózgu	082—083	·	·	·	152	18	0,5	0,06
Wścieklizna	094	2	3	0,01	—	—	—	—
Jaglica	095	·	·	·	22	—	0,07	—
Pryszczyca	096.6	·	·	·	1	—	0,003	—
Dur wysypkowy sporadyczny (Choroba Brilla)	100—102, 108	139	115	0,4	110	3	0,3	0,01
Zimnica	110—117	13	3	0,01	11	—	0,03	—
Toksoplazmoza	122.1	·	·	·	3	—	0,01	—
Włośnica	128	364	279	0,9	404	2	1,3	0,006
Grzybica	131	·	·	·	1852	—	5,8	—
Świerzb	135	·	·	·	104012	—	328,1	—

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

I KWARTAŁ 1966

000002

Do użytku służbowego

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POLSKI w I kwartale 1966 r.

1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	347	4,5
1965	213	2,7
1966	173	2,2

W I kw. 1966 r. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z następujących województw:

Kieleckiego	— 29
Warszawskiego	— 25
Lubelskiego	— 18
Łódzkiego	— 11
Rzeszowskiego	— 10

Z w/w 5 województw zgłoszono łącznie 93 zachorowania, tj. 53,7% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań.

Następujące ogniska duru brzuszego miały miejsce:

1. woj. Kieleckie, pow. Kielce — w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy zanotowano 9 przypadków wśród pacjentów szpitala oraz 1 przypadek z personelu (pielęgniarka). Wyżej wymienieni chorzy nie byli szczepieni p/durowi brzuszemu. Przyczyną zachorowań była woda ze studni zakażona ściekami.

2. woj. Lubelskie, pow. Biłgoraj, gromada Frampol — 4 przypadki w jednej rodzinie. W 3 przypadkach dzieci szkolne nie szczepione oraz w jednym przypadku dziecko w wieku przedszkolnym, również nie szczepione.

3. woj. Gdańskie, pow. Nowy Dwór, gromada Rybna — 4 przypadki w PGR Chełmek; z tego 3 przypadki dzieci w wieku szkolnym nie szczepione oraz 1 przypadek osoba dorosła również nie szczepiona.

4. woj. Szczecińskie, pow. Choszczno — 4 przypadki w jednej rodzinie. W 3 przypadkach zachorowania dotyczyły dzieci w wieku przedszkolnym, nie szczepione oraz w 1 przypadku osoby w wieku 22 lat również nie szczepionej. W otoczeniu tych chorych wykryto nosiciela.

W I kw. 1966 r. zanotowano 4 zgony w sporadycznych przypadkach zachorowań

1) Warszawskim, pow. Pruszków — 2; wiek 23 i 24 lata, nie szczepieni p/durowi brzuszemu;

2) Kieleckim, pow. Kielce — 1; wiek 20 lat, otrzymał 1 dawkę szczepionki formolowo-fenolowej z tężcem w lutym 1966 r.,

3) Białostockim, m. Białystok — 1; wiek 25 lat, nie szczepiony.

W roku 1965, w I kw. notowano również 4 zgony.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	I kwartał					
	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25 i więcej
1964	20	53	87	40	37	110
1965	23	38	26	23	25	78
1966	19	31	17	18	25	63

Liczba zachorowań w miastach i gromadach

Rok	I kwartał	
	Miasta i osiedla	Gromady
1964	173	174
1965	99	114
1966	89	84

2. Dury rzekome

W roku 1966 w I kwartale zgłoszono 15 przypadków duru rzekomego z terenu 8 następujących województw:

- Białostockiego — 2 (pow.: Hajnówka, Suwałki)
- Gdańskiego — 1 (m. Gdańsk)
- Kieleckiego — 1 (m. Kielce)
- Lubelskiego — 1 (m. Lublin)
- Łódzkiego — 1 (pow. Łask)
- Rzeszowskiego — 1 (pow. Ustrzyki Dolne)
- Warszawskiego — 3 (pow.: Ostrów Maz., Wołomin, m. Siedlce).
- Wrocławskiego — 5 (pow.: Ząbkowice Śl. — 4, Zgorzelec — 1).

W I kw. 1965 r. z terenu 11 województw zgłoszono 25 zachorowań.

3. Czerwonka

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	1.899	24,7
1965	1.528	19,7
1966	1.642	21,0

W roku 1966, w I kwartale wyższe wskaźniki od krajowego (21,0) notuje się na terenie 11 województw; z tego najwyższe w województwach:

- m. st. Warszawie — 84,6
- m. Krakowie — 58,3

Olsztyńskim	— 62,1
Krakowskim	— 35,0
Gdańskim	— 32,6
Zielonogórskim	— 32,5
Białostockim	— 30,7
Szczecińskim	— 30,0

a najniższe w m. Wrocławiu (0,8), woj. Rzeszowskim (1,2), Opolskim (3,6), m. Poznaniu (3,7), woj. Katowickim (4,8), Poznańskim (5,1) i Lubelskim (7,4).

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata

Rok	I kwartał		
	Liczba zach.	% hospitalizowanych chorych	Zapadalność na 100 000 dzieci
1964	4.051	55,5	967,7
1965	3.809	53,8	909,9
1966	4.971	66,7	1187,5

Notuje się ogólną poprawę hospitalizowanych chorych na biegunki, lecz w następujących województwach odsetki hospitalizowanych chorych są bardzo niskie:

m. Wrocławiu	— 4,3 ⁰ / ₀
Opolskim	— 33,6 ⁰ / ₀
m. st. Warszawie	— 36,8 ⁰ / ₀
Szczecińskim	— 37,9 ⁰ / ₀
Białostockim	— 43,3 ⁰ / ₀

W roku 1966, w I kwartale zanotowano 247 zgonów w następujących województwach:

Warszawskim	— 35
Bydgoskim	— 29
Poznańskim	— 26
Szczecińskim	— 24
Olsztyńskim	— 21
Katowickim	— 17
Łódzkim	— 15
m. Łodzi	— 11
Białostockim	— 11
Gdańskim	— 11
Wrocławskim	— 10
Zielonogórskim	— 10
Kieleckim	— 7
Koszalińskim	— 6
Lubelskim	— 4
m. st. Warszawie	— 4
m. Krakowie	— 3
m. Wrocławiu	— 1
Opolskim	— 1
Rzeszowskim	— 1

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	30.531	394,1
1965	31.975	412,6
1966	20.366	261,0

We wszystkich województwach notuje się spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z tym samym okresem r. ub. z wyjątkiem m. Poznania i m. Krakowa.

Wyższe wskaźniki od krajowego (261,0) notuje się na terenie 14 województw, z tego najwyższe w województwach:

m. Poznaniu	— 513,4
Poznańskim	— 367,5
Opolskim	— 358,3
Szczecińskim	— 347,2
m. Łodzi	— 335,9
Katowickim	— 316,6
Koszalińskim	— 314,9
m. Wrocławiu	— 303,8.

Najniższe wskaźniki zanotowano w woj. Kieleckim — 139,9; Warszawskim — 149,7 i m. st. Warszawie — 178,2.

Odsetek hospitalizowanych chorych w I kwartale:

1964 r.	— 82,2 ⁰ / ₀
1965 r.	— 83,5 ⁰ / ₀
1966 r.	— 92,2 ⁰ / ₀

W I kw. 1966 r. zgłoszono 62 zgony na zakaźne zapalenie wątroby z województw:

Katowickiego	— 11
m. st. Warszawy	— 6
Szczecińskiego	— 5
Krakowskiego	— 5
Warszawskiego	— 4
m. Łodzi	— 3
m. Wrocławia	— 3
Bydgoskiego	— 3
Lubelskiego	— 3
Olsztyńskiego	— 3
Wrocławskiego	— 3
Gdańskiego	— 2
Koszalińskiego	— 2
Opolskiego	— 2
Poznańskiego	— 2
m. Krakowa	— 1
Białostockiego	— 1
Kieleckiego	— 1
Łódzkiego	— 1
Zielonogórskiego	— 1

6. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań w grupach wieku

grupy wieku	I kwartał		
	1964	1965	1966
0—3	—	—	—
4—7	—	—	—
8—14	2	—	—
15 i więcej	1	2	—
r a z e m	3	2	—

W I kw. 1964 r. zanotowano 1 zgon (woj. Wrocławskie), natomiast w I kw. 1965 r. zgonów z powodu poliomyelitis nie zanotowano.

7. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludn.
1964	286	.	3,7
1965	116	9	1,5
1966	85	5	1,1

W I kw. 1966 r. 5 i więcej przypadków błonicy zgłoszono z województw:

1. m. Kraków — 5 (dz. Nowa Huta — 4, dz. Klepacz — 1)
2. Katowickie — 7 (miasta: Ruda Śl. — 2, Bytom — 1, Chorzów — 1, Czeladź — 1, Częstochowa — 1, pow. Częstochowa — 1).
3. Kieleckie — 10 (powiaty: Opatów — 2, Radom — 2, Szydłowiec — 2, Białobrzegi — 1, Kazimierza Wielka — 1, Pińczów — 1, m. Radom — 1).
4. Krakowskie — 15 (pow.: Wadowice — 9, Nowy Targ — 2, Proszowice — 1, Bochnia — 1, m. Tarnów — 2),
5. Łódzkie — 7 (pow.: Łęczyca — 2, Rawa Mazowiecka — 2, Radomsko — 2, Brzeziny — 1),
6. Warszawskie — 5 (pow.: Grodzisk Maz. — 1, Maków Maz. — 1, Nowy Dwór Maz. — 1, Pułtusk — 1, m. Żyrardów — 1),
7. Wrocławskie — 21 (pow.: Kłodzko — 13, Jelenia Góra — 6, Nowa Ruda — 1, Oława — 1).

Następujące zgony zanotowano w I kwartale:

1. pow. Augustów (woj. Białostockie) — 1 zgon. Dziecko 10-letnie szczepione p/błonicy;
2. pow. Wyrzysk (woj. Bydgoskie) — 1 zgon w wieku 69 lat.
3. miasto Słupsk (woj. Koszalińskie) — 1 zgon. Dziecko 6-letnie, szczepione podstawowo — Di-Te-Per;
4. pow. Radomsko (woj. Łódzkie) — 2 zgony. Dzieci w wieku 8 i 9 lat szczepione p/błonicy.

Zanotowano następujące ogniska błonicy:

1. pow. Kłodzko (woj. Wrocławskie) — w Prewentorium Przeciwgruźliżym Szczytna-Zamek w styczniu i lutym — 13 przypadków; z tego 9 przypadków dzieci szkolne (7 — aktualnie szczepionych p/błonicy) oraz 4 przypadki w wieku lat: 14 mies., 14 mies., 2 lata i 20 lat — nie szczepione. Wszystkie w/w przypadki potwierdzone bakteriologicznie.

2. pow. Jelenia Góra (woj. Wrocławskie) — 6 przypadków. Notowane zachorowania w 3 przypadkach dotyczyły dzieci w wieku przedszkolnym, w dwóch przypadkach w wieku szkolnym oraz w jednym przypadku osoby w wieku 43 lat (nie szczepiona).

3. pow. Wadowice (woj. Krakowskie) — 9 przypadków; z tego z grudnia 1965 r. — 5, stycznia 1966 r. — 4. W 6 przypadkach zachorowania dotyczyły dzieci w wieku szkolnym (w 2 — aktualnie szczepione p/błonicy). W 2 przypadkach zachorowania wśród dzieci w wieku: 1 rok i 2 lata (aktualnie szczepione podstawowo p/błonicy) oraz 1 zachorowanie w wieku lat 30 — nie szczepiony.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	I kwartał				
	0—3	4—7	8—14	15—24	25 i więcej
1964	59	81	101	28	17
1965	22	29	38	20	7
1966	20	15	29	17	4

8. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	7.647	.	99,5
1965	4.846	14	62,5
1966	4.801	7	61,5

W I kw. 1966 r. zanotowano 7 zgonów w następujących województwach: Katowickim — 1, Kieleckim — 1, Koszalińskim — 1, Łódzkim — 1, Olsztyńskim — 1, Rzeszowskim — 1, Szczecińskim — 1.

W I kw. 1966 r. wyższe wskaźniki od krajowego (61,5) wystąpiły na terenie 11 województw, z tego najwyższe w województwach:

Koszalińskim	— 140,9
m. st. Warszawie	— 123,9
m. Wrocławiu	— 111,8
m. Krakowie	— 108,9
Gdańskim	— 95,6
m. Poznaniu	— 86,8
Szczecińskim	— 76,8

9. Tężec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	35	0,4
1965	24	0,3
1966	20	0,2

W I kw. 1965 r. zanotowano 13 zgonów; w I kw. 1966 r. 7 zgonów w województwach:

- 1) Rzeszowskim — 3 (10 dni, 65 lat, 65 lat)
- 2) Bydgoskim — 1 (18 lat)
- 3) Katowickim — 1 (42 lata)
- 4) Krakowskim — 1 (7 dni)
- 5) Szczecińskim — 1 (12 lat)

W I kw. 1966 r. zanotowano 2 przypadki tężca wśród noworodków:

- 1) woj. Rzeszowskie, pow. Jarosław — 1 zach.
- 2) woj. Krakowskie, pow. Myślenice — 1 zach.

W I kw. 1965 r. zanotowano 3 przypadki tężca wśród noworodków (Rzeszowskie — 2, Kieleckie — 1).

10. Zatrucia pokarmowe

Liczba zgłoszonych przypadków

Rok	I kwartał			
	Ogółem	w tym:		
		botulismus	salmonellozy	inne
1964	1.723	13	839	871
1965	1.610	29	728	853
1966	3.306	48	1.776	1.482

Notuje się wzrost liczby zachorowań w I kw. 1966 r. w stosunku do liczby przypadków zarejestrowanych w tym samym czasie w roku 1965. Liczba chorych w ogniskach zatruc pokarmowych, w których czynnikiem etiologicznym były inne drobnoustroje wzrosła o 629 w stosunku do roku 1965. Jakkolwiek liczba ognisk w roku 1965 i 1966 w tym samym czasie nie wykazuje większych różnic, to liczba chorych w poszczególnych ogniskach była większa w roku 1966 i obejmowała 100 i więcej osób. Liczba notowanych przypadków botulizmu wzrosła w 1966 r. o 19; w tym 6 przypadków pochodzi z terenu województwa Zielonogórskiego, gdzie w analogicznym okresie 1965 r. nie notowano zachorowań. Wzrost liczby zatruc pokarmowych notowano na terenie woj.: Poznańskiego, Bydgoskiego i Gdańskiego.

11. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	39.497	.	509,9
1965	767.143	417	9.900,0
1966	567.957	48	7.280,1

W I kw. 1966 r. notowano epidemiczne nasilenie zachorowań szczególnie w województwach:

m. st. Warszawie	— 110.427	przypadków
Katowickim	— 84.427	"
Gdańskim	— 66.082	"
m. Wrocławiu	— 59.370	"
m. Łodzi	— 47.533	"
Wrocławskim	— 24.729	"
m. Krakowie	— 24.655	"

W w/w 7 województwach zanotowano łącznie 417 223 zachorowań, co stanowi 73,5% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w I kwartale br.

12. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	44.279	.	576,3
1965	35.089	64	452,8
1966	45.260	28	580,0

W kwartale sprawozdawczym najwyższe wskaźniki zanotowano w województwach:

m. Krakowie	— 2.131,1
m. st. Warszawie	— 1.718,1
Zielonogórskim	— 1.133,1
Gdańskim	— 1.010,6
m. Wrocławiu	— 1.001,7
m. Poznaniu	— 875,4
m. Łodzi	— 707,2
Opolskim	— 696,2
Olsztyńskim	— 678,3
Szczecińskim	— 644,3

13. Choroba Brill'a i inne riketsjozy

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	22	0,3
1965	26	0,3
1966	36	0,5

W I kwartale 1965 r. zgonów z powodu choroby Brill'a i innych riketsjoz nie notowano, natomiast w I kw. 1966 r. zanotowano 2 zgony (woj. Białostockie, woj. Lubelskie).

14. Brucelloza

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	24	0,3
1965	14	0,2
1966	47	0,6

Z terenu woj. Białostockiego zgłoszono 25 przypadków (23 hospitalizowane), w tym:

pow. Olecko — 15
„ Suwałki — 7
„ Gołdap — 3

Przypadki powyższe zostały ujawnione w trakcie badań środowiskowych wśród zespołu pracowników PGR i ich rodzin na terenie wybranych powiatów woj. Białostockiego.

15. Płonica

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	I kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	20.841	265,6
1965	14.221	183,5
1966	12.719	163,0

W roku 1966, w I kwartale wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 11 województw; z tego najwyższe w województwach: m. Łodzi — 451,7; m. Krakowie — 356,2; m. st. Warszawie — 325,4; woj. Szczecińskim — 274,7; Gdańskim — 215,2; Bydgoskim — 206,5.

16. Włośnica

Liczba przypadków zgłoszonych w I kwartale

1964	1965	1966
293	121	196

W roku 1966 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z następujących województw:

Białostockiego	— 95 (hosp. 75)
Katowickiego	— 48 („ 48)
Warszawskiego	— 22 („ 15)
Wrocławskiego	— 13 („ 13)

Z w/w 4 województw zgłoszono łącznie 178 zachorowań, tj. 90,8% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w I kw. 1966 r.

Następujące większe ogniska włośnicy:

1) miasto Łomża (woj. Białostockie) — 62 zachorowania. Nie ustalono źródła zakażenia. Przypuszczalnie źródłem zakażenia była kiełbasa nabywana w sklepach PSS;

2) pow. Siemiatycze (woj. Białostockie) — 29 zachorowań. Zachorowania zanotowano we wsi Leśniki. Źródłem zakażenia było mięso wieprzowe i jego przetwory pochodzące z nielegalnego uboju gospodarczego;

3) miasto i pow. Gliwice (woj. Katowickie) — 42 zachorowania. Zachorowania wystąpiły po spożyciu nie badanej wieprzowiny z prywatnego uboju spożytej na przyjęciu weselnym w Łabędach;

4) pow. Grodzisk Mazowiecki (woj. Warszawskie) — 12 zachorowań. Zachorowania wystąpiły po spożyciu mięsa wieprzowego pochodzącego z uboju prywatnego w miejscowości Gogole.

5) pow. Sokołów Podlaski (woj. Warszawskie) — 9 zachorowań, z tego 8 zach. wystąpiło po spożyciu nie badanego mięsa ze świni własnego uboju, wśród trzech rodzin na terenie wsi Zembów i Hołowienka;

6) miasto i powiat Jelenia Góra (woj. Wrocławskie) — 9 zachorowań. Zachorowania zanotowano w Cieplicach Śląskich, które wystąpiły po spożyciu nie badanego mięsa z prywatnego uboju.

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dyr brzuszy	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica
					Botulismus	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045— 048	049		050
POLSKA 1965	213	25	723	1.528	29	853	14.221
1966	173	15	1.776	1.642	48	1.482	12.719
M. st. Warszawa	5	—	128	262	1	55	1.008
M. Kraków	1	—	—	75	—	80	458
M. Łódź	2	—	44	31	—	153	831
M. Poznań	—	—	38	4	—	4	172
M. Wrocław	1	—	29	1	1	99	209
Białostockie	3	2	41	88	—	125	455
Bydgoskie	4	—	125	56	12	84	938
Gdańskie	8	1	72	109	1	196	720
Katowickie	7	—	312	42	1	71	1.506
Kieleckie	29	1	52	77	1	16	447
Koszalińskie	3	—	61	44	3	10	346
Krakowskie	8	—	—	184	1	19	684
Lubelskie	18	1	72	35	—	22	296
Łódzkie	11	1	62	58	—	59	394
Olsztyńskie	6	—	194	147	2	37	343
Opolskie	8	—	19	9	2	14	469
Poznańskie	5	—	51	27	15	84	488
Rzeszowskie	10	1	—	5	—	32	338
Szczecińskie	9	—	65	63	—	108	576
Warszawskie	25	3	197	134	—	59	649
Wrocławskie	8	5	125	123	2	79	941
Zielonogórskie	2	—	89	68	6	76	451

CHOROBY ZAKAŻNE*

Róża	Błonica	Krzyszec	Zapalenie opon mózgow.-rdz. nagminne	Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyszynicy
9	10	11	12	13	14	15	16	17
052	055	056	057	061	085	086	087	089
456	116	4.846	220	24	35.089	.	.	50.546
466	85	4.801	190	20	45.260	6.989	26.207	11.347
23	3	384	14	1	5.323	847	2.462	310
6	5	140	2	—	2.740	68	1.107	521
24	1	46	4	—	1.301	108	926	154
4	—	94	—	—	948	512	873	171
16	—	131	—	—	1.174	234	667	64
13	2	112	8	1	485	93	999	699
28	2	314	20	1	2.566	750	1.337	492
35	—	320	4	—	3.381	224	1.995	395
38	7	685	8	3	4.349	1.275	3.192	1.483
10	10	317	11	1	1.964	29	1.036	433
22	3	263	5	—	852	115	638	613
18	15	198	22	5	2.439	135	1.333	1.260
18	—	218	6	—	1.421	35	1.014	292
17	7	138	1	—	593	31	799	247
18	—	38	21	—	1.605	210	993	415
13	1	70	5	—	1.737	293	303	438
30	—	207	15	1	2.262	280	536	903
16	2	220	18	3	1.999	68	979	701
34	—	161	11	1	1.351	336	949	342
33	5	408	2	2	2.001	640	1.261	540
33	21	208	11	1	2.396	369	1.786	631
17	1	129	2	—	2.373	337	1.022	243

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakaźne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Bruceleza	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Tularemia	Listerioza
18	19	20	21	22	23	24	25	26
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480—483	571, 764	044	051	059	064
POLSKA 1965	31.975	547	767.143	3.809	14	.	.	.
1966	20.366	760	567.957	4.971	47	6.705	1	1
M. st. Warszawa	552	15	110.427	87	2	156	—	—
M. Kraków	335	23	24.655	30	—	65	—	—
M. Łódź	618	120	47.533	128	—	3	—	—
M. Poznań	556	50	15.010	16	—	29	—	—
M. Wrocław	356	4	59.370	69	—	89	—	—
Białostockie	579	26	3.874	328	25	51	1	1
Bydgoskie	930	77	18.510	387	5	1.369	—	—
Gdańskie	995	19	66.082	247	3	1.006	—	—
Katowickie	2.759	167	84.427	570	—	185	—	—
Kieleckie	636	7	9.889	97	—	79	—	—
Koszalińskie	593	7	4.529	401	1	46	—	—
Krakowskie	1.216	15	17.110	54	—	364	—	—
Lubelskie	1.237	16	4.028	208	—	152	—	—
Łódzkie	895	34	12.237	263	1	139	—	—
Olsztyńskie	622	9	5.051	332	2	738	—	—
Opolskie	894	9	6.598	125	—	108	—	—
Poznańskie	1.932	29	14.870	237	3	78	—	—
Rzeszowskie	1.093	8	4.436	107	—	79	—	—
Szczecińskie	728	49	16.202	243	—	235	—	—
Warszawskie	908	18	8.123	557	1	555	—	—
Wrocławskie	1.380	46	24.729	339	3	1.055	—	—
Zielonogórskie	552	12	10.267	146	1	124	—	—

CHOROBY ZAKAŻNE*

Różyczka	Zółtaczką zakaźną krętkowa	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Mononukleozę	Jaglica	Dur wysypkowy	Zimnica	Tokso-plazmoza	Włośnica	Grzybica	Świerzb
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
064.4	072, 074	080	082 083	093	095	100—102	110—117	122.1	128	131	135
.	.	2	.	.	.	26	1	.	121	.	.
30	2	—	60	4	2	36	7	2	196	282	14.945
—	—	—	4	—	—	2	1	1	4	—	71
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	128
—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	6	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
1	—	—	—	—	—	9	—	—	95	—	148
5	—	—	4	—	—	—	1	—	—	21	2.198
2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	18	1.562
4	—	—	—	2	2	—	—	1	48	4	671
3	—	—	8	1	—	—	—	—	3	3	515
6	—	—	3	1	—	—	—	—	—	48	1.974
1	—	—	12	—	—	—	—	—	—	10	243
1	—	—	—	—	—	9	—	—	2	9	121
—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	22	433
—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	29	507
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	475
—	1	—	4	—	—	1	—	—	—	26	656
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	13	92
—	1	—	2	—	—	—	3	—	—	49	1.198
1	—	—	2	—	—	5	—	—	22	—	373
—	—	—	2	—	—	5	1	—	13	12	951
3	—	—	5	—	—	—	1	—	—	10	1.999

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIANA 1962—1965	I kwartał 1965		od 1. I. — 3. IV. 1966 r.			
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów	
Dur brzuszny	040	371	213	2,7	173	2,2	4	
Dury rzekome A. B. C.	041	23	25	0,3	15	0,2	—	
Inne Salmonel- lozy	042	532	728	9,4	1.776	22,8	47	
Czerwonka	045—048	1.429	1.528	19,7	1.642	21,0	4	
Zatrucia pokarmowe	Botulismus	049	21	29	0,4	48	0,6	—
	Inne		862	853	11,0	1.482	19,0	3
Płonica	050	14.260	14.221	183,5	12.719	163,0	2	
Róża	052	482	456	5,9	466	6,0	—	
Błonica	055	385	116	1,5	85	1,1	5	
Krzusiec	056	7.350	4.846	62,5	4.801	61,5	7	
Zapalenie opon mózgowo- rdzen. na- gminne	057	210	220	2,8	190	2,4	18	
Tężec	061	27	24	0,3	20	0,2	7	
Odra	085	38.039	35.089	452,8	45.260	580,0	28	
Różyczka	086	.	.	.	6.989	89,6	1	
Ospa wietrzna	087	.	.	.	26.207	335,9	4	
Zapalenie przy- usznicy na- gminne	089	25.709	50.546	652,3	11.347	145,4	—	
Zakaźne zap. wątroby	092	22.034	31.975	412,6	20.366	261,0	62	
Tasiemczyce	125, 126	.	547	7,0	760	9,7	—	
Grypa	480—483	464.939	767.143	9 900,0	567.957	7 280,1	48	

I ZAPADALNOŚĆ* NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIA- NA 1962—1965	I kwartał 1965		od 1. I. — 3. IV. 1966 r.		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	3.850	3.809	909,9	4.971	1.187,5	247
Bruceloza	044	17	14	0,2	47	0,6	—
Paciorkowco- we zapale- nie gardła	051	.	.	.	6.705	85,9	—
Tularemia	059	.	.	.	1	0,01	—
Listerioza	064	.	.	.	1	0,01	—
Różycza	064,4	.	.	.	30	0,4	—
Żółtaczką za- kaźną krę- kowa	072— 074	.	.	.	2	0,02	—
Porażenie dzie- cięce na- gminne	080	2	2	0,02	—	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	.	.	.	60	0,8	8
Mononukleozą	093	.	.	.	4	0,05	—
Jaglica	095	.	.	.	2	0,02	—
Dur wysyp- kowy	100— 102	28	26	0,3	36	0,5	2
Zimnica	110— 117	1	1	0,01	7	0,1	—
Toksoplazmoza	122,1	.	.	.	2	0,02	—
Włośnica	128	187	121	1,6	196	2,5	—
Grzybica	131	.	.	.	282	3,6	—
Świerzb	135	.	.	.	14.945	191,5	—

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dury brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
	040	041	045—048	050				
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
POLSKA	2,7	2,2	0,3	0,2	19,7	21,0	183,5	163,0
M. Warszawa	2,6	1,6	0,3	—	45,6	84,6	482,3	325,4
M. Kraków	1,6	0,8	0,8	—	11,8	58,3	547,9	356,2
M. Łódź	1,6	1,1	0,5	—	7,6	16,8	354,7	451,7
M. Poznań	0,9	—	—	—	9,3	3,7	216,2	158,8
M. Wrocław	0,9	0,8	—	—	2,6	0,8	446,7	178,3
Białostockie	4,5	1,0	1,4	0,7	26,6	30,7	110,4	158,6
Bydgoskie	2,7	0,9	—	—	7,0	12,3	164,2	206,5
Gdańskie	4,8	2,4	0,3	0,3	26,6	32,6	315,0	215,2
Katowickie	1,5	0,8	0,1	—	5,6	4,8	175,5	172,8
Kieleckie	2,8	6,4	—	0,2	66,6	16,9	112,3	98,3
Koszalińskie	3,8	1,6	—	—	28,1	23,6	174,3	185,3
Krakowskie	2,7	1,5	0,2	—	3,4	35,0	121,6	130,1
Lubelskie	2,1	3,8	0,4	0,2	12,8	7,4	114,1	63,0
Łódzkie	1,9	2,7	—	0,2	9,2	14,1	109,3	95,7
Olsztyńskie	4,3	2,5	—	—	48,6	62,1	132,5	144,9
Opolskie	1,6	3,2	—	—	1,2	3,6	149,2	188,0
Poznańskie	3,6	0,9	—	—	2,5	5,1	84,8	92,3
Rzeszowskie	2,4	2,4	—	0,2	1,9	1,2	107,5	80,8
Szczecińskie	1,0	4,3	—	—	34,7	30,0	283,3	274,7
Warszawskie	5,3	4,1	0,2	0,5	36,1	22,1	132,9	107,0
Wrocławskie	2,5	1,6	2,3	1,0	25,1	25,3	258,0	193,5
Zielonogórskie	1,0	0,9	0,5	—	34,2	32,5	155,2	72,1

CHOROBY ZAKAŻNE*

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		056		080		085		092	
1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
1,5	1,1	62,5	61,5	0,02	—	452,8	580,0	412,6	261,0
—	1,0	92,9	123,9	—	—	752,5	1718,1	341,2	178,2
2,4	3,9	104,8	108,9	—	—	600,7	2131,1	256,2	260,5
2,7	0,5	35,5	25,0	—	—	1392,6	707,2	418,1	335,9
—	—	203,1	86,8	—	—	461,3	875,4	432,4	513,4
0,9	—	43,1	111,8	—	—	331,1	1001,7	369,1	303,8
0,7	0,7	42,4	39,0	—	—	611,6	169,1	395,3	201,9
—	0,4	62,4	69,1	—	—	545,9	564,9	372,0	204,7
—	—	115,8	95,6	—	—	597,0	1010,6	453,4	297,4
1,0	0,8	54,5	78,6	—	—	627,0	499,0	562,2	316,6
1,5	2,2	45,7	69,7	—	—	129,3	432,0	239,0	139,9
1,6	1,6	87,7	140,9	—	—	288,0	456,4	502,4	317,7
3,1	2,8	30,8	37,6	—	—	307,2	463,8	370,7	231,2
1,3	—	81,6	46,4	—	—	411,3	302,3	332,0	263,2
3,4	1,7	41,4	33,5	—	—	527,1	144,0	337,3	217,4
2,1	—	64,3	16,0	—	—	328,6	678,3	488,4	262,9
0,8	0,4	53,2	28,0	—	—	350,0	696,2	660,9	358,3
—	—	51,5	39,4	—	—	247,7	430,3	448,7	367,5
1,4	0,5	81,3	52,6	—	—	249,1	477,7	304,8	261,2
3,4	—	96,5	76,8	—	—	318,5	644,3	401,5	347,2
1,0	0,8	67,8	67,3	—	—	331,4	329,9	414,7	149,7
5,0	4,3	33,0	42,8	0,2	—	503,0	492,6	444,5	283,7
—	0,5	37,1	61,6	0,5	—	463,7	1133,1	428,1	263,6

* Zapadalność kwartalna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

LICZBA ZACHOROWAŃ

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1. I. — 3. IV. 1966	
		1. I. — 29. I. 1966	30. I. — 26. II. 1966
Dur brzuszny	040	55	53
Dury rzekome A.B.C.	041	5	5
Inne Salmonellozy	042	511	593
Czerwonka	045—048	429	569
Zatrucia pokarm. } Botulismus	049	20	17
		Inne	313
Płonica	050	3.408	4.399
Róża	052	139	143
Błonica	055	25	29
Krzusiec	056	1.574	1.396
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	57	51
Tężec	061	5	3
Odra	085	12.376	14.213
Zakaźne zapalenie wątroby	092	7.291	6.449
Tasiemczyce	125, 126	218	244
Grypa	480—483	69.023	375.087
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 746	1.538	1.547
Brucelloza	044	12	17
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	18	26
Dur wysypkowy	100—102	13	12
Włośnica	128	44	52
Świerzb	135	3.228	4.480

WG MIESIĘCY (OKRESÓW)

27. II. — 3. IV. 1966	1. I. — 31. III. 1965		
	styczeń 1965	luty 1965	marzec 1965
65	80	77	56
5	10	11	4
672	196	286	246
644	555	419	554
11	8	10	11
634	201	362	290
4.912	4.874	4.487	4.860
184	175	137	144
31	45	40	31
1.831	1.691	1.488	1.667
82	78	66	76
12	7	12	5
18.671	10.493	11.789	12.807
6.626	12.615	10.427	8.933
298	143	160	244
123.847	7.575	304.420	455.148
1.886	1.310	1.181	1.318
18	6	3	5
—	1	1	—
16	.	.	.
11	8	11	7
100	69	22	30
7.237	.	.	.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

II KWARTAŁ 1966

000582

Do użytku służbowego

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POLSKI w II kwartale 1966 r.

1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	316	3,9
1965	186	2,4
1966	234	3,0

W II kw. 1966 r. najwyższe liczby zachorowań zgłoszono z następujących województw:

Kieleckiego	— 26
Warszawskiego	— 26
Opolskiego	— 23
Lubelskiego	— 18
Wrocławskiego	— 17
Bydgoskiego	— 16

Z w/w 6 województw zgłoszono łącznie 126 zachorowań tj. 53,8% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w II kw. br.

W II kw. br. zanotowano dalsze 11 zachorowań na dur brzuszny w pow. kieleckim, w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy wśród pacjentów szpitala. Chorzy nie byli szczepieni p/durowi brzuszemu.

Ponadto w II kw. br. notowano jedynie niewielkie ogniska rodzinne.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	II kwartał					
	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25 i więcej
1964	18	42	80	45	28	103
1965	20	27	14	27	27	71
1966	15	35	40	20	28	96

2. Dury rzekome

W kwartale sprawozdawczym zgłoszono 42 zachorowania z następujących powiatów:

1. Woj. Warszawskie (12) — pow.: Ostrów — 4, Pułtusk — 2, Garwolin — 1, Otwock — 1, Piaseczno — 1, Płońsk — 1, Pruszków — 1, m. Pruszków — 1;
2. woj. Warszawa (8) — dzielnice: Wola — 3, Praga Południe — 3, Śródmieście — 1, Mokotów — 1;
3. woj. Białostockie (8) — pow.: Olecko — 2, Augustów — 1, Białystok — 1, Bielsk Podlaski — 1, Suwałki — 1, Zambrów — 1, m. Białystok — 1;
4. woj. Łódzkie (5) — pow.: Bełchatów — 2, Brzeziny — 1, Kutno — 1, Sieradz — 1;
5. woj. Gdańskie (3) — pow. Kartusy — 2, m. Elbląg — 1;
6. woj. Krakowskie (2) — pow.: Chrzanów — 1, Oświęcim — 1;
7. woj. Lubelskie (2) — pow. Lublin — 1, m. Lublin — 1;
8. woj. Rzeszowskie (2) — pow.: Brzozów — 1, Jarosław — 1.

W II kw. 1965 r. z terenu 14 województw zgłoszono 38 zachorowań.

Zgonów z powodu durów rzekomych w II kw. 1965 r., jak również w II kw. 1966 r. nie notowano.

3. Czerwonka

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	2 439	31,4
1965	1 623	20,8
1966	1 927	24,7

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub.

W bieżącym kwartale wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 12 województw; z tego najwyższe w województwach:

m. st. Warszawie	— 103,9
Zielonogórskim	— 77,8
Olsztyńskim	— 76,5
Szczecińskim	— 36,7
Lubelskim	— 36,2
m. Krakowie	— 35,0
Warszawskim	— 34,1
Gdańskim	— 33,2
m. Łodzi	— 31,0
Białostockim	— 30,7

W porównaniu z I kw. br. krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł z 21,0 — I kw. 1966 do 24,7 — II kw. 1966.

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań, odsetek hospitalizowanych chorych i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata

Rok	II kwartał		
	Liczba zach.	% hospitalizowanych chorych	Zapadalność na 100 000 dzieci
1964	5 782	56,0	1 381,3
1965	6 170	57,9	1 473,9
1966	7 290	59,5	1 741,5

W II kw. br. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu kilku poprzedzających lat i I kwartału br.

W II kw. br. zanotowano 260 zgonów w następujących województwach:

Lódzkim	— 46
Poznańskim	— 31
Warszawskim	— 30
Kieleckim	— 28
Zielonogórskim	— 22
Olsztyńskim	— 21
Białostockim	— 15
m. Łodzi	— 10
Lubelskim	— 10
Koszalińskim	— 8
Bydgoskim	— 7
Wrocławskim	— 7
Rzeszowskim	— 6
Katowickim	— 5
m. st. Warszawie	— 4
Gdańskim	— 3
Krakowskim	— 3
Szczecińskim	— 3
m. Krakowie	— 1

W m. Poznaniu, m. Wrocławiu i woj. Opolskim zgonów z powodu biegunek nie notowano.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	19 607	253,1
1965	18 279	233,9
1966	13 919	178,4

W II kw. br. notuje się spadek wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach w porównaniu z tym samym okresem r. ub. Wyższe wskaźniki od

krajowego (178,4) natuje się na terenie 11 województw; z tego najwyższe w województwach:

m. Łodzi	— 294,1
m. Poznaniu	— 272,4
Katowickim	— 254,7
Opolskim	— 239,3
Poznańskim	— 228,8
Koszalińskim	— 210,0
Gdańskim	— 204,5

Odsetek hospitalizowanych chorych w II kwartale:

1964 r.	— 91,5%
1965 r.	— 92,6%
1966 r.	— 95,2%

W I kw. br. zanotowano 62 zgony, a w II kw. br. zanotowano 51 zgonów.

W II kwartale br. zgony z powodu zakaźnego zapalenia wątroby notowano w następujących województwach:

m. st. Warszawie	— 8
m. Łodzi	— 8
Katowickim	— 7
Poznańskim	— 7
Wrocławskim	— 4
Lubelskim	— 3
Łódzkim	— 3
Białostockim	— 2
Olsztyńskim	— 2
m. Krakowie	— 1
m. Wrocławiu	— 1
Bydgoskim	— 1
Kieleckim	— 1
Opolskim	— 1
Warszawskim	— 1
Zielonogórskim	— 1

Krajowy wskaźnik zapadalności w I kw. 1966 r. wynosił 261,0.

6. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań w grupach wieku

grupy wieku	II kwartał		
	1964	1965	1966
0—3	2	6	—
4—7	2	1	—
8—14	1	2	—
15 i więcej	—	2	—
razem	5	11	—

W II kw. 1964 r. i 1965 r. zgonów z powodu poliomyelitis nie notowano.

7. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludn.
1964	163		2,1
1965	114	6	1,4
1966	55	2	0,7

W II kw. br. 5 i więcej przypadków błonicy zgłoszono z województw:

1. Kieleckiego — 10 (pow.: Kazimierza Wielka — 4, Kielce — 2, Opatów — 2, Opoczno — 1, m. Kielce — 1),
2. Lubelskiego — 7 (pow.: Opole Lubelskie — 5, Biała Podlaska 1, Radzyń — 1),
3. Katowickiego — 6 (pow.: Gliwice — 1, Rybnik — 1, Tychy — 1, miasta: Bielsko — 1, Katowice — 1, Tychy — 1),
4. Warszawskiego — 5 (pow.: Pruszków — 2, Grodzisk — 1, Piaseczno — 1, Wyszów — 1).

Z w/w województw zgłoszono łącznie 28 zachorowań tj. 50,9% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w II kw. br.

W II kw. br. zanotowano 2 zgony w województwach:

- 1). Bydgoskim, m. Bydgoszcz — 1 zgon, dziecko 5 letnie, szczepione podstawowo.
- 2). Kieleckim, m. Kielce — 1 zgon, dziecko 10 letnie, szczepione podstawowo,

Notuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do I kw. br. z 1,1 — I kw. 1966 do 0,7 — II kw. 1966 r.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	II kwartał				
	0—3	4—7	8—14	15—24	25 i więcej
1964	51	37	41	20	14
1965	29	28	38	16	3
1966	18	14	18	- 1	4

8. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	7 915		101,9
1965	5 871	18	75,1
1966	6 585	9	84,4

W II kw. br. zanotowano 9 zgonów w następujących województwach: Kieleckim — 2, Bydgoskim — 1, Lubelskim — 1, Łódzkim — 1, Olsztyńskim — 1, Warszawskim — 1, Wrocławskim — 1 i m. Łodzi — 1.

Krajowy wskaźnik zapadalności wzrósł w porównaniu z II kw. 1965 r. z 75,1 — II kw. 1965 do 84,4 — II kw. 1966; wzrósł również w stosunku do I kw. br. z 61,5 — I kw. 1966 do 84,4 — II kw. 1966.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu 1965 r. notuje się na terenie następujących województw: m. Wrocławia, m. Łodzi, m. Krakowa, Bydgoskiego, Katowickiego, Koszalińskiego, Kieleckiego i Łódzkiego.

W kwartale sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w województwach:

m. Wrocławiu	— 271,3
m. Krakowie	— 235,7
m. st. Warszawie	— 148,1
Koszalińskim	— 128,6
Zielonogórskim	— 120,3
Bydgoskim	— 114,0
Katowickim	— 104,2
m. Łodzi	— 98,4
Szczecińskim	— 91,6
Gdańskim	— 91,2

9. Tężec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	.91	1,2
1965	43	0,5
1966	47	0,6

W II kwartale 1965 r. zanotowano 26 zgonów;

W II kwartale 1966 r. zanotowano 14 zgonów w następujących województwach:

- 1) woj. Kieleckie, pow. Lipsko — 2 (7 dni, 66 lat)
- 2) woj. Krakowskie, pow. Limanowa — 1 (10 dni)
m. Zakopane — 1 (69 lat)
- 3) woj. Lubelskie, pow. Janów Lubelski — 1 (29 lat)
pow. Krasnystaw — 1 (60 lat)
- 4) woj. Bydgoskie, pow. Żnin — 1 (75 lat)
- 5) woj. Katowickie, pow. Tychy — 1 (67 lat)
- 6) woj. Łódzkim, pow. Piotrków Tryb. — 1 (4 dni)
- 7) woj. Opolskie, pow. Nysa — 1 (8 lat)
- 8) woj. Rzeszowskie, pow. Brzozów — 1 (48 lat)
- 9) woj. Zielonogórskie, pow. Żary — 1 (57 lat)
- 10) m. Kraków, dzielnica Podgórze — 1 (19 lat)
- 11) m. Wrocław, dzielnica Fabryczna — 1 (44 lata)

10. Zatrucia pokarmowe

Liczba zgłoszonych przypadków

Rok	II kwartał			
	Ogółem	w tym:		
		botulismus	salmonellozy	inne
1964	3 185	94	928	2 163
1965	3 125	93	1 724	1 308
1966	4 352	141	1 818	2 393

W II kw. br. najwyższe liczby przypadków zatruc pokarmowych zgłoszono z województw:

Bydgoskiego	— 652
Wrocławskiego	— 393
Lubelskiego	— 343
Katowickiego	— 321
Opolskiego	— 321
Warszawskiego	— 311
Gdańskiego	— 247
Szczecińskiego	— 233

Z w/w 8 województw zgłoszono łącznie 2 821 przypadków zatruc pokarmowych tj. 64,8% w stosunku do ogółem zgłoszonych.

Znacznym wzrost liczby przypadków w stosunku do II kw. r. ub. zanotowano w województwach: Bydgoskim, Lubelskim, Opolskim, Wrocławskim.

11. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	708 311		9 144,3
1965	54 449	421	696,8
1966	16 336	13	209,4

W II kwartale br. obserwuje się znaczny spadek liczby zachorowań w stosunku do I kw. br. w którym to notowano epidemiczne nasilenie (567 957 — I kw. 1966 r.; 16 336 — II kw. 1966 r.).

W II kw. br. zanotowano 13 zgonów w województwach:

Łódzkim	— 5
Kieleckim	— 3
Białostockim	— 1
Poznańskim	— 1
Warszawskim	— 1
Zielonogórskim	— 1
m. st. Warszawie	— 1

12. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	45 285		582,9
1965	37 773	51	483,4
1966	45 218	18	579,6

Obserwuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem 1965 r. natomiast w porównaniu z I kw. br. nie notuje się różnicy.

W kwartale sprawozdawczym najwyższe wskaźniki wystąpiły w województwach:

m. st. Warszawie	— 1 870,5	m. Wrocławiu	— 892,5
m. Poznaniu	— 1 174,5	m. Łodzi	— 752,3
m. Krakowie	— 1 113,0	Koszalińskim	— 741,4
Gdańskim	— 972,1	Szczecińskim	— 722,1
Bydgoskim	— 904,6		

a najniższe w woj.: Łódzkim — 178,3; Białostockim — 201,2; Lubelskim — 302,1; Wrocławskim — 377,5 i Warszawskim — 398,7.

13. Choroba Brilla i inne riketsjozy

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	32	0,4
1965	31	0,4
1966	15	0,2

W II kw. r. ub. zanotowano 4 zgony z powodu choroby Brilla i innych riketsjoz. W II kw. br. zanotowano 1 zgon w woj. Białostockim (pow. Wysokie Mazowieckie)

14. Brucelloza

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	12	0,1
1965	23	0,3
1966	29	0,4

W bieżącym kwartale zgłoszono 29 zachorowań. Najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw: Białostockiego — 6, (pow.: Dąbrowa — 1, Gołdap — 3, Łomża — 1, Suwałki — 1), Olsztyńskiego — 5 (pow.: Kętrzyn — 4, Nowe Miasto — 1), Wrocławskiego — 5 (pow.: Swidnica — 2, Bolesławiec — 1, Jawor — 1, Trzebnica — 1) i Szczecińskiego — 4 (m. Szczecin — 1, pow.: Pyrzyce — 1, Stargard — 1, Wolin — 1).

Z w/w województw zgłoszono łącznie 20 zachorowań tj. 69% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w II kw. br. W poprzedzającym kwartale zgłoszono 47 zachorowań.

15. Płonica

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	II kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	13 059	168,1
1965	9 254	118,4
1966	10 280	131,8

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (131,8) notuje się na terenie 12 województw; z tego najwyższe w województwach: m. Łodzi — 312,0; m. st. Warszawie — 248,9; m. Krakowie — 234,1; Szczecińskim — 225,1; Zielonogórskim — 186,7; Koszalińskim — 184,3; Gdańskim — 169,5 i m. Poznaniu — 167,1.

W I kw. br. krajowy wskaźnik wynosił 163,0.

16. Włośnica

Liczba zgłoszonych przypadków w I kwartale

1964	1965	1966
41	107	137

W II kw. 1966 r. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Katowickiego — 75, hosp. 73
 Gdańskiego — 21, hosp. 21
 Wrocławskiego — 11, hosp. 8
 Olsztyńskiego — 11, hosp. 4

W II kw. br. zgłoszono następujące większe ogniska włośnicy z województw:

1) woj. Katowickie, m. Bytom 1 ognisko — 31 przypadków. Źródła zakażenia nie ustalono. m. Świętochłowice 1 ognisko — 23 przypadki. Źródłem zakażenia było mięso z prywatnego uboju, nie badane.

2) woj. Gdańskie, pow. Wejherowo — 1 ognisko, 18 przypadków. Mięso pochodziło z uboju prywatnego, było badane.

3) woj. Olsztyńskie, pow. Iława — 1 ognisko — 11 przypadków. Źródła zakażenia nie ustalono. Prawdopodobnie mięso pochodziło z handlu uspołecznionego.

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dur brzuszy	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica
					Botulismus	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr Nr wg kłdsyti- kacji międzynaro- dowej	040	041	042	045— 048	049		050
POLSKA 1965	186	38	1 724	1 623	93	1 308	9 254
1966	234	42	1 818	1 927	141	2 393	10 280
M. st. Warszawa	7	8	118	322	—	59	771
M. Kraków	2	—	41	45	—	30	301
M. Łódź	10	—	45	57	—	34	574
M. Poznań	1	—	8	29	3	2	181
M. Wrocław	2	—	19	8	3	128	172
Białostockie	14	8	58	88	1	66	325
Bydgoskie	16	—	340	61	24	288	622
Gdańskie	12	3	80	111	8	159	567
Katowickie	15	—	274	51	2	45	1 324
Kieleckie	26	—	17	75	3	31	368
Koszalińskie	3	—	44	55	4	61	344
Krakowskie	10	2	5	46	—	92	603
Lubelskie	18	2	49	170	7	287	337
Łódzkie	10	5	60	38	7	82	300
Olsztyńskie	2	—	96	181	3	65	234
Opolskie	23	—	41	5	8	272	392
Poznańskie	7	—	13	28	41	85	416
Rzeszowskie	9	2	25	7	1	6	328
Szczecińskie	—	—	73	77	5	155	472
Warszawskie	26	12	175	207	1	135	536
Wrocławskie	17	—	81	103	11	301	722
Zielonogórskie	4	—	156	163	9	10	391

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Róża	Błonica	Krzyszczek	Zapalenie opon mózgowo-rdzenio- wych nagminne	Teżec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przysznicy
9	10	11	12	13	14	15	16	17
052	055	056	057	061	085	086	087	089
423	114	5 871	294	43	37 773	.	.	34 644
575	55	6 585	210	47	45 218	8 200	19 765	8 322
34	—	459	11	1	5 795	1 094	1 621	218
5	4	303	—	1	1 431	91	824	464
41	—	181	—	—	1 384	298	843	117
8	—	93	1	—	1 272	728	742	211
16	3	318	—	1	1 046	306	448	33
18	1	190	16	2	577	364	639	273
52	1	518	15	1	4 109	307	1 198	188
26	—	305	8	—	3 252	168	1 900	425
31	6	908	16	5	3 970	1 683	2 855	1 208
18	10	352	6	5	2 263	18	768	353
29	1	240	8	—	1 384	196	472	583
23	4	433	36	9	2 554	193	1 017	885
12	7	253	4	6	1 420	71	754	214
29	—	264	3	1	734	31	450	267
33	1	125	15	1	950	323	610	187
28	2	141	16	1	1 715	186	409	250
24	—	250	23	—	2 579	328	369	585
19	3	223	12	6	1 790	71	572	459
40	2	192	4	—	1 514	156	762	331
43	5	267	4	1	2 418	635	760	292
40	3	318	8	3	1 836	467	1 107	535
6	2	252	4	3	1 225	486	645	244

*) liczby bezwzględne

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakaźne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Brucelloza	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Różyczka
18	19	20	21	22	23	24	25
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480—483	571 764	044	051	064.4
POLSKA 1965	18 279	532	54 449	6 170	23	.	.
1966	13 919	776	16 336	7 290	29	4 860	57
M. st. Warszawa	438	11	115	106	—	185	—
M. Kraków	227	23	87	74	—	16	—
M. Łódź	541	98	3 922	188	—	34	1
M. Poznań	295	33	64	40	—	18	—
M. Wrocław	229	5	106	60	1	65	—
Białostockie	366	21	330	674	6	31	9
Bydgoskie	579	56	632	500	1	993	2
Gdańskie	684	131	295	344	—	768	2
Katowickie	2 220	125	2 602	747	—	103	7
Kieleckie	446	6	1 718	178	—	41	3
Kozalińskie	392	5	263	409	2	174	3
Krakowskie	886	15	1 331	168	—	68	6
Lubelskie	772	7	446	291	1	136	1
Łódzkie	652	50	746	419	1	181	2
Olsztyńskie	395	29	328	548	5	730	—
Opolskie	597	3	624	252	—	132	3
Poznańskie	1 203	30	452	480	—	5	1
Rzeszowskie	695	13	659	263	—	44	3
Szczecińskie	414	44	266	287	4	254	3
Warszawskie	573	17	457	518	1	315	2
Wrocławskie	900	46	543	495	5	478	4
Zielonogórskie	415	8	350	249	2	89	5

*) liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŹNE*)

Żółtaczką zakaźną krętkową	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Mononukleozą	Jaglica	Dur wysypkowy	Zimnica	Włośnica	Grzybica	Świerzb
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
072, 074	080	082, 083	093	095	100 —102	110—117	128	131	135
.	11	.	.	.	31	2	107	.	.
3	—	87	12	2	15	2	137	467	11 131
—	—	1	—	—	1	—	—	—	35
—	—	2	—	—	—	—	—	2	47
—	—	1	—	—	—	—	6	22	796
1	—	—	—	—	—	—	—	—	215
—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
—	—	1	—	—	2	—	7	10	221
1	—	1	—	—	—	—	1	116	1 289
—	—	—	—	—	—	—	21	47	949
—	—	2	3	—	—	—	75	2	686
—	—	4	—	—	—	—	—	5	315
—	—	1	6	—	—	—	—	69	1 028
—	—	40	—	1	—	—	—	16	306
—	—	1	—	—	3	—	—	—	60
—	—	6	—	—	—	—	—	41	438
—	—	4	—	—	—	1	11	43	433
—	—	1	—	—	—	—	—	1	462
—	—	7	—	—	—	—	1	21	451
—	—	4	2	—	—	—	—	8	357
—	—	—	—	—	—	—	—	32	1 002
—	—	5	—	1	5	—	4	—	159
—	—	1	—	—	2	—	11	1	887
1	—	5	1	—	2	1	—	31	945

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIANA 1962—1965	II kwartał 1965		od 3. IV. — 2. VII. 1966 r.		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Dur brzuszny	040	436	186	2,4	234	3,0	6
Dury rzekome A. B. C.	041	51	38	0,5	42	0,5	—
Inne Salmonel- lozy	042	761	1 724	22,1	1 818	23,3	28
Czerwonka	045—048	2 434	1 623	20,8	1 927	24,7	—
Zatrucia pokarmowe	Botulismus	124	93	1,2	141	1,8	3
	Inne	1 716	1 308	16,7	2 393	30,7	2
Płonica	050	13 517	9 254	118,4	10 280	131,8	1
Róża	052	461	423	5,4	575	7,4	1
Błonica	055	260	114	1,4	55	0,7	2
Krztusiec	056	8 465	5 871	75,1	6 585	84,4	9
Zapalenie opon mózgowo- rdzen. na- gminne	057	233	294	3,8	210	2,7	9
Tężec	061	75	43	0,5	47	0,6	14
Odra	085	40 837	37 773	483,4	45 218	579,6	18
Różyczka	086	.	.	.	8 200	105,1	—
Ospa wietrzna	087	.	.	.	19 765	253,3	—
Zapalenie przy- usznicy na- gminne	089	19 849	34 644	443,4	8 322	106,7	—
Zakaźne zap. wątroby	092	14 177	18 279	233,9	13 919	178,4	51
Tasiemczyce	125, 126	.	532	6,8	776	9,9	54
Grypa	480—483	85 561	54 449	696,8	16 336	209,4	13

I ZAPADALNOŚĆ* NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIANA 1962—1965	II kwartał 1965		od 3. IV. — 2. VII. 1966 r.		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	6 023	6 170	1 437,9	7 290	1 741,5	260
Brucelloza	044	21	23	0,3	29	0,4	—
Paciorkowco- we zapale- nie gardła	051	.	.	.	4 860	62,3	—
Różycza	064,4	.	.	.	57	0,7	—
Żółtaczką za- każną kręł- kowa	072— 074	.	.	.	3	0,04	—
Porażenie dzie- cięce na- gminne	080	14	11	0,1	—	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	.	.	.	87	1,1	5
Mononukleoza	093	.	.	.	12	0,1	—
Jaglica	095	.	.	.	2	0,02	—
Dur wysyp- kowy	100— 102	35	31	0,4	15	0,2	1
Zimnica	110— 117	2	2	0,02	2	0,02	—
Włośnica	128	82	107	1,4	137	1,7	1
Grzybica	131	.	.	.	467	6,0	—
Swierzb	135	.	.	.	11 131	142,7	—

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

II kwartał 1965—1966

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
	040		041		045—048		050	
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
POLSKA	2,4	3,0	0,5	0,5	20,8	24,7	118,4	131,8
M. Warszawa	3,2	2,2	0,3	2,6	58,7	103,9	306,7	248,9
M. Kraków	0,8	1,5	0,8	—	11,8	35,0	386,3	234,1
M. Łódź	2,2	5,4	—	—	13,1	31,0	199,5	312,0
M. Poznań	2,8	0,9	—	—	11,2	26,8	110,0	167,1
M. Wrocław	2,6	1,7	—	—	0,9	6,8	216,4	146,8
Białostockie	2,4	4,9	1,7	2,8	22,1	30,7	66,9	113,3
Bydgoskie	2,0	3,5	0,4	—	14,4	13,4	83,3	136,9
Gdańskie	3,0	3,6	0,3	0,9	54,1	33,2	148,7	169,5
Katowickie	1,7	1,7	—	—	6,4	5,8	132,7	151,9
Kieleckie	5,1	5,7	0,2	—	9,6	16,5	51,0	80,9
Koszalińskie	2,2	1,6	0,5	—	91,5	29,5	119,1	184,3
Krakowskie	1,5	1,9	—	0,4	3,8	8,7	96,1	114,7
Lubelskie	1,9	3,8	0,8	0,4	13,2	36,2	83,1	71,7
Łódzkie	1,5	2,4	0,7	1,2	13,6	9,2	86,9	72,9
Olsztyńskie	0,8	0,8	—	—	72,9	76,5	85,7	98,9
Opolskie	4,0	9,2	—	—	22,6	2,0	5,2	157,1
Poznańskie	0,9	1,3	0,8	—	4,2	5,3	58,4	79,1
Rzeszowskie	1,0	2,1	1,2	0,5	1,4	1,7	80,5	78,4
Szczecińskie	2,4	—	—	—	35,2	36,7	159,3	225,1
Warszawskie	5,1	4,3	0,7	2,0	26,3	34,1	90,1	88,4
Wrocławskie	2,7	3,5	1,0	—	17,2	21,2	172,8	148,4
Zielonogórskie	1,4	1,9	0,5	—	51,1	77,8	149,9	186,7

CHOROBY ZAKAŻNE*

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne — Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakaźne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		056		080		085		092	
1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
1,4	0,7	75,1	84,4	0,1	—	483,4	579,6	233,9	178,4
—	—	136,5	148,1	0,6	—	1047,4	1870,5	197,5	141,4
1,6	3,1	157,7	235,7	—	—	934,2	1113,0	185,3	176,5
1,6	—	19,7	98,4	—	—	805,1	752,3	303,3	294,1
0,9	—	225,5	85,9	—	—	1648,5	1174,5	279,6	272,4
0,9	2,5	39,7	271,3	—	—	301,8	892,5	249,2	195,4
1,4	0,3	44,5	66,2	—	—	478,4	201,2	192,4	127,6
—	0,2	58,9	114,0	—	—	484,7	904,6	194,8	127,5
—	—	235,2	91,2	—	—	816,7	972,1	252,7	204,5
0,6	0,7	59,9	104,2	—	—	648,0	455,5	346,1	254,7
1,7	2,2	32,6	77,4	—	—	131,5	497,8	109,1	98,1
0,5	0,5	57,9	128,6	—	—	126,7	741,4	321,6	210,0
5,0	0,8	39,2	82,3	0,8	—	280,3	485,6	212,2	168,5
1,7	1,5	74,1	53,3	—	—	323,0	302,1	217,5	164,2
2,7	—	26,3	64,1	—	—	358,1	178,3	197,8	158,4
—	0,4	103,6	52,8	—	—	337,5	401,5	258,7	166,9
4,8	0,8	93,9	56,5	—	—	486,7	687,4	356,0	239,3
—	—	54,4	47,6	0,2	—	275,4	490,6	269,1	228,8
1,0	0,7	95,9	53,8	—	—	261,6	427,8	183,2	166,1
1,0	0,9	103,3	91,6	—	—	1550,2	722,1	229,7	197,4
0,8	0,8	104,4	44,0	0,5	—	306,7	398,7	181,1	94,5
4,3	0,6	33,4	65,4	0,2	—	413,8	377,5	274,4	185,0
—	0,9	74,2	120,3	—	—	494,1	584,9	209,7	198,2

* Zapadalność kwartalna na 100 000 ludności w stosunku rocznym.

LICZBA ZACHOROWAŃ

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	3. IV. — 2. VII. 1966	
		3. IV. — 30. IV. 66	1. V. — 28. V. 66
Dur brzuszny	040	70	97
Dury rzekome A.B.C.	041	3	20
Inne Salmonellozy	042	441	801
Czerwonka	045—048	426	788
Zatrucia pokarm.	Błulismus 049	13	76
		Inne	386
Płonica	050	3 066	3 985
Róża	052	154	242
Błonica	055	23	17
Krztusiec	056	1 407	2 475
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	90	76
Tężec	061	5	16
Odra	085	14 308	17 314
Zakaźne zapalenie wątroby	092	4 385	5 235
Tasiemczyce	125, 126	213	361
Grypa	480—483	10 462	4 082
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 746	1 448	2 649
Brucelloza	044	10	5
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	26	27
Dur wysypkowy	100—102	5	6
Włośnica	128	48	66
Świerzb	135	3 664	4 158

WG MIESIĘCY (OKRESÓW)

29. V. — 2. VII.	1. IV. — 30. VI. 1965		
	kwiecień 1965	maj 1965	czerwiec 1965
67	55	59	72
19	9	15	14
576	288	668	768
713	550	513	560
52	16	23	54
824	210	566	532
3 229	3 313	3 141	2 800
179	140	134	149
15	35	44	35
2 703	1 715	1 966	2 190
44	95	101	98
26	11	15	17
13 596	11 664	12 993	13 116
4 299	6 465	6 191	5 623
202	179	220	133
1 792	44 906	7 364	2 179
3 193	1 420	1 970	2 780
14	3	12	8
—	2	6	3
34	—	—	—
4	11	12	8
23	40	28	39
3 309	—	—	—

LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ
NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr klasyfikacji międzynarodowej	Zestawienie kumulacyjne			
		1. I. — 2. VII. 66 r.		1. I. — 30. VI. 65 r.	
		liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności
Dur brzuszny	040	407	2,6	399	2,5
Dury rzekome A.B.C.	041	57	0,3	63	0,4
Inne Salmonellozy	042	3.594	22,7	2 452	15,7
Czerwonka	045—048	3.569	22,5	3 151	20,2
Zatrucia pokarm. } Botulismus	049	189	1,2	122	0,8
		Inne	3.875	24,4	2 161
Płonica	050	22 999	145,1	23 475	150,2
Róża	052	1 041	6,6	879	5,6
Błonica	055	140	0,9	230	1,5
Krzusiec	056	11 386	71,8	10 717	68,6
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	400	2,5	514	3,3
Tężec	061	67	0,4	67	0,4
Odra	085	90 478	570,8	72 862	466,2
Zakaźne zapalenie wątroby	092	34 285	216,3	50 254	321,6
Tasiemczyce	125—126	1 536	9,7	1 079	6,9
Grypa	480—483	584 293	3686,3	821 592	5257,4
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	12 261	1464,5	9 979	1191,5
Brucelloza	044	76	0,5	37	0,2
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	—	13	0,08
Zapalenie mózgu	082, 083	147	0,9		
Dur wysypkowy	100—102	51	0,3	57	0,4
Włośnica	128	333	2,1	228	1,4
Świerzb	135	26 076	164,5		

CDW Cieszyn, zam. 3228/67. 650 + 10. E-018.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

III KWARTAŁ 1966

360

Do użytku służbowego

SYTUACJA EPIDEMICZNA POLSKI w III kwartale 1966 r.

1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	519	6,6
1965	327	4,1
1966	360	4,5

Z III kw. 1966 r. najwyższe liczby zachorowań zgłoszono z następujących województw:

Warszawskiego	— 57
Kieleckiego	— 37
m. Łodzi	— 30
Krakowskiego	— 27
Poznańskiego	— 26
Katowickiego	— 23
Bydgoskiego	— 19
Wrocławskiego	— 19

Z w.w. 8 województw zgłoszono łącznie 238 zachorowań tj. 66,1% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w III kw. br.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	III kwartał					
	0—3	4—7	8—14	15—19	20—24	25 i więcej
1964	24	67	89	73	54	212
1965	23	42	55	50	37	120
1966	28	38	35	47	33	179

2. Dury rzekome

W III kw. br. z terenu 16 województw zgłoszono łącznie 87 zachorowań. Najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Krakowskiego	— 29 hosp.	— 27
m. st. Warszawy	— 12	" — 10
Warszawskiego	— 9	" — 9
Białostockiego	— 8	" — 8
Gdańskiego	— 8	" — 8

Z 5 w/w województw zgłoszono łącznie 66 zachorowań.

3. Czerwonka

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	2.298	29,2
1965	1.734	21,8
1966	2.836	35,6

Notuje się znaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do tego samego okresu r. ub. jak również w porównaniu z II kw. br. (21,8 — III. kw. 1965 r.; 24,7 — II. kw. 1966; 35,6 — III. kw. 1966 r.). W bieżącym kwartale najwyższe wskaźniki obserwuje się w m. st. Warszawie — 291,8; woj. Zielonogórskim — 115,1; m. Łodzi — 71,7; woj. Olsztyńskim — 54,5; Warszawskim — 49,9; Szczecińskim — 45,3 i Białostockim — 43,2.

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań, odsetek hospitalizowanych chorych i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata

Rok	III kwartał		
	Liczba zach.	% hospitalizowanych chorych	Zapadalność na 100 000 dzieci
1964	10.210	44,5	2439,1
1965	9.742	46,8	2327,3
1966	13.185	51,7	3149,8

Notuje się znaczny wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. oraz w porównaniu z dwoma poprzedzającymi kwartałami.

W III kw. br. zanotowano 263 zgony w następujących województwach :

Warszawskim	— 45
Łódzkim	— 38
Poznańskim	— 31
Koszalińskim	— 21
Olsztyńskim	— 21
Białostockim	— 19
Bydgoskim	— 15
Kieleckim	— 12
Rzeszowskim	— 8
Gdańskim	— 7
Szczecińskim	— 7
Zielonogórskim	— 7
Lubelskim	— 6
m. Łodzi	— 6
Wrocławskim	— 5
Katowickim	— 4
Krakowskim	— 4
m. st. Warszawie	— 4
Opolskim	— 2
m. Krakowie	— 1

W m. Poznaniu i m. Wrocławiu zgonów z powodu biegunek nie notowano.

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	27.141	346,6
1965	17.962	226,2
1966	17.242	216,3

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 14 województw; z tego najwyższe w województwach:

m. Łodzi	— 363,1
m. Poznaniu	— 344,4
Katowickim	— 314,8
Opolskim	— 288,2
Szczecińskim	— 274,2
Poznańskim	— 273,7
Rzeszowskim	— 258,1

a najniższe w woj. Warszawskim (123,7), Kieleckim (140,6), Bydgoskim (141,6) i Białostockim (153,7).

Odsetek hospitalizowanych chorych w III kwartale:

1964 r.	— 88,1%
1965 r.	— 95,3%
1966 r.	— 94,7%

W III kw. br. zgłoszono 56 zgonów z terenu 17 następujących województw:

Katowickiego	— 9
Wrocławskiego	— 7
m. Łodzi	— 6
m. st. Warszawy	— 5
Szczecińskiego	— 5
Lubelskiego	— 3
Olsztyńskiego	— 3
Rzeszowskiego	— 3
Warszawskiego	— 3
Gdańskiego	— 2
Krakowskiego	— 2
Opolskiego	— 2
Poznańskiego	— 2
Białostockiego	— 1
Kieleckiego	— 1
Koszalińskiego	— 1
m. Poznania	— 1

Krajowy wskaźnik zapadalności w poprzedzającym kwartale wynosił 178,4.

6. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań w grupach wieku

grupy wieku	III kwartał		
	1964	1965	1966
0—3	1	2	—
4—7	—	—	—
8—14	1	2	—
15 i więcej	1	1	1
r a z e m	3	5	1

W III kw. 1964 r. zanotowano 1 zgon; w III kw. 1965 r. zgonów nie notowano; w III kw. 1966 r. zanotowano 1 zgon (województwo Gdańskie, pow. Wejherowo).

7. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludn.
1964	146	•	1,8
1965	73	4	0,9
1966	38	4	0,5

W III kw. br. zanotowano 4 zgony w województwach:

1) Bydgoskim, pow. Szubin — 1 zgon (wiek 55 lat, nieszczepiony)

- 2) Kieleckim, pow. Przysucha — 1 zgon (wiek 9 lat, nieszczepiony)
 3) Warszawskim, pow. Grodzisk — 1 zgon (wiek 10 lat, nieszczepiony)
 4) Wrocławskim, pow. Bolesławiec — 1 zgon (wiek 8 lat, dziecko szczep. podstawowo).

W III kwartale br. obserwuje się spadek krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z dwoma poprzedzającymi kwartałami oraz tym samym okresem 1965 r.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	III kwartał				
	0—3	4—7	8—14	15—24	25 i więcej
1964	34	35	40	23	14
1965	14	9	27	9	14
1966	6	7	12	3	10

8. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	8.045	•	102,4
1965	7.666	21	96,6
1966	10.974	6	135,4

W III kw. br. zanotowano 6 zgonów w następujących województwach: Katowickim — 2, Białostockim — 1, Olsztyńskim — 1, Szczecińskim — 1 i m. st. Warszawie — 1.

Notuje się wzrost krajowego wskaźnika zapadalności w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. z 96,6 — III. kw/1965 r. do 135,4 — III. kw/1966 r. Wzrost wskaźnika notuje się również w stosunku do I i II kw. br. (I kw. 1966 r. — 61,5; II kw. 1966 r. — 84,4).

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 13 województw; z tego najwyższe w województwach:

m. Krakowie	— 497,0
m. Łodzi	— 264,2
m. Wrocławiu	— 278,2
Gdańskim	— 231,1
Szczecińskim	— 229,4
Białostockim	— 177,1
m. st. Warszawie	— 166,2
Bydgoskim	— 162,9
Katowickim	— 157,9

9. Tężec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	131	1,7
1965	108	1,4
1966	80	1,0

W III kw. 1965 r. zanotowano 43 zgony; w III kw. 1966 r. zanotowano 22 zgony w następujących województwach:

- 1) Katowickim, pow. Myszków — 1 (54 lata)
- 2) Koszalińskim, pow. Bytów — 1 (45 lat)
- pow. Sławno — 1 (14 lat)
- 3) Krakowskim, pow. Limanowa — 1 (42 lata)
- m. Zakopane — 1 (63 lata)
- 4) Lubelskim, pow. Janów — 1 (65 lat)
- pow. Lubartów — 1 (77 lat)
- pow. Zamość — 1 (52 lata)
- 5) Olsztyńskim, pow. Olsztyn — 1 (71 lat)
- 6) Poznańskim, pow. Środa — 1 (16 lat)
- 7) Rzeszowskim, pow. Garlice — 2 (58 lat, 40 lat)
- pow. Łańcut — 1 (74 lata)
- pow. Ropczyce — 1 (65 lat)
- pow. Sanok — 1 (78 lat)
- 8) Warszawskim, m. Płock — 2 (9 dni, 19 lat)
- m. Siedlce — 1 (59 lat)
- 9) Wrocławskim, pow. Kłodzko — 1 (66 lat)
- pow. Nowa Ruda — 1 (22 lata)
- pow. Złotoryja — 1 (77 lat)
- 10) Zielonogórskim, pow. Sulęcín — 1 (22 lata)

10. Zatrucia pokarmowe

Liczba zgłoszonych przypadków

Rok	III kwartał			
	Ogółem	w tym:		
		botulismus	salmonellozy	inne
1964	3.574	60	1.104	2.410
1965	4.659	84	2.117	2.458
1966	4.844	171	1.491	3.182

Z województw: Bydgoskiego — 526, Szczecińskiego — 481, Gdańskiego — 442, Wrocławskiego — 438, Łódzkiego — 292, Katowickiego — 268, Olsztyńskiego — 265 i Warszawskiego — 245 zgłoszono łącznie 2957 przypadków zatruc pokarmowych t.j. 61,0% w stosunku do ogółem zgłoszonych przypadków w III kw. br.

11. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	4.299	.	54,9
1965	4.438	39	55,9
1966	5.436	5	68,2

W bieżącym kwartale zanotowano 5 zgonów w województwach: Łódzkim — 2, Warszawskim — 3.

12. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	15.381	.	195,8
1965	15.959	32	201,0
1966	13.918	9	174,6

Notuje się ponad trzykrotny spadek krajowego wskaźnika zapadalności w stosunku do II kw. br. (579,6 — II kw/1966; 174,6 — III kw/1966 r.).

Najwyższe wskaźniki obserwuje się w województwach:

Koszalińskim	— 411,4	m. st. Warszawie	— 251,4
Olsztyńskim	— 333,0	Szczecińskim	— 204,6
Gdańskim	— 321,0	Zielonogórskim	— 203,9
Bydgoskim	— 293,2		

a najniższe w woj. Łódzkim — 77,0; Lubelskim — 106,2, Kieleckim — 111,5; Białostockim — 116,1 i m. Łodzi — 119,6.

13. Choroba Brilla i inne riketsjozy

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	38	0,5
1965	32	0,4
1966	24	0,3

W III kw. 1965 r. i III kw. 1966 r. zgonów z powodu choroby Brilla i innych riketsjoz nie notowano.

14. Brucelloza

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	17	0,2
1965	23	0,3
1966	17	0,2

W kwartale sprawozdawczym zgłoszono z terenu 7 województw 17 zachorowań. (Poznańskiego — 5, Olsztyńskiego 4, Wrocławskiego — 3, Opolskiego — 2, Białostockiego — 1, Koszalińskiego — 1, Szczecińskiego — 1).

15. Płonica

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	III kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	9.425	120,0
1965	6.260	78,8
1966	8.143	102,2

Wzrost krajowego wskaźnika zapadalności notuje się w stosunku do III kw. 1965 r. a spadek w porównaniu z poprzedzającymi kwartałami br. Spadek wskaźnika zapadalności w porównaniu z II kw. br. notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem Bydgoskiego.

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (102,2) wystąpiły na terenie 12 województw; z tego najwyższe w m. Krakowie — 188,2; m. Łodzi — 187,5; woj. Bydgoskim — 172,8 i Gdańskim — 151,8; a najniższe w woj. Lubelskim — 38,3; Kieleckim — 53,0 i Białostockim — 57,5.

16. Włośnica

Liczba zgłoszonych przypadków w III kwartale

1964	1965	1966
15	16	44

W III kw. br. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z powiatów:

Pruszków — 7 (woj. Warszawskie)
Łomża — 7 (woj. Białostockie)
Hawa — 6 (woj. Olsztyńskie)
Biała Podlaska — 5 (woj. Lubelskie)
dzielnica Wola — 6 (m. st. Warszawa)

W poprzedzającym kwartale zgłoszono 137 przypadków włośnicy.

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dur brzuszy	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica
					Botulismus	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045— 048	049		050
POLSKA 1965	327	43	2 117	1 734	84	2 458	6 260
1966	360	87	1 491	2 836	171	3 182	8 143
M. st. Warszawa	11	12	88	904	2	75	409
M. Kraków	8	1	—	36	1	45	242
M. Łódź	30	1	63	132	1	145	345
M. Poznań	4	—	8	28	—	24	121
M. Wrocław	5	—	15	6	—	178	127
Białostockie	15	8	48	124	18	143	165
Bydgoskie	19	1	114	80	42	370	785
Gdańskie	11	8	120	89	5	317	508
Katowickie	23	5	236	119	2	30	1 212
Kieleckie	37	2	45	57	—	19	241
Koszalińskie	7	—	63	56	2	80	247
Krakowskie	27	29	8	53	2	152	452
Lubelskie	16	2	37	98	8	122	180
Łódzkie	12	2	115	109	5	172	289
Olsztyńskie	5	—	140	129	5	120	197
Opolskie	5	1	32	16	4	36	325
Poznańskie	26	1	25	43	31	96	394
Rzeszowskie	15	3	22	5	2	127	293
Szczecińskie	4	2	45	95	15	421	213
Warszawskie	57	9	140	303	11	84	478
Wrocławskie	19	—	58	113	7	373	671
Zielonogórskie	4	—	69	241	8	53	249

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Róża	Błonica	Krzyszec	Zapalenie opon mózgowo-rdzeni- wych nagminne	Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyszczki
9	10	11	12	13	14	15	16	17
052	055	056	057	061	085	086	087	089
439	73	7 666	279	108	15 959	.	.	9 114
753	38	10 974	311	80	13 918	1 681	6 251	3 944
34	—	515	20	1	779	148	428	131
7	3	639	2	1	234	43	177	160
59	—	486	5	1	220	64	245	63
9	—	118	—	—	214	87	176	138
22	—	326	2	—	143	80	112	34
23	—	508	9	1	333	69	180	114
65	1	740	17	2	1 332	83	340	107
41	—	773	4	—	1 074	163	522	259
52	4	1 376	20	5	1 648	294	934	568
19	8	450	18	7	507	18	278	142
33	1	265	9	5	768	34	169	150
39	—	742	38	11	762	76	365	246
25	6	507	13	7	499	51	251	90
45	1	570	7	1	317	22	171	105
30	1	268	46	1	788	63	261	141
22	—	319	48	3	392	27	145	180
33	2	400	12	4	689	47	198	194
25	3	274	14	16	600	34	181	185
41	—	481	9	—	429	65	279	321
57	4	466	5	7	867	35	290	113
47	3	450	11	5	896	123	372	353
25	1	301	2	2	427	55	177	150

*) liczby bezwzględne

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakaźne zapalenie wątroby	Tasienicyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Brucelloza	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Wąglik	Różycyca	Zółtaczką zakaźną krętkowa
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480— 483	571 764	044	051	062	064.4	072, 074
POLSKA	1965 17 962	464	4 438	9 742	23
	1966 17 242	551	5 436	13 185	17	5 892	1	179	46
M. st. Warszawa	518	14	69	227	—	154	—	2	—
M. Kraków	310	20	3	216	—	19	—	—	—
M. Łódź	668	76	471	215	—	23	—	—	—
M. Poznań	373	59	16	83	—	15	—	—	—
M. Wrocław	279	1	24	80	—	93	—	—	—
Białostockie	441	14	172	1 414	1	43	—	3	—
Bydgoskie	643	33	335	835	—	1 323	—	32	—
Gdańskie	757	65	172	620	—	1 304	—	4	—
Katowickie	2 744	99	942	1 175	—	144	—	13	1
Kieleckie	639	6	407	282	—	47	—	19	—
Koszalińskie	409	3	108	667	1	33	—	16	—
Krakowskie	942	11	608	571	—	15	—	20	4
Lubelskie	1 134	6	183	639	—	75	—	6	—
Łódzkie	850	21	262	748	—	314	—	8	—
Olsztyńskie	399	7	155	1 008	4	695	—	7	—
Opolskie	719	10	283	413	2	192	—	3	20
Poznańskie	1 439	12	271	636	5	74	—	3	1
Rzeszowskie	1 080	2	156	484	—	105	—	3	1
Szczecińskie	575	34	61	412	1	343	1	13	3
Warszawskie	750	8	190	1 574	—	328	—	7	—
Wrocławskie	1 094	37	434	608	3	437	—	12	15
Zielonogórskie	479	13	114	278	—	116	—	8	1

*) liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Mononukleozą	Wścieklizna	Jaglica	Pryszczycyca	Dur wysypkowy	Zimnica	Toksoplazmoza	Włośnica	Grzybica	Świerzb
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
080	082, 083	093	094	095	096.6	100 — 102	110 — 117	122.1	128	131	135
5	.	.	2	.	.	32	1	.	16	.	.
1	44	8	—	9	1	24	4	1	44	462	14 103
—	5	—	—	—	—	1	—	—	6	13	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	28	747
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	355
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
—	3	—	—	—	—	5	—	—	7	7	333
—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	80	1 781
—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	11	1 114
—	3	1	—	1	—	—	1	—	—	3	1 254
—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	9	292
—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	53	1 338
—	1	—	—	4	—	1	—	—	—	5	309
—	1	—	—	—	—	8	—	—	5	37	122
—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	33	541
—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	33	537
—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	498
—	2	—	—	—	—	1	—	1	2	10	498
—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	4	277
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	33	1 088
—	3	—	—	2	—	3	1	—	7	60	148
—	4	—	—	—	—	1	—	—	3	22	1 272
—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	17	1 184

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIANA 1962—1965	1. VII—30. IX. 1965		3. VII—1. X. 1966		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Dur brzuszny	040	608	327	4,1	360	4,5	8
Dury rzekome A. B. C.	041	79	43	0,5	87	1,1	1
Inne Salmonel- lozy	042	1277	2117	26,7	1491	18,7	25
Czerwonka	045—048	2523	1734	21,8	2836	35,6	2
Zatrucia pokarmowe	Botulismus	83	84	1,0	171	2,1	7
	Inne	2434	2458	31,0	3182	39,9	51
Płonica	050	19895	6260	78,8	8143	102,2	2
Róża	052	507	439	5,5	753	9,4	2
Błonica	055	211	73	0,9	38	0,5	4
Krzyszec	056	10386	7666	96,6	10974	135,4	6
Zapalenie opon mózgowo- rdzen. na- gminne	057	284	279	3,5	311	3,9	13
Tężec	061	129	108	1,4	80	1,0	22
Odra	085	15317	15959	201,0	13918	174,6	9
Różyczka	086	.	.	.	1681	21,1	—
Ospa wietrzna	087	.	.	.	6251	78,4	—
Zapalenie przy- usznicy na- gminne	089	7686	9114	114,8	3944	49,5	—
Zakaźne zapa- lenie wątroby	092	17585	17962	226,2	17242	216,3	56
Tasiemczyce	125, 126	.	464	5,8	551	6,9	—
Grypa	480—483	9241	4438	55,9	5436	68,2	5

I ZAPADALNOŚĆ* NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIA- NA 1962—1965	1. VII—30. IX. 1965		3. VII—1. X. 1966		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	10468	9742	2327,3	13185	3149,8	263
Brucelloza	044	17	23	0,3	17	0,2	—
Paciorkowco- we zapale- nie gardła	051	.	.	.	5892	73,9	—
Tularemia	059
Wąglik	062	.	.	.	1	0,01	—
Różycza	064,4	.	.	.	179	2,2	—
Zółtaczką za- kaźna krę- tkowa	072— 074	.	.	.	46	0,6	—
Porażenie dzie- cięce na- gminne	080	6	5	0,06	1	0,01	1
Zapalenie mózgu	082, 083	.	.	.	44	0,5	6
Mononukleozą	093	.	.	.	8	0,1	—
Wścieklizna	094	—	2	0,02	—	—	—
Jaglica	095	.	.	.	9	0,1	—
Pryszczyca	096,6	.	.	.	1	0,01	—
Dur wysyp- kowy	100— 102	39	32	0,4	24	0,3	—
Zimnica	110— 117	3	1	0,01	4	0,05	—
Toksoplazmoza	122,1	.	.	.	1	0,01	—
Włośnica	128	15	16	0,2	44	0,5	—
Grzybica	131	.	.	.	462	5,8	—
Świerzb	135	.	.	.	14103	176,9	—

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dura brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
	040		041		045—048		050	
	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
POLSKA	4,1	4,5	0,5	1,1	21,8	35,6	78,8	102,2
M. Warszawa	4,2	3,5	1,0	3,9	91,9	291,8	105,9	132,0
M. Kraków	3,9	6,2	0,8	0,8	23,6	28,0	202,6	188,2
M. Łódź	4,9	16,3	0,5	0,5	33,9	71,7	130,6	187,5
M. Poznań	—	3,7	0,9	—	23,3	25,8	90,4	111,7
M. Wrocław	2,6	4,3	0,9	—	9,5	5,1	141,4	108,4
Białostockie	4,9	5,2	4,2	2,9	36,1	43,2	45,9	57,5
Bydgoskie	2,6	4,2	—	0,2	16,8	17,6	82,9	172,8
Gdańskie	2,7	3,3	0,6	2,4	64,7	26,6	78,0	151,8
Katowickie	2,0	2,6	0,2	0,6	14,2	13,6	111,3	139,1
Kieleckie	4,3	8,1	—	0,4	7,9	12,5	45,0	53,0
Koszalińskie	8,1	3,7	—	—	18,4	30,0	99,1	132,3
Krakowskie	3,8	5,1	—	5,5	5,2	10,1	87,7	85,9
Lubelskie	5,3	3,4	0,2	0,4	13,4	20,8	41,9	38,3
Łódzkie	1,9	2,9	1,9	0,5	14,1	26,5	41,4	70,2
Olsztyńskie	1,3	2,1	—	—	64,8	54,5	49,4	83,2
Opolskie	5,6	2,0	—	0,4	2,4	6,4	107,2	130,3
Poznańskie	3,4	4,9	—	0,2	6,1	8,2	54,7	74,9
Rzeszowskie	4,3	3,6	1,4	0,7	1,4	1,2	51,7	70,0
Szczecińskie	8,2	1,9	1,0	0,9	49,2	45,3	102,8	101,6
Warszawskie	8,8	9,4	—	1,5	18,2	49,9	56,3	78,8
Wrocławskie	6,0	3,9	0,4	—	22,2	23,2	126,9	138,0
Zielonogórskie	2,4	1,9	0,5	—	35,7	115,1	88,7	118,9

CHOROBY ZAKAŻNE*

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne — Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		056		080		085		092	
1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
0,9	0,5	96,6	135,4	0,06	0,01	201,0	174,6	226,2	216,3
—	—	204,7	166,4	0,3	—	292,3	251,4	197,2	167,2
0,8	2,3	203,4	497,0	—	—	504,6	182,0	219,2	241,1
1,6	—	21,9	264,2	—	—	74,9	119,6	304,4	363,1
—	—	204,1	109,0	—	—	431,5	197,6	349,5	344,4
0,9	—	104,3	278,2	—	—	148,3	122,0	257,8	238,0
—	—	64,5	177,1	—	—	77,1	116,1	163,0	153,7
0,4	0,2	94,2	162,9	—	—	180,2	293,2	163,8	141,6
1,5	—	234,2	231,1	—	0,3	272,3	321,0	278,1	226,3
0,1	0,4	98,7	157,9	—	—	260,9	189,1	311,9	314,8
2,6	1,7	78,1	99,0	—	—	137,9	111,5	114,4	140,6
2,2	0,5	94,2	141,9	—	—	122,9	411,4	299,9	219,1
1,5	—	67,0	141,1	—	—	203,6	144,9	219,8	179,1
0,8	1,3	126,7	107,9	—	—	151,7	106,2	232,2	241,2
1,7	0,2	25,1	138,4	—	—	105,1	77,0	191,0	206,5
0,4	0,4	94,2	113,3	—	—	243,3	333,0	210,1	168,6
0,8	—	76,6	127,9	—	—	197,2	157,1	353,2	288,2
—	0,4	60,1	76,1	—	—	161,5	131,1	292,7	273,7
1,4	0,7	144,0	65,5	0,5	—	166,9	143,4	209,9	258,1
—	—	72,4	229,4	—	—	636,6	204,6	248,5	274,2
0,7	0,6	123,3	76,8	0,2	—	160,4	142,9	157,9	123,7
2,1	0,6	49,8	92,5	0,2	—	187,5	184,2	258,8	224,9
1,0	0,5	55,9	143,7	—	—	283,0	203,9	203,9	228,7

* Zapadalność kwartalna na 100 000 ludności przeliczona w stosunku rocznym.

LICZBA ZACHOROWAŃ

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	3.VII—1.X.1966	
		3. VII—30.VII.66 r.	1.VII—27.VIII.66 r.
Dur brzuszny	040	82	96
Dury rzekome A.B.C.	041	14	23
Inne Salmonellozy	042	501	436
Czerwonka	045—048	494	815
Zatrucia pokarm. } Botulismus	049	83	63
		Inne	681
Płonica	050	2 320	2 022
Róża	052	244	227
Błonica	055	15	15
Krztusiec	056	3 332	3 738
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	78	110
Tężec	061	31	28
Odra	085	7 840	2 993
Zakaźne zapalenie wątroby	092	4 272	4 744
Tasiemczyce	125, 126	159	182
Grypa	480—483	824	938
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 746	3 324	4 756
Brucelloza	044	7	1
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	1
Zapalenie mózgu	082, 083	14	16
Dur wysypkowy	100—102	6	10
Włośnica	128	23	16
Świerzb	135	1 925	2 391

WG MIESIĘCY (OKRESÓW)

28. VIII—1. X. 66 r.	1. VII.—30. IX. 1965		
	lipiec 1965	sierpień 1965	wrzesień 1965
182	92	99	136
50	14	23	6
554	863	705	549
1 527	504	444	786
25	36	33	15
1 113	683	991	784
3 801	1 982	1 774	2 504
282	156	132	151
8	28	22	23
3 904	2 568	2 681	2 417
123	74	103	102
21	36	36	36
3 085	8 695	3 649	3 615
8 226	5 273	5 678	7 011
210	158	160	146
3 674	1 240	983	2 215
5 105	3 144	3 219	3 379
9	9	6	8
—	1	1	3
14	·	·	·
8	10	9	13
5	5	9	2
9 787	·	·	·

**LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ
NA 100 000 LUDNOŚCI**

Jednostka chorobowa	Nr klasyfikacji międzynarodowej	Zestawienie kumulacyjne			
		1.I—1.X. 1966		1.I—30.IX. 1965	
		liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności
Dur brzuszny	040	767	3,2	726	3,0
Dury rzekome A.B.C.	041	144	0,6	106	0,4
Inne Salmonellozy	042	5 085	21,4	4 569	19,2
Czerwonka	045—048	6 405	27,0	4 885	20,5
Zatrucia pokarm. } Botulismus	049	360	1,5	206	0,9
		Inne	7 057	29,7	4 619
Płonica	050	31 142	131,2	29 735	124,8
Róża	052	1 794	7,5	1 318	5,5
Błonica	055	178	0,7	303	1,3
Krztusiec	056	22 360	94,2	18 383	77,2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	711	3,0	793	3,3
Tężec	061	147	0,6	175	0,7
Odra	085	104 396	439,8	88 821	372,9
Zakaźne zapalenie wątroby	092	51 527	217,1	68 216	286,4
Tasiemczyce	125—126	2 087	8,8	1 543	6,5
Grypa	480—483	589 729	2 484,5	826 030	3 468,5
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	25 446	1 988,3	19 721	1 541,0
Brucelloza	044	93	0,4	60	0,2
Porażenie dziecięce nagminne	080	1	0,004	18	0,07
Zapalenie mózgu	082, 083	191	0,8	.	.
Dur wysypkowy	100—102	75	0,3	89	0,4
Włośnica	128	377	1,6	244	1,0
Świerzb	135	40 179	169,3	.	.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
MINISTERSTWO ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN
EPIDEMIOLOGICZNY

IV KWARTAŁ 1966

000556

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

SYTUACJA EPIDEMICZNA POLSKI w IV kwartale 1966 r.

1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	383	4,8
1965	314	3,9
1966	312	3,9

W IV kw. 1966 r. 3 i więcej przypadków duru brzuszego zanotowano w następujących powiatach:

- 1) m. st. Warszawa, dz. Praga Południe — 3
- 2) m. Łódź, dz. Śródmieście — 3
- 3) m. Wrocław, dz. Fabryczna — 3
- 4) Białostockie, pow.: Łomża — 4, Suwałki — 3, Białystok — 3
- 5) Bydgoskie, pow. Lipno — 3
- 6) Gdańskie, pow.: Gdańsk — 4, Tczew — 4, m. Gdańsk — 3
- 7) Katowickie, pow. Częstochowa — 6, m. Dąbrowa Górnicza — 4
- 8) Kieleckie, pow.: Kielce — 7, Opoczno — 4, Radom — 4, m. Radom — 3
- 9) Lubelskie, pow.: Kraśnik — 9, Hrubieszów — 6
- 10) Łódzkie, pow. Łódź — 3
- 11) Opolskie, pow.: Racibórz — 5, Strzelce Opolskie — 4
- 12) Poznańskie, pow. Poznań — 3
- 13) Rzeszowskie, pow. Przemyśl — 3
- 14) Warszawskie, pow.: Sierpc — 9, Gostynin — 7, Płońsk — 5, Grójec — 4, Wołomin — 4, Płock — 4, Maków Mazowiecki — 3, Piaseczno — 3
- 15) Wrocławskie, pow.: Legnica — 5, Jelenia Góra — 3;

Z w/w 33 powiatów (miast) zgłoszono łącznie 141 zachorowań tj. 45,2% w stosunku do ogółem zgłoszonych w IV kw. 1966 r.

W IV kw. zanotowano 5 zgonów w sporadycznych przypadkach zachorowań:

1. m. st. Warszawa, dz. Wola — 1 zgon
2. m. Łódź, dz. Widzew — 1 zgon
3. Białostockie, pow. Łomża — 1 zgon
4. Koszalińskie, pow. Szczecinek — 1 zgon
5. Warszawskie, pow. Ryki — 1 zgon

W IV kw. 1965 r. zanotowano 10 zgonów.

2. Dury rzekome

W IV kw. br. zgłoszono 65 przypadków duru rzekomego z terenu 16 województw; z tego hospitalizowano 61 chorych. Zanotowano 1 zgon w woj. Białostockim, pow. Grajewo.

W IV kw. br. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Katowickiego	— 16
Warszawskiego	— 11
Krakowskiego	— 9
Białostockiego	— 6

W IV kw. 1965 r. zanotowano 27 przypadków.

3. Czerwonka

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	1.827	23,0
1965	2.269	28,5
1966	2.401	30,1

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego (30,1) notuje się na terenie 9 województw; z tego najwyższe w województwach:

m. st. Warszawa	— 149,4
Olsztyńskie	— 112,0
Białostockie	— 86,5
Wrocławskie	— 78,3
Zielonogórskie	— 55,4

a najniższe w woj. Opolskim (2,4), Poznańskim (3,4), Krakowskim (5,5), m. Wrocławiu (7,7) i Rzeszowskim (8,1).

W IV kw. 1966 r. zanotowano 1 zgon (m. st. Warszawa, dzielnica Praga-Północ)

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań, odsetek hospitalizowanych chorych i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie w wieku 0—2 lata

Rok	IV kwartał		
	Liczba zach.	% hospitalizowanych chorych	Zapadalność na 100 000 dzieci
1964	5.162	51,4	1 233,1
1965	6.708	55,4	1 602,5
1966	7.465	61,4	1 783,3

W IV kw. 1966 r. zgłoszono 263 zgony z następujących województw:

Łódzkiego	— 32
Warszawskiego	— 30
Kieleckiego	— 29
Olsztyńskiego	— 21
Zielonogórskiego	— 18
Poznańskiego	— 17
Biłostockiego	— 16
Katowickiego	— 15
m. Łodzi	— 13
Koszalińskiego	— 12
Bydgoskiego	— 10
Krakowskiego	— 9
Gdańskiego	— 8
Opolskiego	— 7
Lubelskiego	— 7
Wrocławskiego	— 6
Szczecińskiego	— 5
Rzeszowskiego	— 4
m. st. Warszawy	— 4

5. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	47.043	600,7
1965	25.930	326,6
1966	25.622	320,8

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie 11 województw z tego najwyższe w województwach:

m. Łodzi	— 445,2
Katowickim	— 428,8
Rzeszowskim	— 426,8
Opolskim	— 413,3
Poznańskim	— 404,4
Szczecińskim	— 399,2

a najniższe w m. st. Warszawie — 212,1; woj. Kieleckim — 220,2; Bydgoskim — 225,4 i Warszawskim — 226,7.

W IV kw. br. zgłoszono 62 zgony na zakaźne zapalenie wątroby z województw:

m. st. Warszawy	— 12	Warszawskiego	— 3
Wrocławskiego	— 9	Koszalińskiego	— 2
Katowickiego	— 8	Krakowskiego	— 2
Kieleckiego	— 4	Olsztyńskiego	— 2
Lubelskiego	— 4	Szczecińskiego	— 2
Poznańskiego	— 4	Zielonogórskiego	— 2
m. Łodzi	— 3	m. Krakowa	— 1
Biłostockiego	— 3	Gdańskiego	— 1

6. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań w grupach wieku

grupy wieku	IV kwartał		
	1964	1965	1966
0—3	—	—	—
4—7	—	—	—
8—14	—	—	—
15 i więcej	—	1	—
r a z e m	—	1	—

7. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludn.
1964	154	·	1,9
1965	111	6	1,4
1966	72	3	0,9

W IV kw. 1966 r. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Warszawskiego	— 24
Kieleckiego	— 19
Kozalińskiego	— 8
Katowickiego	— 5

W kwartale sprawozdawczym zanotowano 2 większe ogniska błonicy:

- 1) woj. Kieleckie, pow. Szydłowiec — 14 zachorowań. Pierwszy przypadek zanotowano 1. XI. 1966 r. na terenie m. Szydłowca w szkole podstawowej nr 2 — dziecko — 9 letnie, nie szczepione.

W okresie od 26. XI. do 31. XI. zanotowano dalsze 13 zachorowań wśród dzieci na terenie powiatu Szydłowjec. Zanotowano 1 zgon — dziecko 7 letnie, nie szczepione. Ponadto zanotowano 4 przypadki w pow. Kieleckim i 1 przypadek w m. Radomiu.

- 2) woj. Warszawskie, pow. Płońsk 24 zachorowania; z tego — 19 zachorowań w Domu Dziecka w Płońsku, 4 zach. z terenu m. Płońska i 1 zach. z terenu GRN — Płońsk.

Zachorowania notowano w okresie 23. IX. — 7. X. 1966 r. Z w/w chorych 21 przypadków dotyczyło dzieci w wieku do lat 14, pozostałe 3 przypadki powyżej lat 14.

Zachorowania w 22 przypadkach dotyczyły dzieci nieszczepionych, natomiast w 2 szczepionych p/błonicy.

Zanotowano 1 zgon dziecka — 7 letniego.

Liczba zachorowań w grupach wieku

Rok	IV kwartał				
	0—3	4—7	8—14	15—24	25 i więcej
1964	21	33	63	24	13
1965	11	28	53	18	1
1966	10	11	41	8	2

8. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	5.784	•	72,9
1965	5.726	25	72,0
1966	8.762	14	109,7

W IV kw. 1966 r. zgłoszono 14 zgonów z następujących województw:

Szczecińskiego — 4 (Szczecin m. i pow. — 108 zach., 3 zgony);

pow. Nowogard — 17 zach. 1 zgon;

m. Łodzi — 3 (dz. Bałuty — 155 zach., 3 zgony);

Białostockiego — 2 (pow. Bielsk Podl. — 66 zach., 1 zgon);

pow. Sokółka — 2 zach., 1 zgon);

Katowickiego — 2 (pow. Cieszyn — 27 zach., 1 zgon);

m. Chorzów — 28 zach., 1 zgon);

Łódzkiego — 1 (pow. Piotrków — 37 zach., 1 zgon)

Opolskiego — 1 (pow. Mrągowo — 21 zach., 1 zgon);

Warszawskiego — 1 (pow. Łosice — 12 zach., 1 zgon).

W IV kw. br. najwyższe wskaźniki zanotowano w województwach:

m. Krakowie — 461,2

m. Łodzi — 334,3

m. Wrocławiu — 168,9

Katowickim — 168,9

Gdańskim — 156,9

m. st. Warszawie — 143,3

woj. Szczecińskim — 124,0

Natomiast najniższe w woj. Poznańskim — 44,1, m. Poznaniu — 53,5; woj. Wrocławskim — 58,8; Warszawskim — 72,4 i Opolskim — 76,6.

Znaczny wzrost wskaźnika zapadalności w stosunku do analogicznego okresu r. ub. obserwuje się w m. Łodzi, m. Krakowie, m. Wrocławiu, woj. Katowickim i Krakowskim.

9. Tężec

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	64	0,8
1965	53	0,7
1966	52	0,6

W IV kw. 1965 r. zanotowano 19 zgonów a w IV kw. 1966 r. zanotowano 22 zgony w województwach:

Białostockim, pow. Sokółka	— 2 (7 dni, 6 dni)
Bydgoskim, pow. Toruń	— 1 (35 lat)
Katowickim, pow. Bielsko pow. Cieszyn	— 1 (62 lata)
Kieleckim, pow. Opatów	— 1 (66 lat)
pow. Radom	— 1 (6 dni)
pow. Włoszczowa	— 1 (9 dni)
Koszalińskim, m. Koszalin	— 1 (60 lat)
pow. Świdwin	— 1 (78 lat)
Krakowskim, pow. Limanowa	— 1 (41 lat)
pow. Nowy Sącz	— 1 (6 dni)
pow. Nowy Targ	— 3 (14 dni, 3 dni, 58 lat)
pow. Wadowice	— 1 (64 lata)
Lubelskim, pow. Chełm Lubelski	— 1 (38 lat)
pow. Lubartów	— 1 (33 lata)
Opolskim, m. Opole	— 1 (64 lata)
Rzeszowskim, pow. Dębica	— 1 (84 lata)
pow. Gorlice	— 1 (7 dni)
pow. Mielec	— 1 (4 lata)
	— 1 (66 lat)

W IV kw. 1966 r. najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

Rzeszowskiego	— 13
Krakowskiego	— 12
Kieleckiego	— 7

10. Zatrucia pokarmowe

Liczba zgłoszonych przypadków

Rok	IV kwartał			
	Ogółem	w tym:		
		botulismus	salmonellozy	inne
1964	1.903	34	643	1.226
1965	3.908	46	1.931	1.931
1966	2.745	79	1.278	1.388

Notuje się spadek ogólnej liczby przypadków w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. o 1.163. Spadek ten obserwuje się szczególnie w województwach:

Poznańskim (529 — IV kw. 1965 r.; 95 — IV kw. 1966 r.)
 Wrocławskim (530 — IV kw. 1965 r.; 173 — IV kw. 1966 r.)
 Szczecińskim (486 — IV kw. 1965 r.; 216 — IV kw. 1966 r.).
 Niemniej jednak liczba notowanych przypadków botulizmu wzrosła o 33 w porównaniu z IV kw. 1965 r.

W bieżącym kwartale na terenie 2 województw zanotowano 53 przypadki botulizmu t.j.

- 1) Poznańskiego — 31 (pow.: Wągrowiec — 14, Chodzież — 5, Jarocin — 3, Poznań — 3, Trzcianka — 2, Oborniki — 1, Szamotuły — 1, m. Gniezno — 2),
- 2) Bydgoskiego — 22 (pow.: Mogilno — 6, Żnin — 5, Chojnice — 4, Włocławek — 2, Chełmno — 1, Inowrocław — 1, Świecie — 1, Szubin — 1, Toruń — 1).

W IV kw. 1965 r. z terenu woj. Poznańskiego zgłoszono 16 przypadków botulizmu, a z Bydgoskiego — 6 przypadków.

11. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	24.562	.	313,6
1965	67.998	121	856,5
1966	55.422	14	693,9

W IV kw. br. najwyższe liczby przypadków zanotowano w województwach:

m. Łodzi	— 18.586	Krakowskim	— 4.807
Katowickim	— 7.441	Opolskim	— 2.611
Łódzkim	— 7.146	Kieleckim	— 2.073

z w/w 6 województw zgłoszono łącznie 42.664 zachorowania t.j. 77,0% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w IV kw. br.

12. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał		
	Liczba zach.	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	26.589	.	335,0
1965	35.775	53	449,7
1966	30.047	15	376,2

W kwartale sprawozdawczym wyższe wskaźniki od krajowego notuje się na terenie następujących województw:

Koszalińskim	— 963,7	Bydgoskim	— 593,1
Białostockim	— 786,3	Katowickim	— 585,4
m. Poznaniu	— 689,8	Gdańskim	— 489,6
Wrocławskim	— 645,0	Olsztyńskim	— 428,9

13. Choroba Brilla i inne riketsjozy

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	32	0,4
1965	26	0,3
1966	35	0,4

W IV kw. br. zgłoszono 35 przypadków z terenu 28 powiatów.

W IV kw. 1965 r. zanotowano 3 zgony z powodu choroby Brilla i innych riketsjoz, w IV kw. 1966 r. zgonów nie notowano.

14. Brucelloza

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	10	0,1
1965	18	0,2
1966	42	0,5

W kwartale sprawozdawczym najwyższe liczby przypadków zgłoszono z terenu:

1) woj. Olsztyńskiego — 19 w tym:

- pow. Nidzica — 6
- pow. Lębork Warm. — 3
- pow. Ostróda — 3
- pow. Bartoszyce — 1
- pow. Biskupice — 1
- pow. Braniewo — 1
- pow. Nowe Miasto — 1
- pow. Pisz — 1
- m. Olsztyn — 2

2) woj. Poznańskiego — 9 w tym:

- pow. Wągrowiec — 3
- pow. Pleszew — 1
- pow. Rawicz — 1
- pow. Słupca — 1
- pow. Krotoszyn — 1
- pow. Międzychód — 1
- m. Kalisz — 1

3) woj. Białostockiego — 5 w tym:

- pow. Gołdap — 3
- pow. Ełk — 1
- pow. Mońki — 1

Z w/w województw zgłoszono łącznie 33 przypadki brucellozy.

15. Płonica

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Rok	IV kwartał	
	Liczba zach.	Zapadalność na 100 000 ludności
1964	20.490	258,2
1965	12.135	152,5
1966	18.495	231,5

W stosunku do analogicznego okresu r. ub. notuje się wzrost wskaźnika zapadalności we wszystkich województwach, natomiast znaczny wzrost wystąpił: w m. st. Warszawie, m. Krakowie, m. Łodzi, woj. Gdańskim, Łódzkim, Opolskim i Rzeszowskim.

W kwartale sprawozdawczym najwyższe wskaźniki obserwuje się w województwach:

m. Łodzi	— 532,7
m. Krakowie	— 514,1
m. st. Warszawie	— 496,7
Opolskim	— 322,3
Gdańskim	— 303,7
m. Wrocławiu	— 298,6
Katowickim	— 291,2
Łódzkim	— 273,0
Wrocławskim	— 261,9

a najniższe w województwach: Lubelskim — 102,5; Białostockim — 134,6; Kieleckim — 142,3; Olsztyńskim — 148,2.

16. Włośnica

Liczba zgłoszonych przypadków w IV kwartale

1964	1965	1966
101	35	27

W IV kw. 1966 r. z terenu woj. Katowickiego zgłoszono — 18 przypadków; w tym: m. Siemianowice — 8, m. Chorzów — 7, m. Bytom — 3.

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dur brzuszy	Dury rzekome A.B.C.	Inne Salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica
					Botulismus	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045— 048	049		050
POLSKA 1965	314	27	1 931	2 269	46	1 931	12 135
1966	312	65	1 278	2 401	79	1 388	18 495
M. st. Warszawa	10	5	88	463	2	48	1 539
M. Kraków	1	2	1	49	—	28	661
M. Łódź	6	1	57	76	—	81	980
M. Poznań	2	—	15	12	2	13	209
M. Wrocław	4	—	16	9	—	69	350
Białostockie	18	6	38	248	1	44	386
Bydgoskie	8	—	35	59	22	74	1 140
Gdańskie	16	3	85	70	1	160	1 016
Katowickie	26	16	209	132	1	24	2 538
Kieleckie	30	—	12	51	—	38	647
Koszalińskie	5	1	36	58	1	28	385
Krakowskie	7	9	22	29	—	20	853
Lubelskie	30	1	52	62	—	20	482
Łódzkie	13	3	58	58	1	103	1 124
Olsztyńskie	5	1	123	265	3	128	351
Opolskie	18	—	8	6	7	10	804
Poznańskie	16	1	34	18	31	30	806
Rzeszowskie	10	2	23	34	—	9	736
Szczecińskie	3	1	21	81	3	192	522
Warszawskie	58	11	214	124	2	141	1 248
Wrocławskie	21	2	66	381	1	106	1 274
Zielonogórskie	5	—	65	116	1	22	444

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Róża	Błonica	Krzusiec	Zapalenie opon mózgowo-rdzeni- owych nagminne	Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wielizna	Zapalenie przysznicy
9	10	11	12	13	14	15	16	17
052	055	056	057	061	085	086	087	089
524	111	5 726	218	53	35 775	.	.	12 851
776	72	8 762	198	52	30 047	3 850	25 321	10 794
38	—	444	9	—	884	470	2 626	305
9	3	593	1	1	323	45	529	302
49	—	615	1	—	237	146	1 310	155
8	—	58	—	—	747	88	494	623
30	2	198	—	2	118	159	347	80
16	—	247	13	2	2 254	47	840	317
68	—	466	11	3	2 694	160	1 385	586
50	—	525	2	—	1 638	157	1 827	827
45	5	1 472	7	3	5 102	705	2 974	1 464
26	19	444	9	7	464	167	1 437	520
36	8	186	4	2	1 799	73	523	385
40	1	583	18	12	1 777	99	1 656	301
36	1	389	7	2	647	338	877	175
34	1	370	12	—	1 026	58	577	174
42	2	236	22	—	1 015	218	1 027	511
27	—	191	32	2	702	150	695	380
23	—	232	15	—	1 446	96	673	233
21	2	349	11	13	1 407	108	849	535
52	2	260	2	1	665	84	1 074	829
52	24	439	5	2	1 274	69	1 194	184
57	1	286	14	—	3 137	301	1 550	986
17	1	179	3	—	691	112	857	922

*) liczby bezwzględne

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakaźne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Brucelloza	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Wąglik	Listerioza	Różyczka
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480—483	571, 764	044	051	062	064	064.4
POLSKA 1965	25 930	452	67 998	6 708	18
1966	25 622	642	55 422	7 465	42	7 907	1	8	131
M. st. Warszawa	657	31	130	141	—	232	—	—	—
M. Kraków	425	21	1 671	65	—	49	—	—	—
M. Łódź	819	86	18 586	185	—	—	—	—	2
M. Poznań	414	33	46	39	1	28	—	—	—
M. Wrocław	368	2	181	32	—	145	—	—	—
Białostockie	885	14	512	605	5	149	—	1	2
Bydgoskie	1 024	41	1 453	313	1	1 307	—	—	19
Gdańskie	994	87	877	392	—	1 246	—	—	2
Katowickie	3 737	86	7 441	905	—	462	—	—	10
Kieleckie	1 001	5	2 073	156	—	106	—	—	6
Koszalińskie	547	6	619	538	—	73	—	—	20
Krakowskie	1 465	15	4 807	248	—	49	—	—	16
Lubelskie	1 663	10	724	269	—	148	—	—	5
Łódzkie	1 587	34	7 146	298	—	583	—	—	5
Olsztyńskie	673	37	647	538	19	1 126	—	—	9
Opolskie	1 031	12	2 611	327	1	611	—	7	2
Poznańskie	2 126	24	1 724	267	9	118	—	—	3
Rzeszowskie	1 786	3	712	219	—	67	1	—	3
Szczecińskie	837	53	305	225	2	205	—	—	9
Warszawskie	1 375	6	678	597	1	529	—	—	6
Wrocławskie	1 422	34	1 831	876	2	460	—	—	5
Zielonogórskie	786	2	648	230	1	214	—	—	7

*) liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE*)

Zółtaczką zakaźną krętkowa	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Mononukleozą	Wścieklizna	Jaglica	Dur wysypkowy	Zimnica	Toksoplazmoza	Włośnica	Grzybica	Świerzb
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
072, 074	080	082, 083	093	094	095	100—102	110—117	122.1	128	131	135
.	1	.	.	1	.	26	1	.	35	.	.
57	—	40	12	—	9	35	—	1	27	640	63.824
—	—	2	—	—	—	3	—	—	1	—	925
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	358
—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	38	2 341
—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	1 358
9	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	269
—	—	4	—	—	8	4	—	—	—	31	888
2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	73	5 641
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	12	4 909
—	—	1	—	—	—	3	—	—	18	3	7 820
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	23	1 541
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	44	3 528
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	12	1 522
1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	25	814
1	—	3	—	—	—	1	—	—	1	104	1 722
2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	47	3 077
8	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2 320
—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	31	3 202
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	1 393
5	—	3	—	—	—	2	—	—	—	70	8 929
3	—	2	—	—	—	4	—	—	4	70	2 027
25	—	1	—	—	—	3	—	—	—	21	4 457
1	—	14	—	—	—	—	—	—	—	15	4 783

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIANA 1962—1965	1. X — 31. XII. 65		2. X — 31. XII. 66		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Dur brzuszny	040	542	314	3,9	312	3,9	5
Dury rzekome A. B. C.	041	38	27	0,3	65	0,8	1
Inne Salmonel- lozy	042	590	1.931	24,3	1.278	16,0	26
Czerwonka	045—048	2.154	2.269	28,5	2.401	30,1	1
Zatrucia pokarmowe	Botulismus	43	46	0,6	79	1,0	—
	Inne	1.515	1.931	24,3	1.388	17,4	7
Płonica	050	20.133	12.135	152,5	18.495	231,5	4
Róża	052	596	524	6,6	776	9,7	4
Błonica	055	306	111	1,4	72	0,9	3
Krzusiec	056	8.411	5.726	72,0	8.762	109,7	14
Zapalenie opon mózgowo- rdzen. na- gminne	057	205	218	2,7	198	2,5	10
Tężec	061	75	53	0,7	52	0,6	22
Odra	085	31.182	35.775	449,7	30.047	376,2	15
Różyczka	086	·	·	·	3.850	48,2	—
Ospa wietrzna	087	·	·	·	25.321	317,0	3
Zapalenie przy- usznicy na- gminne	089	18.793	12.851	161,5	10.794	135,1	3
Zakaźne zapa- lenie wątroby	092	30.526	25.930	326,6	25.622	320,8	62
Tasiemczyce	125, 126	·	452	5,7	642	8,0	1
Grypa	480—483	45.329	67.998	856,5	55.422	693,9	14

I ZAPADALNOŚĆ* NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa.	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	MEDIA- NA 1962—1965	1. X — 31. XII. 65		2. X — 31. XII. 66		
			liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zach.	zapa- dalność na 100 000 ludn.	liczba zgo- nów
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	5.562	6.708	1 602,5	7 465	1 783,3	263
Brucelloza	044	13	18	0,2	42	0,5	1
Paciorkowco- we zapale- nie gardła	051	·	·	·	7.907	99,0	1
Wąglik	062	·	·	·	1	0,01	—
Listerioza	064	·	·	·	8	0,1	—
Różycza	064,4	·	·	·	131	1,6	—
Zółtaczką za- każną krę- tkowa	072— 074	·	·	·	57	0,7	—
Porażenie dzie- cięce na- gminne	080	2	1	0,01	—	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	·	·	·	40	0,5	2
Mononukleozą	093	·	·	·	12	0,1	—
Wścieklizna	094	1	1	0,01	—	—	—
Jaglica	095	·	·	·	9	0,1	—
Dur wysyp- kowy	100— 102	33	26	0,3	35	0,4	—
Zimnica	110— 117	3	1	0,01	—	—	—
Toksoplazmoza	122.1	·	·	·	1	0,01	—
Włośnica	128	67	35	0,4	27	0,3	1
Grzybica	131	·	·	·	640	8,0	—
Świerzb	135	·	·	·	63.824	799,1	—

*) Zapadalność kwartału na 100.000 ludności w stosunku rocznym

ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dur brzuszny Typhus abdominalis		Dury rzekome A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
	040		041		045—048		050	
	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
POLSKA	3,9	3,9	0,3	0,8	28,5	30,1	152,5	231,5
M. Warszawa	3,2	3,2	0,6	1,6	114,1	149,4	295,6	496,7
M. Kraków	5,5	0,8	—	1,5	26,8	38,1	381,6	514,1
M. Łódź	5,5	3,3	—	0,5	24,6	41,3	352,2	532,7
M. Poznań	1,9	1,8	—	—	9,3	11,1	150,0	193,0
M. Wrocław	1,7	3,4	0,9	—	8,6	7,7	230,2	298,6
Białostockie	5,6	6,3	1,0	2,1	29,1	86,5	101,6	134,6
Bydgoskie	4,6	1,8	0,4	—	16,6	13,0	227,6	251,0
Gdańskie	2,7	4,8	—	0,9	58,0	20,9	176,8	303,7
Katowickie	2,4	3,0	0,1	1,8	36,4	15,1	199,4	291,2
Kieleckie	6,8	6,6	—	—	17,7	11,2	82,8	142,3
Koszalińskie	2,7	2,7	—	0,5	16,2	31,1	148,3	206,2
Krakowskie	1,7	1,3	—	1,7	6,3	5,5	135,0	162,1
Lubelskie	3,8	6,4	0,2	0,2	10,5	13,2	61,7	102,5
Łódzkie	1,7	3,1	0,7	0,7	18,0	14,1	79,3	273,0
Olsztyńskie	4,3	2,1	0,4	0,4	4,0	112,0	90,8	148,3
Opolskie	4,4	7,2	0,4	—	1,6	2,4	191,1	322,3
Poznańskie	2,1	3,0	0,6	0,2	5,7	3,4	93,8	153,3
Rzeszowskie	7,7	2,4	0,2	0,5	0,7	8,1	73,3	175,9
Szczecińskie	3,4	1,4	—	0,5	28,0	38,6	214,8	249,0
Warszawskie	9,6	9,6	0,7	1,8	32,3	20,4	120,8	205,8
Wrocławskie	2,5	4,3	0,2	0,4	25,9	78,3	224,6	261,9
Zielonogórskie	1,9	2,4	1,4	—	108,5	55,4	151,4	212,0

CHOROBY ZAKAŻNE*

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne — Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemica	
055		056		080		085		092	
1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
1,4	0,9	72,0	109,7	0,01	—	449,7	376,2	326,6	320,8
—	—	147,0	143,3	—	—	493,4	285,5	270,5	212,1
3,9	2,3	184,5	461,2	—	—	1218,1	251,2	307,5	330,5
1,1	—	21,9	334,3	—	—	261,8	128,8	363,4	445,2
—	—	84,8	53,5	—	—	523,7	689,8	467,8	382,3
3,4	1,7	112,1	168,9	—	—	760,6	100,7	405,3	314,0
0,7	—	59,9	86,2	—	—	211,0	786,3	268,5	308,7
1,3	—	79,1	102,6	—	—	272,6	593,1	256,8	225,4
—	—	171,7	156,9	—	—	660,4	489,6	441,9	297,1
0,2	0,6	81,1	168,9	—	—	645,5	585,4	411,6	428,8
2,6	4,2	69,4	97,7	—	—	532,3	102,1	183,8	220,2
1,8	4,3	128,8	99,6	—	—	198,1	963,7	370,3	293,0
4,4	0,2	42,3	110,8	—	—	445,8	337,9	308,1	278,6
0,6	0,2	64,3	82,7	—	—	175,6	137,6	358,5	353,8
—	0,2	25,1	89,9	—	—	174,0	249,2	260,9	385,5
6,0	0,8	37,9	99,7	—	—	646,1	428,9	341,8	284,4
0,8	—	38,3	76,6	—	—	641,9	281,4	480,6	413,3
0,8	—	41,1	44,1	—	—	462,4	275,1	508,2	404,4
0,5	0,5	109,9	83,4	—	—	465,7	336,2	347,9	426,8
—	0,9	83,5	124,0	—	—	729,2	317,2	391,4	399,2
0,7	3,9	74,9	72,4	—	—	385,7	210,0	192,7	226,7
4,8	0,2	33,2	58,8	—	—	333,7	645,0	311,1	292,4
—	0,5	73,3	85,5	0,5	—	744,8	329,9	311,9	375,3

* Zapadalność kwartalna na 100 000 ludności przeliczona w stosunku rocznym.

LICZBA ZACHOROWAŃ

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	2. X—31. XII. 1966	
		2. X—29. X. 1966 r.	30.X—3.XII. 1966 r.
Dur brzuszny	040	150	108
Dury rzekome A.B.C.	041	22	27
Inne Salmonellozy	042	439	473
Czerwonka	045—048	977	1 076
Zatrucia pokarm. } Botulismus	049	17	34
		Inne	578
Płonica	050	5 297	7 210
Róża	052	277	292
Błonica	055	21	30
Krzusiec	056	2 709	3 534
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	67	73
Tężec	061	28	16
Odra	085	6 018	12 721
Zakaźne zapalenie wątroby	092	8 075	9 900
Tasiemczyce	125, 126	203	230
Grypa	480—483	4 264	9 858
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	2 945	2 708
Brucelloza	044	8	10
Porażenie dziecięce nagminne	080	—	—
Zapalenie mózgu	082, 083	14	12
Dur wysypkowy	100—102	10	15
Włośnica	128	1	8
Świerzb	135	16 456	27 014

WG MIESIĘCY (OKRESÓW)

4. XII—31. XII. 66 r.	1. X — 31. XII. 1965 r.		
	październik 1965 r.	listopad 1965 r.	grudzień 1965 r.
54	125	117	72
16	12	5	10
366	892	494	545
348	891	775	603
28	25	5	16
352	422	705	804
5 988	3 515	4 134	4 486
207	199	165	160
21	38	44	29
2 519	2 069	1 935	1 722
58	67	76	75
8	20	17	16
11 308	7 379	12 844	15 552
7 647	7 888	9 065	8 977
209	165	153	134
41 300	4 731	19 571	43 696
1 812	2 788	2 134	1 786
24	—	1	17
—	1	—	—
14	.	.	.
10	10	8	8
18	18	3	14
20 354	.	.	.

LICZBA ZACHORWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr klasyfikacji międzynarodowej	Zestawienie kumulacyjne				
		1. I. — 31. XII. 1966 r.		1. I. — 31. XII. 1965 r.		
		liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności	liczba zachorowań	zapadalność na 100 000 ludności	
Dur brzuszny	040	1 079	3,4	1 040	3,3	
Dury rzekome A.B.C.	041	209	0,6	133	0,4	
Inne Salmonellozy	042	6 363	20,1	6 500	20,6	
Czerwonka	045—048	8 806	27,8	7 154	22,7	
Zatrucia pokarm.	Botulismus	049	439	1,4	252	0,8
	Inne		8 445	26,6	6 550	20,8
Płonica	050	49 637	156,6	41 870	132,9	
Róża	052	2 570	8,1	1 842	5,8	
Błonica	055	250	0,8	414	1,3	
Krzyszec	056	31 122	98,2	24 109	76,5	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	909	2,9	1 011	3,2	
Teżec	061	199	0,6	228	0,7	
Odra	085	134 443	424,1	124 596	395,6	
Zakaźne zapalenie wątroby	092	77 149	243,4	94 146	298,9	
Tasiemczyce	125, 126	2 729	8,6	1 995	6,3	
Grypa	480—483	644 851	2 034,3	894 028	2 838,5	
Biegunki u dzieci do lat 2	571, 764	32 911	2 006,4	26 429	1 561,1	
Brucelloza	044	135	0,4	78	0,2	
Porażenie dziecięce nagminne	080	1	0,003	19	0,06	
Zapalenie mózgu	082, 083	231	0,7	.	.	
Dur wysypkowy	100—102	110	0,3	115	0,4	
Włośnica	128	404	1,3	279	0,9	
Świerzb	135	104 003	328,1	.	.	