

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

MINISTERSTWO ZDROWIA  
I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY



INFORMACYJNY BIULETYN  
EPIDEMIOLOGICZNY

Rok 1968

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

## Sytuacja epidemiczna Polski w roku 1968

### CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ POKARMOWĄ

#### 1. Dur brzuszny

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	1 074	23	3,4	0,07
1967	936	16	2,9	0,05
1968	694	17	2,2	0,05

W roku 1968 najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach:

warszawskim	— 4,3
kieleckim	— 4,1
lubelskim	— 3,3
krakowskim	— 3,1
białostockim	— 3,1

#### Zachorowania na dur brzuszny w grupach wieku, w odsetkach

Lata	0—4	5—9	10—14	15—19	20—24	25 i więcej	Razem
1967	9,9	11,3	13,3	13,3	10,4	41,8	100,0
1968	11,0	12,9	10,2	10,7	11,8	43,4	100,0

#### Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Podział	1967		1968	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
Miasta i osiedla	497	3,1	401	2,5
Gromady	439	2,8	293	1,8
Polska	936	2,9	694	2,2

Szczepienia przeciwko durowi brzuszemu w roku 1968

Rodzaj stosowanej szczepionki	I wstrzyknięcie		II wstrzyknięcie		III wstrzyknięcie		I powtórne	
	Liczba zaszczepionych	% <sup>1)</sup>	Liczba zaszczepionych	% <sup>2)</sup>	Liczba zaszczepionych	% <sup>3)</sup>	Liczba zaszczepionych	% <sup>4)</sup>
formolowo-fenolowa	663 341	89,4	563 339	84,9	470 971	96,6	735 776	58,0
formolowo-fenolowa z tężcem	1242 924	67,5	987 046	79,4	726 788	84,4	2905 412	61,9
Razem	1906 265	73,8	1550 385	81,3	1197 759	88,9	3641 188	61,0

1) odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób podlegających szczepieniu,

2) odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób, które otrzymały jedno wstrzyknięcie w roku 1968,

3) odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób, które otrzymały dwa wstrzyknięcia w roku 1967,

4) odsetek zaszczepionych, w stosunku do liczby osób zaszczepionych (podstawowo) w roku 1965.

Na dzień 31. XII. 1968 r. zarejestrowanych było 4 473 nosicieli S. typhi. Z 2 972 typowanych nosicieli S. typhi w roku 1968 najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
E 1a	687	23,1
F 1	400	13,5
A	307	10,3
D 1	210	7,1
C 1	156	5,2
E 1b	107	3,6
F 4	67	2,3
46	59	2,0
D 4	44	1,5
Szczepy zdegradowane	343	11,5
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	224	7,5

W roku 1968 u 589 zbadanych chorych na dur brzuszny (tj. 84,9% ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1968) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
E 1a	128	21,7
A	97	16,5
F 1	82	13,9
D 1	53	9,0
E 1b	31	5,3
46	18	3,1
C 1	13	2,2
D 6	12	2,0
Szczepy zdegradowane	65	11,0
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	19	3,2

## 2. Dury rzekome

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
1966	205	0,6
1967	199	0,6
1968	98	0,3

W roku 1968 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

białostockiego — 23  
m. st. Warszawy — 13  
warszawskiego — 10  
lubelskiego — 8

Z w/w województw zgłoszono łącznie 54 przypadki, co stanowi 55,1% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1968.

Nie notowano zachorowań w m. Łodzi i m. Poznaniu.

W roku 1968 zbadano 389 zarejestrowanych stałych nosicieli *S. paratyphi* B. Wśród tych nosicieli najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba nosicieli	%
Taunton	122	31,4
1	84	21,6
BAOR	51	13,1
3a I v. 1,2	35	9,0
3a I	27	6,9
3a	16	4,1
Dundee	14	3,6
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	14	3,6

W roku 1968 u 82 zbadanych chorych na dury rzekome (tj. 83,7% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1968) najczęściej występowały następujące typy bakteriofagowe:

Najczęściej występujące typy bakteriofagowe	Liczba chorych	%
Taunton	49	59,8
BAOR	13	15,9
3a I v. 1,2	7	8,5
1	5	6,1
3a I	4	4,9
Szczepy nie reagujące z żadnym bakteriofagiem	2	2,4

### 3. Czerwonka

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	8 805	7	27,8	0,02
1967	8 289	5	25,9	0,02
1968	6 231	5	19,3	0,02

W roku 1968 najwyższe wskaźniki zapadalności zanotowano w województwach:

m. st. Warszawie	— 80,6
olsztyńskim	— 60,3
białostockim	— 39,8
m. Krakowie	— 36,7
zielenogórskim	— 30,7
wrocławskim	— 25,1
warszawskim	— 25,0
gdańskim	— 23,3
szczecińskim	— 22,3

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1966	1 642	21,0	1 931	24,4	2 831	35,4	2 401	30,1
1967	1 128	14,2	1 727	21,4	3 239	40,7	2 195	27,3
1968	1 716	21,5	1 553	19,4	1 426	17,6	1 536	18,9

Odsetek hospitalizowanych chorych

1966	1967	1968
59,1	54,9	55,6

4. Biegunki u dzieci do lat 2

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność na 10 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata, śmiertelność, odsetek hospitalizowanych chorych:

Województwo	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 10 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata	Śmier-telność	Odsetek hospita-lizowa-nych chorych
POLSKA 1966	32 896	1 051	200,6	3,2	57,7
1967	32 088	855	198,1	2,7	59,0
1968	29 439	583	184,3	2,0	59,3
M. st. Warszawa	537	12	152,9	2,2	30,5
M. Kraków	373	7	193,4	1,9	42,9
M. Łódź	582	36	266,1	6,2	94,3
M. Poznań	218	—	144,4	—	45,0
M. Wrocław	183	—	91,6	—	47,0
Białostockie	2 436	21	370,8	0,9	38,2
Bydgoskie	2 344	38	240,4	1,6	52,3
Gdańskie	1 755	40	238,3	2,3	69,5
Katowickie	2 564	20	159,1	0,8	77,1
Kieleckie	838	33	89,2	3,9	54,7
Koszalińskie	1 649	33	366,7	2,0	70,0
Krakowskie	1 195	31	95,4	2,6	67,5
Lubelskie	1 196	27	124,7	2,3	56,3
Łódzkie	1 246	31	158,1	2,5	66,0
Olsztyńskie	2 666	51	428,6	1,9	44,7
Opolskie	1 459	6	241,4	0,4	18,4
Poznańskie	1 372	27	120,6	2,0	67,0
Rzeszowskie	1 080	30	111,4	2,8	65,2
Szczecińskie	937	25	207,2	2,7	61,3
Warszawskie	2 558	72	202,1	2,8	67,4
Wrocławskie	1 668	17	171,1	1,0	71,5
Zielonogórskie	583	26	126,8	4,5	96,7

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0—2 lata w poszczególnych kwartałach

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1966	4 967	1 228,6	7 283	1 822,7	13 181	3 331,4	7 465	1 886,7
1967	4 963	1 267,7	7 123	1 744,4	12 683	3 106,1	7 319	1 792,4
1968	5 439	1 441,3	7 146	1 893,7	10 449	2 632,2	6 405	1 613,5

5. Włośnica

Liczba zachorowań

1966	1967	1968
404	345	378

W roku 1968 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

białostockiego	— 129 (hosp. 53)
gdańskiego	— 53 (hosp. 30)
warszawskiego	— 48 (hosp. 48)
olsztyńskiego	— 27 (hosp. 27)
koszalińskiego	— 23 (hosp. 15)
poznańskiego	— 22 (hosp. 5)
katowickiego	— 17 (hosp. 17)
bydgoskiego	— 16 (hosp. 8)
m. Łodzi	— 13 (hosp. 12)
wrocławskiego	— 11 (hosp. 11)
łódzkiego	— 9 (hosp. 9)

Z w/w 11 województw zgłoszono łącznie 368 przypadków, co stanowi 97,4% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1968.

6. Zatrucia pokarmowe

W roku 1968 zarejestrowano 150 ognisk zbiorowych zatruc pokarmowych, o etiologii bakteryjnej, o łącznej liczbie zachorowań 4 024, w tym:

- 1) o ustalonym czynniku bakteryjnym — 123 ogniska — 3 687 chorych,
  - 2) nieustalonym czynnikiem bakteryjnym — 27 ognisk — 337 chorych.
- W roku 1968 — jedno ognisko o liczbie 8 osób wywołane było spożyciem żywności zanieczyszczonej szkodliwymi związkami chemicznymi.

W roku 1968 zatrucia zbiorowe i indywidualne wywołane spożyciem trujących grzybów notowano w 163 ogniskach, które objęły 299 osób. Zgony spowodowane spożyciem trujących grzybów notowano w 24 przypadkach.

Procentowy udział produktów żywnościowych oraz czynnik etiologiczny,  
w przypadkach zbiorowych zatruc pokarmowych

Lata Produkty żywnościowe	Liczba ognisk	Liczba zachorowań	% ognisk	% zachorowań	Salmonella		Gronkowce		Cl. perfringens		Cl. Botulinum		Inne drobno-ustroje		Czynnik nieustalony	
					liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań	liczba ognisk	liczba zachorowań
RAZEM 1966	162	4 717	100,0	100,0	16	628	70	2 371	7	415	9	38	19	662	41	603
1967	150	3 468	100,0	100,0	33	991	60	1 489	7	123	9	42	21	610	20	213
1968	150	4 024	100,0	100,0	35	1 354	50	1 306	2	9	12	106	24	912	27	337
Mięso i przetwory	88	2 216	58,6	55,1	23	960	24	463	2	9	12	106	14	577	13	101
Mleko i przetwory	16	796	10,7	19,8	3	185	10	444	1	—	—	—	3	167	—	—
Inne	46	1 012	30,7	25,1	9	209	16	399	—	—	—	—	7	168	14	236



## 7. Zakaźne zapalenie wątroby

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	77 068	236	243,1	0,74
1967	69 328	213	217,0	0,67
1968	74 821	237	232,3	0,74

W roku 1968 umieralność na 100 000 ludności z powodu zakaźnego zapalenia wątroby w poszczególnych województwach kształtowała się następująco:

m. Łódź	— 2,79
m. st. Warszawa	— 2,40
katowickie	— 1,50
m. Poznań	— 1,34
m. Kraków	— 1,10
opolskie	— 0,78
lubelskie	— 0,73
szczecińskie	— 0,68
wrocławskie	— 0,65
rzeszowskie	— 0,64
bydgoskie	— 0,53
warszawskie	— 0,48
zielonogórskie	— 0,46
gdańskie	— 0,43
białostockie	— 0,42
m. Wrocław	— 0,41
koszalińskie	— 0,39
kieleckie	— 0,37
łódzkie	— 0,36
poznańskie	— 0,32
olsztyńskie	— 0,20
krakowskie	— 0,14

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1966	20 353	260,3	13 863	175,4	17 230	215,7	25 622	320,8
1967	19 098	239,9	13 144	163,2	15 103	189,7	21 983	273,0
1968	19 402	242,5	13 649	170,6	16 456	202,7	25 314	311,9

Odsetek hospitalizowanych chorych na zakaźne zapalenie wątroby

1966	1967	1968
92,9	95,1	94,7

W postępowaniu profilaktycznym przeciwko zakaźnemu zapaleniu wątroby stosuje się między innymi gamma-globulinę dzieciom do lat 14 z kontaktu z chorym. W roku 1968 zużyto 337 757 ml gamma-globuliny.

8. Porażenie dziecięce nagminne

Liczba zachorowań w latach 1966—1968

1966	1967	1968
11	6	464

W roku 1968 epidemia polio wywołana została typem 3 wirusa polio. Typ 3 wirusa polio izolowano w 458 przypadkach, ponadto w 5 przypadkach izolowano typ 1 (m. Kraków i woj. Krakowskie), w 1 przyp. polio typ 2 (woj. poznańskie).

Liczba zachorowań wg miesięcy w roku 1968

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
—	1	3	6	16	78	182	130	40	5	2	1	464

Poliomyelitis w roku 1968

Grupy wieku	Liczba zachorowań ogółem	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 tys. ludności	Płeć		Postać choroby				
				kobiecy	mężczyźni	bezporażenna	porażenia			
							kończyn	mięśni oddechowych	opuszki	
0—4	238	13	9,3	95	143	14	182	35	7	
5—9	149	3	5,0	66	83	25	102	18	4	
10—14	41	—	1,2	22	19	9	27	5	—	
15—19	11	1	0,3	6	5	1	8	1	1	
20—29	15	—	0,3	7	8	—	12	3	—	
30—39	10	—	0,2	7	3	—	8	2	—	
<b>POLSKA</b>	<b>464</b>	<b>17</b>	<b>1,44</b>	<b>203</b>	<b>261</b>	<b>49</b>	<b>339</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	

## Szczepienia przeciwko poliomyelitis

Lata	Szczepienia doustne					
	typ I		typ II		typ III	
	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających
1967	873 616	98,2	864 923	97,0	—	—
1968	601 304	95,9	744 400	81,7	9080 298	93,6

Ponadto w roku 1968 zaszczepiono typem I wirusa (rewakcyjnacja) 5 608 269 osób w wieku do lat 15, wykonując szczepienia w 96,0%.

## CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ

### 1. Grypa

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność na 100 000 ludności i śmiertelność

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1966	645 170	79	2 035,4	0,01
1967	1 535 965	320	4 808,3	0,02
1968	142 811	44	443,4	0,03

Zapadalność sezonowa na 100 000 ludności

Lata	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1966	7 264,2	206,8	68,1	693,9
1967	18 782,1	155,1	47,3	302,0
1968	1 237,1	203,1	36,5	303,5

Na terenie kraju 14 pracowni wirusologicznych przeprowadziło przegląd serologiczny w kierunku grypy z prób krwi pobranych losowo u ludzi zdrowych.

Wyniki tych prób przedstawia następująca tabela:

Województwo	Liczba zbadanych prób	odsetki wyników	
		* dodatnich A	dodatnich B
Razem	10 763	51,4	92,4
M. Warszawska	853	68,3	97,5
Białostockie	765	89,2	94,4
Bydgoskie	918	31,5	96,7
Gdańskie	779	39,4	79,8
Katowickie	630	55,7	91,4
Krakowskie	600	48,0	93,7
Lubelskie	675	89,8	99,9
Łódzkie	749	18,9	74,0
Olsztyńskie	600	17,0	86,7
Opolskie	739	73,6	99,3
Poznańskie	587	76,5	94,5
Rzeszowskie	1 263	15,4	90,7
Szczecińskie	795	59,4	95,2
Wrocławskie	840	62,4	98,3

## 2. Błonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	248	15	0,78	0,05
1967	142	8	0,44	0,03
1968	123	13	0,38	0,04

W roku 1968 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

rzeszowskiego	— 31
olsztyńskiego	— 16
kieleckiego	— 14
łódzkiego	— 13
warszawskiego	— 10
koszalińskiego	— 9
katowickiego	— 8

Z w/w 7 województw zgłoszono łącznie 101 przypadków tj. — 82,1% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1968.

W roku 1968 zanotowano następujące większe ogniska błonicy:

1. woj. rzeszowskie, pow. Leżajsk (IV kwartał) zanotowano 30 przypadków. W grupie wieku 0—14 lat zanotowano 25 przypadków; 15 lat i więcej — 5 przypadków. Prawidłowe szczepienia stwierdzono u 10 chorych, nie szczepieni lub stwierdzono niepełne szczepienie u 20 chorych. U 16 chorych błonicę potwierdzono bakteriologicznie, od których wyhodowano maczugowca błonicy typu gravis, natomiast w 14 przypadkach błonicę potwierdzono tylko klinicznie. Zanotowano 1 zgon u dziecka 13-letniego.

2. woj. łódzkie, pow. Pajęczno (IV kwartał) — zanotowano 10 przypadków. Zachorowania dotyczyły dzieci w wieku szkolnym z wyjątkiem jednego przypadku — w wieku 3 lat. Zanotowano 2 zgony w wieku 7 i 12 lat. W 5 przypadkach błonicę potwierdzono hodowlą maczugowca błonicy typu gravis, w 5 przypadkach tylko klinicznie.

3. woj. kieleckie, pow. Busko (III kwartał) — zanotowano 8 przypadków. Zachorowania dotyczyły dzieci nie szczepionych; w 3 przypadkach w grupie wieku 0—6 lat, w 5 przypadkach w grupie wieku 7—14 lat. Zanotowano 1 zgon — dziecko 4-letnie.

Liczba zachorowań wg województw i grup wieku

Województwo	Razem	w tym			
		0—2 lat	3—6 lat	7—14 lat	15 i więcej lat
POLSKA 1966	248	37	42	119	50
1967	142	13	32	52	45
1968	123	9	25	68	21
M. St. Warszawa	—	—	—	—	—
M. Kraków	2	1	—	—	1
M. Łódź	2	—	—	—	2
M. Poznań	1	—	—	1	—
M. Wrocław	1	—	1	—	—
Białostockie	2	1	—	1	—
Bydgoskie	2	—	—	2	—
Gdańskie	2	1	—	1	—
Katowickie	8	—	3	2	3
Kieleckie	14	—	6	8	—
Koszalińskie	9	1	1	6	1
Krakowskie	5	2	1	2	—
Lubelskie	4	—	1	1	2
Łódzkie	13	—	3	9	1
Olsztyńskie	16	—	2	13	1
Opolskie	—	—	—	—	—
Poznańskie	—	—	—	—	—
Rzeszowskie	31	1	4	18	8
Szczecińskie	—	—	—	—	—
Warszawskie	10	2	2	4	2
Wrocławskie	—	—	—	—	—
Zielonogórskie	1	—	1	—	—

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności

Podział	1967		1968	
	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
Miasta i osiedla	71	0,44	55	0,33
Gromady	71	0,45	68	0,43
POLSKA	142	0,44	123	0,38

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w grupach wieku

Lata	0—4		5—9		10—14		15—19		20 i więcej		Razem	
	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność	Liczba zachorowań	Zapadalność
1967	26	1,0	40	1,2	31	0,9	33	1,0	12	0,06	142	0,4
1968	22	0,8	45	1,4	35	1,0	13	0,4	8	0,04	123	0,4

Szczepienia przeciwko błonicy

Lata	Dzieci zaszczepione podstawowo (3 wstrzyknięcia)		Szczepienia powtórne		Liczba zaszczepionych dzieci według wskaźników epidemicznych
	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	Liczba zaszczepionych	% zaszczepionych w stosunku do liczby podlegających	
1967	720 835	91,6	2 198 487	94,0	35 110
1968	488 425 <sup>1)</sup>	78,5	2 103 001 <sup>2)</sup>	92,3	5 530

<sup>1)</sup> w tym zaszczepiono podstawowo szczepionkami skojarzonymi: błonica-tężec-krztusiec — 404 058 osób; błonica-tężec — 48 593 osoby,

<sup>2)</sup> w tym zaszczepiono powtórnie szczepionkami skojarzonymi: błonica-tężec-krztusiec — 471 915 osób; błonica-tężec — 1 215 671 osób.

3. Płonica

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	49 695	10	156,8	0,03
1967	47 157	8	147,6	0,03
1968	37 383	2	116,1	0,01

W roku 1968 wyższe wskaźniki od krajowego notowano w województwach:

m. st. Warszawie — 219,3  
 gdańskim — 213,2

m. Krakowie	— 195,0
m. Łodzi	— 171,7
szczecińskim	— 170,0
katowickim	— 166,1
koszalińskim	— 152,0
opolskim	— 138,1
wrocławskim	— 134,2
m. Poznaniu	— 133,4
białostockim	— 132,4
m. Wrocławiu	— 129,1
olsztyńskim	— 120,0

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach:

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	liczba zachorowań	zapa- dal- ność	liczba zachorowań	zapa- dal- ność	liczba zachorowań	zapa- dal- ność	liczba zachorowań	zapa- dal- ność
1966	12 777	163,4	10 280	130,0	8 143	101,9	18 495	231,5
1967	12 379	155,5	10 347	128,5	8 077	101,4	16 354	203,1
1968	11 175	139,7	8 910	111,4	5 656	69,7	11 642	143,4

#### 4. Odra

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	134 442	63	424,1	0,20
1967	131 432	76	411,4	0,24
1968	112 008	55	347,8	0,17

W roku 1968 wskaźnik zapadalności 400 i więcej na 100 000 ludności notowano w województwach:

gdańskim	— 790,2
szczecińskim	— 735,1
olsztyńskim	— 582,9
koszalińskim	— 498,8
zielonogórskim	— 488,7
opolskim	— 466,5
m. Krakowie	— 440,5
bydgoskim	— 435,3
m. Łodzi	— 411,6
m. st. Warszawie	— 406,4

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność
1966	45 261	578,9	45 214	571,9	13 920	174,3	30 047	376,2
1967	38 221	480,1	54 385	675,5	16 374	205,7	22 452	278,9
1968	28 191	352,4	35 293	441,2	13 495	166,3	35 029	431,6

5. Krztusiec

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
1966	31 114	39	98,1	0,12
1967	28 062	27	87,8	0,08
1968	18 733	11	58,2	0,03

W roku 1968, w stosunku do 1967 r., spadek wskaźnika zapadalności notuje się we wszystkich województwach z wyjątkiem zielonogórskiego.

W roku 1968 wyższe wskaźniki od krajowego zanotowano w województwach:

m. Krakowie	— 109,6
rzeszowskim	— 93,9
bydgoskim	— 89,1
gdańskim	— 86,9
m. st. Warszawie	— 81,7
szczecińskim	— 78,2
zielonogórskim	— 76,1
lubelskim	— 70,8
opolskim	— 70,4
olsztyńskim	— 61,3

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności w poszczególnych kwartałach

Lata	I kwartał		II kwartał		III kwartał		IV kwartał	
	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność	liczba zachorowań	zapadalność
1966	4 803	61,4	6 581	83,2	10 968	137,3	8 762	109,7
1967	6 005	75,4	6 388	79,3	9 429	118,4	6 240	77,5
1968	5 053	63,2	3 923	49,0	5 835	71,9	3 922	48,3



## INNE CHOROBY

### 1. Wąglik

W roku 1968 zgłoszono z terenu całego kraju 10 przypadków. Zachorowania notowano w następujących województwach, powiatach i kwartałach:

Województwo	Powiat	Liczba przypadków	Kwartał
Gdańskie	port Gdynia	1	IV
Kieleckie	Opatów	2	IV
Krakowskie	Myślenice	2	II
Lubelskie	Lubartów	1	I
	Chełm	1	III
	Hrubieszów	1	III
Opolskie	Nysa	1	III
Poznańskie	Wolsztyn	1	IV

W roku 1967 zanotowano 5 przypadków.

### 2. Tęžec

Liczba zachorowań, liczba zgonów, zapadalność i umieralność na 100 000 ludności i śmiertelność

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności	Śmiertelność
1966	199	67	0,6	0,21	33,7
1967	197	67	0,6	0,21	34,0
1968	184	81	0,6	0,25	44,0

W roku 1968 — 10 i więcej przypadków zgłoszono z województw:

krakowskiego	— 31 (1,4 na 100 000 ludn.)
rzeszowskiego	— 30 (1,7 na 100 000 ludn.)
katowickiego	— 18 (0,5 na 100 000 ludn.)
kieleckiego	— 14 (0,7 na 100 000 ludn.)
lubelskiego	— 12 (0,6 na 100 000 ludn.)
łódzkiego	— 10 (0,6 na 100 000 ludn.)
opolskiego	— 10 (1,0 na 100 000 ludn.)
warszawskiego	— 10 (0,4 na 100 000 ludn.)

Z w/w 8 województw zgłoszono łącznie 135 przypadków, co stanowi 73,4% w stosunku do ogółem zgłoszonych w roku 1968.

W roku 1968 zanotowano 4 przypadki tężca wśród noworodków:

- 1) woj. krakowskie, pow. Nowy Targ — 1
- pow. Myślenice — 1
- pow. Limanowa — 1
- 2) woj. łódzkie, pow. Wieluń — 1

Liczba zachorowań na tężec w roku 1968

Dane ze skróconych wywiadów epidemiologicznych z meldunków o zachorowaniach na choroby zakaźne — form. E. II-12.

Województwo	Ogółem	w tym												
		od 0 do 28 dnia życia					od 29 dnia życia do 11 miesięcy							
		Razem	w tym				Razem	w tym						
			od 0—7 dnia życia	od 8—14 dnia życia	od 15—21 dnia życia	od 22—28 dnia życia		od 29 dnia życia do 3 mies.	od 4—11 miesięcy	od 1—3 lat	od 4—7 lat	od 8—14 lat	15 i więcej lat	
POLSKA 1967	196	8	4	4	—	—	1	1	—	—	2	16	168	1
1968	187	4	2	2	—	—	—	—	—	3	3	6	170	1
M. st. Warszawa	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
M. Kraków	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
M. Łódź	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
M. Poznań	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Wrocław	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Białostockie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Bydgoskie	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
Gdańskie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Katowickie	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
Kieleckie	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
Koszalińskie	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—
Krakowskie	31	3	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	27	—
Lubelskie	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10	—
Łódzkie	10	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
Olsztyńskie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Opolskie	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
Poznańskie	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
Rzeszowskie	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	27	—
Szczecińskie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Warszawskie	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—
Wrocławskie	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
Zielonogórskie	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—

W roku 1968 zachorowania w grupach wieku stanowiły:

0—7 lat	— 5,4%
8—14 lat	— 3,2%
15—19 lat	— 3,2%
20—29 lat	— 5,4%
30 i więcej lat	— 82,8%

W roku 1968 w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań 55,9% stanowili mężczyźni, 44,1% kobiety.

### 3. Bruceloza

Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności, odsetek hospitalizowanych chorych

Lata	Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Odsetek hospitalizowanych chorych
1966	135	0,4	66,4
1967	161	0,5	72,0
1968	249	0,8	79,5

W roku 1968 najwyższe liczby przypadków zgłoszono z województw:

olsztyńskiego	— 129 (hosp. 112)
białostockiego	— 34 (hosp. 33)
poznańskiego	— 20 (hosp. 7)
warszawskiego	— 20 (hosp. 18)
zielenogórskiego	— 12 (hosp. 1)

Z w/w 5 województw zgłoszono łącznie 215 przypadków co stanowi 86,3% w stosunku do ogółem zgłoszonych zachorowań w roku 1968.

### 4. Choroba Brilla i inne riketsjozy

Liczba zachorowań, liczba zgonów i zapadalność na 100 000 ludności

Lata	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności
1966	110	3	0,3
1967	68	—	0,2
1968	58	—	0,2

W roku 1968 wskaźniki zapadalności 0,2 i więcej na 100 000 ludności notowano w województwach:

białostockim	— 1,1
m. Wrocławiu	— 0,8
m. Warszawie	— 0,7
lubelskim	— 0,6
m. Krakowie	— 0,2
gdańskim	— 0,2
warszawskim	— 0,2

Nie notowano zachorowań w m. Łodzi, m. Poznaniu, woj. koszalińskim, krakowskim, łódzkim, opolskim, poznańskim i szczecińskim.

### 5. Wścieklizna

W roku 1968 zanotowano 1 przypadek wścieklizny w woj. gdańskim (pow. Gdańsk). Zachorowanie dotyczyło osoby w wieku 49 lat ugryzionej przez dzikiego lisa.

ZACHOROWANIA NA

Województwo	Dnr brzusznego	Dury rzekome A. B. C.	Inne salmonellozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica
					Botulismus	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr Nr klasyfikac. międzynarodowej	040	041	042	045—048	049.1	049.0, 049.2	050
POLSKA	1967 936	199	6 863	8 289	413	8 593	47 757
	1968 694	98	5 569	6 231	491	7 686	37 383
m. st. Warszawa	27	13	197	1 039	3	394	2 828
m. Kraków	12	1	45	200	1	435	1 064
m. Łódź	13	—	257	155	2	384	1 292
m. Poznań	6	—	53	43	5	15	599
m. Wrocław	7	1	75	19	1	459	633
Białostockie	37	23	44	471	16	247	1 566
Bydgoskie	17	1	386	236	88	497	1 953
Gdańskie	24	2	558	327	19	835	2 992
Katowickie	58	1	1 139	222	8	210	5 981
Kieleckie	79	3	96	231	50	351	1 126
Koszalińskie	12	1	246	167	14	405	1 184
Krakowskie	67	4	75	203	8	413	1 954
Lubelskie	64	8	352	376	7	367	791
Łódzkie	24	5	470	163	24	261	1 310
Olsztyńskie	14	4	247	589	28	175	1 173
Opolskie	11	3	57	24	22	117	1 425
Poznańskie	33	5	137	94	106	167	1 471
Rzeszowskie	26	5	142	84	17	84	895
Szczecińskie	12	1	175	196	12	657	1 491
Warszawskie	108	10	474	623	12	241	2 276
Wrocławskie	34	5	319	502	33	820	2 687
Zielonogórskie	9	2	25	267	15	152	692

\*) liczby bezwzględne

CHOROBY ZAKAŻNE\*

Rok 1968

Róża	Błonica	Krzusiec	Zapalenie opon mózgowo-rdzenio- wych nagminne	Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyusz- nicy nagminne
9	10	11	12	13	14	15	16	17
052	055	056	057	061	085	086	087	089
2 967	142	28 062	951	197	131 432	52 201	95 192	74 860
2 965	123	18 733	1 102	184	112 008	38 241	107 841	140 491
129	—	1 053	138	2	5 240	2 539	8 643	12 701
75	2	598	20	4	2 404	3 339	3 709	2 760
158	2	178	2	2	3 098	1 507	3 019	5 504
18	1	95	4	—	1 638	1 021	3 033	1 806
85	1	262	1	3	1 194	562	2 165	3 044
75	2	459	56	2	2 747	435	3 699	1 815
231	2	1 675	63	8	8 186	1 701	5 465	6 589
210	2	1 219	75	1	11 090	7 860	8 054	9 098
193	8	2 022	94	18	8 691	3 077	16 713	22 965
94	14	441	34	14	6 182	868	3 597	5 633
141	9	390	72	6	3 886	587	2 539	2 861
205	5	1 129	1	31	6 371	2 239	6 195	6 909
73	4	1 364	67	12	6 380	616	4 102	6 047
151	13	544	23	10	2 545	1 455	3 754	7 275
165	16	599	95	2	5 696	414	3 153	4 281
96	—	726	127	10	4 813	719	4 029	5 220
101	—	933	49	7	2 829	1 043	4 225	5 330
120	31	1 622	79	30	4 854	1 329	3 688	6 697
187	—	686	50	1	6 448	3 346	3 545	2 648
221	10	1 374	10	10	6 353	1 098	5 343	10 547
160	—	702	31	9	7 111	1 097	6 502	7 156
77	1	662	11	2	4 252	1 389	2 669	3 605

## ZACHOROWANIA NA

Województwo	Zakażne zapalenie wątroby	Tasiemczyce	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Brucelozą	Paciorkowcowe zapalenie gardła
17	18	19	20	21	22	23
Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	092	125, 126	480—483	571.0, 764	044	051
POLSKA	1967 69 328	2 822	1535 965	32 088	161	32 180
	1968 74 821	2 771	142 811	29 439	249	34 751
m. st. Warszawa	2 261	126	16 312	537	2	926
m. Kraków	1 259	47	5 993	373	—	14
m. Łódź	2 610	293	6 914	582	—	72
m. Poznań	890	246	1 884	218	—	46
m. Wrocław	1 079	22	5 693	183	1	413
Białostockie	2 422	70	6 697	2 436	34	373
Bydgoskie	3 143	183	7 479	2 344	4	7 335
Gdańskie	2 278	370	8 403	1 755	2	5 092
Katowickie	9 937	311	31 530	2 564	—	1 914
Kieleckie	3 414	45	3 086	838	—	312
Koszalińskie	1 778	21	1 636	1 649	3	924
Krakowskie	5 405	59	8 447	1 195	—	1 187
Lubelskie	4 312	32	3 060	1 196	1	471
Łódzkie	5 281	89	4 056	1 246	1	619
Olsztyńskie	2 677	59	3 729	2 666	129	4 192
Opolskie	3 135	47	3 925	1 459	2	2 086
Poznańskie	4 721	130	7 155	1 372	20	227
Rzeszowskie	4 019	31	1 437	1 080	5	596
Szczecińskie	1 942	334	5 378	937	7	2 063
Warszawskie	4 869	57	3 665	2 558	20	2 700
Wrocławskie	5 403	144	7 565	1 668	6	2 153
Zielonogórskie	1 986	55	3 767	583	12	1 036

\*) liczby bezwzględne

## CHOROBY ZAKAŻNE\*)

ROK 1968

Tularemia	Wąglik	Listerioza	Różyczka	Żółtaczką zakaźną krętkową	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Wścieklizna	Jaglica	Papuzia choroba i inne ornitozy	Dur wysypkowy spordyczny (choroba Brilla)	Zimnica	Toksoplazmoza	Włośnica	Grzybica	Swierzb	Twardziel
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
059	062	064	064.4	072 — 074	080	082 — 083	094	095	096.2	100- 102, 108	110 — 117	122.1	128	131	135	138
—	5	2	406	74	6	186	2	30	—	68	9	2	345	2967	165 253	1
2	10	2	360	49	464	265	1	63	33	58	7	9	378	3910	186 956	3
—	—	—	4	5	1	21	—	—	—	9	2	1	5	99	3 787	—
—	—	—	3	—	6	20	—	1	—	1	—	—	1	45	2 355	—
—	—	—	4	3	6	27	—	—	—	—	—	—	13	24	7 126	—
—	—	—	—	2	34	—	—	1	—	—	—	—	1	49	3 958	—
—	—	1	—	1	4	1	—	—	—	4	—	—	—	—	1 006	—
—	—	—	18	1	5	14	—	1	—	13	—	—	129	142	4 418	—
1	—	—	30	2	5	9	—	—	—	1	—	—	16	461	18 854	—
1	1	—	16	3	17	21	1	33	—	3	—	—	53	171	15 839	—
—	—	—	14	1	28	7	—	—	—	3	—	—	17	35	22 328	1
—	2	—	25	—	5	12	—	1	33	2	—	3	—	60	4 611	1
—	—	—	42	2	17	12	—	—	—	—	—	—	23	354	10 870	—
—	2	—	63	1	4	52	—	2	—	—	—	2	—	101	5 084	—
—	3	—	24	—	4	—	—	—	—	12	—	—	1	107	5 075	—
—	—	—	25	—	16	10	—	1	—	—	—	—	9	259	7 067	—
—	—	1	14	4	—	8	—	—	—	1	—	—	27	296	11 796	—
—	1	—	13	1	5	4	—	4	—	—	1	—	—	27	9 728	—
—	1	—	9	3	197	10	—	—	—	—	—	—	22	179	6 404	—
—	—	—	7	7	5	14	—	—	—	2	—	—	—	22	4 330	—
—	—	—	10	8	49	6	—	19	—	—	2	1	2	583	14 194	1
—	—	—	17	3	4	8	—	—	—	4	—	—	48	762	7 332	—
—	—	—	9	2	29	8	—	—	—	2	1	—	11	80	11 304	—
—	—	—	13	—	23	1	—	—	—	1	1	2	—	54	9 490	—

## ZAPADALNOŚĆ NA NIEKTÓRE

Województwo	Dyżenteryja Typhus abdominalis		Dyżenteryja A. B. C. Paratyphus A. B. C.		Czerwonka Dysenteria		Płonica Scarlatina	
	040		041		045—048		050	
	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968
POLSKA	2,9	2,2	0,6	0,3	25,9	19,3	147,6	116,1
M. st. Warszawa	2,4	2,1	2,7	1,0	88,1	80,6	316,0	219,3
M. Kraków	3,4	2,2	0,4	0,2	41,1	36,7	295,7	195,0
M. Łódź	1,5	1,7	0,1	—	38,3	20,6	308,0	171,7
M. Poznań	1,6	1,3	0,2	—	5,8	9,6	188,2	133,4
M. Wrocław	3,1	1,4	—	0,2	64,7	3,9	178,8	129,1
Białostockie	3,7	3,1	1,1	1,9	36,4	39,8	139,5	132,4
Bydgoskie	1,9	0,9	0,2	0,1	10,0	12,5	124,0	103,8
Gdańskie	2,2	1,7	0,4	0,1	32,1	23,3	214,7	213,2
Katowickie	1,9	1,6	0,3	0,02	10,2	6,2	156,8	166,1
Kieleckie	3,9	4,1	0,3	0,2	16,5	12,1	71,7	58,8
Koszalińskie	1,0	1,5	0,3	0,1	28,3	21,4	181,3	152,0
Krakowskie	2,5	3,1	0,2	0,2	6,7	9,4	112,4	90,2
Lubelskie	2,6	3,3	0,1	0,4	24,2	19,5	52,1	41,0
Łódzkie	1,9	1,4	0,1	0,3	6,6	9,7	144,8	78,0
Olsztyńskie	1,7	1,4	0,1	0,4	163,7	60,3	125,3	120,0
Opolskie	2,5	1,1	0,3	0,3	2,7	2,3	194,5	138,1
Poznańskie	1,8	1,5	0,1	0,2	3,9	4,3	78,8	67,8
Rzeszowskie	1,7	1,5	0,5	0,3	15,6	4,9	87,1	51,8
Szczecińskie	1,7	1,4	0,3	0,1	34,6	22,3	203,7	170,0
Warszawskie	6,0	4,3	3,7	0,4	19,9	25,0	132,4	91,4
Wrocławskie	8,5	1,7	0,2	0,2	12,4	25,1	197,4	134,2
Zielonogórskie	2,4	1,0	0,2	0,2	74,6	30,7	122,8	79,5

\*) Zapadalność na 100 000 ludności

## CHOROBY ZAKAŻNE\*

ROK 1967—1968

Błonica Diphtheria		Krzusiec Pertussis		Porażenie dziecięce nagminne Poliomyelitis anterior acuta		Odra Morbilli		Zakażne zapalenie wątroby Hepatitis epidemicna	
055		056		080		085		092	
1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968
0,4	0,4	87,8	58,2	0,02	1,44	411,4	347,8	217,0	232,3
0,3	—	123,9	81,7	—	0,08	425,4	406,4	154,3	175,3
1,1	0,4	190,5	109,7	—	1,10	716,8	440,5	237,2	230,7
0,5	0,3	101,7	23,7	—	0,80	728,4	411,6	340,1	346,8
—	0,2	43,4	21,2	—	7,57	711,3	364,9	226,8	198,3
—	0,2	81,4	53,4	—	0,82	571,4	243,5	205,0	220,1
0,1	0,2	73,1	38,8	—	0,42	362,9	232,3	196,1	204,8
—	0,1	98,4	89,1	—	0,27	339,1	435,3	171,1	167,1
0,1	0,1	109,2	86,9	0,07	1,26	666,4	790,2	194,4	162,3
0,3	0,2	105,3	56,2	0,03	0,78	545,7	241,4	289,7	276,0
1,9	0,7	50,7	23,0	—	0,26	228,0	323,0	127,1	178,4
1,9	1,2	118,6	50,1	—	2,18	466,7	498,8	217,6	228,2
0,3	0,2	76,9	52,1	0,05	0,18	248,6	294,0	252,1	249,4
0,3	0,2	75,9	70,8	—	0,21	210,4	331,1	203,5	223,8
1,3	0,8	45,8	32,4	—	0,95	381,6	151,6	227,0	314,5
1,7	1,6	151,7	61,3	—	—	347,8	586,9	218,9	273,9
0,3	—	113,2	70,4	—	0,48	618,9	466,5	289,8	303,8
0,1	—	69,8	43,0	—	9,08	292,9	130,4	243,9	217,6
—	1,8	109,7	93,9	—	0,29	194,7	280,9	230,1	232,6
0,1	—	98,6	78,2	—	5,59	603,8	735,1	218,6	221,4
0,2	0,4	69,8	55,2	0,04	0,16	279,4	255,0	148,6	195,5
0,1	—	58,1	35,1	—	1,45	583,9	355,3	205,3	269,9
0,2	0,1	75,8	76,1	0,23	2,64	546,0	488,7	217,9	228,2

ZGONY NA CHOROBY

Województwo	Dur brzuszny	Dury rzekome A. B. C.	Inne salmonelozy	Czerwonka	Zatrucia pokarmowe		Płonica	Róża	Błonica	Krzusiec	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne
					Botulismus	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nr klasyfikacji międzynarodowej	040	041	042	045-048	049 0	049.0, 049.2	050	052	055	056	057
POLSKA 1967	16	—	142	5	7	45	8	3	8	27	49
1968	17	—	53	5	12	29	2	3	13	11	39
M. st. Warszawa	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1
M. Kraków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Łódź	—	—	4	—	2	2	—	1	—	—	1
M. Poznań	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M. Wrocław	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Białostockie	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2
Bydgoskie	1	—	2	—	—	5	—	—	—	—	4
Gdańskie	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
Katowickie	—	—	11	—	1	—	—	—	—	2	5
Kieleckie	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1
Koszalińskie	—	—	2	1	2	—	—	—	2	—	2
Krakowskie	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—
Lubelskie	2	—	10	—	—	2	—	—	1	2	2
Łódzkie	—	—	3	1	1	—	—	—	2	—	—
Olsztyńskie	—	—	3	—	—	—	—	1	4	—	—
Opolskie	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	5
Poznańskie	—	—	4	—	1	3	—	—	—	—	—
Rzeszowskie	3	—	3	1	1	1	—	—	2	2	6
Szczecińskie	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	4
Warszawskie	4	—	1	2	—	—	1	—	—	1	—
Wrocławskie	1	—	—	—	1	8	—	—	—	1	2
Zielonogórskie	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—

\*) Liczby bezwzględne — w/g danych stacji sanitarno-epidemiologicznych (form. E. II — 13).

ZAKAŻNE\*

ROK 1967—1968

Tężec	Odra	Różyczka	Ospa wietrzna	Zapalenie przyusznic nagminne	Zakaźne zapalenie wątroby	Grypa	Biegunki u dzieci do lat 2	Paciorkowcowe zapalenie gardła	Listerioza	Żółtaczką zakaźną krętkowa	Porażenie dziecięce nagminne	Zapalenie mózgu	Wścieklizna	Toksoplazmoza
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
061	085	086	087	089	092	480-483	571.0, 764	051	064	072-074	080	082-083	094	121.1
67	76	1	3	1	213	320	855	—	—	1	—	22	2	1
81	55	1	5	—	237	44	583	1	1	1	17	20	1	—
—	—	—	—	—	31	3	12	—	—	—	—	1	—	—
2	—	—	—	—	6	—	7	—	—	—	—	1	—	—
3	1	—	1	—	21	—	36	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	5	—	21	—	—	—	—	2	—	—
6	7	—	1	—	10	—	38	—	—	—	—	2	—	—
1	6	1	2	—	6	2	40	—	—	—	—	2	1	—
3	—	—	—	—	54	—	20	—	—	—	—	—	—	—
8	2	—	—	—	7	4	33	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	3	1	33	—	—	—	1	—	—	—
12	4	—	—	—	3	3	31	—	—	—	1	3	—	—
8	5	—	—	—	14	3	27	—	—	—	—	—	—	—
5	1	—	—	—	6	7	31	—	—	—	3	—	—	—
—	5	—	—	—	2	6	51	—	1	—	—	2	—	—
4	3	—	—	—	8	1	6	—	—	—	—	—	—	—
4	2	—	—	—	7	1	27	—	—	—	5	—	—	—
12	5	—	1	—	11	1	30	—	—	1	1	2	—	—
1	4	—	—	—	6	—	25	—	—	—	2	—	—	—
4	3	—	—	—	12	9	72	1	—	—	—	1	—	—
2	1	—	—	—	13	3	17	—	—	—	3	2	—	—
1	2	—	—	—	4	—	26	—	—	—	—	1	—	—

LICZBA ZACHOROWAŃ, LICZBA ZGONÓW,

Jednostka chorobowa	Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	Mediana 1964-1967	Rok 1967				Rok 1968				
			Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności	
Dur brzuszny	040	1 057	936	16	2,9	0,05	694	17	2,2	0,05	
Dury rzekome A. B. C.	041	167	199	—	0,6	—	98	—	0,3	—	
Inne salmonelozy	042	6 421	6 863	142	21,5	0,44	5 569	53	17,3	0,16	
Czerwonka	045—048	8 376	8 289	5	25,9	0,02	6 231	5	19,3	0,02	
Zatrucie pokarmowe	Botulismus Inne	049.1,	332	413	7	1,3	0,02	491	12	1,5	0,04
		049.0 049.2	7 584	8 593	45	26,9	0,14	7,686	29	23,9	0,09
Pionica	050	48 426	47 157	8	147,6	0,03	37 383	2	116,1	0,01	
Róża	052	2 481	2 967	3	9,3	0,01	2 965	3	9,2	0,01	
Błonica	055	331	142	8	0,4	0,03	123	13	0,4	0,04	
Krztusiec	056	28 726	28 062	27	87,8	0,08	18 733	11	58,2	0,03	
Zapalenie opon-mózgowo-rdzeniowych	057	939	951	49	3,0	0,15	1 102	39	3,4	0,12	
Tężec	061	213	197	67	0,6	0,21	184	81	0,6	0,25	
Odra	085	131 483	131 432	76	411,4	0,24	112 008	55	347,8	0,17	
Różyczka	086	·	52 201	1	163,4	0,003	38 241	1	118,7	0,003	
Ospa wietrzna	087	·	95 192	3	298,0	0,01	107 841	5	334,8	0,02	
Zapalenie przysznic nagminne	089	84 527	74 860	1	234,3	0,003	140 491	—	436,2	—	
Zakaźne zapalenie wątroby	092	85 607	69 328	213	217,0	0,67	74 821	237	232,3	0,74	
Tasiemczyce	125,126	·	2 822	—	8,8	—	2 771	—	8,6	—	
Grypa	480-483	835 345	1535965	320	4808,3	1,0	142 811	44	443,4	0,14	

ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI

Jednostka chorobowa	Nr Nr klasyfikacji międzynarodowej	Mediana 1964-1967	Rok 1967				Rok 1968			
			Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności	Liczba zachorowań	Liczba zgonów	Zapadalność na 100 000 ludności	Umieralność na 100 000 ludności
Biegunki u dzieci do lat 2	571.0, 764	29 258	32 088	855	1980,9	54,5	29 439	583	1843,4	38,3
Bruceloza	044	106	161	—	0,5	—	249	—	0,8	—
Paciorkowcowe zapalenie gardła	051	·	32 180	—	100,7	—	34 751	1	107,9	0,003
Tularemia	059	·	—	—	—	—	2	—	0,01	—
Wąglik	062	·	5	—	0,02	—	10	—	0,03	—
Listerioza	064	·	2	—	0,01	—	2	1	0,01	0,003
Różycza	064.4	·	406	—	1,3	—	360	—	1,1	—
Żółtaczka zakaźna krętkowa	072—074	·	74	1	0,2	0,003	49	1	0,2	0,003
Porażenie dziecięce nagminne	080	11	6	—	0,02	—	464	17	1,44	0,05
Zapalenie mózgu	082—083	·	186	22	0,6	0,07	265	20	0,8	0,06
Wścieklizna	094	1	2	2	0,01	0,006	1	1	0,003	0,003
Jaglica	095	·	30	—	0,1	—	63	—	0,2	—
Papuzia choroba i inne ornitozy	096.2	·	—	—	—	—	33	—	0,1	—
Dur wysypkowy sporadyczny (choroba Brilla)	100—102, 108	112	68	—	0,2	—	58	—	0,2	—
Zimnica	110—117	10	9	—	0,03	—	7	—	0,02	—
Toksoplazmoza	122.1	·	2	1	0,01	0,003	9	—	0,03	—
Włośnica	128	374	345	—	1,1	—	378	—	1,2	—
Grzybica	131	·	2 967	—	9,3	—	3 910	—	12,1	—
Świerzb	135	·	165 253	—	517,3	—	186 956	—	580,5	—
Twardziel	138	·	1	—	0,003	—	3	—	0,01	—

\*) Zapadalność na 100 000 dzieci w grupie wieku 0-2 lata.



LICZBA ZACHOROWAŃ WG

Jednostka chorobowa	Nr Nr wg klasyfikacji międzynarodowej	Rok	
		1. I—1. IV. 1967	2. IV—1. VII. 1967
Dur brzuszny	040	183	220
Dury rzekome A. B. C.	041	13	29
Inne salmonelozy	042	1 595	2 347
Czerwonka	045—048	1 128	1 727
Zatrucia pokarmowe	Botulismus	049.1	38
	Inne	049.0, 049.2	1 131
Płonica	050	12 379	10 347
Róża	052	552	564
Błonica	055	44	26
Krzusiec	056	6 005	6 388
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nagminne	057	179	221
Tężec	061	16	53
Odra	085	38 221	54 385
Zakaźne zapalenie wątroby	092	19 098	13 144
Tasiemczyce	125,126	718	739
Grypa	480—483	1 495 393	12 485
Biegunki u dzieci do lat 2	571.0, 764	4 963	7 123
Brucelloza	044	29	27
Porażenie dziecięce nagminne	080	2	1
Zapalenie mózgu	082, 083	29	35
Dur wysypkowy sporydyczny (choroba Brilla)	100—102, 108	14	23
Włośnica	128	99	70
Świerzb	135	34 261	27 294

\*) liczby bezwzględne

MIESIĄCY (OKRESÓW)\*

Rok 1967—1968

1967		Rok 1968			
2. VII—30. IX. 1967	1. X—31. XII. 1967	1. I—30. III. 1968	31. III—29. IV. 1968	30. IV—28. IX. 1968	29. IX—31. XII. 1968
274	259	178	143	183	190
116	41	22	19	30	27
1 698	1 223	1 129	2 027	1 594	819
3 239	2 195	1 716	1 553	1 426	1 536
135	68	61	165	124	141
3 384	1 857	1 664	1 876	2 494	1 652
8 077	16 354	11 175	8 910	5 656	11 642
919	932	651	641	896	777
23	49	25	10	27	61
9 429	6 240	5 053	3 923	5 835	3 922
327	224	217	258	344	283
76	52	23	44	75	42
16 374	22 452	28 191	35 293	13 495	35 029
15 103	21 983	19 402	13 649	16 456	25 314
610	755	871	679	621	600
3 768	24 319	98 969	16 245	2 964	24 633
12 683	7 319	5 439	7 146	10 449	6 405
27	78	99	70	36	44
—	3	4	100	352	8
63	59	62	68	77	58
15	16	17	16	10	15
33	143	257	34	39	48
24 526	79 172	53 461	29 658	27 690	76 147