

Czerwonka w 1976 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	56,7	63,5	49,3	55,7	53,1	59,7
0	58,3	14,2	44,3	10,9	51,5	12,6
1	87,4	20,8	84,0	20,0	85,7	20,4
2	86,3	19,1	64,6	14,2	75,8	16,7
3	33,9	7,1	22,5	4,8	28,3	6,0
4	11,0	2,3	27,3	5,8	18,9	4,0
5-9	7,5	7,1	10,9	10,6	9,2	8,8
5	12,8	2,6	19,4	3,9	16,0	3,2
6	7,2	1,4	9,0	1,8	8,1	1,6
7	7,7	1,4	11,2	2,1	9,5	1,8
8	1,5	0,3	9,5	1,8	5,5	1,0
9	7,7	1,4	4,8	0,9	6,3	1,2
10-14	3,2	3,1	1,5	1,5	2,4	2,3
15-19	2,4	2,8	2,7	3,3	2,5	3,1
20-24	2,7	3,4	3,0	3,9	2,8	3,7
25-29	4,8	5,4	4,9	5,8	4,8	5,6
30-34	2,4	1,7	5,1	3,9	3,8	2,8
35-39	2,3	1,7	3,0	2,4	2,7	2,1
40-44	1,5	1,1	3,5	3,0	2,5	2,1
45-49	3,6	2,8	3,4	3,0	3,5	2,9
50-54	2,6	1,7	2,9	2,4	2,8	2,1
55-59	3,3	1,4	2,7	1,5	3,0	1,5
60 i >	2,9	4,0	1,3	2,7	1,9	3,4
Ogółem	8,2	100,0	7,3	100,0	7,8	100,0

Czerwonka w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	10,3	8,5	5,8	5,8	8,2	7,3
%	52,4	47,6	49,8	50,2	51,5	48,5
Zapadalność na 100 000	9,4		5,8		7,8	
%	66,1		33,9		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	8,2	10,3	7,9	11,0	19,1	6,5	5,8
K	7,3	8,6	8,9	7,5	16,2	4,6	5,7
Ogółem	7,9	9,4	8,4	8,8	17,6	5,5	5,8

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	4,8
II	4,9
III	5,1
IV	3,5
V	4,5
VI	3,6
VII	5,6
VIII	9,4
IX	21,9
X	20,1
XI	11,1
XII	5,5
Razem	100,0

Krztusiec w 1976 roku /na wybranych terenach/
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	10,4	49,3	11,5	59,7	11,0	54,2
0	16,3	16,9	11,1	12,5	13,8	14,8
1	8,4	8,4	19,1	20,8	16,6	14,2
2	7,7	7,2	15,1	15,3	11,3	11,0
3	12,2	10,8	4,2	4,2	8,3	7,7
4	6,8	6,0	7,2	6,9	7,0	6,5
5-9	8,7	34,9	5,3	23,6	7,0	29,7
5	12,8	10,8	1,5	1,4	7,3	6,5
6	2,9	2,4	6,0	5,6	4,4	3,8
7	9,3	7,3	8,0	6,9	8,7	7,1
8	10,7	8,4	6,4	5,6	8,6	7,1
9	7,7	6,0	4,8	4,2	6,3	5,2
10-14	3,5	14,5	3,0	13,8	3,3	14,2
15-19	0,2	1,3	0,2	1,4	0,2	1,3
20-24	-	-	0,2	1,4	0,1	0,6
Ogółem	1,94	100,0	1,59	100,0	1,76	100,0

Krzusiec w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,26	1,32	2,74	1,93	1,94	1,59
%	46,8	53,2	58,1	41,9	53,5	46,5
Zapadalność na 100 000	1,29		2,33		1,76	
%	40,0		60,0		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	1,9	1,3	0,5	2,4	1,1	1,2	2,7
K	1,6	1,3	1,1	2,6	0,4	1,2	1,9
Ogółem	1,8	1,3	0,9	2,4	0,7	1,2	2,3

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	7,1
II	4,5
III	3,2
IV	5,8
V	9,0
VI	6,5
VII	7,7
VIII	9,0
IX	13,5
X	20,6
XI	10,3
XII	2,6
Razem	100,0

Płonica w 1976 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	167,9	29,9	162,9	28,7	165,5	29,3
0	16,3	0,6	11,1	0,4	13,8	0,5
1	47,9	1,8	54,7	2,1	51,2	1,9
2	167,5	5,9	158,2	5,4	163,0	5,7
3	279,1	9,3	250,0	8,4	264,8	8,9
4	371,2	12,3	378,4	12,4	374,7	12,3
5-9	245,1	37,1	261,4	39,6	253,1	38,3
5	321,5	10,2	302,5	9,6	312,2	9,9
6	326,1	10,2	292,2	9,2	309,5	9,7
7	221,4	6,5	250,4	7,4	235,6	6,9
8	204,9	6,1	241,7	7,1	222,9	6,6
9	139,3	4,1	215,4	6,3	176,7	5,2
10-14	132,5	20,6	146,5	22,8	139,4	21,7
15-19	52,1	9,9	34,8	6,7	43,6	8,3
20-24	7,1	1,4	7,9	1,5	7,2	1,5
25-29	4,0	0,7	1,6	0,3	2,9	0,5
30-34	1,2	0,1	1,9	0,2	1,6	0,2
35-39	0,8	0,1	1,1	0,1	1,0	0,1
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	0,7	0,1	0,4	0,05
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	0,7	0,04	-	-	0,3	0,02
60 i >	0,2	0,04	-	-	0,1	0,02
Ogółem	51,8	100,0	46,9	100,0	49,3	100,0

Plonica w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	66,2	57,0	34,9	34,5	51,8	46,9
%	51,6	48,4	49,7	50,3	51,0	49,0
Zapadalność na 100 000	61,4		34,7		49,3	
%	68,1		31,9		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	51,8	66,2	55,5	67,6	67,1	72,1	34,9
K	46,9	57,0	55,3	64,1	49,5	58,4	34,5
Ogółem	49,3	61,4	55,4	63,1	57,9	65,0	34,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	10,6
II	10,1
III	10,8
IV	10,5
V	11,6
VI	6,9
VII	3,5
VIII	3,7
IX	6,0
X	8,9
XI	8,8
XII	8,6
Razem	100,0

Odra w 1976 roku /na wybranych terenach/
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1630,8	47,5	1656,8	47,7	1643,5	47,6
0	448,1	2,8	540,0	3,4	492,8	3,1
1	2011,9	12,4	1986,0	12,1	1999,4	12,2
2	2264,2	13,0	2253,1	12,6	2258,8	12,8
3	1811,7	10,0	1792,1	9,8	1802,1	9,9
4	1727,4	9,3	1828,8	9,8	1776,8	9,6
5-9	1639,4	40,5	1609,2	39,8	1624,6	40,2
5	1793,7	9,3	1736,2	9,0	1765,6	9,2
6	1852,8	9,5	1775,6	9,1	1850,0	9,3
7	1704,3	8,1	1781,7	8,6	1742,3	8,3
8	1730,9	8,4	1605,7	7,8	1669,5	8,1
9	1085,1	5,2	1125,4	5,4	1104,9	5,3
10-14	401,2	10,2	408,1	10,4	404,5	10,3
15-19	42,4	1,3	45,2	1,4	43,8	1,4
20-24	8,5	0,3	10,3	0,3	9,4	0,3
25-29	4,0	0,1	4,9	0,1	4,4	0,1
30-34	1,6	0,03	2,4	0,05	2,0	0,04
35-39	1,5	0,03	1,1	0,02	1,3	0,03
40-44	1,5	0,03	1,1	0,02	1,3	0,03
45-49	0,4	0,01	0,3	0,01	0,4	0,01
50-54	1,3	0,02	0,7	0,01	1,0	0,02
55-59	-	-	0,5	0,01	0,3	0,004
60 i >	0,2	0,01	0,3	0,01	0,3	0,01
Ogółem	317,0	100,0	286,8	100,0	301,5	100,0

Odra w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	345,2	308,2	284,0	260,3	317,0	286,8
%	50,7	49,3	51,6	48,4	51,1	48,9
Zapadalność na 100 000	325,9		272,0		301,5	
%	59,1		40,9		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	317,0	345,2	428,4	346,4	214,2	362,8	284,0
K	286,8	308,2	379,3	300,0	203,9	323,5	260,3
Ogółem	301,5	325,9	402,7	309,2	208,9	342,4	272,0

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	19,1
II	12,2
III	12,0
IV	11,4
V	12,6
VI	8,9
VII	3,5
VIII	1,0
IX	1,6
X	3,0
XI	5,1
XII	9,6
Razem	100,0

Różyczka w 1976 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	824,4	25,1	854,8	22,6	839,2	23,6
0	261,3	1,7	250,9	1,4	256,3	1,6
1	622,7	4,0	664,1	3,7	642,8	3,8
2	828,6	5,0	847,3	4,3	837,6	4,6
3	1117,8	6,4	1120,8	5,6	1119,3	6,0
4	1415,1	8,0	1512,2	7,4	1462,4	7,6
5-9	1328,8	34,3	1448,4	32,8	1387,7	33,3
5	1441,0	7,8	1470,9	7,0	1455,6	7,3
6	1370,8	7,3	1465,4	6,9	1417,1	7,1
7	1438,1	7,2	1504,0	6,6	1472,0	6,8
8	1174,3	5,9	1408,6	6,2	1289,2	6,1
9	1209,0	6,0	1390,7	6,1	1298,1	6,0
10-14	976,1	25,9	1253,3	29,1	1111,8	27,5
15-19	332,8	10,8	346,9	9,9	339,7	10,3
20-24	43,0	1,5	81,5	2,5	61,9	2,0
25-29	20,2	0,6	27,0	0,7	23,6	0,7
30-34	9,9	0,2	20,6	0,4	15,2	0,3
35-39	3,8	0,1	12,5	0,2	8,2	0,2
40-44	2,2	0,05	8,9	0,2	5,6	0,1
45-49	1,1	0,02	2,7	0,06	1,9	0,04
50-54	0,4	0,01	1,8	0,03	1,2	0,02
55-59	5,9	0,07	1,1	0,01	3,3	0,04
60 i >	1,5	0,05	2,1	0,1	1,8	0,08
Brak danych		1,2		1,4		1,8
Ogółem	303,0	100,0	313,8	100,0	310,2	100,0

Różyczka w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	437,7	425,6	145,7	175,0	303,0	313,8
%	48,4	51,2	44,8	55,2	47,4	52,6
Zapadalność na 100 000	432,9		160,6		310,2	
%	76,3		23,7		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	303,0	437,7	375,0	440,4	215,9	604,6	145,7
K	313,8	425,6	387,3	446,7	204,9	565,9	175,0
Ogółem	310,2	432,9	382,4	443,7	216,3	584,5	160,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	5,7
II	8,2
III	17,0
IV	21,2
V	19,2
VI	12,5
VII	4,2
VIII	1,4
IX	1,4
X	2,1
XI	2,7
XII	3,9
NN	0,4
Razem	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w 1976 r. /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	648,1	24,5	554,5	22,5	602,8	23,3
0	66,5	0,5	41,8	0,4	54,5	0,5
1	160,5	1,3	118,3	1,0	140,0	1,1
2	573,5	4,3	481,4	3,8	528,9	4,0
3	1097,6	7,8	959,3	7,4	1030,3	7,5
4	1500,0	10,6	1309,4	9,9	1414,7	10,2
5-9	1399,2	45,0	1254,6	43,8	1328,3	43,9
5	1463,7	9,9	1418,8	10,3	1441,8	10,1
6	1544,0	10,4	1379,5	10,0	1470,9	10,1
7	1506,2	9,4	1309,8	8,9	1409,8	9,0
8	1385,3	8,7	1136,7	7,8	1263,4	8,2
9	1065,0	6,6	1008,0	6,8	1037,1	6,5
10-14	680,6	22,5	686,6	24,6	683,7	23,2
15-19	100,2	4,1	90,1	4,0	95,4	4,0
20-24	12,0	0,5	26,9	1,3	19,3	0,9
25-29	16,4	0,6	22,9	1,0	19,6	0,8
30-34	18,2	0,4	21,7	0,6	20,0	0,5
35-39	10,4	0,3	11,3	0,3	10,9	0,3
40-44	6,9	0,2	6,0	0,2	6,5	0,2
45-49	4,7	0,1	1,7	0,1	3,2	0,1
50-54	1,3	0,0	3,2	0,1	2,4	0,1
55-59	-	-	2,2	-	1,2	0,0
60 i >	2,5	0,1	1,3	0,1	1,8	0,1
NN		1,7		1,4		2,6
Ogółem	243,7	100,0	203,6	100,0	225,8	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	281,7	234,1	198,8	165,3	243,7	203,5
%	52,5	47,5	54,0	46,0	53,5	46,5
Zapadalność na 100 000	257,9		184,1		225,8	
%	62,7		37,3		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	243,7	281,7	313,0	354,6	259,2	232,8	198,8
K	203,5	234,1	260,8	308,5	200,2	193,9	165,3
Ogółem	225,8	257,9	289,5	317,4	228,5	212,6	184,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	14,6
II	12,6
III	13,8
IV	13,5
V	9,4
VI	6,2
VII	2,8
VIII	1,7
IX	2,3
X	5,5
XI	8,2
XII	9,4
Razem	100,0

Zapalenie mózgu w 1976 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	9,1	51,4	7,2	52,9	8,2	52,1
0	16,3	20,0	17,2	27,5	16,8	23,1
1	15,6	18,5	7,6	11,8	11,7	15,7
2	3,9	4,3	8,3	11,8	5,9	7,4
3	3,9	4,3	-	-	2,1	2,5
4	3,9	4,3	1,5	1,8	2,8	3,4
5-9	2,1	10,0	2,2	13,7	2,1	11,6
5	1,4	1,4	-	-	0,7	0,8
6	4,3	4,3	6,0	7,8	5,2	5,8
7	3,1	2,9	1,6	2,0	2,4	2,5
8	-	-	3,2	3,9	1,6	1,7
9	1,5	1,4	-	-	0,8	0,8
10-14	1,2	5,8	1,8	11,8	1,5	8,2
15-19	1,2	7,1	0,5	3,9	0,8	5,8
20-24	0,7	4,3	0,9	7,9	0,8	5,8
25-29	1,3	7,1	0,5	3,9	0,9	5,8
30-34	1,2	4,3	0,4	2,0	0,8	3,3
35-39	0,8	2,9	0,8	3,9	0,8	3,3
40-44	0,4	1,4	-	-	0,2	0,8
45-49	0,7	2,9	-	-	0,4	1,7
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	0,7	1,4	-	-	0,3	0,8
60 i >	0,2	1,4	-	-	0,1	0,8
Ogółem	1,6	100,0	1,1	100,0	1,4	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,3	1,0	2,0	1,3	1,6	1,1
%	42,8	49,0	57,2	51,0	57,9	42,1
Zapadalność na 100 000.	1,1		1,7		1,4	
%	45,5		54,5		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	1,6	1,3	2,5	1,3	0,2	1,1	2,0
K	1,1	1,0	1,5	0,8	0,8	0,8	1,3
Ogółem	1,4	1,1	2,0	1,0	0,5	1,0	1,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	5,0
II	9,9
III	9,9
IV	10,7
V	7,4
VI	8,3
VII	8,3
VIII	5,0
IX	10,7
X	11,6
XI	6,6
XII	6,6
Razem	100,0

Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	27,2	39,3	19,0	50,7	23,2	43,2
0	47,8	15,1	39,4	22,9	43,7	17,7
1	32,3	9,9	19,1	10,7	25,9	10,2
2	23,2	6,6	9,6	5,0	16,6	6,1
3	12,2	3,3	14,0	7,1	13,1	4,6
4	16,4	4,4	10,1	5,0	13,3	4,6
5-9	11,4	14,0	6,9	15,7	9,2	14,6
5	27,0	7,0	8,9	4,3	18,2	6,1
6	14,4	3,7	7,5	3,6	11,1	3,6
7	3,1	0,7	6,4	2,8	4,7	1,5
8	4,6	1,1	6,4	2,8	5,5	1,7
9	6,2	1,5	4,8	2,2	5,5	1,7
10-14	7,0	8,8	3,0	7,1	5,1	8,2
15-19	3,6	5,5	2,4	7,1	3,0	6,1
20-24	4,5	7,4	2,1	6,5	3,3	7,0
25-29	2,0	2,9	1,3	3,6	1,7	3,1
30-34	3,2	2,9	0,4	0,7	1,8	2,2
35-39	3,5	3,3	-	-	1,7	2,2
40-44	4,4	4,4	0,4	0,7	2,3	3,1
45-49	0,7	0,7	1,0	2,2	0,9	1,2
50-54	3,9	3,3	1,4	2,8	2,6	3,2
55-59	2,0	1,1	0,5	0,7	1,2	1,0
60 i	2,4	6,4	0,4	2,2	1,7	4,9
Ogółem	6,4	100,0	3,1	100,0	4,7	100,0

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce w 1976 roku
/na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg poci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	5,4	2,5	7,6	3,9	6,4	3,1
%	29,9	15,0	36,2	18,9	66,0	34,0
Zapadalność na 100 000	3,9		5,7		4,7	
%	44,9		55,1		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg poci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	6,4	5,4	6,1	8,6	5,8	2,8	7,6
K	3,1	2,5	2,3	4,0	3,0	1,5	3,9
Ogółem	4,7	3,9	4,1	6,0	4,3	2,1	5,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,0
II	9,0
III	7,5
IV	8,7
V	8,3
VI	7,8
VII	7,3
VIII	8,7
IX	9,5
X	9,9
XI	7,3
XII	8,0
Razem	100,0

Wirusowe zapalenie opon m-rdz. w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	26,2	28,1	15,3	30,1	20,9	28,8
0	23,3	5,5	25,8	11,1	24,6	7,4
1	8,4	1,9	5,1	2,1	6,8	2,0
2	19,3	4,1	13,8	5,3	16,6	4,5
3	25,7	5,2	15,4	5,8	20,7	5,4
4	57,5	11,4	15,8	5,8	37,2	9,5
5-9	38,9	35,5	11,2	19,0	25,3	29,9
5	48,4	9,3	11,9	4,2	30,6	7,6
6	49,1	9,3	13,6	4,8	31,7	7,7
7	35,6	6,3	12,8	4,2	24,4	5,6
8	41,3	7,4	6,4	2,1	24,2	5,6
9	18,6	3,2	11,3	3,7	15,0	3,4
10-14	16,3	15,3	12,4	21,7	14,4	17,5
15-19	6,2	7,1	3,5	7,4	4,8	7,2
20-24	4,0	4,9	3,2	7,4	3,6	5,8
25-29	0,8	0,8	2,3	4,8	1,5	2,2
30-34	4,7	3,3	2,8	3,7	3,8	3,4
35-39	1,2	0,8	0,8	1,1	1,0	0,9
40-44	1,5	1,1	1,4	2,1	1,4	1,4
45-49	0,7	0,5	-	-	0,4	0,4
50-54	0,4	0,3	0,7	1,1	0,6	0,5
55-59	0,7	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4
60 i >	1,5	2,0	0,3	1,1	0,8	1,6
Ogółem	8,6	100,0	4,2	100,0	6,3	100,0

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce w 1976 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	10,1	4,6	6,8	3,7	8,6	4,2
%	42,0	20,5	24,0	13,5	65,9	34,1
Zapadalność na 100 000	7,2		5,2		6,3	
%	62,5		37,5		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	8,6	10,1	10,6	9,0	13,1	8,8	6,8
K	4,2	4,6	3,8	4,4	5,3	4,7	3,7
Ogółem	6,3	7,2	7,0	6,4	9,0	6,7	5,2

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	4,3
II	3,4
III	4,1
IV	4,1
V	3,2
VI	4,7
VII	7,5
VIII	10,8
IX	28,8
X	17,1
XI	7,0
XII	5,0
Razem	100,0

WZW w 1976 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	107,0	4,5	97,8	3,8	102,5	4,1
0	15,2	0,2	19,7	0,2	17,4	0,2
1	29,9	0,3	12,7	0,1	21,6	0,2
2	72,2	0,6	68,8	0,5	70,5	0,5
3	157,2	1,2	155,9	1,2	156,6	1,2
4	289,0	2,2	256,1	1,8	273,0	2,0
5-9	472,5	16,7	488,0	16,4	480,1	16,6
5	401,1	3,0	360,7	2,5	381,4	2,8
6	408,4	3,0	460,8	3,2	434,0	3,1
7	541,8	3,7	561,8	3,7	551,6	3,7
8	522,9	3,6	585,1	3,8	553,4	3,7
9	498,5	3,4	482,3	3,2	490,5	3,3
10-14	468,1	17,1	506,7	17,5	487,0	17,3
15-19	310,2	13,9	269,4	11,4	290,1	12,6
20-24	182,1	8,7	245,1	11,2	213,2	9,9
25-29	181,5	7,6	198,9	8,1	190,1	7,8
30-34	159,9	4,3	163,3	4,3	161,6	4,3
35-39	153,4	4,2	146,4	4,0	149,8	4,1
40-44	141,9	4,1	122,8	3,6	132,2	3,9
45-49	133,4	3,9	143,8	4,4	138,7	4,2
50-54	155,0	3,8	137,7	4,0	145,6	3,9
55-59	175,5	2,8	134,3	2,6	153,0	2,7
60 i >	165,8	8,4	117,3	8,7	136,9	8,6
Ogółem	221,1	100,0	211,7	100,0	216,3	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w Polsce w 1976 r. /na wybranych terenach/

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	203,5	196,4	241,7	230,7	221,1	211,7
%	48,8	51,2	50,6	49,4	49,7	50,3
Zapadalność na 100 000	199,8		236,1		216,3	
%	50,5		49,5		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	221,1	203,5	223,6	238,0	196,4	174,7	241,7
K	211,7	196,4	214,0	236,1	183,3	169,7	230,7
Ogółem	216,3	199,8	218,6	227,4	189,5	172,1	236,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	10,5
II	8,8
III	7,6
IV	6,3
V	6,6
VI	6,1
VII	6,1
VIII	7,3
IX	8,8
X	10,4
XI	11,0
XII	10,5
Razem	100,0