

1977r.

Czerwonka w 1977 roku (na wybranych terenach)

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	56,9	51,4	56,5	49,4	56,7	50,4
0	31,5	6,2	29,5	5,6	30,5	5,9
1	70,7	13,5	87,8	16,2	78,9	14,8
2	94,1	16,7	89,4	15,2	91,8	16,0
3	58,3	9,9	46,3	7,7	52,4	8,8
4	30,1	5,1	28,8	4,7	29,5	4,9
5-9	15,6	11,9	15,3	11,5	15,4	11,7
5	35,6	5,7	31,3	4,9	33,5	5,3
6	20,2	3,2	12,0	1,9	16,2	2,5
7	9,3	1,4	16,1	2,3	12,6	1,9
8	9,2	1,4	7,9	1,2	8,6	1,3
9	1,5	0,2	8,0	1,2	4,7	0,7
10-14	16,9	13,3	14,6	11,2	15,7	12,3
15-19	7,1	6,9	7,2	6,8	7,2	6,8
20-24	2,4	2,5	5,7	5,8	4,1	4,2
25-29	2,8	2,5	3,6	3,3	3,2	2,9
30-34	1,6	0,9	2,4	1,4	2,0	1,2
35-39	2,3	1,4	2,3	1,4	2,3	1,4
40-44	2,9	1,8	2,1	1,4	2,5	1,6
45-49	3,2	2,1	3,8	2,6	3,5	2,3
50-54	2,6	1,4	2,2	1,4	2,4	1,4
55-59	4,6	1,6	2,7	1,2	3,6	1,4
60 +	1,9	2,1	1,5	2,6	1,8	2,3
NN	-	0,2	-	-	-	0,1
Ogółem	10,2	100,0	9,5	100,0	9,8	100,0

Czerwonka w Polsce w 1977 roku (na wybranych terenach)
 Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	11,2	11,4	9,0	7,0	10,2	9,5
(%)	47,4	52,6	55,8	44,2	50,5	49,5
Zapadalność na 100 000	11,3		8,0		9,8	
(%)	63,0		37,0		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby
 ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	10,2	11,2	6,5	17,3	13,9	9,5	9,0
K	9,5	11,4	6,1	16,8	15,6	9,8	7,0
Ogółem	9,8	11,3	6,3	17,0	14,8	9,6	8,0

Rozkład sezonowy
 zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	4,1
II	2,6
III	4,7
IV	3,0
V	2,0
VI	13,8
VII	11,1
VIII	16,9
IX	23,3
X	11,8
XI	3,9
XII	2,8
Razem	100,0

Krztusiec w 1977 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	15,2	53,6	22,0	65,6	18,5	59,9
0	25,7	19,6	54,1	35,2	39,5	27,8
1	25,1	18,8	19,1	12,0	22,2	15,2
2	3,9	2,7	12,4	7,2	8,0	5,1
3	8,1	5,4	11,2	6,4	9,6	5,9
4	10,9	7,1	8,6	4,8	9,8	5,9
5-9	11,4	33,9	10,3	26,4	10,8	30,0
5	14,2	8,9	11,9	6,4	13,1	7,6
6	11,5	7,1	12,0	6,4	11,8	6,8
7	10,8	6,3	12,8	6,4	11,8	6,3
8	13,8	8,0	9,5	4,8	11,7	6,3
9	6,2	3,6	4,8	2,4	5,5	3,0
10-14	4,1	12,5	2,4	6,4	3,3	9,3
15-19	-	-	0,2	0,8	0,1	0,4
20-24	-	-	-	-	-	-
25 +	-	-	0,04	0,8	0,02	0,4
Ogółem	2,6	100,0	2,8	100,0	2,7	100,0

Krztusiec w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,6	2,2	3,8	3,5	2,6	2,8
%	40,7	59,3	51,4	48,6	47,3	52,7
Zapadalność na 100 000	1,9		3,7		2,7	
%	38,4		61,6		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	2,6	1,6	1,4	3,3	0,8	1,2	3,8
K	2,8	2,2	1,0	4,2	1,8	2,0	3,5
Ogółem	2,7	1,9	1,2	3,8	1,3	1,6	3,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	2,5
II	4,2
III	4,7
IV	8,0
V	8,0
VI	5,1
VII	12,7
VIII	13,5
IX	13,1
X	8,4
XI	10,1
XII	9,7
Razem	100,0

Odra w 1977 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	695,9	50,5	639,2	48,9	668,4	49,8
0	246,2	3,9	227,6	3,8	237,7	3,9
1	1019,2	15,7	940,2	15,1	980,9	15,4
2	891,8	12,8	823,9	12,3	858,9	12,5
3	653,5	8,9	608,1	8,9	631,7	8,9
4	687,7	9,3	618,7	8,8	654,0	9,0
5-9	619,1	38,2	598,9	39,4	609,2	38,8
5	698,4	9,1	690,0	9,5	694,3	9,3
6	714,3	9,1	689,8	9,4	702,3	9,3
7	687,3	8,2	659,7	8,4	673,8	8,3
8	518,3	6,3	558,0	7,2	537,8	6,7
9	464,4	5,5	384,2	4,9	425,1	5,2
10-14	150,2	9,5	146,8	9,9	148,6	9,7
15-19	15,2	1,2	15,1	1,3	15,1	1,2
20-24	4,0	0,3	3,8	0,3	3,8	0,3
25-29	1,3	0,1	1,0	0,08	1,1	0,08
30-34	1,6	0,1	0,8	0,04	1,2	0,06
35-39	-	-	0,4	0,02	0,2	0,01
40-44	-	-	0,7	0,04	0,4	0,02
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	0,4	0,02	-	-	0,2	0,01
55-59	0,7	0,02	-	-	0,3	0,01
60 +	0,4	0,04	0,1	0,02	0,3	0,03
Ogółem	128,4	100,0	109,3	100,0	119,1	100,0

Odra w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	133,4	110,8	122,1	107,2	128,4	109,3
%	52,5	47,5	52,3	47,7	52,4	47,6
Zapadalność na 100 000	121,7		115,2		119,0	
%	55,9		44,1		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	128,4	133,5	115,7	216,2	110,8	112,4	122,1
K	109,3	110,8	94,7	179,7	91,6	94,6	107,2
Ogółem	119,0	121,7	104,7	197,3	100,8	103,1	115,2

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	12,7
II	8,3
III	7,3
IV	8,9
V	12,0
VI	10,4
VII	4,9
VIII	2,5
IX	3,0
X	6,9
XI	8,6
XII	14,5
Razem	100,0

Róźyczka w 1977 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	620,2	33,6	579,4	28,3	600,5	30,8
0	155,2	1,8	166,0	1,8	160,5	1,8
1	695,8	8,0	559,8	5,7	629,9	6,8
2	632,7	6,8	636,9	6,1	634,7	6,4
3	693,8	7,0	658,7	6,1	676,6	6,6
4	991,8	10,0	943,9	8,6	969,1	9,2
5-9	804,0	37,0	878,8	36,8	840,6	36,8
5	967,3	9,4	983,6	8,6	975,2	8,9
6	952,4	9,1	920,2	8,0	936,6	8,5
7	880,8	7,8	1032,1	8,4	955,1	8,1
8	625,4	5,6	697,9	5,7	660,9	5,7
9	571,2	5,1	750,8	6,1	659,3	5,6
10-14	437,8	20,7	572,8	24,7	504,2	22,7
15-19	98,3	5,7	118,0	6,2	108,0	6,0
20-24	15,6	1,0	25,7	1,5	20,6	1,2
25-29	6,0	0,3	13,1	0,7	9,6	0,5
30-34	6,3	0,2	8,7	0,3	7,5	0,3
35-39	1,9	0,07	3,4	0,1	2,7	0,1
40-44	0,7	0,03	1,4	0,05	1,1	0,04
45-49	0,7	0,03	0,3	0,01	0,5	0,02
50-54	1,3	0,04	1,4	0,05	1,4	0,05
55-59	0,7	0,01	0,5	0,01	0,6	0,01
60 +	0,8	0,05	0,3	0,03	0,5	0,04
Brak danych		1,2		1,2		1,4
Ogółem	170,1	100,0	169,3	100,0	170,1	100,0

Różyczka w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	242,5	228,5	84,4	94,6	170,1	169,3
%	49,3	50,6	46,6	53,4	48,6	51,2
Zapadalność na 100 000	235,3		89,6		170,1	
%	75,6		23,9		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	170,1	242,5	225,3	277,9	233,9	239,5	84,4
K	169,3	228,5	215,2	274,1	231,7	210,6	94,6
Ogółem	170,1	235,3	220,1	275,9	232,9	224,5	89,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	11,6
II	12,4
III	16,6
IV	15,9
V	16,7
VI	10,4
VII	3,9
VIII	2,4
IX	1,7
X	2,1
XI	2,8
XII	3,2
NN	0,2
Razem	100,0

Płonica w 1977 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	177,1	33,8	163,9	31,2	170,8	32,6
0	9,3	0,4	4,9	0,2	7,2	0,3
1	63,5	2,6	50,9	2,0	57,4	2,3
2	172,7	6,5	207,7	7,7	190,3	7,1
3	313,0	11,2	255,6	9,3	284,8	10,3
4	371,2	13,1	338,1	12,0	355,1	12,6
5-9	265,4	43,1	261,1	42,7	263,5	42,9
5	345,7	11,8	320,4	11,0	333,3	11,4
6	300,1	10,1	304,2	10,3	302,1	10,2
7	297,2	9,3	274,5	8,7	286,0	9,0
8	200,3	6,4	190,8	6,1	195,6	6,2
9	174,9	5,5	209,0	6,6	192,4	6,1
10-14	101,9	16,9	111,0	18,0	106,2	18,0
15-19	18,3	3,7	22,2	4,6	20,2	4,1
20-24	3,8	0,8	4,4	1,0	4,1	1,0
25-29	2,0	0,4	3,1	1,0	2,5	1,0
30-34	1,2	0,1	1,2	0,2	1,2	0,1
35-39	0,4	0,05	0,4	0,1	0,4	0,1
40-44	0,4	0,05	0,7	0,1	0,5	0,1
45-49	0,7	0,1	0,3	0,1	0,5	0,1
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60 i	-	-	-	-	-	-
Ogółem	48,3	100,0	43,4	100,0	45,8	100,0

Płonica w Polsce w 1977 roku (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	63,2	53,8	30,8	30,4	48,3	43,4
%	51,9	48,1	49,7	50,3	51,2	48,8
Zapadalność na 100 000	58,3		30,7		45,8	
%	69,6		30,4		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	48,3	63,2	47,6	75,7	54,9	71,5	30,8
K	43,4	53,8	41,3	60,6	49,6	61,0	30,4
Ogółem	45,8	58,3	44,3	68,0	52,2	66,1	30,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	10,1
II	9,0
III	12,7
IV	9,9
V	9,0
VI	6,8
VII	4,0
VIII	5,7
IX	6,8
X	10,1
XI	8,9
XII	7,0
Razem	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach). Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	877,0	28,9	739,1	26,5	810,0	27,7
0	67,7	0,5	51,7	0,4	59,9	0,4
1	271,8	1,9	160,3	1,2	217,8	1,6
2	698,5	4,5	609,4	4,3	656,0	4,4
3	1410,6	8,7	1224,7	8,4	1319,3	8,5
4	2169,9	13,3	1836,0	12,2	2007,0	12,8
5-9	1687,3	47,2	1504,8	46,5	1598,4	46,7
5	2153,6	12,7	1877,8	12,1	2019,7	12,4
6	1978,4	11,5	1763,6	11,3	1873,2	11,3
7	1756,9	9,5	1606,7	9,6	1684,0	9,5
8	1393,0	7,6	1254,4	7,6	1325,8	7,6
9	1096,0	5,9	977,5	5,9	1037,9	5,9
10-14	625,6	18,0	611,3	19,4	618,8	18,6
15-19	80,9	2,8	75,8	3,0	78,4	2,9
20-24	17,1	0,6	31,2	1,3	24,1	0,9
25-29	15,4	0,5	23,2	0,9	19,2	0,7
30-34	19,7	0,4	18,2	0,4	19,0	0,4
35-39	7,7	0,2	9,5	0,2	8,6	0,2
40-44	5,1	0,1	7,1	0,2	6,1	0,2
45-49	3,2	0,1	4,4	0,1	3,9	0,1
50-54	2,6	0,1	4,0	0,1	3,3	0,1
55-59	3,3	-	4,3	0,1	3,8	0,1
60+	0,8	-	1,4	0,1	1,2	0,1
NN		1,1		1,2		1,3
Ogółem	280,2	100,0	230,0	100,0	255,2	100,0

Nagminne zapalenie przyusznic w Polsce (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	354,1	281,1	192,8	165,6	280,2	230,0
%	53,6	46,4	53,2	46,8	53,5	46,5
Zapadalność na 100 000	317,5		179,1		255,2	
%	68,1		31,9		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczba ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	280,2	354,1	270,3	408,7	293,7	414,8	192,8
K	230,0	281,1	202,5	332,5	229,7	335,6	165,6
Ogółem	255,2	317,5	240,5	369,2	260,5	373,7	179,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	7,9
II	6,4
III	7,1
IV	8,3
V	9,4
VI	7,3
VII	4,9
VIII	2,9
IX	4,5
X	10,9
XI	16,3
XII	14,1
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (320) w Polsce w 1977 r.
 (na wybranych terenach). Zapadalność i podział procentowy
 wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	39,8	41,4	26,8	56,8	30,4	46,9
0	60,7	16,2	40,6	18,7	50,9	17,1
1	43,1	11,2	44,5	19,8	43,8	14,3
2	16,8	4,0	13,8	5,7	15,3	4,6
3	20,3	4,7	15,4	6,3	17,9	5,3
4	23,3	5,3	15,8	6,3	19,6	5,6
5-9	13,5	14,0	8,7	15,9	11,1	14,7
5	27,0	5,9	13,4	5,1	20,4	5,6
6	18,8	4,1	9,0	3,4	14,0	3,8
7	7,7	1,6	6,4	2,3	7,1	1,8
8	6,1	1,2	11,1	4,0	8,6	2,2
9	6,2	1,2	3,2	1,1	4,7	1,3
10-14	8,4	9,0	4,6	8,5	6,5	8,9
15-19	6,0	7,8	1,0	2,3	3,5	5,8
20-24	4,0	5,7	1,4	3,4	2,7	4,8
25-29	2,5	3,1	1,0	2,3	1,8	2,8
30-34	2,8	2,2	1,2	1,7	2,0	2,0
35-39	3,8	3,1	0	0	1,9	2,0
40-44	3,6	3,1	0	0	1,8	2,0
45-49	2,5	2,2	1,4	2,3	1,9	2,2
50-54	4,8	3,4	0,4	0,6	2,4	2,4
55-59	1,3	0,6	1,6	1,7	1,5	1,1
60+	2,9	4,4	1,1	4,5	1,8	4,4
Ogółem	7,5	100,0	3,9	100,0	5,7	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (320) w Polsce w 1977 roku
(na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	6,8	3,6	8,3	4,3	7,5	3,9
%	63,6	36,4	65,6	34,4	64,6	35,4
Zapadalność na 100 000	5,1		6,3		5,7	
%	49,7		50,3		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	7,5	6,8	5,8	6,8	7,3	7,3	8,3
K	3,9	3,6	3,4	3,6	3,0	4,0	4,3
Ogółem	5,7	5,1	4,5	5,2	5,0	5,6	6,3

Podział sezonowy
zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,7
II	6,8
III	8,5
IV	8,0
V	8,5
VI	10,5
VII	10,7
VIII	9,2
IX	6,2
X	7,8
XI	4,6
XII	10,5
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (045,079,2) w Polsce w 1977 roku (na wybranych terenach). Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	29,2	28,9	7,8	17,5	18,8	25,5
0	26,8	5,8	16,0	7,9	21,6	6,4
1	19,2	4,0	2,5	1,2	11,1	3,2
2	14,2	2,8	2,8	1,2	8,6	2,2
3	36,6	6,8	7,0	3,0	22,1	5,7
4	52,1	9,5	10,1	4,2	31,6	8,0
5-9	35,9	30,2	18,1	34,9	27,2	31,6
5	54,1	9,5	23,8	9,6	39,3	9,6
6	33,2	5,8	22,6	9,1	28,0	6,7
7	26,3	4,4	19,3	7,2	22,9	5,2
8	33,6	5,5	14,3	5,4	24,2	5,5
9	31,0	5,0	9,6	3,6	20,5	4,6
10-14	17,5	15,0	7,0	14,0	12,3	14,7
15-19	9,5	10,0	3,0	7,2	6,3	9,2
20-24	4,2	4,8	4,4	11,2	4,3	6,7
25-29	4,3	4,3	2,1	4,8	3,2	4,4
30-34	2,0	1,3	1,6	2,4	1,8	1,6
35-39	2,3	1,5	0,8	1,2	1,5	1,4
40-44	2,5	1,8	0,7	1,2	1,6	1,6
45-49	0,7	0,5	0,7	1,2	0,7	0,7
50-54	0,9	0,5	1,1	1,8	1,0	0,9
55-59	0,7	0,2	0,5	0,6	0,6	0,4
60+	0,8	1,0	0,4	1,8	0,6	1,3
Ogółem	9,3	100,0	3,7	100,0	6,4	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (045, 079,2) w Polsce w 1977 r.
(na wybranych terenach).

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	10,3	4,3	8,2	2,9	9,3	3,7
%	68,8	31,2	73,3	26,7	70,6	29,4
Zapadalność na 100 000	7,1		5,5		6,4	
%	60,8		39,2		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	100 tys.	
M	9,3	10,3	5,8	7,9	17,2	10,7	8,2
K	3,7	4,3	3,3	3,6	5,7	4,5	2,9
Ogółem	6,4	7,1	4,5	5,7	11,2	7,5	5,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	5,0
II	2,5
III	2,8
IV	2,7
V	6,1
VI	11,5
VII	17,0
VIII	18,8
IX	17,6
X	6,9
XI	4,8
XII	4,3
Razem	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1977 roku (065,323) na wybranych terenach. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	5,3	37,5	6,2	45,1	5,7	41,3
0	7,0	10,7	12,3	19,6	9,6	15,0
1	10,8	16,1	10,2	15,7	10,5	16,1
2	3,9	5,4	4,1	5,9	4,0	5,6
3	2,7	3,6	2,8	3,9	2,8	3,7
4	1,4	1,7	-	-	0,7	0,9
5-9	2,1	12,5	1,2	7,9	1,7	10,3
5	1,4	1,7	-	-	0,7	0,9
6	-	-	3,0	3,9	1,5	1,9
7	6,2	7,2	1,6	2,0	3,9	4,7
8	-	-	1,6	2,0	0,8	0,9
9	3,1	3,6	-	-	1,6	1,9
10-14	0,6	3,6	1,5	9,7	1,0	6,5
15-19	1,0	7,2	0,5	3,9	0,7	5,6
20-24	0,7	5,4	0,7	5,9	0,7	5,6
25-29	1,0	7,2	0,8	5,9	0,9	6,5
30-34	0,8	3,6	0,8	3,9	0,8	3,7
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	1,4	7,2	0,3	2,0	0,9	4,7
50-54	2,2	8,7	0,7	3,9	1,4	6,5
55-59	0,7	1,7	1,6	5,9	1,2	3,7
60+	0,6	5,4	0,4	5,9	0,5	5,6
Ogółem	1,3	100,0	1,1	100,0	1,2	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,2	0,8	1,5	1,6	1,3	1,1
%	58,7	41,3	47,5	52,5	52,3	47,7
Zapadalność na 100 000	1,0		1,5		1,2	
%	43,0		57,0		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	1,3	1,2	1,4	0,9	0,9	1,3	1,5
K	1,1	0,8	0,9	0,6	0,2	1,1	1,6
Ogółem	1,2	1,0	1,1	0,7	0,5	1,2	1,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	14,1
II	6,5
III	6,5
IV	11,2
V	6,5
VI	10,4
VII	11,2
VIII	11,2
IX	4,7
X	7,5
XI	6,5
XII	3,7
Razem	100,0

WZW w 1977 roku (na wybranych terenach)

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	111,8	4,4	128,0	4,7	119,7	4,7
0	36,2	0,3	25,8	0,2	31,1	0,3
1	27,5	0,2	25,4	0,2	26,5	0,2
2	64,4	0,5	101,8	0,7	82,5	0,6
3	159,9	1,2	188,2	1,3	173,8	1,3
4	298,6	2,2	329,5	2,3	313,7	2,3
5-9	489,2	16,7	553,7	17,8	520,8	17,2
5	379,8	2,7	433,7	2,9	406,1	2,8
6	483,4	3,4	545,2	3,6	513,6	3,5
7	541,8	3,6	634,0	4,0	587,1	3,8
8	490,8	3,3	543,7	3,4	516,7	3,3
9	560,4	3,7	622,2	3,9	590,7	3,8
10-14	475,1	16,8	465,7	15,5	470,5	16,1
15-19	310,6	13,3	277,5	11,3	294,4	12,3
20-24	221,5	10,2	256,4	11,2	238,7	10,7
25-29	171,9	7,0	222,3	8,7	196,9	7,8
30-34	180,4	4,7	196,5	5,0	188,5	4,8
35-39	132,7	3,5	122,5	3,2	127,6	3,4
40-44	132,4	3,7	123,9	3,5	128,1	3,6
45-49	151,4	4,3	132,8	3,9	141,8	4,1
50-54	166,3	3,9	147,8	4,1	156,2	4,0
55-59	200,5	3,1	164,7	3,0	180,9	3,1
60 +	170,4	8,4	113,3	8,1	136,3	8,2
Ogółem	229,4	100,0	220,9	100,0	225,0	100,0

WZW w Polsce w 1977 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	220,6	215,5	239,4	227,3	229,3	220,8
%	48,5	51,5	50,7	49,3	49,5	50,5
Zapadalność na 100 000	218,0		233,3		224,9	
%	53,0		47,0		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100	
M	229,3	220,6	230,7	297,7	174,3	197,5	239,4
K	220,8	215,5	236,3	278,5	169,4	192,6	227,3
Ogółem	224,9	218,0	233,6	287,7	171,8	194,9	233,3

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	9,1
II	7,5
III	6,5
IV	5,8
V	6,4
VI	5,8
VII	6,8
VIII	9,5
IX	10,4
X	11,5
XI	11,0
XII	9,7
Razem	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby na wybranych terenach Polski
w roku 1977

Sezonowość i zapadalność na 100 tys. według wieku

Miesiąc	Wiek w latach			
	0 - 14		15 i więcej	
	zapadalność na 100 000	%	zapadalność na 100 000	%
I	400,9	9,4	196,2	8,9
II	293,3	6,8	175,2	8,1
III	205,0	4,8	164,5	7,5
IV	196,5	4,6	146,0	6,6
V	211,9	4,9	160,0	7,3
VI	191,3	4,4	146,4	6,6
VII	236,0	5,5	167,0	7,6
VIII	410,7	9,6	208,4	9,5
IX	488,6	11,4	216,3	9,8
X	589,3	13,7	220,8	10,1
XI	602,5	14,0	199,3	9,1
XII	465,7	10,9	196,2	8,9
Ogółem	357,6	100,0	183,0	100,0