

1978
okr. Generala

Czerwonka w 1978 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	68,3	64,5	65,6	53,7	67,2	58,9
0	32,7	6,7	24,6	4,4	28,7	5,5
1	86,2	17,3	86,5	14,9	86,4	16,0
2	122,4	22,8	126,5	20,2	124,4	21,4
3	65,0	11,5	57,6	9,0	61,4	10,2
4	35,6	6,2	34,5	5,2	37,8	5,8
5-9	11,4	9,1	13,7	9,7	12,5	9,4
5	17,1	2,9	20,9	3,1	18,9	3,0
6	7,2	1,2	25,6	3,7	16,2	2,5
7	12,4	1,9	4,8	0,7	8,7	1,3
8	12,2	1,9	4,8	0,7	8,6	1,3
9	7,7	1,2	11,3	1,5	9,5	1,3
10-14	8,7	7,2	9,4	6,8	9,1	7,0
15-19	2,1	2,2	4,4	3,9	3,3	3,1
20-24	2,4	2,6	5,5	5,3	4,0	4,0
25-29	3,3	3,1	3,1	2,6	3,2	2,9
30-34	3,2	1,9	5,5	3,1	4,3	2,5
35-39	4,2	2,6	4,2	2,4	4,2	2,5
40-44	1,8	1,2	5,7	3,5	3,8	2,4
45-49	3,2	2,2	4,1	2,6	3,7	2,4
50-54	3,0	1,7	1,4	0,9	2,2	1,3
55-59	2,0	0,7	2,7	1,1	2,4	0,9
60 i	0,8	1,0	2,8	4,4	2,0	2,7
Ogółem	9,8	100,0	10,1	100,0	9,9	100,0

Czerwonka w Polsce w 1978 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	13,6	13,5	5,3	6,0	9,8	10,1
%	48,2	51,8	46,4	53,6	47,8	52,2
Zapadalność na 100 000	13,5		5,6		9,9	
%	74,4		25,6		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	9,8	13,6	3,4	11,0	32,4	11,3	5,3
K	10,1	13,5	4,3	15,2	27,6	10,8	6,0
Ogółem	9,9	13,5	3,9	13,2	29,9	11,0	5,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	3,4
II	3,3
III	10,0
IV	2,6
V	1,7
VI	8,2
VII	6,1
VIII	20,1
IX	17,7
X	14,5
XI	9,2
XII	3,2
Razem	100,0

Krztusiec w 1978 roku (na wybranych terenach)
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	11,7	70,8	15,3	64,1	13,4	66,9
0	28,0	36,9	25,8	23,6	26,9	29,2
1	12,0	15,4	15,3	13,5	13,6	14,3
2	12,9	15,4	15,1	12,4	14,0	13,6
3	2,7	3,1	9,8	7,9	6,2	5,8
4	-	-	8,6	6,7	4,2	3,9
5-9	4,5	23,1	8,1	29,2	6,3	26,6
5	4,3	4,6	6,0	4,5	5,1	4,6
6	5,8	6,2	7,5	5,6	6,6	5,8
7	4,6	4,6	14,4	10,1	9,5	7,8
8	4,6	4,6	11,1	7,9	7,8	6,5
9	3,1	3,1	1,6	1,1	2,4	2,0
10-14	0,9	4,6	1,5	5,6	1,2	5,2
15-19	0,2	1,5	0,2	1,1	0,2	1,3
Ogółem	1,5	100,0	2,0	100,0	1,8	100,0

Krzyszew w Polsce w 1978 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,5	2,1	1,6	1,8	1,5	1,8
%	39,5	60,5	45,6	54,4	42,2	57,8
Zapadalność na 100 000	1,8		1,7		1,8	
%	55,8		44,2		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	1,5	1,5	1,1	1,5	0,9	2,1	1,6
K	2,0	2,1	1,3	2,0	2,4	2,5	1,8
Ogółem	1,8	1,8	1,2	1,8	1,6	2,3	1,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	7,8
II	7,1
III	2,0
IV	9,1
V	4,0
VI	7,8
VII	11,0
VIII	5,8
IX	12,3
X	9,8
XI	14,9
XII	8,4
Razem	100,0

Krztusiec w Polsce w 1978 roku. Zapadalność na
100 000 wg wieku i środowiska (na wybranych terenach)

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000
0	19	22,2	25	30,8	44	26,3
1	19	22,8	3	3,8	22	13,6
2	17	22,4	5	6,7	22	14,6
3	7	9,6	2	2,8	9	6,2
4	2	2,8	4	5,7	6	4,2
5	4	5,8	3	4,4	7	5,1
6	4	5,9	5	7,4	9	6,6
7	2	3,2	10	15,5	12	9,5
8	6	9,7	4	6,0	10	7,8
9	2	3,3	1	1,5	3	2,4
10-14	4	1,3	4	1,1	8	1,2
15-19	-	-	2	0,5	2	0,2
20-24	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-
60 >	-	-	-	-	-	-
Ogółem	86	1,8	68	1,7	154	1,8

Płonica w 1978 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	164,1	38,0	135,0	31,6	150,0	34,9
0	7,0	0,4	14,8	0,7	10,8	0,6
1	57,5	2,8	48,3	2,4	53,1	2,6
2	166,2	7,6	112,8	5,1	140,4	6,4
3	275,1	11,9	220,5	9,9	248,3	10,9
4	356,1	15,3	309,4	13,5	333,3	14,4
5-9	213,9	42,0	233,4	47,1	223,5	44,5
5	283,1	11,7	323,4	13,6	302,8	12,6
6	242,4	9,8	259,0	10,8	250,6	10,3
7	244,6	9,3	242,4	9,5	243,5	9,4
8	159,0	6,1	173,3	6,9	166,0	6,5
9	133,1	5,1	160,8	6,3	146,7	5,7
10-14	75,1	15,2	83,1	17,2	79,0	16,2
15-19	14,3	3,5	9,6	2,5	12,0	3,0
20-24	2,7	0,7	3,0	0,8	2,8	0,8
25-29	0,8	0,2	1,8	0,4	1,3	0,3
30-34	0,4	0,1	1,2	0,2	0,8	0,1
35-39	0,4	0,1	-	-	0,2	0,03
40-44	-	-	1,1	0,2	0,5	0,1
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	0,4	0,1	-	-	0,2	0,03
55-59	0,7	0,1	-	-	0,3	0,04
60 +	-	-	-	-	-	-
Ogółem	39,8	100,0	35,2	100,0	37,4	100,0

Płonica w Polsce w 1978 roku (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	55,8	46,6	21,1	21,1	39,8	35,2
%	52,4	47,6	49,4	50,6	51,6	48,4
Zapadalność na 100 000	51,0		21,1		37,4	
%	74,5		25,5		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	39,8	55,8	44,0	64,1	31,7	72,9	21,1
K	35,2	46,6	33,5	56,4	27,8	61,0	21,1
Ogółem	37,4	51,0	38,5	60,1	29,7	66,7	21,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	12,2
II	9,0
III	9,2
IV	10,6
V	10,6
VI	7,4
VII	5,3
VIII	4,1
IX	6,0
X	8,5
XI	9,6
XII	7,5
Razem	100,0

Płonica w Polsce w 1978 roku. Zapadalność na 100 000
wg wieku i środowiska (na wybranych terenach)

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000
0	12	14,0	6	7,4	18	10,8
1	58	69,5	28	35,6	86	53,5
2	156	205,8	56	75,2	212	141,1
3	286	391,2	77	107,1	363	250,3
4	387	533,1	92	131,6	479	336,1
5	343	497,1	75	109,6	418	304,2
6	260	382,4	82	121,1	342	252,0
7	216	347,3	94	145,3	310	244,3
8	152	245,6	62	93,4	214	166,8
9	133	219,8	54	81,4	187	147,5
10-14	339	107,0	178	50,0	517	76,8
15-19	72	18,0	27	6,4	99	12,0
20-24	19	3,5	6	1,8	25	2,8
25-29	6	1,2	4	1,5	10	1,3
30-34	4	1,2	-	-	4	0,8
35-39	-	-	1	0,5	1	0,2
40-44	2	0,6	1	0,4	3	0,5
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	1	0,4	1	0,2
55-59	1	0,6	-	-	1	0,3
60 >	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2446	51,0	844	21,2	3290	37,4

Tablica I O d r a w 1978 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy w/g płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Zapadaln.	%	Zapadaln.	%	Zapadaln.	%
0 - 4	1.125,0	44,5	1.075,8	42,4	1.101,1	43,5
0	233,3	2,0	206,6	1,8	220,4	1,9
1	1.597,6	13,4	1.550,9	12,9	1.575,0	13,2
2	1.841,5	14,4	1.680,9	12,9	1.763,8	13,6
3	1.035,2	7,7	102,8	7,5	1.019,3	7,6
4	960,3	7,0	997,1	7,3	978,2	7,2
5 - 9	1.170,6	39,3	1.240,9	42,0	1.205,0	40,6
5	981,5	6,9	1.052,2	7,4	1.016,0	7,2
6	1.057,7	7,4	1.180,7	8,3	1.118,0	7,8
7	1.373,1	8,9	1.446,2	9,5	1.409,0	9,2
8	1.396,0	9,2	1.472,2	9,8	1.433,4	9,5
9	1.066,6	6,9	1.069,1	7,0	1.067,8	7,9
10-14	380,2	13,1	365,0	12,7	372,7	12,9
15-19	27,8	1,2	19,3	0,8	23,6	1,0
20-24	2,9	0,1	4,4	0,2	3,6	0,2
25-29	3,5	0,2	3,6	0,1	3,6	0,1
30-34	1,6	0,04	1,6	0,04	1,6	0,04
35-39	1,2	0,03	0,8	0,02	0,9	0,03
40-44	0,4	0,01	0,7	0,02	0,5	0,01
45-49	-	-	-	-	-	-
50-54	0,4	0,01	-	-	0,2	0,01
55-59	-	-	-	-	-	-
60 +	0,2	0,01	0,3	0,02	0,2	0,01
NN	-	1,5	-	1,7	-	1,6
Ogółem	233,1	100,0	209,8	100,0	221,1	100,0

Tablica II O d r a w Polsce /na wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy w/g płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
Zapadalność na 100.000	277,2	241,2	181,5	170,9	233,1	209,8
%	51,4	48,6	50,9	49,1	51,2	48,8
Zapadalność na 100.000	258,4		176,2		221,1	
%	63,9		36,1		100,0	

Tablica III O d r a Zapadalność na 100.000 w/g płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	100tys.	
Mężczyźni	233,1	277,2	200,2	325,4	207,3	342,2	181,5
Kobiety	209,8	241,2	177,6	284,4	185,2	292,5	170,9
Ogółem	221,1	258,4	188,4	304,0	195,8	316,4	176,2

Tablica IV O d r a Rozkład sezonowy Zapadalność w odsetkach

m-ce	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	br. danych	Razem
%	9,8	7,8	10,6	15,5	18,4	12,9	5,0	1,8	2,4	4,1	5,9	5,3	0,5	100,0

Różyczka w Polsce w 1978 roku (na wybranych terenach)
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	449,9	34,7	421,1	29,7	436,3	32,0
0	169,2	2,9	131,6	2,0	151,5	2,4
1	531,7	8,7	500,0	7,4	516,3	8,0
2	491,0	7,4	504,8	6,9	498,3	7,2
3	490,5	7,1	445,2	6,0	469,0	6,5
4	601,4	8,6	558,3	7,4	580,4	7,9
5-9	541,9	35,4	574,0	34,9	557,8	34,9
5	591,7	8,1	642,3	8,2	616,4	8,1
6	607,5	8,2	637,0	8,0	622,7	8,1
7	640,9	8,1	595,5	7,0	618,6	7,5
8	460,2	5,9	508,7	6,1	484,0	5,9
9	400,9	5,1	477,5	5,6	438,5	5,3
10-14	329,8	22,2	397,5	25,0	363,2	23,3
15-19	64,7	5,4	81,5	6,3	185,2	5,7
20-24	9,8	1,0	25,0	2,1	17,4	1,4
25-29	5,8	0,5	11,8	1,0	8,8	0,6
30-34	3,6	0,3	5,9	0,4	4,7	0,2
35-39	1,5	0,1	1,5	0,1	1,5	0,1
40-44	0,4	0,1	2,5	0,2	1,4	0,1
45-49	0,7	0,1	0,3	0,1	0,5	0,1
50-54	0,9	0,1	-	-	0,4	0,1
55-59	-	-	1,1	0,1	0,6	0,1
60 i >	0,2	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1
NN						1,3
Ogółem	120,0	100,0	117,1	100,0	119,0	100,0

Różyczka w Polsce w 1978 r. (na wybranych terenach)
Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	177,8	164,5	52,6	58,3	120,0	117,1
%	49,8	50,2	46,8	53,2	49,0	51,0
Zapadalność na 100 000	171,0		55,5		119,0	
%	79,0		21,0		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	120,1	177,8	91,0	151,3	180,3	249,7	52,6
K	117,2	164,5	81,7	138,9	186,8	222,6	58,3
Ogółem	119,0	171,0	86,2	144,9	183,9	235,6	55,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	6,6
II	6,8
III	10,8
IV	12,8
V	16,6
VI	12,0
VII	6,2
VIII	3,3
IX	3,2
X	5,2
XI	7,5
XII	8,4
NN	0,6
Razem	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1978 r. (na wybranych terenach). Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1341,2	24,9	1158,9	23,1	1252,4	24,0
0	84,0	0,3	84,9	0,4	84,4	0,4
1	328,1	1,3	260,8	1,1	295,5	1,2
2	1168,8	4,3	946,4	3,7	1061,2	4,0
3	2193,8	7,6	1953,7	7,4	2075,9	7,5
4	3297,3	11,4	2838,8	10,5	3073,7	10,9
5-9	3081,4	48,6	2766,0	47,5	2926,9	47,6
5	3480,8	11,5	298,5	10,7	3238,7	11,0
6	3733,0	12,2	3260,5	11,6	3501,8	11,8
7	3447,4	10,5	3213,5	10,7	3332,5	10,5
8	2607,0	8,1	2399,0	8,1	2505,1	8,0
9	2061,9	6,3	1924,4	6,4	1994,5	6,3
10-14	1237,0	20,1	1229,7	21,6	1233,4	20,7
15-19	169,7	3,4	157,5	3,4	163,7	3,4
20-24	27,8	0,6	48,7	1,1	38,1	0,8
25-29	26,2	0,5	54,0	1,1	40,0	0,8
30-34	32,8	0,4	47,4	0,6	40,1	0,5
35-39	20,3	0,2	18,5	0,3	19,4	0,3
40-44	12,7	0,2	10,6	0,2	11,7	0,2
45-49	6,1	0,1	6,8	0,1	6,5	0,1
50-54	2,6	0,03	8,3	0,1	5,7	0,07
55-59	8,5	0,1	8,7	0,1	5,7	0,07
60 i >	2,5	0,1	1,5	0,1	2,0	0,06
NN	-	0,8	-	0,7	-	1,4
Ogółem	498,9	100,0	417,1	100,0	456,8	100,0

Nagminne zapalenie przyuszniczy w Polsce (na wybranych terenach)

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	578,6	473,1	397,9	341,1	498,9	417,1
%	52,9	47,1	53,2	46,8	53,0	47,0
Zapadalność na 100 000	523,6		369,1		456,8	
%	63,1		36,9		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	495,2	578,6	486,4	518,8	417,2	765,8	397,9
K	417,1	473,1	387,0	435,0	351,5	622,3	341,1
Ogółem	456,8	523,6	434,4	475,2	383,0	691,2	456,8

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,6
II	7,5
III	8,2
IV	9,3
V	9,4
VI	7,4
VII	4,5
VIII	2,9
IX	5,0
X	11,0
XI	14,5
XII	11,2
NN	0,5
Razem	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1978 roku (065,323) na wybranych terenach. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	5,8	55,0	6,7	60,8	6,3	57,8
0	8,2	16,7	12,3	24,3	10,2	20,5
1	7,2	14,4	12,7	24,3	9,9	19,3
2	7,7	14,4	2,8	4,9	5,3	9,6
3	4,1	7,1	1,4	2,4	2,8	4,8
4	1,4	2,4	2,9	4,9	2,1	3,6
5-9	2,4	18,9	0,3	2,5	1,4	10,9
5	2,8	4,7	1,5	2,4	2,2	3,6
6	2,9	4,7	-	-	1,5	2,4
7	1,5	2,4	-	-	0,8	1,3
8	4,6	7,1	-	-	2,3	3,6
9	-	-	-	-	-	-
10-14	0,3	2,4	0,9	7,4	0,6	4,8
15-19	-	-	0,5	4,9	0,2	2,4
20-24	0,2	2,4	0,2	2,4	0,2	2,4
25-29	0,5	4,7	-	-	0,3	2,4
30-34	0,8	4,7	0,4	2,4	0,6	3,6
35-39	0,4	2,4	0,8	4,9	0,6	3,6
40-44	0,4	2,4	1,1	7,4	0,7	4,8
45-49	0,7	4,7	-	-	0,4	2,4
50-54	-	-	-	-	-	-
55-59	0,7	2,4	1,1	4,9	0,9	3,6
60 i >	-	-	0,1	2,4	0,1	1,3
Ogółem	1,0	100,0	0,9	100,0	0,9	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1978 r. na wybranych terenach.

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	0,8	0,9	1,2	0,9	1,0	0,9
%	46,3	53,7	54,8	45,2	46,3	53,7
Zapadalność na 100 000	0,9		1,1		0,9	
%	54,2		45,8		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	1,0	0,8	0,1	1,1	0,6	1,2	1,2
K	0,9	0,9	0,7	0,4	1,4	1,0	0,9
Ogółem	0,9	0,9	0,4	0,7	1,0	1,1	1,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,4
II	18,1
III	7,2
IV	3,6
V	8,4
VI	6,0
VII	12,0
VIII	7,2
IX	14,6
X	4,9
XI	6,0
XII	3,6
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (320) w Polsce w 1978 roku.
(na wybranych terenach). Zapadalność i podział procentowy wg
płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	40,9	49,5	26,3	56,0	33,8	51,8
0	80,5	21,3	40,6	18,9	61,1	20,4
1	51,5	13,2	47,1	21,1	49,4	16,0
2	21,9	5,2	13,8	5,7	18,0	5,4
3	23,0	5,2	14,0	5,7	18,6	5,4
4	20,5	4,6	11,5	4,6	16,1	4,6
5-9	9,3	9,5	5,6	10,3	7,5	9,8
5	10,0	2,1	10,4	4,0	10,2	2,8
6	14,4	3,1	3,0	1,1	8,8	2,4
7	15,5	3,1	8,0	2,9	11,8	3,0
8	4,6	0,9	4,8	1,7	4,7	1,2
9	1,5	0,3	1,6	0,6	1,6	0,4
10-14	6,1	6,5	1,8	3,4	4,0	5,4
15-19	4,8	6,2	1,7	4,0	3,3	5,4
20-24	4,7	6,5	1,1	2,9	2,9	5,2
25-29	3,5	4,3	1,3	2,9	2,4	3,8
30-34	4,3	3,4	1,2	1,7	2,8	2,8
35-39	3,8	3,1	1,5	2,3	2,7	2,8
40-44	4,0	3,4	2,1	3,4	3,1	3,4
45-49	1,8	1,5	0,7	1,1	1,2	1,4
50-54	2,2	1,5	0,7	1,1	1,4	1,4
55-59	3,3	1,5	1,0	4,0	3,6	2,4
60 i >	2,1	3,1	1,3	5,2	1,6	3,8
NN	-	-	-	1,7	-	0,6
Ogółem	7,6	100,0	3,9	100,0	5,7	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (320) w Polsce w 1978 roku (na wybranych terenach). Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	7,0	2,9	8,4	5,1	7,6	3,9
%	68,7	31,3	61,8	38,2	65,0	35,0
Zapadalność na 100 000	4,9		6,7		5,7	
%	46,6		53,4		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	7,6	7,0	6,5	8,3	5,6	7,3	8,4
K	3,9	2,9	2,8	3,6	3,2	2,5	5,1
Ogółem	5,7	4,9	4,6	5,9	4,3	5,8	6,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,8
II	6,4
III	9,4
IV	9,4
V	10,0
VI	9,2
VII	8,6
VIII	7,2
IX	8,0
X	10,0
XI	5,0
XII	7,2
NN	0,8
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce (0,45;0792) w 1978 roku
(na wybranych terenach). Zapadalność i podział procentowy wg płci
i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	21,6	28,5	13,9	29,4	17,9	28,8
0	22,2	6,4	12,3	5,6	17,4	6,1
1	15,6	4,4	10,2	4,5	13,0	4,4
2	15,5	4,0	15,1	6,2	15,3	4,8
3	23,0	5,7	11,2	4,5	17,2	5,3
4	32,9	8,1	21,6	8,5	27,4	8,2
5-9	30,5	34,2	14,0	25,4	22,4	30,9
5	39,8	9,4	14,9	5,6	27,7	8,0
6	47,6	11,1	12,0	4,5	30,2	8,6
7	27,9	6,0	19,3	6,8	23,6	6,3
8	18,3	4,0	12,7	4,5	15,6	4,2
9	17,0	3,7	12,3	4,0	14,2	3,8
10-14	14,0	16,1	6,1	11,3	10,1	14,3
15-19	5,5	7,7	2,0	4,5	3,8	6,5
20-24	1,6	2,4	2,1	5,1	1,8	3,4
25-29	1,8	2,4	4,1	9,0	2,9	4,9
30-34	2,8	2,4	2,8	4,0	2,8	3,0
35-39	2,7	2,4	1,5	2,3	2,1	2,3
40-44	1,5	1,3	1,1	1,7	1,3	1,5
45-49	-	-	0,7	1,1	0,4	0,4
50-54	0,4	0,3	1,8	2,8	1,2	1,3
55-59	2,6	1,3	-	-	1,2	0,8
60 i >	0,4	0,7	0,3	1,1	0,3	0,8
NN	-	0,3	-	2,3	-	1,1
Ogółem	7,0	100,0	3,9	100,0	5,4	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (045,0792) w Polsce w 1978 roku. na wybranych terenach. Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	7,6	3,9	6,2	3,9	7,0	3,9
%	64,1	35,9	60,9	39,1	62,7	37,3
Zapadalność na 100 000	5,7		5,1		5,4	
%	57,5		42,5		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg. pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	7,0	7,6	5,0	6,1	6,6	10,7	6,2
K	3,9	3,9	2,5	2,2	3,5	6,1	3,9
Ogółem	5,4	5,7	3,7	4,1	5,0	8,3	5,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	4,6
II	3,6
III	4,6
IV	9,5
V	7,0
VI	8,2
VII	10,9
VIII	12,0
IX	10,7
X	13,5
XI	7,8
XII	7,6
Razem	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w 1978 roku na wybranych terenach Polski. Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	98,3	4,7	93,8	4,2	96,1	4,5
0	25,7	0,3	27,1	0,3	26,3	0,3
1	39,5	0,4	24,2	0,2	32,1	0,3
2	77,3	0,7	59,1	0,5	68,5	0,6
3	146,3	1,3	154,5	1,3	150,3	1,3
4	224,7	2,0	224,5	1,9	224,6	2,0
5-9	355,5	14,6	397,3	15,4	376,0	15,0
5	277,4	2,4	311,5	2,5	294,0	2,5
6	399,7	3,4	412,7	3,3	406,0	3,4
7	394,7	3,1	410,9	3,1	402,7	3,1
8	370,0	3,0	410,2	3,1	389,7	3,0
9	339,0	2,7	446,9	3,4	392,0	3,0
10-14	350,8	14,8	349,8	13,9	350,3	14,3
15-19	246,8	12,7	196,8	9,6	222,3	11,2
20-24	177,4	9,8	218,2	11,5	197,5	10,6
25-29	168,1	8,2	205,9	9,7	186,8	8,9
30-34	179,6	5,6	195,3	6,0	187,5	5,8
35-39	109,7	3,5	107,0	3,4	108,3	3,5
40-44	117,2	4,0	109,0	3,7	113,0	3,8
45-49	134,8	4,6	126,3	4,5	130,4	4,5
50-54	162,0	4,6	141,3	4,7	150,7	4,7
55-59	207,8	3,9	177,1	3,9	191,0	3,9
60 i >	153,5	9,0	111,0	9,5	128,1	9,3
Ogółem	190,9	100,0	183,4	100,0	187,1	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w Polsce w 1978 r. (na wybranych terenach)
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	177,4	173,0	206,6	196,3	190,9	183,4
%	48,5	51,5	50,7	49,3	49,6	50,4
Zapadalność na 100 000	175,1		201,4		187,1	
%	51,2		48,8		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	190,9	177,4	173,7	181,8	124,4	207,5	206,6
K	183,4	173,0	165,9	179,3	120,0	204,6	196,3
Ogółem	187,1	175,1	169,6	180,5	122,1	206,0	201,4

Rozkład sezonowy
zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	10,4
II	8,8
III	7,8
IV	7,1
V	6,5
VI	6,3
VII	6,6
VIII	8,4
IX	10,1
X	9,7
XI	9,4
XII	8,9
Razem	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby na wybranych terenach Polski
w roku 1978

Sezonowość i zapadalność na 100 tys. według wieku

Miesiąc	Wiek w latach			
	0 - 14		15 i więcej	
	zapadalność na 100 000	%	zapadalność na 100 000	%
I	394,6	12,5	179,4	9,3
II	278,4	8,8	171,1	8,8
III	222,2	7,0	160,0	8,3
IV	202,2	6,4	143,3	7,4
V	171,3	5,4	137,2	7,1
VI	145,5	4,6	138,6	7,2
VII	163,8	5,2	141,9	7,3
VIII	241,1	7,6	170,2	8,8
IX	332,2	10,5	190,7	9,8
X	326,5	10,3	182,1	9,4
XI	341,9	10,8	169,1	8,7
XII	342,5	10,9	152,1	7,9
Ogółem	263,5	100,0	161,3	100,0