

**Czerwonka** w Polsce w **1979** roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	127,8	64,2	107,2	52,1	117,7	58,2
0	44,3	4,9	38,1	4,0	41,3	4,4
1	166,4	17,8	166,7	17,1	166,6	17,4
2	206,2	20,4	163,7	15,5	185,6	18,0
3	136,9	12,9	113,8	10,5	125,5	11,8
4	89,0	8,3	54,7	4,9	72,3	6,6
5-9	34,1	14,6	32,7	13,7	33,4	14,1
5	64,0	5,7	62,6	5,5	63,3	5,6
6	39,0	3,4	39,2	3,4	39,1	3,4
7	24,8	2,0	28,9	2,3	26,8	2,2
8	16,8	1,4	19,1	1,6	17,9	1,5
9	23,2	1,9	11,3	0,9	17,4	1,4
10-14	4,9	2,2	10,9	4,7	7,9	3,4
15-19	5,7	3,1	8,6	4,6	7,2	3,8
20-24	2,4	1,4	6,4	3,6	4,4	2,5
25-29	6,3	3,2	9,3	4,7	7,8	3,9
30-34	7,5	2,4	12,3	4,0	9,9	3,3
35-39	5,0	1,7	3,4	1,2	4,2	1,4
40-44	4,0	1,4	6,7	2,5	5,4	1,9
45-49	3,6	1,3	4,1	1,6	3,9	1,4
50-54	5,6	1,7	6,5	2,3	6,1	2,0
55-59	5,3	1,0	7,0	1,7	6,2	1,4
60	3,1	1,9	3,6	3,4	3,4	2,6
Ogółem	18,4	100,0	17,0	100,0	17,7	100,0

Czerwonka w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
 Liczba i zapadalność na 100 000 wg wieku i środowiska

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000
0	36	42,0	33	40,6	69	41,3
1	205	245,5	65	82,7	270	166,6
2	213	281,0	66	88,6	279	185,6
3	127	173,7	55	76,5	182	125,5
4	81	111,6	22	31,5	103	72,3
5	59	85,5	28	40,9	87	63,3
6	34	50,0	19	28,1	53	39,1
7	20	32,2	14	21,6	34	26,8
8	12	19,4	11	16,6	23	17,9
9	14	23,1	8	12,1	22	17,4
10-14	27	8,5	26	7,3	53	7,9
15-19	24	6,0	35	8,2	59	7,2
20-24	27	5,0	12	3,5	39	4,4
25-29	28	5,5	33	12,1	61	7,8
30-34	34	10,5	16	8,8	50	9,9
35-39	11	3,5	11	5,3	22	4,2
40-44	21	6,5	9	3,9	30	5,4
45-49	14	4,4	8	3,2	22	3,9
50-54	14	5,1	17	7,3	31	6,1
55-59	11	6,5	10	6,0	21	6,2
60 >	20	3,4	21	3,5	41	3,4
Ogółem	1032	21,5	519	13,0	1551	17,7

Czerwonka w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	22,4	20,7	13,7	12,4	18,4	17,0
%	49,8	50,2	51,8	48,2	50,5	49,5
Zapadalność na 100 000	21,5		13,0		17,7	
%	66,5		33,5		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	18,4	22,4	10,3	41,1	17,6	22,9	13,7
K	17,0	20,7	9,5	42,4	13,0	20,7	12,4
Ogółem	17,7	21,5	9,9	41,8	15,2	21,7	13,0

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	1,4
II	1,5
III	1,1
IV	1,4
V	1,4
VI	5,5
VII	10,0
VIII	24,3
IX	31,3
X	12,3
XI	7,0
XII	2,8
Razem	100,0

Krztusiec w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	9,7	73,1	12,1	64,3	10,8	68,0
0	12,8	21,2	19,7	22,9	16,2	22,1
1	19,2	30,8	20,4	22,9	19,7	26,2
2	3,9	5,8	6,9	7,5	5,3	6,6
3	2,7	3,8	5,6	5,7	4,1	4,9
4	8,2	11,5	5,8	5,7	7,0	8,2
5-9	2,1	13,5	6,5	30,0	4,3	23,0
5	1,4	1,9	7,4	7,1	4,4	4,9
6	0	0	7,5	7,1	3,7	4,1
7	3,1	3,8	11,2	10,0	7,1	7,4
8	7,3	7,7	1,6	1,4	3,9	4,1
9	0	0	4,8	4,4	2,4	2,5
10-14	1,7	11,6	1,2	5,7	1,5	8,2
15-19	0,2	1,9	0	0	0,1	0,8
Ogółem	1,2	100,0	1,5	100,0	1,4	100,0

Krzyszczak w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
 Liczba zachorowań i zapadalność wg wieku i środowiska.

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapadalność na 100 000	liczba	zapadalność na 100 000	liczba	zapadalność na 100 000
0	9	10,5	18	22,1	27	22,1
1	16	19,2	16	20,4	32	19,7
2	5	6,6	3	4,0	8	5,3
3	2	2,7	4	5,6	6	4,9
4	5	6,9	5	7,2	10	7,0
5	3	4,3	3	4,4	6	4,4
6	3	4,4	2	3,0	5	3,7
7	5	8,0	4	6,2	9	7,1
8	5	8,1	0	0	5	3,9
9	2	3,3	1	1,5	3	2,4
10-14	4	1,3	6	1,7	10	1,5
15-19	1	0,2	0	0	1	0,1
Ogółem	60	1,2	62	1,6	122	100,0

Krztusiec w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,3	1,2	1,1	2,0	1,2	1,5
%	51,7	48,3	33,9	66,1	42,6	57,4
Zapadalność na 100 000	1,2		1,6		1,4	
%	49,2		50,8		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	1,2	1,3	1,6	1,8	0,4	1,5	1,1
K	1,5	1,2	1,8	0,8	1,0	1,0	2,0
Ogółem	1,4	1,2	1,7	1,3	0,7	1,2	1,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	5,0
II	12,3
III	7,9
IV	7,3
V	4,1
VI	9,0
VII	8,2
VIII	14,8
IX	8,2
X	10,7
XI	4,9
XII	8,2
Ogółem	100,0

Płonica w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	276,4	28,8	260,6	26,4	268,7	27,6
0	22,2	0,5	14,8	0,3	18,6	0,4
1	79,0	1,7	80,2	1,7	79,6	1,7
2	284,8	5,9	233,8	4,6	260,1	5,3
3	466,1	9,1	449,4	8,7	457,9	8,9
4	600,0	11,6	587,1	11,1	593,7	11,3
5-9	555,4	49,2	564,7	49,2	559,9	49,2
5	655,8	12,2	617,0	11,2	636,8	11,7
6	630,6	11,6	623,5	11,2	627,1	11,5
7	651,7	11,2	629,2	10,6	640,7	10,9
8	458,7	7,9	535,8	9,3	496,5	8,5
9	366,9	6,3	410,0	6,9	388,0	6,6
10-14	195,1	17,8	230,9	20,7	212,6	19,2
15-19	25,2	2,8	19,8	2,2	22,5	2,5
20-24	3,8	0,5	4,8	0,6	4,3	0,5
25-29	0,8	0,1	2,9	0,2	1,5	0,2
30-34	0,8	0,05	1,6	0,1	1,2	0,1
35-39	0,4	0,03	0,8	0,05	0,6	0,04
40-44	0	0	0	0	0	0
45-49	0,4	0,03	0,3	0,03	0,4	0,03
50-54	0	0	0	0	0	0
55-59	0	0	0	0	0	0
60 >	0	0	0	0	0	0
NN	-	0,8	-	0,5	-	0,7
Ogółem	88,4	100,0	81,5	100,0	84,9	100,0

Płonica w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność na 100 000 wg wieku i środowiska

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000	liczba	zapadal- ność na 100 000
0	24	28,0	7	86,1	31	18,6
1	101	121,0	28	35,6	129	79,6
2	307	405,0	84	112,8	391	260,1
3	553	756,5	111	154,4	664	457,9
4	725	998,6	121	173,1	846	593,7
5	710	1029,0	165	241,2	875	636,8
6	695	1022,1	156	230,4	851	627,1
7	664	1067,5	149	230,3	813	640,7
8	501	809,4	136	204,8	637	496,5
9	390	644,6	102	153,8	492	388,0
10-14	1053	332,5	378	106,1	1431	212,6
15-19	105	26,2	81	19,1	186	22,5
20-24	22	4,1	16	4,7	38	4,3
25-29	8	1,6	4	1,5	12	1,5
30-34	3	0,9	3	1,7	6	1,2
35-39	1	0,3	2	1,0	3	0,6
40-44	0	0	0	0	0	0
45-49	1	0,3	1	0,4	2	0,4
50-54	0	0	0	0	0	0
55-59	0	0	0	0	0	0
60 >	0	0	0	0	0	0
NN	42	-	7	-	49	-
Ogółem	5905	123,0	1551	38,9	7456	84,9



Płonica w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	132,9	113,9	36,5	41,3	88,4	81,5
%	51,7	48,3	46,4	53,6	50,6	49,4
Zapadalność na 100 000	123,0		38,9		84,9	
%	79,2		20,8		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

Płeć	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	88,4	132,9	95,3	115,0	104,0	184,7	36,5
K	81,5	113,9	79,4	110,6	90,8	152,5	41,3
Ogółem	84,9	123,0	87,0	112,7	97,1	167,9	38,9

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	3,3
II	3,7
III	5,6
IV	5,5
V	6,9
VI	3,3
VII	3,1
VIII	3,4
IX	8,8
X	16,6
XI	18,9
XII	20,9
Ogółem	100,0

Tabela I.

ODNA w 1979 roku /na wybranych terenach/

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

GRUPY WIEKU	MĘŻCZYZNI			KOBIECY			OGÓLEM		
	l.zachor.	zapadal.	%	l.zachor.	zapadal.	%	l.zachor.	zapadal.	%
0 - 4	863	219,3	37,3	808	216,4	35,8	1 671	217,9	36,6
0	27	31,5	1,2	32	39,4	1,4	59	35,3	1,3
1	324	388,0	14,0	290	368,9	12,9	614	378,8	13,4
2	222	286,1	9,6	178	244,8	7,9	400	266,1	8,8
3	160	216,6	6,9	154	216,3	6,8	314	216,6	6,9
4	130	178,1	5,6	154	221,6	6,8	284	199,3	6,2
5 - 9	949	283,9	41,0	963	300,1	42,8	1 912	291,9	41,9
5	165	234,7	7,1	157	233,9	7,0	322	234,4	7,1
6	133	191,9	5,7	151	227,4	6,7	284	209,3	6,2
7	203	314,2	8,8	209	335,5	9,3	412	324,7	9,0
8	263	402,1	11,4	247	392,7	11,0	510	397,5	11,2
9	185	286,4	8,0	199	319,9	8,8	384	302,8	8,4
10 -14	387	112,7	16,7	403	122,3	17,9	790	117,4	17,3
15 -19	77	18,3	3,3	51	12,6	2,3	128	15,5	2,8
20 -24	22	4,9	1,0	16	3,7	0,7	38	4,3	0,8
25 -29	5	1,3	0,2	4	1,0	0,2	9	1,1	0,2
30 -34	2	0,8	0,08	2	0,8	0,1	4	0,8	0,1
35 -39	-	-	-	1	0,4	0,04	1	0,2	0,02
40 -44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 -49	1	0,4	0,04	1	0,3	0,04	2	0,4	0,04
50 -54	-	-	-	1	0,4	0,04	1	0,2	0,02
55 -59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 i >	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brak danych	9	-	0,4	2	-	0,1	11	-	0,3
Ogółem	2 315	54,3	100,0	2 252	49,8	100,0	4 567	51,9	100,0

Tabela II.  
ODRA 1970. Zapadalność i udział % wg płci i środowiska

	M I A S T O		W I E Ś		O G Ó Ł E M	
	M	K	M	K	M	K
Zapadaln./100000	53,1	48,2	55,6	51,9	54,9	49,8
%	50,3	49,7	51,1	48,9	50,7	49,3
Zapadaln./100000	50,5		53,7		51,9	
%	53,1		46,9		100,0	

Tabela III.  
Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska  
oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M I A S T O					W I E Ś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	54,3	53,1	59,1	52,9	45,9	53,3	55,6
K	49,8	48,2	55,6	41,0	48,5	46,8	51,9
Ogółem	51,9	50,5	57,3	46,7	47,2	49,9	53,7

Tabela IV.  
Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

MIESIĄC	%
I	16,5
II	13,9
III	15,8
IV	13,1
V	12,1
VI	8,5
VII	4,6
VIII	2,1
IX	1,9
X	2,1
XI	2,8
XII	6,6
Razem	100,0

Różyczka w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach)  
 Zapadalność na 100 tys. i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.,	%	zapad.,	%	zapad.,	%
0-4	495,9	27,2	468,3	22,6	482,5	24,7
0	101,5	1,2	93,5	1,0	97,6	1,1
1	485,0	5,6	502,5	5,1	493,5	5,3
2	514,2	5,6	491,1	4,6	503,0	5,1
3	631,4	6,5	591,3	5,4	611,7	5,9
4	815,1	8,3	718,0	6,4	767,7	7,3
5-9	793,8	36,9	883,4	36,6	837,9	36,7
5	820,8	8,0	833,1	7,2	826,8	7,6
6	707,1	6,8	847,9	7,3	776,0	7,0
7	981,4	8,8	956,7	7,7	969,3	8,3
8	727,8	6,6	828,3	6,7	777,9	6,7
9	736,8	6,6	958,2	7,7	845,4	7,2
10-14	510,0	24,4	671,7	28,6	589,2	26,5
15-19	154,5	9,0	152,1	7,9	153,3	8,4
20-24	18,2	1,1	34,9	2,0	26,4	1,6
25-29	4,8	0,3	16,5	0,8	10,6	0,6
30-34	5,5	0,2	14,6	0,5	10,1	0,3
35-39	2,3	0,08	2,6	0,1	2,5	0,1
40-44	-	-	2,1	0,07	1,1	0,04
45-49	0,4	0,01	0,3	0,01	0,4	0,01
50-54	0,9	0,02	1,4	0,05	1,2	0,04
55-59	0,6	0,01	0,5	0,01	0,6	0,01
60 i	-	-	0,3	0,02	0,2	0,01
Brak danych		0,7		0,7		1,0
Ogółem	168,3	100,0	171,4	100,0	170,4	100,0

Różyczka w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach).

Zapadalność i udział procentowy wg pici i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	235,7	225,5	88,9	103,0	168,3	171,4
%	49,0	51,0	45,7	54,3	48,0	52,0
Zapadalność na 100 000	230,4		96,1		170,4	
%	74,4		25,6		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg pici i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	168,3	235,7	169,6	222,2	192,5	312,3	88,9
K	171,4	225,5	158,4	208,0	192,1	300,3	103,0
Ogółem	170,4	230,4	163,8	214,8	192,3	306,0	96,1

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	6,8
II	8,3
III	17,3
IV	19,5
V	22,8
VI	8,3
VII	3,0
VIII	1,9
IX	1,8
X	2,2
XI	3,2
XII	4,4
NN	0,3
Razem	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach). Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	881,1	24,9	697,3	21,5	791,6	23,4
0	67,7	0,4	41,8	0,3	55,1	0,4
1	224,0	1,3	190,8	1,2	207,9	1,3
2	711,3	4,0	536,5	3,2	626,7	3,6
3	1474,3	7,8	1120,8	6,6	1300,7	7,3
4	2168,5	11,4	1771,2	10,2	1974,7	10,8
5-9	2030,8	48,9	1816,8	48,2	1926,0	48,6
5	2052,6	10,4	1791,4	9,9	1925,0	10,2
6	2202,0	11,0	1989,5	10,9	2098,0	10,9
7	2483,0	11,6	2247,2	11,6	2367,2	11,6
8	1834,9	8,6	1642,3	8,6	1740,5	8,6
9	1569,7	7,3	1405,1	7,2	1489,0	7,3
10-14	812,2	20,1	844,1	23,0	827,8	21,4
15-19	116,9	3,5	110,1	3,7	113,6	3,6
20-24	20,3	0,7	30,3	1,1	25,2	0,9
25-29	22,9	0,7	34,0	1,1	28,4	0,9
30-34	20,1	0,4	27,7	0,6	23,9	0,5
35-39	11,1	0,2	9,1	0,2	10,1	0,2
40-44	11,6	0,2	4,3	0,1	7,9	0,1
45-49	3,2	0,1	6,5	0,2	4,9	0,1
50-54	5,2	0,1	5,8	0,1	5,5	0,1
55-59	3,9	0,1	3,8	0,1	3,9	0,1
60 i >	2,1	0,1	1,7	0,1	1,8	0,1
Ogółem	325,0	100,0	267,5	100,0	295,4	100,0

Nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach), Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	356,1	290,0	288,7	239,5	325,0	267,5
%	53,0	47,0	54,1	45,9	53,4	46,6
Zapadalność na 100 000	321,6		263,8		295,4	
%	59,5		40,5		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	325,0	356,1	358,1	297,9	271,0	435,2	288,7
K	267,0	290,0	282,8	243,8	223,4	358,5	239,5
Ogółem	295,4	321,6	318,7	269,7	246,7	395,3	263,8

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	14,3
II	12,8
III	12,9
IV	11,5
V	9,5
VI	6,3
VII	3,1
VIII	1,5
IX	2,6
X	6,1
XI	8,6
XII	10,8
Razem	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w roku 1979 ( 65:323) na wybranych terenach. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	6,9	42,1	4,0	46,9	5,5	43,8
0	8,2	10,9	8,6	21,9	8,4	14,6
1	14,4	18,7	6,4	15,6	10,5	17,7
2	6,4	7,8	1,4	3,1	4,0	6,3
3	1,4	1,6	2,8	6,3	2,1	3,1
4	2,7	3,1	-	-	1,4	2,1
5-9	3,9	20,3	1,2	12,5	2,6	17,7
5	7,1	7,8	-	-	3,6	5,2
6	1,4	1,6	3,0	6,3	2,2	3,1
7	1,5	1,6	1,6	3,1	1,6	2,1
8	3,1	3,1	-	-	1,6	2,1
9	6,2	6,2	1,6	3,1	3,9	5,2
10-14	0,9	4,7	0,3	3,1	0,6	4,2
15-19	1,0	6,3	0,2	3,1	0,6	5,2
20-24	1,1	7,8	0,5	6,3	0,8	7,2
25-29	0,5	3,1	1,0	12,5	0,8	6,3
30-34	0,8	3,1	0,8	6,3	0,8	4,2
35-39	1,2	4,7	0,4	3,1	0,8	4,2
40-44	0,4	1,6	-	-	0,2	1,0
45-49	0,4	1,6	-	-	0,2	1,0
50-54	-	-	0,4	3,1	0,2	1,0
55-59	1,3	3,1	-	-	0,6	2,1
60 i >	0,2	1,6	0,1	3,1	0,2	2,1
Ogółem	1,5	100,0	0,7	100,0	1,1	100,0



Zapalenie mózgu w Polsce w 1979 roku na wybranych terenach.  
Zapadalność na 100 000 i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,3	0,6	1,7	0,9	1,5	0,7
%	68,2	31,8	63,4	34,6	66,7	33,3
Zapadalność na 100 000	0,9		1,3		1,1	
%	45,8		54,2		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	1,5	1,3	1,4	0,9	0,2	2,1	1,7
K	0,7	0,6	0,7	0,6	-	0,8	0,9
Ogółem	1,1	0,9	1,0	0,7	0,1	1,4	1,3

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	6,3
II	7,2
III	7,2
IV	8,3
V	9,7
VI	10,4
VII	8,3
VIII	5,1
IX	12,5
X	6,3
XI	6,3
XII	11,4
NN	1,0
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne (320) w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach). Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg pici i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	42,4	44,7	35,4	53,7	39,0	48,3
0	64,2	14,7	61,5	20,3	62,9	17,0
1	60,0	13,4	56,0	17,9	58,0	15,2
2	30,9	6,4	23,4	7,0	27,3	6,6
3	32,5	6,4	19,7	5,7	26,2	6,1
4	19,2	3,8	10,1	2,8	14,7	3,4
5-9	16,5	14,7	8,7	11,4	12,7	13,4
5	17,1	3,2	16,4	4,5	16,7	3,7
6	23,1	4,3	3,0	0,8	13,3	2,9
7	15,5	2,7	11,2	2,8	13,4	2,7
8	12,2	2,1	9,5	2,5	10,9	2,3
9	13,9	2,4	3,2	0,8	8,7	1,8
10-14	4,7	4,3	5,8	7,7	5,2	5,7
15-19	6,9	7,8	3,0	4,9	5,0	6,6
20-24	4,7	5,6	2,8	4,9	3,7	5,3
25-29	3,3	3,5	1,8	2,8	2,5	3,2
30-34	4,3	3,0	2,8	2,8	3,6	2,9
35-39	2,7	1,9	1,1	1,2	1,9	1,6
40-44	3,6	2,7	1,1	1,2	2,3	2,1
45-49	3,2	2,4	1,0	1,2	2,1	2,0
50-54	4,3	2,7	1,4	1,6	2,8	2,3
55-59	7,9	3,2	2,7	2,1	5,0	2,7
60 i	2,7	3,5	1,5	4,5	2,0	3,9
Ogółem	8,7	100,0	5,4	100,0	7,0	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne (320) w Polsce w 1979 r. (na wybranych terenach). Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	8,2	5,1	9,4	5,9	8,7	5,4
%	59,7	40,3	60,9	39,1	60,3	39,7
Zapadalność na 100 000	6,6		7,6		7,0	
%	50,9		49,1		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	8,7	8,2	8,8	5,5	8,4	9,1	9,4
K	5,4	5,1	5,4	3,4	4,7	5,8	5,9
Ogółem	7,0	6,6	7,1	4,4	6,5	7,4	7,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	8,1
II	7,4
III	8,6
IV	9,9
V	9,7
VI	9,7
VII	11,3
VIII	6,9
IX	6,9
X	6,6
XI	8,6
XII	6,3
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - surowicze (045;079) w Polsce w 1979 roku (na wybranych terenach). Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	43,2	27,9	24,9	26,1	34,3	27,2
0	39,7	5,6	20,9	4,8	30,5	5,3
1	27,5	3,8	12,7	2,8	20,4	3,4
2	30,9	3,9	19,3	3,9	25,3	3,9
3	39,3	4,8	29,5	5,9	34,5	5,2
4	82,2	9,8	44,6	8,7	63,9	9,4
5-9	61,9	34,0	33,3	30,0	47,9	32,6
5	66,9	7,7	37,3	7,0	52,4	7,5
6	76,5	8,7	27,1	5,1	52,3	7,4
7	60,4	6,4	40,1	7,0	49,9	6,6
8	56,6	6,1	31,8	5,6	44,4	5,9
9	48,0	5,1	30,5	5,3	39,4	5,2
10-14	30,0	16,9	13,9	12,9	22,1	15,5
15-19	9,5	6,6	7,9	9,0	8,7	7,5
20-24	5,6	4,1	4,1	5,1	4,9	4,5
25-29	6,6	4,3	5,7	6,2	6,1	5,0
30-34	5,9	2,5	5,5	3,9	5,7	3,0
35-39	1,5	0,6	1,9	1,4	1,7	0,9
40-44	2,5	1,1	0,7	0,6	1,6	0,9
45-49	1,8	0,8	1,7	1,4	1,8	1,0
50-54	0,4	0,2	2,1	1,7	1,4	0,8
55-59	2,6	0,6	1,1	0,6	1,8	0,6
60 i >	0,2	0,2	0,6	1,1	0,4	0,5
NN	-	0,2	-	-	-	0,1
Ogółem	14,3	100,0	7,9	100,0	11,0	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych surowicze (045;079) w Polsce w 1979 roku na wybranych terenach. Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	15,5	8,9	12,8	6,6	14,3	7,9
%	61,7	38,3	65,3	34,7	63,1	36,9
Zapadalność na 100 000	12,1		9,7		11,0	
%	60,0		40,0		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	14,3	15,5	13,9	9,7	11,4	22,3	12,8
K	7,9	8,9	7,1	6,7	6,7	12,6	6,6
Ogółem	11,0	12,1	10,3	8,1	8,9	17,2	9,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	3,0
II	3,7
III	2,6
IV	3,4
V	5,0
VI	16,1
VII	22,7
VIII	18,8
IX	12,2
X	6,8
XI	3,7
XII	1,9
NN	0,1
Razem	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w 1979 roku na wybranych terenach Polski. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg pici i wieku

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	60,9	3,7	63,8	4,0	57,9	3,4
0	26,3	0,3	29,2	0,4	23,4	0,3
1	18,5	0,2	19,2	0,3	17,8	0,2
2	39,9	0,5	49,0	0,6	30,3	0,4
3	84,1	1,0	86,7	1,0	81,5	0,9
4	148,1	1,7	147,9	1,7	148,2	1,6
5-9	246,4	12,7	241,5	12,9	251,5	12,7
5	192,9	2,1	186,3	2,1	199,7	2,1
6	251,3	2,7	241,0	2,7	262,0	2,7
7	267,9	2,7	263,2	2,7	272,9	2,7
8	269,7	2,7	273,7	2,9	265,5	2,6
9	253,9	2,5	247,7	2,5	260,5	2,6
10-14	210,4	11,2	209,0	11,4	211,8	10,9
15-19	146,8	9,6	160,0	10,7	133,1	8,4
20-24	160,2	11,2	136,7	9,8	184,5	12,6
25-29	163,5	10,1	150,2	9,5	177,0	10,8
30-34	155,3	6,2	144,9	5,8	165,7	6,6
35-39	99,6	4,1	100,8	4,2	98,3	4,1
40-44	117,4	5,2	116,5	5,1	118,2	5,2
45-49	117,6	5,3	126,9	5,6	108,8	5,0
50-54	133,7	5,4	149,4	5,5	120,8	5,3
55-59	171,7	4,6	201,8	4,9	146,8	4,2
60 i >	112,9	10,6	137,7	10,5	96,2	10,7
Brak danych	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Ogółem	144,1	100,0	147,1	100,0	141,2	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w Polsce w 1979 r. (na wybranych terenach)

Zapadalność na 100 000 i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	153,4	149,0	139,7	131,4	147,1	141,2
%	48,6	51,4	50,9	49,1	49,6	50,4
Zapadalność na 100 000	151,1		135,5		144,1	
%	57,3		42,7		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	147,1	153,4	162,0	150,2	88,1	186,5	139,7
K	141,2	149,0	164,8	141,9	90,2	190,5	131,4
Ogółem	144,1	151,1	163,5	145,9	89,2	180,9	135,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach według wieku

Miesiąc	ogółem	0-14 lat	15 i > lat
I	10,4	12,5	9,6
II	8,0	7,7	8,1
III	7,4	6,0	8,0
IV	6,7	5,7	7,1
V	6,6	5,3	7,1
VI	6,3	2,9	7,6
VII	6,9	5,3	7,6
VIII	10,0	10,0	10,0
IX	9,7	10,7	9,3
X	10,2	12,3	9,3
XI	9,7	12,6	8,6
XII	8,1	9,1	7,7
Razem	100,0	100,0	100,0

Odsetek WZW z wykrytym antygenem HBs w Polsce w roku 1979 w stosunku do ogólnej liczby zachorowań na WZW w zależności od płci i wieku

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
0-4	18,6	21,5	15,3
0	27,3	16,0	42,1
1	33,3	50,0	14,3
2	28,3	28,9	27,3
3	18,9	21,9	15,5
4	11,8	15,7	7,8
5-9	8,2	9,3	7,2
5	7,2	8,4	6,0
6	8,5	8,4	8,6
7	8,5	10,0	7,1
8	7,5	10,1	4,8
9	9,3	9,4	9,3
10-14	7,3	8,1	6,6
15-19	12,8	12,6	13,0
20-24	32,2	29,5	34,2
25-29	29,0	29,1	39,0
30-34	44,3	43,9	44,6
35-39	49,1	50,6	47,7
40-44	49,8	53,0	46,8
45-49	49,6	48,9	50,3
50-54	52,6	52,0	53,1
55-59	51,6	51,5	51,7
60 i >	53,0	53,4	52,6
Razem	32,1	32,1	32,2



Odsetek WZW z wykrytym antygenem HBs w Polsce w 1979 roku w stosunku do ogólnej liczby zachorowań na WZW w zależności od:

placi i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
%	39,2	39,1	22,9	22,6	32,1	32,2
%	39,1		22,8		32,1	

placi i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	32,1	39,2	29,0	33,0	46,5	45,9	22,9
K	32,2	39,1	31,8	33,0	50,9	43,0	22,6
Ogółem	32,1	31,1	30,5	33,0	48,8	44,5	22,8

od miesiąca w którym nastąpiło zachorowanie

Miesiąc	%
I	28,0
II	31,6
III	37,2
IV	36,0
V	41,0
VI	44,7
VII	36,4
VIII	33,0
IX	28,2
X	27,5
XI	26,3
XII	26,0
Razem	32,1

Wirusowe zapalenie wątroby z wykrytym antygenem HBs w 1979 r.  
na wybranych terenach Polski. Zapadalność na 100 000 i podział  
procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	11,3	2,1	13,7	2,7	8,8	1,6
0	7,2	0,3	4,7	0,2	9,8	0,4
1	6,2	0,2	9,6	0,4	2,5	0,1
2	11,3	0,4	14,2	0,5	8,3	0,3
3	15,9	0,6	19,0	0,7	12,6	0,4
4	17,5	0,6	23,3	0,9	11,5	0,4
5-9	20,3	3,2	22,4	3,8	18,1	2,8
5	13,8	0,5	15,6	0,5	11,9	0,4
6	21,4	0,7	20,2	0,7	22,6	0,7
7	22,9	0,7	26,3	0,9	19,3	0,6
8	20,3	0,6	27,5	0,9	12,7	0,4
9	23,7	0,7	23,2	0,8	24,1	0,7
10-14	15,5	2,6	16,9	2,9	14,0	2,2
15-19	18,8	3,8	20,2	4,2	17,3	3,4
20-24	51,6	11,2	40,3	9,0	63,2	13,4
25-29	63,8	12,3	58,7	11,6	69,0	13,0
30-34	68,7	8,6	63,6	8,0	73,9	9,1
35-39	48,9	6,3	51,0	6,6	46,9	6,1
40-44	58,5	8,0	61,7	8,4	55,4	7,6
45-49	58,3	8,2	62,0	8,5	54,8	7,8
50-54	70,3	8,8	77,7	8,9	64,2	8,7
55-59	88,5	7,3	103,9	7,9	75,8	6,8
60 i >	59,8	17,6	73,5	17,5	50,5	17,5
Razem	46,3	100,0	47,2	100,0	45,5	100,0

WZW z wykrytym antygenem HBs w Polsce w 1979 r. (na wybranych terenach)  
Zapadalność na 100 000 i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	60,1	58,2	32,1	29,7	47,2	45,5
%	48,7	51,3	51,3	48,7	49,5	50,5
Zapadalność na 100 000	59,1		30,8		46,3	
%	69,8		30,2		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	47,2	60,1	47,0	49,6	41,0	85,6	32,1
K	45,5	58,2	52,4	46,9	45,9	75,6	29,7
Ogółem	46,3	59,1	49,8	48,2	43,5	80,6	30,8

Rozkład sezonowy zachorowań  
w odsetkach według wieku

Miesiąc	ogółem	0-14 lat	15 i > lat
I	9,0	11,4	8,8
II	7,9	5,5	8,1
III	8,6	7,4	8,7
IV	7,5	8,6	7,4
V	8,4	9,3	8,3
VI	8,8	5,9	9,0
VII	7,8	6,2	8,0
VIII	10,3	11,7	10,1
IX	8,5	6,2	8,7
X	8,7	10,8	8,5
XI	8,0	10,5	7,8
XII	6,5	6,5	6,6
Razem	100,0	100,0	100,0