

1980

Erztusiec w 1980 roku /na wybranych terenach/.
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	6,6	78,8	5,6	75,0	6,1	77,1
0	14,0	36,4	13,5	39,3	13,8	37,7
1	6,0	15,1	6,4	17,8	6,2	16,4
2	6,4	15,1	4,1	10,8	5,3	13,1
3	2,7	6,1	2,8	7,1	2,8	6,6
4	2,7	6,1	0	0	1,4	3,3
5-9	1,8	18,2	0,9	10,8	1,4	14,7
5	0	0	0	0	0	0
6	2,9	6,1	1,5	3,6	2,2	4,9
7	1,5	3,0	1,6	3,6	1,6	3,3
8	3,1	6,1	1,6	3,6	2,3	4,9
9	1,5	3,0	0	0	0,8	1,6
10-14	0	0	1,2	14,2	0,6	6,6
15-19	0,2	3,0	0	0	0,1	1,6
Ogółem	0,8	100,0	0,6	100,0	0,7	100,0

Krzyszak w Polsce w 1930 roku /na wybranych terenach/.
 Zapadalnoř na 100 000 wg wieku i Źrodowiska.

Grupy wieku	Miasto		Wieř		Ogółem	
	Liczba	zapad. na 100 000	Liczba	zapad. na 100 000	Liczba	zapad. na 100 000
0	12	14,0	11	13,5	23	13,8
1	6	7,2	4	5,1	10	6,2
2	5	6,6	3	4,0	8	5,3
3	3	4,1	1	1,4	4	2,8
4	0	0	2	2,9	2	1,4
5	0	0	0	0	0	0
6	2	2,9	1	1,5	3	2,2
7	0	0	2	3,1	2	1,6
8	2	3,2	1	1,5	3	2,3
9	1	1,7	0	0	1	0,8
10-14	2	0,5	2	0,6	4	0,6
15-19	0	0	1	0,2	2	0,1
Ogółem	33	0,7	28	0,7	61	0,7

Krzusiec w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasta		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	0,7 51,5	0,6 48,5	0,8 57,1	0,6 42,9	0,8 54,1	0,6 45,9
Zapadalność na 100 000	0,7 54,1		0,7 45,9		0,7 100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	0,8	0,7	0,5	0,4	1,3	0,7	0,8
K	0,6	0,6	0,8	0,6	1,2	0,2	0,6
Ogółem	0,7	0,7	0,7	0,5	1,2	0,5	0,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	6,6
II	19,6
III	8,2
IV	4,9
V	6,6
VI	16,4
VII	9,8
VIII	8,2
IX	1,6
X	6,6
XI	4,9
XII	6,6
Razem	100,0

Czerwonka w 1980 roku /na wybranych terenach/
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapadaln.	%	zapadaln.	%	zapadaln.	%
0-4	53,1	66,8	46,3	57,3	49,8	62,1
0	37,3	10,2	30,8	8,3	34,1	9,3
1	63,8	22,4	61,1	15,9	72,8	19,2
2	64,4	16,0	49,5	11,9	57,2	14,0
3	39,3	9,3	59,0	13,9	49,0	11,5
4	38,4	8,9	31,7	7,3	35,1	8,1
5-9	15,9	16,9	12,8	13,6	14,3	15,3
5	32,7	7,3	20,9	4,6	26,9	6,0
6	23,1	5,1	18,1	4,0	20,6	4,5
7	7,7	1,6	14,4	3,0	11,0	2,3
8	6,1	1,3	7,9	1,7	7,0	1,5
9	7,7	1,6	1,6	0,3	4,7	1,0
10-14	1,7	1,9	2,7	3,0	2,2	2,4
15-19	1,4	1,9	4,4	5,9	2,9	3,9
20-24	0,7	1,0	3,3	4,6	1,9	2,7
25-29	1,8	2,2	3,3	4,3	2,5	3,2
30-34	1,6	1,3	2,8	2,3	2,2	1,8
35-39	0,8	0,6	0,8	0,7	0,8	0,7
40-44	1,8	1,6	2,1	2,0	2,0	1,8
45-49	3,6	3,2	1,4	1,3	2,5	2,3
50-54	1,3	1,0	2,2	2,0	1,8	1,5
55-59	2,0	1,0	1,1	0,7	1,5	0,8
60+>	0,4	0,6	1,0	2,3	0,8	1,5
Ogółem	7,3	100,0	6,7	100,0	7,0	100,0

Czerwonka w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	8,5 51,2	7,5 48,8	5,9 30,4	5,7 49,6	7,3 50,9	6,7 49,1
Zapadalność na 100 000	8,0 62,3		5,8 37,7		7,0 100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz
liczby ludności w miastach.

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	7,3	8,5	7,4	8,1	3,0	12,7	5,9
K	6,7	7,5	3,6	10,85	2,8	11,1	5,7
Ogółem	7,0	8,0	5,4	9,4	2,9	11,9	5,8

Rozkład sezonowy zachorowań
w odsetkach

Miesiąc	%
I	2,6
II	1,8
III	2,1
IV	1,8
V	1,6
VI	2,1
VII	4,6
VIII	25,5
IX	38,7
X	15,1
XI	2,8
XII	2,3
Razem	100,0

Płonica w 1980 roku / na wybranych terenach/
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	447,9	23,1	414,7	19,5	431,7	21,2
0	21,0	0,2	25,8	0,3	23,4	0,2
1	117,4	1,3	96,7	1,0	107,3	1,1
2	389,2	4,0	334,3	3,0	362,6	3,5
3	735,8	7,1	661,5	5,9	699,3	6,5
4	1098,6	10,5	1060,4	9,3	1080,0	9,9
5-9	1132,3	49,5	1227,2	49,5	1178,8	49,5
5	1093,9	10,0	1175,9	9,9	1133,9	10,0
6	1134,2	10,3	1199,0	10,0	1165,8	10,1
7	1331,3	11,3	1409,3	11,0	1369,5	11,2
8	1162,1	9,9	1281,4	10,2	1220,6	10,0
9	942,7	8,0	1075,6	8,4	1007,9	8,2
10-14	501,6	22,5	621,4	25,8	560,2	24,2
15-19	67,8	3,7	72,3	3,7	70,1	3,7
20-24	6,5	0,4	11,0	0,6	8,7	0,5
25-29	3,8	0,2	6,7	0,3	5,2	0,3
30-34	2,7	0,1	2,8	0,1	2,8	0,06
35-39	1,2	0,04	1,9	0,06	1,5	0,05
40-44	0,4	0,02	0,7	0,01	0,5	0,02
45-49	-	-	0,3	0,01	0,2	0,01
50-54	-	-	0,4	0,01	0,2	0,01
55-59	-	-	-	-	-	-
60+	0,6	0,04	0,1	0,01	0,3	0,02
Ogółem	179,1	100,0	176,0	100,0	177,5	100,0

Flonica w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność wg wieku i środowiska

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	liczba	zapad.	liczba	zapad.	liczba	zapad.
0	28	32,7	11	13,5	39	23,4
1	126	150,9	48	61,1	174	107,3
2	378	498,7	167	224,2	545	362,6
3	742	1015,0	272	378,3	1014	699,3
4	1142	1573,0	397	568,0	1539	1080,0
5	1131	1639,1	427	624,3	1558	1133,9
6	1153	1695,6	429	633,7	1582	1165,8
7	1237	1988,7	501	774,3	1738	1369,6
8	1091	1762,5	475	715,4	1566	1220,6
9	846	1398,3	432	651,6	1278	1007,9
10-14	2210	697,8	1561	438,0	3771	560,2
15-19	272	68,0	306	72,0	578	70,1
20-24	37	6,8	40	11,7	77	8,7
25-29	21	4,1	20	7,3	41	5,2
30-34	9	2,8	5	2,8	14	2,8
35-39	3	0,9	5	2,4	8	1,5
40-44	2	0,6	1	0,4	3	0,5
45-49	1	0,3	-	-	1	0,2
50-54	-	-	1	0,4	1	0,2
55-59	-	-	-	-	-	-
60 >	3	0,5	1	0,2	4	0,3
NN	39	-	25	-	64	-
Ogółem	10471	218,1	5124	128,6	15595	177,5

PZH 182/81, 85 egz.

Chłonicza w Polsce /na wybranych terenach/w 1980 roku
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000 %	228,0 50,1	209,0 49,9	122,1 46,9	135,0 53,1	179,1 49,0	176,0 51,0
Zapadalność na 100 000 %	218,1 67,1		128,6 32,9		177,5 100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska
oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	179,1	228,0	208,0	183,3	214,0	272,8	122,1
K	176,0	209,0	192,0	178,1	196,3	245,1	135,0
Ogółem	177,5	218,1	199,6	180,6	204,7	259,2	128,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	12,0
II	12,2
III	16,2
IV	12,9
V	12,1
VI	7,8
VII	4,5
VIII	2,3
IX	3,5
X	5,4
XI	5,0
XII	6,0
NN	0,1
Razem	100,0

Nagminne zapalenie przyusznic w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/.

Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	‰	zapad.	‰	zapad.	‰
0-4	1117,1	27,7	965,2	25,8	1029,7	26,8
0	46,7	0,3	41,8	0,2	44,3	0,3
1	287,4	1,5	192,1	1,1	241,2	1,3
2	930,4	4,5	748,3	3,9	842,3	4,2
3	1887,5	8,8	1591,3	8,1	1742,1	8,5
4	2742,5	12,6	2505,0	12,5	2626,7	12,5
5-9	2354,9	49,5	2123,4	48,9	2241,5	49,2
5	2741,1	12,1	2366,6	11,4	2558,2	11,8
6	2662,3	11,6	2406,2	11,4	2537,2	11,5
7	2757,0	11,2	2610,0	11,7	2684,8	11,4
8	2110,1	8,7	1833,1	8,3	1974,3	8,5
9	1450,5	5,9	1365,0	6,1	1408,5	6,0
10-14	812,8	17,6	787,0	18,6	800,2	18,1
15-19	95,9	2,5	94,3	2,8	95,1	2,6
20-24	19,1	0,6	34,5	1,1	26,7	0,8
25-29	20,8	0,5	32,4	0,9	26,5	0,7
30-34	27,6	0,4	35,2	0,6	31,4	0,5
35-39	15,8	0,3	17,0	0,3	16,4	0,3
40-44	7,3	0,1	7,1	0,1	7,2	0,1
45-49	2,2	0,04	5,8	0,1	4,0	0,1
50-54	5,2	0,1	5,4	0,1	5,3	0,1
55-59	2,0	0,02	2,2	0,04	2,1	0,04
60 i >	1,2	0,04	1,3	0,06	1,3	0,06
NN	-	0,6	-	0,6	-	0,6
Ogółem	372,2	100,0	308,6	100,0	339,5	100,0

Nagminne zapalenie przyuszniczy w Polsce /na wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	462,5	371,1	266,9	231,0	372,2	308,6
	53,4	46,6	52,0	47,0	53,3	46,7
Zapadalność na 100 000	414,9		248,7		339,5	
	66,8		33,2		100,0	

Zapadalność na 100 000 płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	100 tys.	
M	372,2	462,5	376,5	482,5	386,8	552,5	266,9
K	308,6	371,1	303,3	391,6	315,9	437,7	231,0
Ogółem	339,5	414,9	338,2	435,2	349,8	492,8	248,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	9,1
II	8,2
III	8,6
IV	7,4
V	8,6
VI	7,8
VII	5,2
VIII	2,6
IX	4,3
X	12,2
XI	14,1
XII	11,9
Razem	100,0

Odra w 1980 roku na wybranych terenach Polski.

Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0 - 4	169,5	24,6	167,4	25,2	171,7	24,0
0	63,5	2,0	57,2	1,9	70,1	2,1
1	281,9	8,7	270,7	8,6	293,9	8,7
2	197,6	5,6	216,4	6,4	177,4	4,8
3	134,5	3,7	130,1	3,7	139,0	3,7
4	171,9	4,6	164,4	4,6	179,9	4,7
5 - 9	361,5	44,7	350,7	44,8	371,1	44,6
5	201,6	5,2	187,8	5,0	216,1	5,4
6	277,8	7,2	268,4	7,1	287,7	7,1
7	364,1	8,7	357,6	8,8	370,8	8,7
8	495,7	12,0	498,5	12,5	492,8	11,6
9	481,9	11,6	459,8	11,4	504,8	11,8
10 - 14	205,0	26,1	196,2	25,8	214,2	26,4
15 - 19	22,1	2,6	14,5	2,3	19,0	2,9
20 - 24	4,5	0,8	4,9	0,8	4,1	0,7
25 - 29	1,8	0,4	1,0	0,2	2,6	0,4
30 - 34	1,2	0,1	1,6	0,2	0,8	0,1
35 - 39	0,6	0,06	0,8	0,1	0,4	0,03
40 - 44	0,2	0,02	-	-	0,4	0,03
45 - 49	0,4	0,04	-	-	0,7	0,1
50 - 54	0,4	0,04	0,4	0,04	0,4	0,03
55 - 59	-	-	-	-	-	-
60 i	0,2	0,04	0,2	0,04	0,1	0,04
b.d.	-	0,6	-	0,5	-	0,7
Ogółem	60,1	100,0	61,3	100,0	59,1	100,0

Odra na wybranych terenach Polski w 1980 roku.

Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	65,1	59,6	56,8	58,5	61,3	59,1
%	50,1	49,9	48,7	51,3	49,5	50,5
Zapadalność na 100 000	62,2		57,7		60,1	
%	56,5		43,5		100,0	

Zapadalność na 100 000 według płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	61,3	65,1	108,5	38,2	39,0	65,4	56,8
K	59,1	59,6	98,5	32,7	36,3	61,2	58,5
Ogółem	60,1	62,2	103,2	35,4	37,6	63,2	57,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	4,0
II	5,6
III	9,6
IV	11,9
V	12,4
VI	14,8
VII	5,6
VIII	2,0
IX	5,5
X	9,7
XI	11,7
XII	7,2
Razem	100,0

Różyczka w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1052,6	31,2	1052,0	27,2	1052,3	29,1
0	156,4	1,0	146,4	0,8	151,5	0,9
1	930,5	5,9	823,2	4,5	878,5	5,1
2	1221,6	7,1	1207,7	6,1	1214,9	6,6
3	1345,5	7,5	1363,8	6,7	1354,5	7,1
4	1768,5	9,7	1837,8	9,1	1826,7	9,4
5-9	1520,6	38,2	1690,9	37,5	1604,0	37,9
5	1745,4	9,2	1918,0	8,9	1829,7	9,1
6	1646,5	8,6	1844,9	8,5	1743,6	8,5
7	1817,3	8,8	1845,9	7,9	1831,4	8,4
8	1310,4	6,5	1504,0	6,5	1405,3	6,5
9	1057,3	5,1	1315,1	5,7	1183,8	5,4
10-14	349,8	22,0	1092,5	24,9	968,7	23,5
15-19	191,6	6,1	223,0	6,2	207,0	5,1
20-24	30,9	1,0	61,1	1,3	45,8	1,5
25-29	15,4	0,4	37,6	1,0	26,4	0,7
30-34	13,4	0,3	28,5	0,5	20,9	0,4
35-39	3,8	0,07	10,2	0,2	7,0	0,1
40-44	4,0	0,08	2,8	0,06	3,4	0,07
45-49	-	-	0,7	0,01	0,4	0,01
50-54	2,2	0,03	1,8	0,03	2,0	0,04
55-59	1,3	0,01	0,5	0,01	0,9	0,01
60 >	0,6	0,02	0,3	0,01	0,4	0,02
NN	-	0,6	-	0,3	-	0,6
Ogółem	311,5	100,0	220,1	100,0	313,0	100,0

Różyczka w Polsce w 1980 roku / na wybranych terenach/
 Liczba zachorowań i zapadalności na 100 000 yg wieku i Gęstość

Grupy wieku	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	zapad.	Liczba	zapad.	Liczba	zapad.
0-4	6708	1716,9	1360	361,5	8070	1052,3
0	194	226,4	59	72,6	253	151,5
1	1156	1364,4	267	339,7	1424	879,5
2	1513	1996,0	312	418,8	1826	1214,9
3	1658	2268,1	306	425,6	1964	1354,5
4	2187	3012,4	416	595,1	2603	1826,7
5-9	8183	2544,5	2325	697,2	10508	1604,0
5	2094	3034,8	420	614,0	2514	1829,7
6	1888	2776,5	478	706,1	2366	1743,6
7	1798	2890,7	526	813,0	2324	1891,4
8	1329	2147,0	474	713,9	1803	1405,3
9	1074	1775,2	427	644,0	1501	1153,3
10-14	4424	1396,9	2096	588,1	6520	968,7
15-19	1130	282,4	576	135,5	1708	307,0
20-24	279	51,5	126	36,8	405	55,8
25-29	147	28,7	60	22,0	207	26,4
30-34	68	20,9	38	20,9	106	20,9
35-39	22	6,9	15	7,2	37	7,0
40-44	14	4,3	5	2,1	19	3,4
45-49	2	0,6	-	-	2	0,4
50-54	7	2,6	3	1,3	10	2,0
55-59	2	1,2	1	0,6	3	0,9
60 >	5	0,8	-	-	5	0,4
NN	114	-	39	-	153	-
Ogółem	21105	439,7	6644	166,7	27753	315,9

Różyczka w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/.
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska.

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	446,7	433,3	153,7	179,3	311,5	320,1
%	48,6	51,4	45,5	54,5	47,9	52,1
Zapadalność na 100 000	439,7		166,7		315,9	
%	76,0		24,0		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	311,5	446,7	384,9	567,1	394,3	451,3	153,7
K	320,1	433,3	395,0	537,9	397,6	421,6	179,5
Ogółem	315,9	439,7	390,2	551,9	396,0	435,8	166,7

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	2,5
II	4,6
III	8,2
IV	13,3
V	19,1
VI	19,4
VII	8,2
VIII	3,4
IX	2,7
X	4,9
XI	6,6
XII	7,1
Razem	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	5,4	40,3	4,8	46,0	5,6	42,6
0	11,7	16,2	4,9	10,2	8,4	13,9
1	10,8	14,5	8,9	17,9	9,9	15,8
2	3,9	4,8	8,3	15,3	6,0	8,9
3	2,7	3,2	-	-	1,4	2,0
4	1,4	1,6	1,4	2,6	1,4	2,0
5-9	2,7	14,5	0,6	5,2	1,7	10,9
5	4,3	4,8	-	-	2,2	3,0
6	-	-	-	-	-	-
7	1,5	1,6	1,6	2,6	1,6	2,0
8	1,5	1,6	1,6	2,6	1,6	2,0
9	6,2	6,5	-	-	3,2	3,9
10-14	2,3	13,0	2,1	17,9	2,2	14,8
15-19	0,5	3,2	0,2	2,6	0,4	3,0
20-24	1,3	9,7	-	-	0,7	5,9
25-29	0,3	1,6	-	-	0,1	1,0
30-34	1,6	6,5	0,4	2,6	1,0	4,9
35-39	0,4	1,6	-	-	0,2	1,0
40-44	-	-	0,4	2,6	0,2	1,0
45-49	0,4	1,6	-	-	0,2	1,0
50-54	0,4	1,6	0,7	5,2	0,6	3,0
55-59	1,3	3,2	0,5	2,6	0,9	3,0
60 i	0,4	3,2	0,8	15,3	0,7	7,9
Ogółem	1,5	100,0	0,9	100,0	1,1	100,0

Zapalenie mózgu w Polsce w 1980 roku /na wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	1,1 62,5	0,6 37,5	1,9 60,7	1,2 39,3	1,5 61,4	0,9 38,6
Zapadalność na 100 000	0,8 39,6		1,5 60,4		1,1 100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz
liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	1,5	1,1	2,0	0,9	1,1	0,6	1,9
K	0,9	0,6	1,0	0,2	0,2	0,9	1,2
Ogółem	1,1	0,8	1,5	0,5	0,6	0,7	1,5

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	%
I	6,0
II	7,9
III	11,9
IV	7,9
V	10,9
VI	2,9
VII	6,9
VIII	2,9
IX	5,0
X	8,9
XI	7,9
XII	6,9
Razem	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe w Polsce
/na wybranych terenach/.
Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	22,4	24,9	10,4	18,7	16,3	22,6
0	2,2	5,4	8,6	3,4	15,6	4,6
1	15,6	3,7	16,5	6,2	16,0	4,6
2	7,7	1,7	5,3	1,9	6,7	1,8
3	23,0	4,8	14,0	4,8	18,6	4,8
4	45,2	9,3	7,2	2,4	26,7	6,8
5-9	34,1	32,3	21,2	32,7	27,8	22,5
5	37,0	7,3	26,8	8,7	32,0	7,8
6	28,9	5,7	18,1	5,6	23,6	5,7
7	44,9	8,2	14,4	4,3	29,9	6,8
8	29,1	5,4	23,8	7,2	26,5	6,1
9	31,0	5,7	22,5	6,7	26,8	6,1
10-14	17,8	17,3	9,4	14,9	13,7	15,4
15-19	4,8	5,7	4,0	7,7	4,1	6,4
20-24	3,3	4,0	3,0	6,2	3,2	5,0
25-29	3,5	4,0	2,6	6,7	3,6	5,0
30-34	5,1	3,7	4,7	5,8	4,9	4,1
35-39	4,2	3,1	2,8	3,4	3,4	3,3
40-44	1,1	0,8	0,7	1,0	0,9	0,9
45-49	1,8	1,4	1,0	1,1	1,4	1,1
50-54	1,7	1,1	0,9	1,0	1,2	1,1
55-59	1,2	0,6	-	-	0,6	0,3
60 i >	0,6	0,8	0,1	0,5	0,3	0,7
Ogółem	8,3	100,0	4,6	100,0	6,4	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe w Polsce
/na wybranych terenach/.
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska.

	Miasta		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	8,9	4,7	7,5	4,5	8,3	4,6
	63,5	36,5	62,2	37,8	62,9	37,1
Zapadalność na 100 000	6,7		6,0		6,4	
	57,6		42,4		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach.

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		Razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	8,3	8,9	8,3	6,4	6,6	12,1	7,5
K	4,6	4,7	3,9	3,0	4,3	6,4	4,5
Ogółem	6,4	6,7	6,0	4,6	5,4	9,1	6,0

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	L. zachor.	%
I	29	5,2
II	26	4,6
III	26	4,6
IV	26	4,6
V	24	4,3
VI	42	7,5
VII	44	7,9
VIII	106	18,9
IX	114	20,1
X	77	13,7
XI	31	5,5
XII	16	2,9
Razem	561	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne w 1980 roku
 /na wybranych terenach/
 Zapadalność i podział procentowy wg płci i wieku.

Grupy wieku	Mężczyźni			Kobiety			Ogółem		
	Liczba	zap. na 100 000	%	Liczba	zap. na 100 000	%	Liczba	zap. na 100 000	%
0-4	147	37,3	41,5	124	33,2	51,7	271	35,3	45,6
0	64	74,7	18,1	47	57,8	19,6	111	66,5	18,7
1	35	63,9	15,5	52	66,2	21,7	107	66,0	18,0
2	13	16,8	3,7	10	13,8	4,2	23	15,3	3,9
3	9	12,2	2,5	7	9,8	2,9	16	11,0	2,7
4	6	8,2	1,7	8	11,5	3,3	14	9,8	2,3
5-9	36	10,0	10,2	15	4,7	6,3	51	7,0	6,0
5	12	17,1	3,4	4	6,0	1,7	16	11,0	2,7
6	6	8,7	1,7	4	6,0	1,7	10	7,4	1,7
7	3	4,0	0,6	2	3,2	0,8	5	3,1	0,8
8	8	12,2	2,3	2	3,2	0,8	10	7,8	1,7
9	7	10,8	2,0	3	4,8	1,3	10	7,0	1,7
10-14	16	4,7	4,5	13	3,9	5,4	29	4,2	4,9
15-19	23	5,5	6,5	13	3,2	5,4	36	4,4	6,1
20-24	27	5,0	7,6	10	2,3	4,2	37	4,2	6,2
25-29	20	5,0	5,7	12	3,1	5,0	32	4,1	5,4
30-34	22	8,7	6,2	3	2,0	2,1	27	5,3	4,5
35-39	14	5,4	4,0	1	0,4	0,4	15	2,9	2,5
40-44	12	4,4	3,4	4	1,4	1,7	16	2,9	2,7
45-49	10	3,6	2,8	6	2,1	2,5	16	2,8	2,7
50-54	5	2,2	1,4	7	2,5	2,9	12	2,4	2,0
55-59	7	4,6	2,0	9	4,9	3,7	16	4,8	2,7
60 +	15	3,1	4,2	21	2,9	6,7	36	3,0	6,1
Ogółem	354	8,3	100,0	240	5,3	100,0	594	6,8	100,0

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne w 1980 roku /na
wybranych terenach/
Zapadalność i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem		Razem
	M	K	M	K	M	K	
Zachorowania	165	115	189	125	354	240	594
Zapadalność	7,2	4,6	9,6	6,2	8,3	5,3	6,8
%	58,9	41,1	60,2	39,8	59,6	40,4	100,0
Zachorowania	280		314		594		
Zapadalność	5,8		7,9		6,8		
%	47,1		52,9		100,0		

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby
ludności w miastach

	Ogółem	Miasta					Wieś
		Razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M							
liczba	354	165	41	33	23	68	189
zapad.	8,3	7,2	7,4	7,2	4,9	8,3	9,6
K							
liczba	240	115	26	31	10	48	125
zapad.	5,3	4,6	4,3	6,3	2,0	5,4	6,2
Razem							
liczba	594	280	67	64	33	116	314
zapad.	6,8	5,8	5,8	6,7	3,4	6,8	7,9

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach

Miesiąc	1. zach.	%
I	50	8,4
II	49	8,2
III	52	8,8
IV	46	7,7
V	47	7,9
VI	58	9,8
VII	50	8,4
VIII	49	8,3
IX	44	7,4
X	45	7,6
XI	50	8,4
XII	54	9,1
Razem	594	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w Polsce w 1980 r. /na wybranych terenach/
Zapadalność na 100 000 i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	148,2	158,1	135,5	128,0	142,4	144,7
%	46,3	53,7	50,8	49,2	48,2	51,8
Zapadalność na 100 000	153,4		131,7		143,5	
%	58,4		41,6		100,0	

Zapadalność na 100 000 wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	< 20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	> 100 tys.	
M	142,4	148,2	154,3	131,3	108,7	175,9	135,5
K	144,7	158,1	163,8	150,8	117,8	181,2	128,0
Ogółem	143,5	153,4	159,3	141,4	113,5	178,7	131,7

Rozkład sezonowy zachorowań
w odsetkach według wieku

Miesiąc	Ogółem	0-14 lat	15 i < lat
I	9,4	10,5	9,0
II	8,9	10,1	8,5
III	8,0	7,1	8,3
IV	6,9	6,0	7,3
V	6,8	4,9	7,4
VI	6,4	4,0	7,3
VII	7,1	5,3	7,7
VIII	7,7	6,6	8,1
IX	8,7	8,9	8,7
X	10,6	13,6	9,6
XI	10,2	12,4	9,4
XII	9,3	10,6	8,7
Razem	100,0	100,0	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w 1980 roku na wybranych terenach Polski. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0 - 4	58,0	3,5	61,7	4,0	54,1	3,1
0	18,6	0,2	23,3	0,3	13,5	0,2
1	19,7	0,3	25,2	0,4	13,9	0,2
2	50,6	0,6	63,1	0,8	37,1	0,4
3	82,1	0,9	82,7	1,0	81,5	0,8
4	131,2	1,5	126,0	1,5	136,7	1,5
5 - 9	250,0	13,0	255,5	14,1	244,3	12,0
5	174,7	1,9	173,5	2,0	175,9	1,7
6	224,8	2,4	217,9	2,5	231,9	2,4
7	282,1	2,8	312,7	3,3	250,4	2,4
8	288,4	2,9	301,2	3,2	275,0	2,7
9	287,4	2,9	281,7	3,0	294,2	2,8
10-14	204,7	10,9	200,0	11,3	209,7	10,6
15-19	140,8	9,2	149,0	10,3	132,4	8,1
20-24	159,1	11,2	123,6	9,1	195,7	13,0
25-29	161,1	10,0	147,2	9,6	175,3	10,4
30-34	183,9	7,4	166,2	6,9	201,7	7,8
35-39	95,2	4,0	99,3	4,3	91,2	3,7
40-44	102,8	4,6	99,1	4,5	106,5	4,6
45-49	107,1	4,8	111,4	5,1	103,0	4,6
50-54	144,6	5,8	149,8	5,7	140,2	6,0
55-59	173,2	4,6	174,9	4,4	171,7	4,9
60 i >	115,4	10,9	134,8	10,7	102,3	11,2
b.d.	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Ogółem	143,6	100,0	142,4	100,0	144,7	100,0

WZW z wykrytym antygenem HBs w Polsce w 1980 r. /na wybranych terenach/
Zapadalność na 100 000 i udział procentowy wg płci i środowiska

	Miasto		Wieś		Ogółem	
	M	K	M	K	M	K
Zapadalność na 100 000	63,9	69,2	40,7	38,6	53,2	55,5
%	45,9	54,1	50,7	49,3	47,5	52,5
Zapadalność na 100 000	66,6		39,6		54,4	
%	66,9		33,1		100,0	

Zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska oraz liczby ludności w miastach

	Ogółem	M i a s t a					Wieś
		razem	<20 tys.	20-50 tys.	50-100 tys.	>100 tys.	
M	53,2	63,9	45,8	50,9	51,0	90,6	40,7
K	55,5	69,2	53,7	63,9	51,6	92,7	38,6
Ogółem	54,4	66,6	49,9	57,7	51,3	91,7	39,6

Rozkład sezonowy zachorowań w odsetkach według wieku

Miesiąc	Ogółem	0-14 lat	15 i. lat
I	8,4	8,5	8,4
II	8,7	7,1	8,8
III	8,1	8,3	8,1
IV	7,2	7,4	7,2
V	8,1	6,7	8,2
VI	8,4	6,2	8,6
VII	9,3	8,8	9,3
VIII	8,2	4,6	8,6
IX	8,2	8,5	8,1
X	9,5	14,1	9,0
XI	8,7	12,2	8,4
XII	7,3	7,4	7,3
Razem	100,0	100,0	100,0

Odsetek WZW z wykrytym antygenem HBs w Polsce w roku 1980 w stosunku do ogólnej liczby zachorowań na WZW w zależności od płci i wieku

Wiek	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
0 - 4	20,4	24,3	15,8
0	29,0	35,0	18,2
1	50,0	52,4	45,5
2	35,5	40,8	25,9
3	15,1	14,8	15,5
4	11,2	13,0	9,5
5 - 9	11,5	13,8	8,9
5	12,9	16,4	9,3
6	10,8	12,6	9,1
7	8,4	10,4	5,8
8	13,5	16,2	10,4
9	12,1	14,3	9,8
10-14	11,2	13,0	9,6
15-19	18,6	19,2	17,9
20-24	40,5	33,7	45,0
25-29	44,3	45,7	43,0
30-34	48,0	49,2	47,1
35-39	55,8	55,2	56,4
40-44	57,9	60,4	55,7
45-49	59,8	61,5	58,1
50-54	60,8	62,6	59,1
55-59	58,7	58,3	59,0
60 i >	57,0	54,4	59,4
b.d.	11,1	20,0	-
Ogółem	37,9	37,4	36,4

Wirusowe zapalenie wątroby w 1980 roku na wybranych terenach Polski. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0 - 4	58,0	3,5	61,7	4,0	54,1	3,1
0	18,6	0,2	23,3	0,3	13,5	0,2
1	19,7	0,3	25,2	0,4	13,9	0,2
2	50,6	0,6	63,1	0,8	37,1	0,4
3	82,1	0,9	82,7	1,0	81,5	0,8
4	131,2	1,5	126,0	1,5	136,7	1,5
5 - 9	250,0	13,0	255,5	14,1	244,3	12,0
5	174,7	1,9	173,5	2,0	175,9	1,7
6	224,8	2,4	217,9	2,5	231,9	2,4
7	282,1	2,8	312,7	3,3	250,4	2,4
8	288,4	2,9	301,2	3,2	275,0	2,7
9	287,4	2,9	281,7	3,0	294,2	2,8
10-14	204,7	10,9	200,0	11,3	209,7	10,6
15-19	140,8	9,2	149,0	10,3	132,4	8,1
20-24	159,1	11,2	123,6	9,1	195,7	13,0
25-29	161,1	10,0	147,2	9,6	175,3	10,4
30-34	183,9	7,4	166,2	6,9	201,7	7,8
35-39	95,2	4,0	99,3	4,3	91,2	3,7
40-44	102,8	4,6	99,1	4,5	106,5	4,6
45-49	107,1	4,8	111,4	5,1	103,0	4,6
50-54	144,6	5,8	149,8	5,7	140,2	6,0
55-59	173,2	4,6	174,9	4,4	171,7	4,9
60 i >	115,4	10,9	134,8	10,7	102,3	11,2
b.d.	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Ogółem	143,6	100,0	142,4	100,0	144,7	100,0

Wirusowe zapalenie wątroby w 1980 roku na wybranych terenach Polski. Zapadalność na 100 000 i podział procentowy wg płci i wieku

Grupy wieku	Ogółem		Mężczyźni		Kobiety	
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0 - 4	58,0	3,5	61,7	4,0	54,1	3,1
0	18,6	0,2	23,3	0,3	13,5	0,2
1	19,7	0,3	25,2	0,4	13,9	0,2
2	50,6	0,6	63,1	0,8	37,1	0,4
3	82,1	0,9	82,7	1,0	81,5	0,8
4	131,2	1,5	126,0	1,5	136,7	1,5
5 - 9	250,0	13,0	255,5	14,1	244,3	12,0
5	174,7	1,9	173,5	2,0	175,9	1,7
6	224,8	2,4	217,9	2,5	231,9	2,4
7	282,1	2,8	312,7	3,3	250,4	2,4
8	288,4	2,9	301,2	3,2	275,0	2,7
9	287,4	2,9	281,7	3,0	294,2	2,8
10-14	204,7	10,9	200,0	11,3	209,7	10,6
15-19	140,8	9,2	149,0	10,3	132,4	8,1
20-24	159,1	11,2	123,6	9,1	195,7	13,0
25-29	161,1	10,0	147,2	9,6	175,3	10,4
30-34	183,9	7,4	166,2	6,9	201,7	7,8
35-39	95,2	4,0	99,3	4,3	91,2	3,7
40-44	102,8	4,6	99,1	4,5	106,5	4,6
45-49	107,1	4,8	111,4	5,1	103,0	4,6
50-54	144,6	5,8	149,8	5,7	140,2	6,0
55-59	173,2	4,6	174,9	4,4	171,7	4,9
60 i >	115,4	10,9	134,8	10,7	102,3	11,2
b.d.	-	0,1	-	0,1	-	0,1
Ogółem	143,6	100,0	142,4	100,0	144,7	100,0