

dr Ewa Gonera

1981

P A Ń S T W O W Y   Z A K Ł A D   H I G I E N Y  
00 - 791 W A R S Z A W A   u l . C H O C I M S K A   2 4

WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE W 1981 ROKU

LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 MIESZKAŃCÓW  
WEDŁUG WIEKU, PŁCI, ŚRODOWISKA I MIESIĄCA ZACHOROWANIA

W A R S Z A W A   1982

SPIS WYBRANYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH

- czerwonka	2
- różyczka	6
- nagminne zapalenie przyusznicy	10
- płonica	14
- krztusiec	18
- tężec	22
- świerzb	26
- odra	30
- zatrucia pokarmowe - ogółem	35
- zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami salmonela	39
- zatrucia jadem kiełbasianym	43
- inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych/	47
- zapalenie mózgu	51
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe i surowicze	55
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe i inne bakteryjne	59
- wirusowe zapalenie wątroby	63
- wirusowe zapalenie wątroby HBsAg+	67

Tabuła 1. Liczba zachorowań na czerniak..... w/s wieku, płci i środowisku - w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM	
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem		
0-4	573	549	1122	154	172	326	1448	721 727
0	58	51	109	35	34	69	178	25 93
1	162	163	325	33	46	79	404	209 195
2	157	162	319	38	42	80	399	204 195
3	101	93	194	32	32	64	258	125 133
4	95	80	175	16	18	34	209	98 111
5-9	191	178	369	74	44	118	487	222 265
5	59	57	116	24	11	35	151	68 83
6	58	58	116	17	6	23	139	64 75
7	29	20	49	8	10	18	67	30 37
8	22	20	42	12	11	23	65	31 34
9	23	23	46	13	6	19	65	29 36
10-14	69	66	135	54	45	99	234	111 123
15-19	33	14	52	31	16	47	99	30 69
20-24	44	28	72	24	10	34	106	38 68
25-29	38	28	66	37	16	53	119	44 75
30-34	29	23	52	25	16	41	93	39 54
35-39	17	9	26	25	9	34	60	18 42
40-44	11	11	22	14	18	32	54	19 25
45-49	10	4	14	17	13	30	44	27 27
50-54	13	10	23	12	7	19	42	17 25
55-59	10	6	16	9	4	13	29	10 19
60-64	2	3	5	4	5	9	14	2 6
65-74	7	1	8	7	4	11	19	5 14
75 +	4	2	6	4	5	9	15	7 8
Ogółem	1056	932	1988	491	384	875	2863	

1316 715  
1547 814

Tabela 2. Zapadalność i podzina procentowy w/ę pici, wieku i środowiska  
*czarnonka w Polsce w 1981 r.*

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓLNA	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%
0-4	62,8	54,3	57,4	59,0	60,0	56,4	22,4	31,4	23,9	44,8	23,1	37,2	44,2	50,5
0	31,4	5,5	26,3	5,5	20,8	5,5	23,9	7,1	22,1	9,9	23,0	7,9	26,2	6,2
1	87,0	15,3	83,3	17,5	85,1	16,3	23,1	6,7	30,6	12,0	26,9	9,0	59,8	14,1
2	85,6	24,9	84,0	17,4	84,8	16,0	27,8	7,8	29,2	10,9	28,5	9,1	60,7	13,9
3	56,6	9,6	49,7	10,0	53,1	9,8	24,5	6,5	23,5	8,3	24,0	7,3	40,8	9,0
4	53,0	9,0	42,5	8,6	47,6	8,8	12,2	3,3	13,2	4,7	12,7	3,9	33,0	7,3
5-9	23,3	18,1	20,8	19,0	22,0	18,6	11,7	15,1	6,6	11,5	9,1	13,5	16,4	17,0
5	32,9	5,6	30,4	6,1	31,6	5,9	18,1	4,9	8,0	2,8	12,9	4,0	23,7	5,3
6	33,8	5,5	32,3	6,2	33,0	5,8	13,1	3,5	4,4	1,6	6,6	2,6	22,5	4,8
7	17,8	2,7	11,8	2,1	14,7	2,5	6,3	1,6	7,6	2,6	7,0	2,1	11,3	2,3
8	14,1	2,1	12,3	2,1	13,2	2,1	9,7	2,4	8,5	2,9	9,1	2,6	11,3	2,3
9	15,5	2,2	14,8	2,5	15,2	2,3	10,8	2,7	4,7	1,6	7,7	2,2	11,8	2,3
10-14	10,5	6,5	9,6	7,1	10,0	6,8	9,2	11,0	7,3	11,7	8,3	11,3	9,2	8,2
15-19	5,0	3,6	4,8	4,5	3,3	2,6	5,7	6,3	2,8	4,2	4,2	5,4	3,7	3,5
20-24	4,4	4,2	2,9	3,0	3,7	3,6	4,1	4,9	1,4	2,6	2,7	3,9	3,3	3,7
25-29	3,4	3,6	2,6	3,0	3,0	3,3	6,7	7,5	2,4	4,2	4,4	6,1	3,6	4,2
30-34	2,9	2,8	2,4	2,5	2,6	2,6	5,3	5,1	3,0	4,2	4,1	4,7	3,1	3,2
35-39	2,7	1,6	1,5	1,0	2,1	1,3	7,9	5,1	2,8	2,3	5,3	3,9	3,2	2,1
40-44	1,7	1,0	1,7	1,2	1,7	1,1	3,7	2,9	4,7	4,7	4,2	3,6	2,6	1,9
45-49	1,5	0,9	0,6	0,4	1,1	0,7	4,0	3,5	3,1	3,4	3,6	3,4	2,1	1,5
50-54	2,0	1,2	1,7	1,1	1,9	1,2	2,6	2,4	4,6	4,8	2,1	2,2	2,0	1,5
55-59	1,7	0,9	1,3	0,6	1,5	0,8	2,0	1,8	1,1	1,0	1,6	1,5	1,6	1,0
60-64	0,8	0,2	1,1	0,3	0,8	0,3	1,3	0,8	2,0	1,3	1,6	1,0	1,2	0,5
65-74	0,9	0,7	0,2	0,1	0,7	0,4	1,1	1,4	0,8	1,0	1,0	1,3	0,8	0,7
75+	0,9	0,4	1,0	0,2	0,9	0,3	1,0	0,8	2,2	1,3	1,5	1,0	1,2	0,5
OGÓLNA	9,6	100,0	9,2	100,0	9,4	100,0	6,6	100,0	5,2	100,0	5,9	100,0	8,0	100,0

ZAPADALNOŚĆ W/Ę PICI W 1981 R.

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*czarnonta w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	932	9,2	1056	9,6	1988	9,4
	<20 tys.	107		125		232	5,2
	20-50 tys.	352		376		728	20,9
	50-100 tys.	125		139		264	9,6
	>100 tys.	348		416		764	7,3
WIEŚ		384	5,2	491	6,6	875	5,9
OGÓLEM		1316	7,5	1547	8,4	2863	8,0

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabola 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na CZERNĄTKĘ W. POLSCE W 1981r.

Miesiąc	Liczba	%
I	44	1,5
II	64	2,2
III	73	2,5
IV	53	1,9
V	44	1,5
VI	100	3,5
VII	195	6,8
VIII	803	28,0
IX	746	26,0
X	445	15,6
XI	219	7,6
XII	83	2,9
Razem	2869	100,0

\* wg daty zachorowania

200,0

Tabuła 1. Liczba zachorowań na rodzyczkę..... w/c wieku, płci i środowisku w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	19060	19026	38086	3517	3670	7187	45273
0	860	848	1708	200	250	450	2158
1	2377	2460	4331	573	589	1162	5993
2	3779	3808	7587	687	774	1461	9048
3	5120	5056	10176	832	902	1734	11910
4	6930	6854	13784	1225	1155	2380	16164
5-9	34063	33359	67422	9537	8821	18358	85780
5	7346	7442	14788	1302	1392	2694	17482
6	7194	7327	14521	1677	1564	3241	17762
7	7348	7107	14455	2231	2081	4312	18767
8	6519	6180	12699	2282	1958	4240	16939
9	5656	5303	10959	2045	1826	3871	14830
10-14	20637	18740	39377	8808	7259	16067	55444
15-19	4912	4586	9498	2455	1980	4435	13933
20-24	1608	997	2605	609	277	886	3491
25-29	889	379	1268	301	139	440	1708
30-34	397	209	606	132	47	179	785
35-39	162	67	229	46	30	76	305
40-44	72	24	96	34	16	50	146
45-49	27	10	37	11	9	20	57
50-54	19	10	29	11	6	17	46
55-59	11	11	22	5	4	9	31
60-64	4	4	8	-	-	-	8
65-74	4	2	6	3	-	3	9
75 +	3	1	4	2	1	3	7
Ogółem	81868	77425	159293	25471	22259	47730	207023

8 6010 11 2 (18) 5 1 6 124 16

Tabola 2. Zapadalność i podział procentowy w/e płci, wieku i środowiska

rozyczka w Polsce w 1981r

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓLNI	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	2089,3	23,3	1987,8	24,6	2037,3	23,9	511,6	13,9	509,1	16,5	510,3	15,0	1381,2	21,9
0	465,4	1,1	438,1	1,1	451,4	1,1	136,8	0,8	162,2	1,1	149,9	0,9	316,0	1,0
1	1273,3	2,9	1257,2	3,2	1265,1	3,0	400,9	2,2	391,2	2,6	396,9	2,4	887,4	2,9
2	2059,4	4,6	1975,3	4,9	2016,3	4,8	501,9	2,7	538,3	3,5	520,5	3,1	1377,3	4,4
3	2869,6	6,3	2701,9	6,5	2783,8	6,4	636,5	3,3	661,8	4,1	649,4	3,6	1882,8	5,8
4	3863,4	8,4	3645,4	8,9	3751,8	8,6	937,1	4,8	848,5	5,2	891,9	5,0	2548,6	7,8
5-9	4162,3	41,6	3899,4	43,1	4028,0	42,4	1505,3	37,5	1330,8	39,6	1416,1	38,5	2888,0	41,5
5	4089,6	8,9	3969,8	9,6	4028,4	9,3	982,9	5,1	1008,4	6,3	995,9	5,6	2741,8	8,4
6	4191,3	8,8	4078,2	9,5	4133,4	9,1	1290,5	6,6	1150,3	7,0	1218,8	6,8	2877,8	8,6
7	4517,6	9,0	4181,3	9,2	4345,7	9,1	1767,7	8,8	1572,9	9,3	1668,0	9,1	3174,7	9,1
8	4177,3	8,0	3787,5	8,0	3978,1	8,0	1839,5	9,0	1507,8	8,8	1664,9	8,9	2955,5	8,2
9	3811,6	6,9	3416,6	6,8	3609,7	6,9	1691,7	8,0	1442,6	8,2	1563,7	8,1	2690,8	7,2
10-14	3138,8	25,2	2725,9	24,2	2927,7	24,7	1505,8	34,7	1185,2	32,7	1341,8	33,7	2180,8	26,8
15-19	647,8	6,0	575,1	5,9	610,5	6,0	448,2	9,6	344,9	9,0	393,5	9,3	519,4	6,7
20-24	162,5	2,0	103,2	1,3	133,2	1,6	103,6	2,4	39,9	1,2	69,1	1,9	107,8	1,7
25-29	79,9	1,1	35,8	0,5	58,4	0,8	54,2	1,2	21,2	0,6	36,3	0,9	51,2	0,8
30-34	39,6	0,5	21,5	0,3	30,7	0,4	28,2	0,5	8,9	0,2	18,0	0,4	26,4	0,4
35-39	25,5	0,2	10,8	0,1	18,3	0,1	14,5	0,2	9,2	0,1	11,8	0,2	16,1	0,1
40-44	10,9	0,1	3,8	0,0	7,4	0,1	9,0	0,1	4,2	0,1	6,6	0,1	7,1	0,1
45-49	4,1	0,0	1,6	0,0	2,8	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	2,4	0,0	2,7	0,0
50-54	3,0	0,0	1,7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	1,4	0,0	1,9	0,0	2,2	0,0
55-59	1,9	0,0	2,4	0,0	2,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,7	0,0
60-64	1,1	0,0	1,5	0,0	1,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,7	0,0
65-74	0,5	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-	-	0,3	0,0	0,4	0,0
75+	0,7	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0
OGÓLNI	7444	100,0	761,6	100,0	752,6	100,0	343,7	100,0	303,8	100,0	323,9	100,0	576,6	100,0

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 mied.



Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*różycyżka w Polsce w 1981r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	77425	761,6	81868	744,4	159293	752,6
	<20 tys.	15162		16788		31950	720,8
	20-50 tys.	13085		13571		26656	767,0
	50-100 tys.	8866		9346		18212	665,1
	>100 tys.	40312		42163		82475	784,1
WIEŚ		22259	303,8	25471	343,7	47730	323,9
OGÓLEM		99684	569,8	107339	583,1	207023	576,6

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na różyczkę... w... 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	17377	8,5
II	26781	13,1
III	54732	26,7
IV	44573	21,7
V	37314	18,2
VI	14641	7,1
VII	3944	1,9
VIII	1271	0,6
IX	4142	0,6
X	1247	0,6
XI	1078	0,5
XII	928	0,5
Razem	205028	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na *bagrowe zap. przyrostki/c* wieku, płci i środowisku w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLEM
	Kobioty	Mężczyźni	Ogółem	Kobioty	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	11307	13041	24348	2694	3337	6031	30379
0	117	140	257	65	94	159	416
1	463	580	1033	167	197	364	1397
2	1823	2081	3904	427	570	997	4901
3	3738	4252	7990	873	937	1860	9850
4	5176	5988	11164	1162	1489	2651	13815
5-9	19021	21434	40455	8599	10159	18758	59213
5	5210	6022	11232	1410	1725	3135	14367
6	4901	5628	10529	1820	2105	3925	14454
7	3866	4310	8176	2025	2384	4409	12585
8	2915	3207	6122	1775	2134	3909	10031
9	2129	2267	4396	1569	1811	3380	7776
10-14	4987	5131	10118	4444	4757	9201	19319
15-19	769	718	1487	877	879	1756	3243
20-24	365	248	613	281	175	456	1069
25-29	337	214	551	208	139	347	898
30-34	195	163	358	131	119	250	608
35-39	67	66	133	53	54	107	240
40-44	32	37	69	32	24	56	125
45-49	37	21	58	25	17	42	100
50-54	31	23	54	13	10	23	77
55-59	15	14	29	8	3	11	40
60-64	9	3	12	6	4	10	22
65-74	9	5	14	4	4	8	22
75 +	2	-	2	1	1	2	4
Ogółem	37183	41118	78301	17376	19682	37058	115359

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/c płci, wieku i środowiska

*nażmienne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1981 r.*

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓLNE	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	1239,4	30,4	1362,5	31,7	1302,4	31,1	391,9	15,5	462,9	17,0	428,2	16,3	926,8	26,3
0	63,3	0,3	72,3	0,3	67,9	0,3	44,5	0,4	61,0	0,5	53,0	0,4	61,3	0,4
1	243,3	1,2	296,4	1,4	270,5	1,3	116,8	1,0	130,9	1,0	124,0	1,0	206,9	1,2
2	993,5	4,9	1079,5	5,1	1037,5	5,0	311,9	2,5	396,4	2,9	355,2	2,7	746,0	4,2
3	2095,1	10,1	2272,3	10,3	2185,8	10,2	667,8	5,0	724,1	5,0	696,6	5,0	1557,1	8,5
4	2885,6	13,9	3184,8	14,6	3038,7	14,3	888,9	6,7	1093,8	7,6	993,5	7,2	2178,2	12,0
5-9	2324,3	51,2	2505,5	52,1	2416,9	51,7	1357,2	49,5	1532,7	51,6	1446,9	50,6	1993,5	51,3
5	2900,4	14,0	3212,3	14,6	3059,7	14,5	1064,4	8,1	1249,6	8,8	1158,9	8,5	2253,3	12,5
6	2855,3	13,3	3132,5	13,7	2997,1	13,4	1400,6	10,5	1548,2	10,7	1476,1	10,6	2341,8	12,5
7	2376,8	10,4	2535,7	10,5	2458,0	10,4	1604,5	11,7	1801,9	12,1	1705,5	11,9	2128,9	10,9
8	1867,9	7,8	1965,5	7,8	1917,8	7,8	1430,8	10,2	1643,4	10,8	1539,5	10,5	1750,2	8,7
9	1434,8	5,7	1460,6	5,5	1448,0	5,6	1297,9	9,0	1429,8	9,2	1365,4	9,1	1410,9	6,7
10-14	758,5	13,4	746,3	12,5	752,3	12,9	759,8	25,6	776,7	24,2	768,4	24,8	759,9	16,8
15-19	101,4	2,1	90,0	1,7	95,6	1,8	160,1	5,0	152,8	4,4	155,8	4,8	120,9	2,9
20-24	36,9	1,0	25,7	0,6	31,3	0,8	47,8	1,6	25,2	0,9	35,6	1,2	33,0	0,9
25-29	300,7	0,9	20,2	0,5	25,4	0,7	37,4	1,2	21,2	0,7	28,6	0,9	26,5	0,8
30-34	19,5	0,5	16,7	0,4	18,1	0,5	27,9	0,8	22,6	0,6	25,1	0,7	20,5	0,5
35-39	10,5	0,2	10,7	0,2	10,6	0,2	16,7	0,3	16,5	0,3	16,6	0,3	12,6	0,2
40-44	4,8	0,1	5,3	0,1	5,3	0,1	8,5	0,2	6,3	0,1	7,4	0,2	6,1	0,1
45-49	5,6	0,1	3,3	0,1	4,5	0,1	5,9	0,1	4,1	0,1	5,0	0,1	4,7	0,1
50-54	4,8	0,1	3,9	0,1	4,4	0,1	2,8	0,1	2,3	0,1	2,6	0,1	3,6	0,1
55-59	2,6	0,0	3,0	0,0	2,8	0,0	1,8	0,0	0,8	0,0	1,3	0,0	2,2	0,0
60-64	2,5	0,0	1,1	0,0	1,9	0,0	2,0	0,0	1,6	0,0	1,8	0,0	1,9	0,0
65-74	1,2	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0
75+	0,4	0,0	-	-	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
OGÓLNE	3381	100,0	404,4	100,0	370,0	100,0	234,5	100,0	268,6	100,0	251,5	100,0	321,3	100,0

*ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 osób*

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapaadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*nagminne zapalenie przyusznicy w Polsce w 1981r.*

		Mężczyzni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapaadaln.	liczba	zapaadaln.	liczba	zapaadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	41118	404,4	37183	338,1	78301	370,0
	<20 tys.	9729		8598		18327	413,5
	20-50 tys.	7679		6832		14511	417,5
	50-100 tys.	4727		4235		8962	327,3
	>100 tys.	18983		17518		36501	347,0
WIEŚ		19682	268,6	17376	234,5	37058	251,5
OGÓŁEM		60800	347,6	54559	296,4	115359	321,3

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 mieszka.*

Tablica 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na ~~02901006. KAPARKOIE~~ przyuszcicy w 1981 r.

Miesiac	Liczba	%
I	15017	13,3
II	14262	12,7
III	17553	15,6
IV	15732	14,0
V	11944	10,6
VI	9296	8,2
VII	5051	4,5
VIII	2418	2,1
IX	2487	2,2
X	5573	4,9
XI	7532	6,7
XII	5874	5,2
Razem	112739	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zachorowań na ptonicę..... w/g wieku, płci  
i Środowiska w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	2589	2879	5468	701	746	1447	6915
0	38	38	76	30	19	49	125
1	143	177	320	56	67	123	443
2	460	470	930	142	150	292	1222
3	780	928	1708	197	259	456	2164
4	1168	1266	2434	276	251	527	2961
5-9	4345	4528	8873	1570	1496	3066	11939
5	1071	1163	2234	280	317	597	2831
6	1096	1084	2180	318	330	648	2828
7	810	973	1783	353	317	670	2453
8	769	709	1478	311	289	600	2078
9	599	599	1198	308	243	551	1749
10-14	1838	1699	3537	1141	875	2016	5553
15-19	293	369	662	222	223	445	1107
20-24	76	62	138	64	39	103	241
25-29	52	31	83	25	19	44	127
30-34	24	9	33	13	5	18	51
35-39	8	3	11	3	7	10	21
40-44	4	3	7	3	2	5	12
45-49	4	-	4	2	3	5	9
50-54	1	2	3	1	2	3	6
55-59	1	-	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	-	1	1	1
65-74	-	2	2	-	4	4	6
75 +	-	-	-	1	1	2	2
Ogółem	9235	9587	18822	3746	3423	7169	25991

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska

płonica w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓLNI	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapat.	%
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%		
0-4	283,8	28,0	300,8	30,1	292,5	29,0	102,0	18,7	103,5	21,8	102,7	20,3	211,0	26,6
0	20,6	0,4	19,6	0,4	20,1	0,4	20,5	0,8	12,3	0,6	16,3	0,7	10,4	0,5
1	76,8	1,5	80,5	1,8	83,8	1,7	39,2	1,5	44,5	2,0	41,9	1,7	65,6	1,7
2	250,7	5,0	243,8	4,9	247,2	4,9	103,7	3,8	104,3	4,4	104,0	4,1	186,0	4,7
3	437,2	8,4	495,9	9,7	467,2	9,1	150,7	0,3	190,0	7,5	170,8	6,4	342,1	8,3
4	651,2	12,7	673,3	13,3	662,5	12,9	211,1	7,3	184,4	7,3	197,5	7,4	466,9	11,4
5-9	530,9	47,1	529,3	47,2	530,1	47,3	247,8	41,9	225,7	43,7	236,5	42,7	402,0	45,9
5	596,2	11,6	620,4	12,2	608,6	11,9	211,4	7,5	229,6	9,3	220,7	8,3	444,0	10,9
6	638,5	11,9	603,3	11,3	620,5	11,6	244,7	8,5	242,7	9,6	243,7	9,0	458,2	10,9
7	498,0	8,8	572,4	10,1	536,0	9,5	279,7	9,4	239,6	9,3	259,2	9,3	415,0	9,4
8	492,8	8,3	434,5	7,4	463,0	7,9	250,7	8,3	221,6	8,4	236,3	8,4	362,6	8,0
9	403,7	6,5	385,9	6,2	394,6	6,4	254,8	8,2	191,8	7,1	222,6	7,7	317,3	6,7
10-14	279,6	19,9	247,1	17,8	263,0	18,8	195,1	30,5	142,9	25,6	168,4	28,1	218,4	21,5
15-19	38,6	3,2	46,3	3,9	42,6	3,5	40,5	5,9	38,5	6,5	39,5	6,2	41,3	4,3
20-24	7,7	0,8	6,4	0,6	7,1	0,7	10,9	1,7	5,6	1,1	8,0	1,4	7,4	0,9
25-29	4,7	0,6	2,0	0,3	3,8	0,4	4,5	0,7	2,9	0,6	3,6	0,6	3,8	0,5
30-34	2,4	0,3	0,9	0,1	1,7	0,2	2,8	0,3	2,0	0,1	1,8	0,3	1,7	0,2
35-39	1,3	0,1	0,5	0,0	0,9	0,1	0,9	0,1	2,1	0,2	1,6	0,1	1,1	0,1
40-44	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,6	0,0
45-49	0,6	0,0	-	-	0,3	0,0	0,5	0,1	0,7	0,1	0,6	0,1	0,4	0,0
50-54	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0
55-59	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
65-74	-	-	0,4	0,0	0,2	0,0	-	-	0,8	0,1	0,4	0,1	0,3	0,0
75+	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0
OGÓLNI	84,0	100,0	94,3	100,0	88,9	100,0	59,5	100,0	46,7	100,0	48,6	100,0	72,4	100,0

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 mied.



Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska  
i liczby ludności w miastach

*ptonica w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	4587	94,3	9235	84,0	18822	88,9
	<20 tys.	2070		2052		4122	93,0
	20-50 tys.	1636		1672		3308	95,2
	50-100 tys.	1219		1190		2409	88,0
	>100 tys.	4662		4321		8983	85,4
WIEŚ		3423	46,7	3746	50,5	7169	48,6
OGÓLEM		13010	74,4	12981	70,5	25991	72,4

*zapadalność na 100.000 miesz.*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *ptakulca* w Polsce w 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	3485	13,6
II	4019	15,7
III	4719	18,4
IV	3446	13,5
V	2781	10,9
VI	1590	6,2
VII	833	3,2
VIII	477	1,9
IX	793	3,1
X	1088	4,2
XI	1390	5,4
XII	1002	3,9
Razem	25623	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na *Krzusiec*..... w/c wieku, płci

i środowisku *w Polsce w 1981. - 281 zach. w. Białej 1981*

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLNE
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	74	43	117	39	36	75	192
0	35	24	59	26	27	53	112
1	15	7	22	5	2	7	29
2	9	2	11	3	4	7	18
3	9	5	14	3	2	5	19
4	6	5	11	2	1	3	14
5-9	32	22	54	3	3	6	60
5	4	6	10	2	1	3	13
6	8	3	11	-	2	2	13
7	4	2	6	1	-	1	7
8	8	5	13	-	-	-	13
9	8	6	14	-	-	-	14
10-14	10	10	20	-	1	1	21
15-19	-	1	1	-	-	-	1
20-24	-	-	-	1	-	1	1
25-29	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	116	76	192	43	40	83	275

*11 (Biał. 1981) - liczba zachorowań w latach 79-81  
w grupach wiekowych (%)*

*24-01-81*

Tablica 2. Zapadalność i podział procentowy w/c płci, wieku i środowiska

miasteczec w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓLEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	8,1	63,9	4,5	56,6	6,3	60,9	5,7	90,1	5,0	90,0	5,3	90,4	5,9	69,8
0	18,9	30,2	12,4	31,6	15,6	30,7	17,8	60,4	17,5	67,5	17,7	63,9	16,5	40,7
1	8,1	12,9	3,6	9,2	5,8	11,5	3,5	11,6	4,3	5,0	2,4	8,5	4,3	10,6
2	4,9	7,8	1,0	2,6	2,9	5,7	2,2	7,0	2,8	10,0	2,5	8,4	2,7	6,5
3	5,0	7,8	2,7	6,6	3,8	7,3	2,3	7,0	1,5	5,0	1,9	6,0	3,0	6,9
4	3,3	5,2	2,7	6,6	3,0	5,7	1,5	4,7	0,7	2,5	1,1	3,6	2,2	5,1
5-9	3,9	27,5	2,6	28,9	3,2	28,1	0,5	7,0	0,5	7,5	0,5	7,2	2,0	21,8
5	2,2	3,4	3,2	7,9	2,7	5,2	1,5	4,7	0,7	2,5	1,1	3,6	2,0	4,7
6	4,7	6,9	1,7	3,9	3,1	5,7	-	-	1,5	5,0	0,8	2,4	2,1	4,7
7	2,5	3,4	1,2	2,6	1,8	3,1	0,8	2,3	-	-	0,4	1,2	1,2	2,6
8	5,1	6,9	3,1	6,6	4,1	6,8	-	-	-	-	-	-	2,3	4,7
9	5,4	6,9	3,9	7,9	4,6	7,3	-	-	-	-	-	-	2,5	5,1
10-14	1,5	8,6	1,5	13,2	1,5	10,5	-	-	0,2	2,5	0,1	1,2	0,8	7,6
15-19	-	-	0,1	1,3	0,1	0,5	-	-	-	-	-	-	0,0	0,4
20-24	-	-	-	-	-	-	0,2	2,3	-	-	0,1	1,2	0,0	0,4
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM	1,1	100,0	0,7	100,0	0,9	100,0	0,6	100,0	0,5	100,0	0,6	100,0	0,8	100,0

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg pici, środowiska

i liczby ludności w miastach

*krztusiec w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	76	0,7	116	1,1	192	0,9
	<20 tys.	13		22		35	
	20-50 tys.	11		11		22	
	50-100 tys.	14		17		31	
	>100 tys.	38		66		104	
WIEŚ		40	0,5	43	0,6	83	0,6
OGÓLEM		116	0,7	159	0,9	275	0,8

1  
20  
1

*zapadalność na 100.000 mieszk.*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *Kożusiec. n. Polse* w 1981r.

Miesiąc	Liczba	%
I	5	1,8
II	7	2,5
III	7	2,5
IV	6	2,1
V	18	6,5
VI	12	4,3
VII	22	7,9
VIII	38	13,6
IX	58	20,8
X	48	17,2
XI	41	14,7
XII	17	6,1
Razem	279	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na *szereg. n. 1981 r.*... w/c wieku, płci  
i środowiska

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	1	1	-	-	-	1
30-34	1	-	1	1	-	1	2
35-39	-	-	-	1	1	2	2
40-44	-	1	1	3	4	7	8
45-49	-	3	3	2	5	7	10
50-54	1	3	4	3	6	9	13
55-59	3	1	4	3	5	8	12
60-64	1	2	3	1	1	2	5
65-74	2	1	3	10	8	18	21
75 +	3	2	5	9	3	12	17
Ogółem	11	14	25	33	33	66	91

Tabola 2. Zapadalność i podział procentowy w/8 płci, wieku i środowiska

*Łądz w Polsce w 1981 r.*

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓLN.	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	0,1	9,1	0,1	7,1	0,1	4,0	0,2	3,0	-	-	0,1	1,5	0,1	1,1
35-39	-	-	-	-	-	-	0,3	3,0	0,3	3,0	0,3	3,0	0,1	2,2
40-44	-	-	-	7,1	0,1	4,0	0,3	9,1	1,1	12,1	0,9	10,6	0,4	8,8
45-49	-	-	0,2	21,5	0,2	12,0	0,5	6,1	1,2	15,2	0,8	10,6	0,5	11,0
50-54	0,2	9,1	0,5	21,5	0,3	16,0	0,6	9,1	1,4	18,2	1,0	13,7	0,6	14,3
55-59	0,5	27,3	0,5	7,1	0,4	16,0	0,7	9,1	1,4	15,2	1,0	12,1	0,6	13,2
60-64	0,3	9,1	0,2	14,3	0,5	12,0	0,3	3,0	0,4	3,0	0,4	3,0	0,4	5,5
65-74	0,3	18,1	0,8	7,1	0,2	12,0	1,6	30,3	1,7	24,2	1,6	27,3	0,9	23,0
75+	0,7	27,3	0,2	14,3	0,8	20,0	2,4	27,3	1,3	9,1	2,0	18,2	1,3	18,7
OGÓLN.	0,1	100,0	0,1	100,0	0,1	100,0	0,4	100,0	0,5	100,0	0,4	100,0	0,3	100,0

ZAPADALNOŚĆ WŁ. 200 000 1981



Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska  
i liczby ludności w miastach

*Teżec w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	44	0,1	41	0,1	25	0,1
	<20 tys.	5		4		9	
	20-50 tys.	2		1		3	
	50-100 tys.	1		3		4	
	>100 tys.	6		3		9	
WIEŚ		33	0,5	33	0,4	66	0,4
OGÓLEM		47	0,3	44	0,2	91	0,3

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIAŠEK*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *tyfus. n. Policz. w 1981 r.*

Miesiąc	Liczba	%
I	4	4,44
II	2	2,22
III	7	7,77
IV	11	12,23
V	7	7,77
VI	9	10,00
VII	12	13,34
VIII	11	12,23
IX	8	8,89
X	8	8,89
XI	6	6,67
XII	5	5,55
Razem	90	100,00

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zachorowań na ..SKURDZIO..... w/c wieku, płci i środowiska w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	MIASTO			WIEŚ			OGÓLEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	1708	1864	3572	1231	1326	2557	6129
0	144	136	280	102	136	238	518
1	283	353	636	241	253	494	1130
2	416	429	845	283	304	587	1432
3	428	448	876	288	322	610	1486
4	437	498	935	317	311	628	1563
5-9	2465	2387	4852	1971	2006	3977	8829
5	476	512	988	328	314	642	1630
6	550	551	1101	360	390	750	1851
7	474	443	917	407	440	847	1764
8	466	438	904	414	440	854	1758
9	499	443	942	462	422	884	1826
10-14	2136	1951	4087	2164	2257	4421	8508
15-19	2159	1769	3928	1923	1323	3246	7174
20-24	1482	1590	3072	1104	992	2096	5168
25-29	1132	1241	2373	646	768	1414	3787
30-34	859	886	1745	485	527	1012	2757
35-39	589	486	1075	371	314	685	1760
40-44	492	385	877	423	354	777	1654
45-49	415	385	800	417	347	764	1564
50-54	319	315	634	318	344	662	1296
55-59	216	151	367	231	227	458	825
60-64	150	102	252	159	112	271	523
65-74	165	121	286	190	161	351	637
75 +	61	60	121	115	113	228	349
Ogółem	14348	13693	28041	11748	11171	22919	50960

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/c płci, wieku i środowiska

Świerzb w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%
0-4	187,2	11,9	194,7	13,6	191,1	12,7	179,1	10,5	183,9	11,9	181,6	11,2	187,0	12,0
0	77,9	1,0	70,3	1,0	74,0	1,0	69,3	0,8	88,3	1,2	79,3	1,0	76,3	1,0
1	152,0	2,0	180,4	2,6	166,5	2,3	168,6	2,1	168,1	2,3	168,3	2,2	167,3	2,2
2	226,7	2,9	222,5	3,1	224,6	3,0	206,7	2,4	211,4	2,7	209,1	2,6	218,0	2,8
3	239,9	3,0	239,4	3,3	239,6	3,1	220,3	2,5	236,2	2,9	228,4	2,7	234,9	2,9
4	243,6	3,0	264,9	3,6	254,5	3,3	242,5	2,7	228,5	2,8	235,3	2,7	246,4	3,1
5-9	301,2	17,2	279,0	17,4	289,9	17,3	311,1	16,8	302,6	18,0	306,8	17,4	297,2	17,3
5	265,0	3,3	273,1	3,7	269,1	3,5	247,6	2,8	227,5	2,8	237,3	2,8	255,6	3,2
6	320,4	3,8	306,7	4,1	313,4	3,9	277,0	3,1	286,8	3,5	282,1	3,3	299,9	3,6
7	291,4	3,3	269,6	3,2	275,7	3,3	322,5	3,5	332,6	3,9	327,6	3,7	298,4	3,5
8	298,6	3,2	268,4	3,2	283,2	3,2	333,7	3,5	338,8	3,9	336,3	3,7	306,7	3,4
9	336,3	3,6	285,4	3,2	310,3	3,4	382,2	3,9	333,2	3,9	357,1	3,9	331,3	3,6
10-14	324,9	14,9	283,8	14,3	303,9	14,6	370,0	18,3	368,5	20,2	369,2	19,2	334,7	16,8
15-19	284,7	15,0	221,8	12,9	252,5	14,0	351,1	16,4	228,4	11,8	288,0	14,2	267,4	14,1
20-24	149,8	10,4	164,6	11,6	157,1	11,0	187,9	9,4	143,0	8,9	163,6	9,1	159,6	10,1
25-29	101,8	7,9	117,1	9,2	109,2	8,5	116,2	5,5	116,9	6,9	116,6	6,2	111,9	7,4
30-34	85,4	6,0	91,0	6,5	88,3	6,2	103,4	4,1	100,2	4,7	101,7	4,4	92,8	5,4
35-39	92,7	4,2	78,5	3,5	85,7	3,8	117,2	3,2	96,2	2,8	106,5	3,0	92,7	3,5
40-44	74,3	3,4	60,8	2,8	67,7	3,1	112,4	3,6	93,1	3,2	102,7	3,4	80,6	3,2
45-49	62,5	2,9	60,6	2,8	61,6	2,9	98,0	3,5	83,5	3,1	90,9	3,3	73,1	3,1
50-54	49,6	2,2	53,1	2,3	51,3	2,3	67,8	2,7	80,5	3,1	73,9	2,9	60,8	2,5
55-59	37,1	1,5	32,7	1,4	35,1	1,3	51,4	2,0	61,9	2,0	56,2	2,0	44,4	1,6
60-64	41,9	1,0	38,6	0,9	40,5	0,9	52,3	1,4	44,3	1,0	48,7	1,2	44,3	1,0
65-74	22,2	1,1	26,1	0,9	23,7	1,0	30,5	1,6	33,4	1,4	31,7	1,5	27,6	1,3
75+	13,3	0,4	30,0	0,4	18,3	0,4	30,2	1,0	50,6	1,0	37,7	1,0	27,6	0,7
OGÓŁEM	130,5	100,0	134,7	100,0	132,5	100,0	158,5	100,0	152,5	100,0	155,5	100,0	141,9	100,0

127

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapaadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

Świeżob w Polsce w 1981r

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapaadaln.	liczba	zapaadaln.	liczba	zapaadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	13693	134,7	14348	130,5	28041	132,5
	<20 tys.	3377		3653		7030	158,6
	20-50 tys.	1763		2080		3843	110,5
	50-100 tys.	2192		2187		4379	159,9
	>100 tys.	6361		6428		12789	121,6
WIEŚ		11171	152,5	11748	158,5	22919	155,5
OGÓLNE		24864	142,1	26096	141,8	50960	141,9

ZAPADAŁOŚĆ NA 100 000 MIESZK.

Tablica 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *Świerzb. w. Polsce. w. 1981 r.*

Miesiąc	Liczba	%
I	5632	11,06
II	5042	9,90
III	5064	9,95
IV	3857	7,58
V	2976	5,84
VI	1889	3,71
VII	1844	3,62
VIII	2633	5,17
IX	5401	10,60
X	6931	13,61
XI	6088	11,96
XII	3568	7,00
Razem	50925	100,00

\* wg daty zachorowania

Tabeld 1. Liczba zachorowań na *odkry. w. 1981 r.*... w/c wieku, płci  
i środowisku

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLNE
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	2957	3217	6174	1371	1444	2815	8989
0	350	300	650	179	241	420	1070
1	1005	1193	2198	496	500	996	3194
2	611	666	1277	277	280	557	1834
3	497	518	1015	184	202	386	1401
4	494	540	1034	235	221	456	1490
5-9	4038	4082	8120	2746	2751	5497	13617
5	531	547	1078	282	266	548	1626
6	637	591	1228	392	346	738	1966
7	833	799	1632	536	575	1111	2743
8	988	1053	2041	712	715	1427	3468
9	1049	1092	2141	824	849	1673	3814
10-14	3018	2965	5983	2621	2492	5113	11096
15-19	228	289	517	315	364	679	1196
20-24	64	58	122	60	46	106	228
25-29	44	29	73	21	14	35	108
30-34	8	11	19	6	6	12	31
35-39	5	2	7	1	4	5	12
40-44	2	-	2	1	-	1	3
45-49	-	1	1	-	2	2	3
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	10364	10655	21019	9142	7123	14265	35284

Tabola 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
odra w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	324,1	28,6	336,1	30,3	330,3	29,4	199,4	19,2	200,3	20,3	199,9	19,7	274,2	25,5
0	189,4	3,4	155,0	2,8	171,8	3,1	122,5	2,5	156,4	3,4	139,9	2,9	157,7	3,0
1	539,7	9,7	609,7	11,2	575,6	10,5	347,0	6,9	332,1	7,0	339,4	7,0	472,9	9,1
2	333,0	5,9	345,5	6,3	339,4	6,1	202,4	3,9	194,7	3,9	198,4	3,9	279,2	5,2
3	278,6	4,8	276,8	4,9	277,7	4,8	140,8	2,6	148,2	2,8	144,6	2,7	222,5	4,0
4	275,4	4,8	287,2	5,1	281,4	4,9	179,8	3,3	162,3	3,2	170,9	3,2	234,9	4,2
5-9	493,4	39,0	477,2	38,3	485,1	38,6	433,4	38,4	415,0	38,6	424,0	38,5	458,4	38,6
5	295,6	5,2	291,8	5,1	293,7	5,1	212,9	3,9	192,7	3,7	202,6	3,8	255,0	4,6
6	371,1	6,1	328,9	5,5	349,6	5,8	301,7	5,5	254,5	4,9	277,5	5,2	318,5	5,6
7	512,1	8,0	470,1	7,5	490,6	7,8	424,7	7,5	434,6	8,1	429,8	7,8	464,0	7,8
8	633,1	9,5	645,3	9,9	639,4	9,7	573,9	10,0	560,6	10,0	562,0	10,0	605,1	9,8
9	706,9	10,2	703,6	10,3	705,2	10,2	681,7	11,5	670,3	11,9	675,8	11,7	692,0	10,8
10-14	459,0	29,1	431,3	27,8	444,8	28,5	448,1	36,8	406,9	35,0	427,0	35,9	436,4	32,5
15-19	30,1	2,2	36,2	2,7	33,2	2,5	57,5	4,4	62,8	5,1	60,3	4,9	44,6	3,4
20-24	6,5	0,6	6,0	0,5	6,2	0,6	10,2	0,8	6,6	0,6	8,3	0,7	7,0	0,6
25-29	4,0	0,4	2,7	0,3	3,4	0,3	3,8	0,3	2,1	0,2	2,9	0,2	3,2	0,3
30-34	0,8	0,1	1,1	0,1	1,0	0,1	1,3	0,1	1,1	0,1	1,2	0,1	1,0	0,1
35-39	0,8	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	4,2	0,1	0,8	0,0	0,6	0,0
40-44	0,3	0,0	-	-	0,2	0,0	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
45-49	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	94,2	100,0	104,8	100,0	99,3	100,0	96,4	100,0	97,2	100,0	96,8	100,0	98,3	100,0



Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

odra w Polsce w 1981 r.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	10655	104,8	10364	94,2	21019	99,3
	<20 tys.	2663		2682		5345	120,6
	20-50 tys.	1993		1860		3853	110,9
	50-100 tys.	919		961		1880	68,7
	>100 tys.	5080		4861		9941	94,5
WIEŚ		7123	97,2	7142	96,4	14265	96,8
OGÓLEM		17778	101,6	17506	95,1	35284	98,3

- 32 -

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.

Tabola 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na ~~otrz.~~ w. Polsec. w 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	3222	9,2
II	2970	8,5
III	5253	15,0
IV	5891	16,8
V	6013	17,1
VI	4856	13,8
VII	2095	6,0
VIII	514	1,5
IX	557	1,6
X	1164	3,3
XI	1359	3,9
XII	1155	3,3
Razem	35049	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 5. Zachorowania na odrę w Polsce w 1981 roku dzieci szczepionych i nieszczepionych przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Ogółem 100%	Zachorowania na odrę dzieci:					
		Szczepionych		Nieszczepionych		Brak danych o szczepieniu	
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
0	1070	28	2,6	969	90,6	73	6,8
1	3194	313	9,8	2519	78,9	362	11,3
2	1834	393	21,4	1180	64,3	261	14,3
3	1401	468	33,4	719	51,3	214	15,3
4	1490	542	36,4	716	48,1	232	15,5
0 - 4	8989	1744	19,4	6102	67,9	1142	12,7
5	1626	569	35,0	834	51,3	223	13,7
6	1966	604	30,7	1034	52,6	328	16,7
7	2743	590	21,5	1798	65,5	355	13,0
8	3468	481	13,9	2567	74,0	420	12,1
9	3814	232	6,1	3096	81,2	486	12,7
5 - 9	13617	2476	18,2	9329	68,5	1812	13,3
10 - 14	11096	351	3,2	9591	86,4	1154	10,4
Ogółem	33702	4571	13,6	25023	74,2	4108	12,2

Tabela 1. Liczba zachorowań na <sup>zatrucie pokarmowe</sup> ~~zatrucie pokarmowe~~... w/c wieku, płci  
i środowiska w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	330	390	720	146	183	329	1049
0	26	25	51	32	44	76	127
1	86	91	177	22	22	44	221
2	71	84	155	30	38	68	223
3	72	96	168	29	41	70	238
4	75	94	169	33	38	71	240
5-9	438	425	863	211	248	459	1322
5	75	92	167	41	49	90	257
6	102	101	203	50	63	113	316
7	101	90	191	30	40	70	261
8	77	65	142	38	40	78	220
9	83	77	160	52	56	108	268
10-14	388	370	758	290	251	541	1299
15-19	613	392	1005	320	221	541	1546
20-24	452	367	819	256	204	460	1279
25-29	421	351	772	208	206	414	1186
30-34	402	291	693	167	193	360	1053
35-39	204	168	372	126	97	223	595
40-44	223	212	435	121	101	222	657
45-49	191	170	361	114	114	228	589
50-54	190	147	337	129	106	235	572
55-59	113	89	202	112	82	194	396
60-64	68	68	136	69	45	114	250
65-74	93	64	157	73	66	139	296
75 +	54	38	92	37	24	61	153
Ogółem	4180	3542	7722	2379	2141	4520	12242

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/c płci, wieku i środowiska

*zatrucia pokarmowe ogółem w Polsce w 1981r.*

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						O G Ń L N E	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapat.	%
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%		
0-4	36,2	7,9	40,7	11,1	38,5	9,3	21,2	6,1	25,4	8,6	23,4	7,3	32,0	8,6
0	14,1	0,6	12,9	0,7	13,5	0,7	21,9	1,3	28,6	2,1	25,3	1,7	18,7	1,0
1	46,2	2,1	46,5	2,6	46,4	2,3	15,4	0,9	14,6	1,0	15,0	1,0	32,7	1,8
2	38,7	1,7	43,6	2,4	41,2	2,0	21,9	1,3	26,4	1,8	24,2	1,5	33,9	1,8
3	40,4	1,7	51,3	2,7	46,0	2,2	22,2	1,2	30,1	1,9	26,2	1,5	37,6	1,9
4	41,8	1,8	50,0	2,7	46,0	2,1	25,2	1,4	27,9	1,8	26,6	1,6	37,8	2,1
5-9	53,5	10,5	49,7	12,0	51,6	11,2	33,3	8,9	37,4	11,6	35,4	10,1	44,5	10,8
5	41,8	1,8	49,1	2,6	45,5	2,2	31,0	1,7	35,5	2,3	33,3	2,0	40,3	2,1
6	59,4	2,4	56,2	2,9	57,8	2,6	38,5	2,1	46,3	2,9	42,5	2,5	51,2	2,6
7	62,1	2,4	52,9	2,5	57,4	2,5	23,8	1,3	30,2	1,9	27,1	1,5	44,2	2,1
8	49,3	1,8	39,8	1,8	44,5	1,8	30,6	1,6	30,8	1,9	30,7	1,7	38,4	1,8
9	55,9	2,1	49,6	2,2	52,7	2,1	43,0	2,2	44,2	2,6	43,6	2,4	48,6	2,2
10-14	59,0	9,3	53,8	10,4	56,4	9,8	49,6	12,2	41,0	11,8	45,2	12,0	51,1	10,6
15-19	80,8	14,7	49,2	11,1	64,6	13,0	58,4	13,5	38,2	10,3	48,0	12,0	57,6	12,7
20-24	45,7	10,8	38,0	10,4	41,9	10,6	43,6	10,8	29,4	9,5	35,9	10,2	39,5	10,4
25-29	37,9	10,1	33,1	9,9	35,5	10,0	37,4	8,7	31,4	9,6	34,1	9,2	35,0	9,7
30-34	40,1	9,6	29,9	8,2	35,1	9,0	35,6	7,0	36,7	9,0	36,2	8,0	35,5	8,6
35-39	32,1	4,9	27,1	4,7	29,6	4,8	39,8	5,3	29,7	4,5	34,7	4,9	31,4	4,9
40-44	33,7	5,3	33,5	6,0	33,6	5,6	32,2	5,1	26,6	4,7	29,3	4,9	32,0	5,4
45-49	28,8	4,6	26,8	4,8	27,8	4,7	26,8	4,8	27,4	5,3	27,1	5,0	27,5	4,8
50-54	29,5	4,5	24,8	4,2	27,3	4,4	27,5	5,4	24,8	5,0	26,2	5,2	26,8	4,7
55-59	19,4	2,7	19,3	2,5	19,3	2,6	24,9	4,7	22,4	3,8	23,8	4,3	21,3	3,2
60-64	19,0	1,6	25,7	1,9	21,8	1,8	22,7	2,9	17,8	2,1	20,5	2,5	21,2	2,0
65-74	12,5	2,2	13,8	1,8	13,0	2,0	11,7	3,1	13,7	3,1	12,6	3,1	12,8	2,4
75+	41,8	4,3	19,0	1,0	13,9	1,2	9,7	1,5	10,7	1,1	10,1	1,3	12,1	1,2
O G Ń L N E	38,0	100,0	34,8	100,0	36,5	100,0	32,1	100,0	29,2	100,0	30,7	100,0	34,1	100,0

35

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 WZROSTKOWCÓW

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*zatrucia pokarmowe ogółem w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	3542	34,8	4180	38,0	7722	36,5
	<20 tys.	908		1212		2120	47,8
	20-50 tys.	720		670		1390	40,0
	50-100 tys.	278		342		620	22,6
	>100 tys.	1636		1956		3592	34,2
WIEŚ		2141	29,2	2379	32,1	4520	30,7
OGÓLEM		5683	32,5	6559	35,6	12242	34,1

- 37 -

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na ZATYFICIA. POKALUPPNE ogółem w 1981r

Miesiąc	Liczba	%
I	390	3,2
II	558	4,6
III	563	4,6
IV	617	5,1
V	2121	17,5
VI	1605	13,2
VII	1763	14,5
VIII	1669	13,8
IX	748	6,2
X	1198	9,9
XI	566	4,7
XII	322	2,7
Razem	12120	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na zatrucie pokarm. myk. w/c wieku, płci i środowiska w Polsce w 1981r.  
*patoczkami salmonella*

Grupy wieku	MIASTO			WIEŚ			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	265	296	561	83	124	207	768
0	23	20	43	12	38	50	93
1	78	81	159	15	13	28	187
2	48	54	102	17	23	40	142
3	56	78	134	18	29	47	181
4	60	63	123	21	21	42	165
5-9	306	289	595	133	137	270	865
5	48	58	106	25	25	50	156
6	74	77	151	30	30	60	211
7	65	55	120	18	25	43	163
8	58	46	104	25	27	52	156
9	61	53	114	35	30	65	179
10-14	311	292	603	175	158	333	936
15-19	322	245	567	188	114	302	869
20-24	286	206	492	152	128	280	772
25-29	285	213	498	120	114	234	732
30-34	268	173	441	90	112	202	643
35-39	136	107	243	76	55	131	374
40-44	146	116	262	76	62	138	400
45-49	124	90	214	63	62	125	339
50-54	120	78	198	77	51	128	326
55-59	63	42	105	64	31	95	200
60-64	48	31	79	31	23	54	133
65-74	47	25	72	27	25	52	124
75 +	24	12	36	11	7	18	54
Ogółem	2751	2215	4966	1366	1203	2569	7535

↑

718E  
7534



Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/w płci, wieku i środowiska

zatrucia pokarmowe rybn. pałeczkami salmonella w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓŁEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	29,0	9,6	30,9	13,4	30,0	11,3	12,1	6,0	17,2	10,3	14,7	8,0	23,4	10,2
0	12,4	0,8	10,3	0,9	11,4	0,8	8,2	0,9	24,7	3,2	16,7	1,9	13,7	1,2
1	41,9	2,9	41,4	3,8	41,6	3,2	10,5	1,1	8,6	1,1	9,5	1,1	27,7	2,5
2	26,2	1,7	28,0	2,4	27,1	2,1	12,4	1,2	16,0	1,9	14,3	1,6	21,6	1,9
3	31,4	2,0	41,7	3,5	36,7	2,7	13,8	1,3	21,3	2,4	17,6	1,8	28,6	2,4
4	33,4	2,2	33,5	2,8	33,5	2,5	16,1	1,5	15,4	1,7	15,7	1,6	26,0	2,1
5-9	37,4	11,1	33,8	13,1	35,5	11,9	21,0	9,7	20,7	11,4	20,8	10,4	29,1	11,6
5	26,7	1,7	30,9	2,6	28,9	2,1	18,9	1,8	18,1	2,1	18,5	1,9	24,5	2,1
6	43,1	2,7	42,9	3,5	43,0	3,0	23,1	2,2	22,1	2,5	22,6	2,3	34,2	2,8
7	40,0	2,4	32,4	2,5	36,1	2,4	14,3	1,3	18,9	2,1	16,6	1,7	27,6	2,2
8	37,2	2,1	28,2	2,1	32,6	2,1	20,2	1,8	20,8	2,2	20,5	2,0	27,2	2,1
9	41,1	2,2	34,1	2,4	37,5	2,3	29,0	2,6	23,7	2,5	26,3	2,5	32,5	2,4
10-14	47,3	11,4	42,5	13,2	44,8	12,2	29,9	12,8	25,8	13,1	27,8	13,0	36,8	12,4
15-19	42,5	11,7	30,7	11,1	36,4	11,4	34,3	13,8	19,7	9,5	26,8	11,8	32,4	11,5
20-24	28,9	10,4	21,3	9,3	25,2	9,9	25,9	11,1	18,5	10,5	21,9	10,9	23,8	10,2
25-29	25,6	10,4	20,1	9,6	21,9	10,0	21,6	8,8	17,4	9,5	19,3	9,1	21,6	9,7
30-34	26,7	9,7	17,8	7,8	22,3	8,9	19,2	6,6	24,3	9,3	20,3	7,9	21,6	8,5
35-39	21,4	4,9	17,3	4,8	19,4	4,9	24,0	5,6	16,8	4,6	20,4	5,1	19,7	5,0
40-44	22,0	5,3	18,3	5,2	20,2	5,3	20,2	5,6	16,3	5,2	18,2	5,4	19,5	5,3
45-49	18,7	4,5	14,2	4,1	16,5	4,3	14,8	4,6	14,9	5,2	14,9	4,9	15,8	4,5
50-54	18,6	4,4	13,2	3,5	16,0	4,1	16,4	5,6	14,9	4,2	14,3	5,0	15,3	4,3
55-59	10,8	2,3	9,1	1,9	10,1	2,1	14,3	4,7	8,5	2,6	11,6	3,7	10,8	2,7
60-64	13,4	1,7	11,7	1,4	12,7	1,6	10,2	2,3	9,1	1,9	9,7	2,1	11,3	1,8
65-74	6,3	1,7	5,4	1,1	6,0	1,4	4,3	2,0	5,2	2,1	4,7	2,0	5,4	1,6
75+	5,2	0,9	6,0	0,5	5,5	0,7	2,9	0,8	3,1	0,6	3,0	0,7	4,3	0,7
OGÓŁEM	25,0	100,0	21,8	100,0	23,5	100,0	18,4	100,0	16,4	100,0	17,4	100,0	21,0	100,0

ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 WYB.

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, krotkowska  
i liczby ludności w miastach

zakażenia pokarmowe *Hyd. paratyfoidalna salmonella* w 1981 r.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	2215	21,8	2751	25,0	4966	23,5
	<20 tys.	580		751		1331	
	20-50 tys.	508		457		965	
	50-100 tys.	165		191		356	
	>100 tys.	962		1352		2314	
WIEŚ		1203	16,4	1366	18,4	2569	17,4
OGÓLEM		3418	19,5	4117	22,4	7535	21,0

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *Zatrucie pokarmowe* wyw. pałeczkami  
*salmonela* w Polsce w 1981r.

Miesiąc	Liczba	%
I	155	2,1
II	192	2,6
III	255	3,4
IV	353	4,7
V	1555	20,9
VI	1125	15,1
VII	1201	16,2
VIII	1062	14,3
IX	361	4,9
X	397	5,3
XI	207	2,8
XII	67	0,9
Razem	7430	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zachorowań na *zatrucie jadem kielb* w/c wieku, płci i środowiska w Polsce w 1981 r.

Grupa wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	2	1	3	4	2	6	9
0	-	-	-	1	-	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	2	1	-	1	3
3	1	-	1	-	-	-	1
4	-	-	-	2	2	4	4
5-9	1	5	6	3	14	17	23
5	-	1	1	-	2	2	3
6	-	1	1	-	3	3	4
7	-	-	-	2	1	3	3
8	1	-	1	-	3	3	4
9	-	3	3	1	5	6	9
10-14	3	3	6	14	12	26	32
15-19	7	6	13	13	11	24	37
20-24	14	15	29	22	28	50	79
25-29	9	17	26	15	36	51	77
30-34	13	14	27	17	35	52	79
35-39	9	14	23	9	18	27	50
40-44	11	15	26	11	16	27	53
45-49	4	6	10	14	14	28	38
50-54	3	3	6	12	17	29	35
55-59	4	6	10	14	14	28	38
60-64	1	2	3	8	6	14	17
65-74	3	5	8	10	15	25	33
75 +	-	-	-	7	5	12	12
Ogółem	84	112	196	173	243	416	612

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/w płci, wieku i środowiska

zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						O G Ń L N E	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapat.	%
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%		
0-4	0,2	2,4	0,1	0,9	0,2	1,5	0,6	2,3	0,3	0,8	0,4	1,4	0,3	1,5
0	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	-	-	0,3	0,2	0,1	0,2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,5	4,2	0,5	0,9	0,5	1,0	0,7	0,6	-	-	0,4	0,2	0,5	0,5
3	0,6	1,2	-	-	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2
4	-	-	-	-	-	-	1,5	1,1	-	-	1,5	1,0	0,6	0,6
5-9	0,1	1,2	0,6	4,5	0,4	3,0	0,5	4,7	2,1	5,7	1,3	4,0	0,8	3,8
5	-	-	0,5	0,9	0,3	0,5	-	-	1,4	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5
6	-	-	0,6	0,9	0,3	0,5	-	-	2,2	1,2	1,1	0,7	0,6	0,7
7	-	-	-	-	-	-	1,6	1,1	0,8	0,4	1,2	0,7	0,5	0,5
8	0,6	1,2	-	-	0,3	0,5	-	-	2,3	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7
9	-	-	1,9	2,7	1,0	1,5	0,8	0,6	3,9	2,1	2,4	1,4	1,6	1,4
10-14	0,5	3,6	0,4	2,7	0,4	3,1	2,4	8,1	2,0	4,9	2,2	6,3	1,3	5,2
15-19	0,9	8,3	0,8	5,4	0,8	6,6	2,4	7,5	1,9	4,5	2,1	5,8	1,4	6,0
20-24	1,4	16,6	1,6	13,4	1,5	14,8	3,7	12,7	4,0	11,5	3,9	12,0	2,4	12,9
25-29	0,8	10,7	1,6	15,1	1,2	13,3	2,7	8,7	5,5	14,8	4,2	12,3	2,3	12,6
30-34	1,3	15,4	1,4	12,4	1,4	13,8	3,6	9,8	6,7	14,4	5,2	12,5	2,7	12,9
35-39	1,4	10,7	2,3	12,4	1,8	11,7	2,8	5,2	5,5	14,4	4,2	6,5	2,6	8,2
40-44	1,7	13,1	2,4	13,4	2,0	13,3	1,9	6,4	4,2	6,6	3,6	6,5	2,6	8,7
45-49	0,6	4,8	0,9	5,4	0,8	5,1	3,3	8,1	3,4	5,8	3,3	6,7	1,8	6,2
50-54	0,5	3,6	0,5	2,7	0,5	3,1	2,6	7,0	4,0	7,0	3,2	7,0	1,6	5,7
55-59	0,7	4,8	1,3	5,4	1,0	5,1	3,1	8,1	3,8	5,8	3,4	6,7	2,0	6,2
60-64	0,3	1,2	0,8	1,8	0,5	1,5	2,6	4,6	2,4	2,5	2,5	3,4	1,4	2,8
65-74	0,4	3,6	1,1	4,5	0,7	4,1	1,6	5,8	3,1	6,2	2,3	6,0	1,4	5,3
75+	-	-	-	-	-	-	1,8	4,0	2,2	2,1	2,0	1,9	0,9	2,0
Ogółem	0,8	100,0	1,1	100,0	0,9	100,0	2,3	100,0	3,3	100,0	2,8	100,0	1,7	100,0

- 44 -

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*zatrucia jadem welbasianym w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	112	1,1	84	0,8	196	0,9
	<20 tys.	40		18		58	1,3
	20-50 tys.	17		17		34	0,9
	50-100 tys.	10		7		17	0,6
	>100 tys.	45		42		87	0,8
WIEŚ		243	3,3	173	2,3	416	2,8
OGÓŁEM		355	2,0	257	1,4	612	1,7

- 45 -

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIAŁEK*

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na zatrucie jadem kiełbasianym  
w Polsce w 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	32	5,2
II	17	2,8
III	39	6,3
IV	31	5,0
V	79	12,8
VI	106	17,2
VII	75	12,2
VIII	48	7,8
IX	48	7,8
X	65	10,6
XI	56	9,1
XII	20	3,2
Razem	616	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na 1002. szkorciorky w/w wieku, płci  
z wyjątkiem zatrudnionych w zakładach pokarmowych  
i środowisku w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	2044	2636	4680	1339	1788	3127	7807
0	1305	1674	2979	918	1224	2142	5121
1	413	560	973	301	428	729	1702
2	186	214	400	68	96	164	564
3	86	108	194	26	22	48	242
4	54	80	134	26	18	44	178
5-9	193	219	412	77	73	150	562
5	50	70	120	19	18	37	157
6	43	60	103	18	12	30	133
7	43	30	73	15	16	31	104
8	30	33	63	16	14	30	93
9	27	26	53	9	13	22	75
10-14	74	101	175	52	46	98	273
15-19	114	63	177	73	32	105	282
20-24	135	78	213	75	23	98	311
25-29	124	84	208	52	46	98	306
30-34	95	83	178	27	31	58	236
35-39	86	43	129	23	23	46	175
40-44	94	46	140	25	20	45	185
45-49	68	49	117	31	15	46	163
50-54	79	40	119	36	22	58	177
55-59	51	24	75	27	20	47	122
60-64	26	17	43	12	6	18	61
65-74	31	20	51	12	19	31	82
75 +	18	7	25	11	10	21	46
Ogółem	3232	3510	6742	1872	2174	4046	10788



Tabla 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska

inne salmonellozy w Polsce w 1981.  
[z występowaniem zakażeń pokarmowych]

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓLEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapat.	%
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%		
0-4	224,1	63,2	275,4	75,1	250,3	69,4	194,8	71,5	248,0	82,2	222,0	77,3	238,2	72,4
0	706,2	40,4	864,8	47,7	787,3	44,2	628,0	49,0	794,4	56,3	713,4	52,4	754,6	47,5
1	221,8	12,7	286,2	16,0	254,8	14,4	210,6	16,1	284,3	19,7	248,4	18,0	252,0	15,8
2	101,4	5,7	111,0	6,1	106,3	5,9	49,7	3,6	66,8	4,4	58,4	4,1	85,9	5,2
3	48,2	2,7	57,7	3,1	53,1	2,9	19,9	1,4	16,1	1,0	18,0	1,2	38,3	2,2
4	30,1	1,7	42,5	2,2	36,5	2,0	19,9	1,4	13,2	0,8	16,5	1,1	28,1	1,7
5-9	23,6	6,0	25,6	6,2	24,6	6,1	12,2	4,1	11,0	3,4	11,6	3,7	18,9	5,2
5	27,8	1,5	37,3	2,0	32,7	1,8	14,3	1,0	13,0	0,8	13,7	0,9	24,6	1,5
6	25,1	1,4	33,4	1,7	29,3	1,5	13,9	1,0	8,8	0,6	11,3	0,7	21,5	1,2
7	26,4	1,4	17,6	0,9	21,9	1,1	11,9	0,8	12,1	0,7	12,0	0,8	17,6	1,0
8	19,2	0,9	20,2	0,9	19,7	0,9	12,9	0,8	10,8	0,7	11,3	0,7	16,2	0,9
9	18,2	0,8	16,8	0,7	17,5	0,8	7,4	0,5	10,3	0,6	8,9	0,6	13,6	0,6
10-14	11,3	2,3	14,7	2,9	13,0	2,6	8,9	2,8	7,5	2,1	8,2	2,4	10,7	2,5
15-19	15,0	3,5	7,9	1,8	11,4	2,6	13,3	3,9	5,5	1,5	9,3	2,7	10,5	2,6
20-24	13,6	4,2	8,1	2,2	10,9	3,2	12,8	4,0	3,3	1,1	7,6	2,4	9,6	2,9
25-29	11,2	3,8	7,9	2,4	9,6	3,1	9,4	2,9	7,0	2,1	8,1	2,4	9,0	2,8
30-34	9,5	2,9	8,5	2,4	9,0	2,6	5,8	1,4	5,9	1,4	5,8	1,4	7,9	2,2
35-39	13,5	2,7	6,9	1,2	10,3	1,9	7,3	1,2	7,0	1,1	7,2	1,1	9,2	1,6
40-44	14,2	2,9	7,3	1,3	10,8	2,2	6,6	1,3	5,3	0,9	5,9	1,1	9,0	1,7
45-49	10,2	2,1	7,7	1,4	9,0	1,7	7,3	1,8	3,6	0,7	5,5	1,1	7,6	1,5
50-54	12,3	2,4	6,7	1,1	9,6	1,8	7,7	1,9	5,1	1,0	6,5	1,4	8,3	1,6
55-59	8,8	1,6	5,2	0,7	7,2	1,1	6,0	1,4	5,5	0,9	5,8	1,2	6,6	1,1
60-64	7,3	0,8	6,4	0,5	6,9	0,6	3,9	0,6	2,4	0,3	3,2	0,4	5,2	0,7
65-74	4,2	1,0	4,3	0,6	4,2	0,7	1,9	0,6	3,9	0,9	2,8	0,9	3,5	0,8
75+	3,9	0,6	3,5	0,2	3,8	0,4	2,9	0,6	4,5	0,4	3,5	0,5	3,6	0,4
OGÓLEM	29,4	100,0	34,5	100,0	31,9	100,0	25,3	100,0	29,7	100,0	27,5	100,0	30,0	100,0

ZAPADNOŚĆ NA 100 000 WYŚC.

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*inne salmonelozы w Polsce w 1981 r.  
/z wyjątkiem zatruć pokarmowych/*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	3510	34,5	3232	29,4	6742	31,9
	<20 tys.	654		607		1261	28,5
	20-50 tys.	510		493		1003	28,9
	50-100 tys.	401		416		817	29,8
	>100 tys.	1945		1716		3661	34,8
WIEŚ		2174	29,7	1872	25,3	4046	27,5
OCOLEN		5684	32,5	5104	27,7	10788	30,0

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabola 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań:

na salmonellozy *N. Połbca* N 1981r  
(z użyciem załmci pokarmowych)

Miesiąc	Liczba	%
I	952	9,1
II	931	8,9
III	948	9,1
IV	835	8,0
V	1099	10,5
VI	1145	11,0
VII	948	9,1
VIII	910	8,7
IX	741	7,1
X	797	7,6
XI	642	6,2
XII	490	4,7
Razem	10438	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zachorowań na zapalenie mózgu... w/g wieku, płci i środowiska w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	28	44	72	51	59	110	182
6	13	21	34	24	33	57	91
1	6	10	16	16	15	31	47
2	4	6	10	6	5	11	21
3	3	3	6	2	4	6	12
4	2	4	6	3	2	5	11
5-9	4	11	15	5	6	11	26
5	2	1	3	1	1	2	5
6	2	4	6	1	2	3	9
7	-	1	1	-	-	-	1
8	-	3	3	2	1	3	6
9	-	2	2	1	2	3	5
10-14	7	5	12	4	6	10	22
15-19	3	5	8	5	2	7	15
20-24	5	9	14	3	4	7	21
25-29	1	2	3	2	-	2	5
30-34	2	4	6	1	4	5	11
35-39	1	3	4	-	-	-	4
40-44	2	1	3	2	-	2	5
45-49	2	6	8	1	1	2	10
50-54	4	7	11	2	2	4	15
55-59	3	4	7	1	3	4	11
60-64	2	-	2	-	-	-	2
65-69	-	4	4	1	1	2	6
75 +	-	1	1	1	1	2	3
Ogółem	64	106	170	79	89	168	338

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/c płci, wieku i środowiska

Zapalenie mózgu (ogólny) w Polsce w 1981.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓLNI	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	1,5	43,8	4,6	41,5	3,9	42,3	7,4	64,6	8,2	66,3	7,8	65,4	5,6	53,8
0	3,4	20,3	10,8	19,8	9,0	20,0	16,4	30,4	21,4	37,1	19,0	33,9	13,4	26,8
1	1,6	3,4	5,1	3,4	4,2	3,4	11,1	20,3	10,0	16,9	10,6	13,4	7,0	13,9
2	1,1	6,3	3,1	5,7	2,7	5,9	4,4	7,6	3,5	5,6	3,9	6,5	3,2	6,2
3	0,8	4,7	1,6	2,8	1,6	3,5	1,5	2,5	2,9	4,5	2,2	3,6	1,9	3,6
4	0,5	3,1	2,1	3,8	1,6	3,5	2,3	3,8	1,5	2,2	1,9	3,0	1,7	3,3
5-9	0,2	6,3	1,3	10,4	0,9	8,9	0,8	6,3	0,9	6,7	0,8	6,5	0,9	7,7
5	0,5	3,1	0,5	1,0	0,8	1,8	0,8	1,3	0,7	1,2	0,7	1,1	0,8	1,5
6	0,6	3,2	2,2	3,8	1,7	3,5	0,8	1,3	1,5	2,2	1,1	1,8	1,5	2,7
7	-	-	0,6	0,9	0,3	0,6	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3
8	-	-	1,8	2,8	0,9	1,8	1,6	2,4	0,8	1,1	1,2	1,8	1,0	1,8
9	-	-	1,3	1,9	0,7	1,2	0,8	1,3	1,6	2,2	1,2	1,8	0,9	1,4
10-14	0,5	10,9	0,7	4,7	0,9	7,1	0,7	5,0	1,0	6,8	0,9	5,9	0,9	6,5
15-19	0,2	4,7	0,6	4,7	0,5	4,7	0,9	6,3	0,3	2,2	0,6	4,2	0,6	4,4
20-24	0,3	7,8	0,9	8,5	0,7	8,2	0,5	3,8	0,6	4,5	0,5	4,2	0,6	6,2
25-29	0,0	1,6	0,2	1,9	0,1	4,8	0,4	2,5	-	-	0,2	1,2	0,1	1,5
30-34	0,1	3,1	0,4	3,8	0,3	3,5	0,2	1,3	0,8	4,6	0,5	3,0	0,4	3,3
35-39	0,1	1,6	0,5	2,8	0,3	2,3	-	-	-	-	-	-	0,2	1,2
40-44	0,2	3,1	0,2	0,9	0,2	1,8	0,5	2,5	-	-	0,4	1,2	0,2	1,5
45-49	0,2	3,1	0,9	5,7	0,6	4,7	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,2	0,5	3,0
50-54	0,3	6,2	1,2	6,6	0,9	6,5	0,4	2,5	0,5	2,2	0,4	2,4	0,7	4,4
55-59	0,3	4,7	0,9	3,8	0,7	4,1	0,2	1,3	0,8	3,4	0,5	2,4	0,6	3,2
60-64	0,3	3,1	-	-	0,3	1,2	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6
65-74	-	-	0,9	3,8	0,3	2,3	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,2	0,3	1,8
75+	-	-	0,5	0,9	0,2	0,6	0,3	1,3	0,4	1,1	0,3	1,2	0,2	0,9
OGÓLNI	0,3	100,0	1,0	100,0	0,8	100,0	1,1	100,0	1,2	100,0	1,1	100,0	0,9	100,0

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

zapalenie mózgu w Polsce w 1981 r.  
ogółem

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	106	1,0	64	0,6	170	0,8
	<20 tys.	30		20		50	1,1
	20-50 tys.	21		14		35	1,0
	50-100 tys.	14		7		21	0,7
	>100 tys.	41		23		64	0,6
WIEŚ		89	1,2	79	1,1	168	1,1
OGÓŁEM		195	1,1	143	0,8	338	0,9

zapadalność na 100.000 miesz.

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na zapalenie wątroby 1981 r.  
(ogółem)

Miesiąc	Liczba	%
I	28	8,7
II	25	7,7
III	33	10,2
IV	32	9,9
V	28	8,7
VI	22	6,8
VII	22	6,8
VIII	28	8,7
IX	26	8,1
X	27	8,4
XI	26	8,0
XII	26	8,0
Razem	323	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zachorowań na ~~zakażenie~~ <sup>zakażenie</sup> ~~OPR. MÓZG~~ <sup>OPR. MÓZG</sup> w/c wieku, płci  
 W0 - ~~rodzeń~~ <sup>rodzeń</sup>, ~~enterowirusowe~~ <sup>enterowirusowe</sup> i ~~surynuzie~~ <sup>surynuzie</sup>  
 i środowisku ~~w Polsce w 1981r.~~ <sup>w Polsce w 1981r.</sup>

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	124	279	403	53	102	155	558
0	29	49	78	19	37	56	134
1	18	24	42	11	21	32	74
2	15	39	54	6	10	16	70
3	23	72	95	11	13	24	119
4	39	95	134	6	21	27	161
5-9	177	386	563	85	154	239	802
5	49	105	154	17	26	43	197
6	43	96	139	20	36	56	195
7	44	79	123	18	30	48	171
8	21	55	76	18	28	46	122
9	20	51	71	12	34	46	117
10-14	63	159	222	64	121	185	407
15-19	35	67	102	32	72	104	206
20-24	38	45	83	48	51	99	182
25-29	48	41	89	22	33	55	144
30-34	28	19	47	17	13	30	77
35-39	20	10	30	6	9	15	45
40-44	6	4	10	8	11	19	29
45-49	7	4	11	8	7	15	26
50-54	5	6	11	6	12	18	29
55-59	4	3	7	6	1	7	14
60-64	3	1	4	2	4	6	10
65-74	5	4	9	4	4	8	17
75 +	-	-	-	2	2	4	4
Ogółem	563	1028	1591	363	596	959	2550



Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/ę płci, wieku i środowiska

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe i wirusowe w Polsce  
w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓLEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	13,6	22,0	29,1	27,1	21,6	25,3	7,7	14,6	13,1	17,1	11,0	16,2	17,0	9,2
0	15,7	5,1	25,3	4,8	20,6	4,9	13,0	5,2	24,0	6,2	18,7	5,9	19,7	1,9
1	9,7	3,2	12,3	2,3	11,0	2,6	7,7	3,0	13,9	3,5	19,9	3,3	11,0	1,9
2	8,2	2,7	20,2	3,8	14,4	3,4	4,4	1,7	7,0	1,7	5,7	1,7	10,7	1,8
3	12,9	4,3	32,5	7,0	26,0	6,0	8,4	3,0	9,5	2,2	9,0	2,5	18,8	1,8
4	21,7	6,9	50,5	9,2	36,5	8,4	4,6	17,7	15,4	3,5	10,1	2,8	25,4	1,8
5-9	21,6	31,4	45,1	37,5	33,6	35,4	13,4	23,4	23,2	25,8	18,4	24,9	27,0	8,2
5	27,3	8,7	56,0	10,1	42,0	9,7	12,8	4,6	18,8	4,4	15,9	4,5	30,9	1,8
6	25,1	7,6	53,4	9,3	39,6	8,7	15,4	5,5	26,5	6,0	21,1	5,8	31,6	1,7
7	27,1	7,8	46,5	7,7	37,0	7,7	14,3	5,0	22,7	5,0	18,6	5,0	28,9	1,6
8	13,5	3,7	33,7	5,4	23,8	4,8	14,5	5,0	21,6	4,7	18,1	4,8	21,3	1,6
9	13,5	3,6	32,9	5,0	23,4	4,5	9,9	3,3	26,8	5,7	18,6	4,8	21,2	1,5
10-14	9,6	11,2	23,1	15,5	16,5	13,9	10,9	17,6	19,8	20,3	15,5	19,4	16,0	7,1
15-19	4,6	6,2	8,4	6,5	6,6	6,4	5,8	8,8	12,4	12,1	9,2	10,8	7,7	7,5
20-24	3,8	6,8	4,7	4,4	4,2	5,2	8,2	13,2	7,4	8,6	7,7	10,3	5,6	9,0
25-29	4,3	8,5	3,9	4,0	4,1	5,6	4,0	6,1	5,0	5,5	4,5	5,7	4,3	9,4
30-34	2,8	5,0	2,0	1,8	2,4	3,0	3,6	4,7	2,5	3,0	3,1	2,6	8,3	8,3
35-39	3,1	3,6	1,6	1,0	2,4	1,9	1,9	1,7	1,8	1,5	2,3	1,6	2,4	5,3
40-44	0,9	1,1	0,6	0,4	0,8	0,6	0,6	2,1	2,2	2,9	1,8	2,5	1,4	5,7
45-49	1,1	1,2	0,6	0,4	0,8	0,7	1,9	2,2	1,7	1,8	1,6	1,6	1,2	6,0
50-54	0,8	0,9	1,0	0,6	0,9	0,7	1,3	1,7	2,8	2,0	2,0	1,9	1,4	5,9
55-59	0,7	0,7	0,6	0,3	0,7	0,7	1,3	1,7	0,3	0,2	0,9	0,7	0,8	5,2
60-64	0,8	0,5	0,4	0,1	0,6	0,3	0,7	0,5	1,6	0,7	1,1	0,6	0,8	3,3
65-74	0,7	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6	0,6	1,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	6,4
75+	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,9	0,3	0,7	0,4	0,3	3,5
OGÓLEM:	5,1	100,0	10,1	100,0	7,5	100,0	4,9	100,0	8,1	100,0	6,5	100,0	7,1	100,0

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

*zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe i  
surynowe w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	1028	10,1	563	5,1	1591	7,5
	<20 tys.	198		95		293	6,6
	20-50 tys.	146		77		223	6,4
	50-100 tys.	134		86		220	8,0
	>100 tys.	550		305		855	8,1
WIEŚ		596	8,1	363	4,9	959	6,5
OGÓLEM		1624	9,3	926	5,0	2550	7,1

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabola 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań

na zapalenie. ppo. rógogono-raxen enteroinfuzore  
i surouize w Polsce w 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	136	5,5
II	111	4,5
III	130	5,3
IV	120	4,9
V	154	6,3
VI	213	8,7
VII	241	9,8
VIII	355	14,5
IX	367	14,9
X	339	13,8
XI	197	8,0
XII	93	3,8
Razem	2456	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na zapalenie czołowe w/w wieku, płci  
w/w-rodzeń. meningokokowe i inne bakteryjne  
i środowisku w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLEM
	Kobioty	Mężczyźni	Ogółem	Kobioty	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	267	393	660	262	389	651	1311
0	122	190	312	126	196	322	634
1	59	93	152	77	97	174	326
2	37	53	90	31	43	74	164
3	33	26	59	13	38	51	110
4	16	31	47	15	15	30	77
5-9	55	89	144	49	74	123	267
5	14	23	37	13	23	36	73
6	17	21	38	10	18	28	66
7	9	21	30	10	12	22	52
8	7	14	21	6	14	20	41
9	8	10	18	10	7	17	35
10-14	22	32	54	31	49	80	134
15-19	14	49	63	24	73	97	160
20-24	17	86	103	21	89	110	213
25-29	26	57	83	16	61	77	160
30-34	17	36	53	15	43	58	111
35-39	10	29	39	11	28	39	78
40-44	8	45	53	8	28	36	89
45-49	9	27	36	11	21	32	68
50-54	16	25	41	10	22	32	73
55-59	10	13	23	11	14	25	48
60-64	10	13	23	11	13	24	47
65-74	6	18	24	14	20	34	58
75 +	5	6	11	2	7	9	20
Ogółem	492	918	1410	496	931	1427	2837

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe i inne bakteryjne w Polsce w r. 1951

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓŁEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	29,3	54,3	41,1	42,8	35,3	46,8	38,1	52,9	54,0	41,8	46,2	45,7	40,0	46,3
0	66,0	24,8	98,2	20,7	82,5	22,1	86,2	25,5	127,2	21,1	107,2	22,6	93,4	22,4
1	31,7	12,0	47,5	10,1	39,8	10,8	53,9	15,5	64,4	10,4	59,3	12,2	48,3	11,5
2	20,2	7,5	27,5	5,8	23,9	6,4	22,6	6,3	29,9	4,6	26,4	5,2	25,0	5,8
3	18,5	6,7	13,9	2,8	16,1	4,2	9,9	2,6	27,9	4,1	19,1	3,6	17,4	3,9
4	8,9	3,3	16,5	3,4	12,8	3,3	11,5	3,0	11,0	1,6	11,2	2,1	12,1	2,7
5-9	6,7	11,2	10,4	9,7	8,6	10,2	7,7	9,9	11,2	7,9	9,5	8,6	9,0	9,4
5	7,8	2,8	12,3	2,5	10,1	2,6	9,8	2,7	16,7	2,4	13,3	2,5	11,4	2,7
6	9,9	3,6	11,7	2,3	10,8	2,7	7,7	2,0	13,2	1,9	10,5	2,0	10,7	2,3
7	5,5	1,8	12,4	2,3	9,0	2,1	7,9	2,0	9,1	1,3	8,5	1,5	8,8	1,8
8	4,5	1,4	8,6	1,5	6,6	1,5	4,8	1,2	10,8	1,5	7,9	1,4	7,2	1,4
9	5,4	1,6	6,4	1,1	5,9	1,3	8,3	2,0	5,5	0,8	6,9	1,2	6,4	1,2
10-14	3,3	4,5	4,7	3,5	4,0	3,8	5,3	6,4	8,0	5,3	6,7	5,6	5,3	4,7
15-19	1,8	2,8	6,1	5,3	4,0	4,5	4,4	4,8	12,6	7,8	8,6	6,8	6,0	5,6
20-24	1,7	3,5	8,9	9,4	5,3	7,1	3,6	4,2	12,8	9,5	8,6	7,7	6,6	7,6
25-29	2,3	5,3	5,4	6,2	3,8	5,9	2,9	3,2	9,3	6,6	6,4	5,4	4,8	5,6
30-34	1,7	3,5	3,7	3,9	2,7	3,8	3,2	3,0	8,2	4,6	5,8	4,1	3,7	3,9
35-39	1,6	2,0	4,7	3,2	3,1	2,8	3,5	2,2	8,2	3,0	6,1	2,7	4,1	2,7
40-44	1,2	1,6	7,1	4,9	4,1	3,8	2,1	1,6	7,4	3,0	4,8	2,5	4,3	3,1
45-49	1,4	1,8	4,3	2,9	2,8	2,6	2,6	2,2	5,1	2,3	3,8	2,2	3,2	2,4
50-54	2,5	3,3	4,2	2,7	3,3	2,9	2,1	2,0	5,1	2,4	3,6	2,2	3,4	2,6
55-59	1,7	2,0	2,8	1,4	2,2	1,6	2,2	2,2	3,8	1,5	3,1	1,8	2,6	1,7
60-64	2,8	1,0	4,9	1,4	3,7	1,6	3,6	2,2	5,1	1,4	4,3	1,7	4,0	1,7
65-74	0,8	1,2	3,9	2,0	2,0	1,7	2,2	2,8	4,1	2,1	3,1	2,4	2,5	2,0
75+	1,1	1,0	3,0	0,7	1,7	0,8	0,5	0,4	3,1	0,8	1,5	0,6	1,6	0,7
OGÓŁEM:	4,5	100,0	9,0	100,0	6,7	100,0	6,7	100,0	12,7	100,0	9,7	100,0	7,9	100,0

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci; środowiska

i liczby ludności w miastach

*zapalenie opon mózgowo-rdzeni. meningokokowe i inne bakteryjne w Polsce w roku 1981*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	918	9,0	492	4,5	1410	6,7
	<20 tys.	199		129		328	7,4
	20-50 tys.	202		107		309	8,9
	50-100 tys.	90		34		124	4,5
	>100 tys.	425		224		649	6,2
WIEŚ		931	12,7	496	6,7	1427	9,7
OGÓLEM		1849	10,6	988	5,4	2837	7,9

- 61 -

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIAST*

Tablica 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań

na zapalenie opon mózgowo-rdzeni.  
meningokokowe i inne bakteryjne w Polsce  
w roku 1981.

Miesiąc	Liczba	%
I	277	10,7
II	243	9,3
III	248	9,5
IV	240	9,2
V	237	9,0
VI	206	8,0
VII	224	8,6
VIII	229	8,8
IX	189	7,2
X	190	7,2
XI	179	6,9
XII	147	5,6
Razem	2609	100,0

\* wg daty zachorowania

Tabela 1. Liczba zabiorowców na *N.Z.N.w.* 1981 r. w/c wieku, płci

1 Srodowiska

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓŁEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	
0-4	479	553	1032	344	368	712	1744
0	33	36	69	15	34	49	118
1	31	51	82	19	24	43	125
2	65	90	155	30	39	69	224
3	130	161	291	109	89	198	489
4	220	215	435	171	182	353	788
5-9	1767	1716	3483	1933	1681	3614	7097
5	299	291	590	251	249	500	1090
6	365	353	718	379	331	710	1428
7	354	368	722	431	353	784	1506
8	378	364	742	445	359	804	1546
9	371	340	711	427	389	816	1527
10-14	1276	1411	2687	1763	1714	3477	6164
15-19	1008	1253	2261	1199	1530	2729	4990
20-24	1762	1291	3053	1109	990	2099	5152
25-29	1631	1272	2903	827	736	1563	4466
30-34	1171	983	2154	520	505	1025	3179
35-39	661	590	1251	267	320	587	1838
40-44	679	641	1320	285	307	592	1912
45-49	754	709	1463	315	328	643	2106
50-54	791	673	1464	361	387	748	2212
55-59	683	622	1305	346	343	689	1994
60-64	423	372	795	254	279	533	1328
65-74	743	514	1257	392	463	855	2112
75 +	336	188	524	169	175	344	868
Ogółem	14164	12788	26952	10084	10126	20210	47162



Tabola 2. Zapadalność i podział procentowy w/ę pici, wieku i środowiska

Wirusowa zapalenie wątroby w Polsce w 1981r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						OGÓLNE	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	52,5	3,4	57,8	4,3	55,2	3,9	50,0	3,4	51,1	3,6	50,6	3,5	53,2	3,7
0	17,9	0,2	18,6	0,3	18,2	0,3	10,3	0,1	22,1	0,3	16,3	0,2	17,4	0,3
1	16,6	0,2	26,1	0,4	21,5	0,3	13,3	0,2	15,9	0,2	14,7	0,2	18,5	0,3
2	35,4	0,5	46,7	0,7	41,2	0,6	21,9	0,3	27,1	0,4	24,6	0,3	34,1	0,5
3	72,9	0,9	86,0	1,3	79,6	1,1	83,4	1,1	65,3	0,9	74,1	1,0	77,3	1,0
4	122,6	1,6	114,4	1,6	118,4	1,6	130,8	1,7	133,7	1,8	132,3	1,8	124,2	1,6
5-9	215,9	12,5	200,6	13,5	208,1	13,0	305,1	19,2	253,6	16,6	278,8	17,9	238,9	15,0
5	166,5	2,1	155,2	2,3	160,7	2,2	189,5	2,5	180,4	2,5	184,8	2,5	171,0	2,3
6	212,7	2,6	196,5	2,8	204,4	2,7	291,7	3,8	243,5	3,3	267,0	3,5	231,4	3,0
7	217,6	2,5	216,5	2,9	217,1	2,7	341,5	4,3	266,8	3,5	303,3	3,9	254,8	3,2
8	242,2	2,7	223,1	2,8	232,4	2,8	358,7	4,4	276,5	3,5	316,6	4,0	269,7	3,3
9	200,0	2,6	219,1	2,7	234,2	2,6	353,2	4,2	307,1	3,8	329,6	4,0	277,1	3,2
10-14	194,1	9,0	205,2	11,0	199,8	10,0	301,4	17,5	279,9	16,9	290,4	17,2	242,5	13,1
15-19	132,9	7,1	157,1	9,8	145,3	8,4	218,9	11,9	264,2	15,1	242,2	13,5	186,0	10,6
20-24	178,1	12,4	133,6	10,1	156,1	11,3	188,7	11,0	142,7	9,8	163,8	10,4	159,2	10,9
25-29	246,7	11,5	120,0	9,9	133,6	10,8	148,8	8,2	112,1	7,3	128,9	7,7	131,9	9,5
30-34	116,9	8,3	101,0	7,7	109,0	8,0	110,9	5,2	46,1	5,0	103,0	5,1	107,0	6,7
35-39	104,0	4,7	95,3	4,6	99,7	4,6	84,3	2,6	98,0	3,2	91,3	2,9	96,9	3,9
40-44	102,5	4,8	101,2	5,0	101,9	4,9	75,7	2,8	89,8	3,0	78,3	2,9	93,2	4,1
45-49	113,5	5,3	111,7	5,5	112,6	5,4	74,0	3,1	79,0	3,2	76,5	3,2	98,4	4,5
50-54	122,9	5,6	113,5	5,3	118,4	5,4	77,0	3,6	90,5	3,8	83,5	3,7	103,7	4,7
55-59	117,2	4,8	134,7	4,9	125,0	4,8	77,0	3,4	93,6	3,4	84,5	3,4	107,2	4,2
60-64	118,1	3,0	140,7	2,9	127,7	2,9	83,6	2,5	110,3	2,8	95,7	2,6	112,6	2,8
65-74	100,2	5,2	111,0	4,0	104,3	4,7	62,9	3,9	95,9	4,6	77,3	4,2	91,4	4,5
75+	73,1	2,4	94,0	1,5	79,4	1,9	44,3	1,7	78,3	1,7	56,9	1,8	68,7	1,8
OGÓLNE	128,8	100,0	125,8	100,0	127,3	100,0	136,1	100,0	138,2	100,0	137,1	100,0	131,4	100,0

Tabela 3. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska  
i liczby ludności w miastach

*Wirusowe zapalenie wątroby w Polsce w 1981 r.*

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	12788	125,8	14164	128,8	26952	127,3
	<20 tys.	2923		3224		6147	
	20-50 tys.	2384		2599		4983	
	50-100 tys.	1487		1609		3096	
	>100 tys.	5994		6732		12726	
WIEŚ		10126	138,2	10084	136,1	20210	137,1
OGÓŁEM		22914	131,0	24248	131,7	47162	131,4

*ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.*

Tabola 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na *N.Z.W..w. Polseca* w 1981 r.

Miesiąc	Liczba	%
I	4118	8,8
II	3531	7,5
III	3673	7,9
IV	2979	6,4
V	3050	6,5
VI	2972	6,4
VII	3222	6,9
VIII	3902	8,4
IX	4907	10,5
X	5455	11,7
XI	4992	10,7
XII	3858	8,3
Razem	46659	100,0

\* wg daty zachorowania

Tablica 1. Liczba zachorowań na W.Z.N., H.B., Ag(t) w/c wieku, płci  
i środowisku w Polsce w 1981 r.

M 7389  
K 7985

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			OGÓLEM
	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni	Ogółem	K
0-4	✓ 97	142	239	✓ 40	46	86	137 325.
0	18	16	34	5	6	11	45
1	13	29	42	6	9	15	57
2	21	33	54	6	7	13	67
3	15	31	46	6	9	15	61
4	29	34	63	17	15	32	95
5-9	✓ 129	197	326	✓ 84	104	188	213 514.
5	30	39	69	11	22	33	102
6	23	52	75	20	22	42	117
7	28	43	71	13	20	33	104
8	29	40	69	15	21	36	105
9	19	23	42	25	19	44	86
10-14	✓ 109	167	276	✓ 73	106	179	182 455
15-19	✓ 198	280	478	✓ 108	153	261	306 739
20-24	✓ 784	485	1269	✓ 296	215	511	1022 1780
25-29	✓ 737	576	1313	✓ 295	244	539	1032 1852
30-34	✓ 579	520	1099	✓ 208	194	402	87 1501
35-39	✓ 382	317	699	✓ 96	138	234	478 933
40-44	✓ 390	391	781	✓ 142	144	286	321 1067
45-49	✓ 409	439	848	✓ 156	174	330	355 1178
50-54	✓ 463	398	861	✓ 200	221	421	683 1282
55-59	✓ 426	389	815	✓ 189	217	406	45 1221
60-64	257	212	469	150	155	305	774
65-74	458	314	772	216	242	458	1230
75 +	216	129	345	88	80	168	513
Ogółem	5634	4956	10590	2341	2433	4774	15364

921

635

454

777

460 + 0 = 7517 ✓

M 1132

K 1385

Tabola 2. Zapadalność i podział procentowy w/E płci, wieku i środowiska

Wirusowe zapalenie wątroby HBs Ag (+) w Polsce w 1981 r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						OGÓŁEM	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	10,6	1,7	14,8	2,9	12,8	2,3	5,8	1,7	6,4	1,9	6,1	1,8	9,9	2,1
0	9,7	0,3	8,3	0,3	9,0	0,3	3,4	0,2	3,9	0,2	3,7	0,2	6,6	0,3
1	7,0	0,2	14,8	0,6	11,0	0,5	4,2	0,3	6,0	0,4	5,1	0,3	8,4	0,4
2	11,4	0,4	17,1	0,7	14,4	0,5	4,4	0,3	4,9	0,3	4,6	0,3	10,2	0,4
3	8,4	0,3	16,6	0,6	12,6	0,4	4,6	0,3	6,6	0,4	5,6	0,3	9,6	0,4
4	16,2	0,5	18,1	0,7	17,1	0,6	13,0	0,6	11,0	0,6	12,0	0,7	15,0	0,6
5-9	15,8	2,3	23,0	4,0	19,5	3,1	13,3	3,6	15,7	4,3	14,5	3,9	17,3	3,3
5	16,7	0,5	20,8	0,8	18,8	0,7	8,3	0,5	15,9	0,9	12,2	0,7	16,0	0,6
6	13,4	0,4	28,9	1,0	21,3	0,7	15,4	0,9	16,2	0,9	15,8	0,9	19,0	0,8
7	17,2	0,5	25,3	0,9	21,3	0,7	10,3	0,6	15,1	0,8	12,8	0,7	17,6	0,7
8	18,6	0,5	24,5	0,8	21,6	0,6	12,1	0,6	16,2	0,9	14,2	0,7	18,3	0,7
9	14,8	0,4	14,8	0,5	13,8	0,4	20,7	1,0	15,0	0,8	17,8	0,9	15,6	0,5
10-14	16,6	1,9	24,3	3,4	20,5	2,6	12,5	3,1	17,3	4,4	14,9	3,7	17,9	3,0
15-19	26,1	3,5	35,1	5,6	30,7	4,5	19,7	4,6	26,4	6,3	23,2	5,5	27,5	4,8
20-24	74,2	13,9	50,2	9,8	64,9	12,0	50,4	12,6	31,0	8,8	39,9	10,7	55,0	11,6
25-29	66,3	13,1	54,3	11,6	60,4	12,4	53,1	12,6	37,2	10,0	44,5	11,3	54,7	12,0
30-34	57,8	10,3	53,4	10,5	55,6	10,3	44,4	8,9	36,9	8,0	40,4	8,4	50,5	9,8
35-39	60,1	6,8	51,2	6,4	55,7	6,6	30,3	4,1	42,3	5,7	36,4	4,9	49,2	6,0
40-44	58,9	6,9	61,8	7,9	60,3	7,3	31,7	6,1	37,9	5,9	37,8	6,0	52,0	7,1
45-49	61,6	7,3	69,1	8,9	65,3	8,0	36,7	6,7	41,9	7,1	39,2	6,9	55,0	7,7
50-54	71,9	8,2	67,1	8,0	69,6	8,1	42,7	8,5	51,7	9,1	47,0	8,8	60,1	8,3
55-59	73,1	7,6	84,2	7,8	78,0	7,7	42,1	8,1	59,2	8,9	49,8	8,5	65,6	7,9
60-64	71,7	4,6	80,2	4,3	75,3	4,4	49,3	6,4	61,3	6,4	54,8	6,5	65,6	5,0
65-74	61,7	8,1	67,8	6,3	64,1	7,3	34,7	9,2	50,1	9,9	41,4	9,6	53,2	8,1
75+	47,0	3,8	64,5	2,6	52,3	3,4	23,1	3,8	35,8	3,3	27,8	3,5	40,6	3,3
OGÓŁEM	51,2	100,0	48,7	100,0	50,0	100,0	31,6	100,0	33,2	100,0	32,4	100,0	42,8	100,0

Tabela J. Liczba zachorowań i zapadalność wg płci, środowiska

i liczby ludności w miastach

W.Z.W. HB5 Ag(+) w Polsce w 1981r.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.	liczba	zapadaln.
MIASTO	Ogółem w tym:	4956	48,7	5634	51,2	10590	50,0
	<20 tys.	903		1014		1917	43,2
	20-50 tys.	904		1021		1925	55,4
	50-100 tys.	664		718		1382	50,5
	>100 tys.	2485		2881		5366	51,0
WIEŚ		2433	33,2	2341	31,6	4774	32,4
OGÓLEM		7389	42,2	7975	43,3	15364	42,8

ZAPADALNOŚĆ NA 100.000 MIESZK.

Tabela 4. Rozkład sezonowy\* zachorowań  
na W.Z.W...HBs...Ag(+) w 1981r.

Miesiąc	Liczba	%
I	1446	9,57
II	1277	8,45
III	1367	9,05
IV	1153	7,63
V	1216	8,05
VI	1230	8,14
VII	1392	9,21
VIII	1356	8,98
IX	1251	8,28
X	1311	8,68
XI	1160	7,68
XII	949	6,28
Razem	15108	100,00

\* wg daty zachorowania