

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
Instytut Naukowo-Badawczy  
Zakład Epidemiologii  
00-791 Warszawa ul. Chocimska 24

1983

*gpc*

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
00 - 791 WARSZAWA ul. CHOCIMSKA 24

WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE W POLSCE W 1983 ROKU

LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 MIESZKAŃCÓW  
WEDŁUG WIEKU, PŁCI, ŚRODOWISKA, MIESIĄCA ZACHOROWANIA  
I REJESTRACJI

WARSZAWA 1984

SPIS WYBRANYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH

- czerwonka	21
- różyczka	6
- nagminne zapalenie przyusznicy	10
- płonica	14
- świerzb	18
- odra	22
- zatrucia pokarmowe - ogółem	27
- <u>zatrucia pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella</u>	31
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe i surowicze	35
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe i inne bakteryjne	39
- wirusowe zapalenie wątroby	43
- wirusowe zapalenie wątroby HBsAg+	47
- <u>inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych/</u>	57

Tabela 1. Liczba zachorowań na czerniakę ..... w/g wieku, płci i środowiska.

M	K	Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
			Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
1311	1190	0-4	744	695	1439	567	495	1062	2501
185	185	0	99	86	185	86	99	185	370
285	218	1	159	115	274	126	103	229	503
337	318	2	187	197	384	150	121	271	655
279	266	3	171	167	338	108	99	207	545
225	203	4	128	130	258	97	73	170	428
595	632	5-9	350	381	731	245	251	496	1227
158	186	5	100	120	220	58	66	124	344
148	157	6	91	97	188	57	60	117	305
111	124	7	59	68	127	52	56	108	235
98	86	8	60	52	112	38	34	72	184
80	79	9	40	44	84	40	35	75	159
301	312	10-14	157	160	317	144	152	296	613
112	129	15-19	54	64	118	58	65	123	241
83	117	20-24	29	57	86	54	60	114	200
116	130	25-29	51	76	127	65	54	119	246
102	104	30-34	50	58	108	52	46	98	206
55	68	35-39	25	43	68	30	25	55	123
46	44	40-44	18	22	40	28	22	50	90
44	46	45-49	25	29	54	19	17	36	90
35	42	50-54	14	25	39	21	17	38	77
22	39	55-59	13	16	29	9	23	32	61
17	16	60-64	6	6	12	11	10	21	33
22	29	65-74	6	15	21	16	14	30	51
8	22	75 +	3	6	9	5	16	21	30
2869		Ogółem	1545	1653	3198	1324	1267	2591	5789

2020  
6070  
15      28      42      32      40      72      116

Tabela 2. Zapadalność<sup>z</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

... Czerwonka .....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	75,1	48,2	73,77	42,0	74,5	45,0	76,5	42,8	70,1	39,0	73,4	41,0	74,0	43,2
0	49,2	6,4	45,0	5,2	47,2	5,8	53,7	6,5	64,8	7,8	59,1	7,1	52,5	6,4
1	81,3	10,3	62,0	6,9	71,9	8,6	83,4	9,5	71,7	8,1	77,7	8,8	74,4	8,7
2	95,1	12,1	105,0	11,9	100,0	12,0	102,5	11,3	86,9	9,5	94,9	10,5	97,8	11,3
3	85,4	11,1	87,7	10,1	86,5	10,5	74,5	8,2	71,8	7,8	73,2	8,0	80,9	9,4
4	65,0	8,3	69,4	7,9	67,1	8,1	69,9	7,3	55,2	5,8	63,7	6,6	65,3	7,4
5-9	37,9	22,7	43,1	23,0	40,4	22,8	37,0	18,5	39,6	19,8	38,2	19,1	39,5	21,1
5	52,2	6,5	66,0	7,2	59,1	6,8	43,9	4,4	52,1	5,2	47,9	4,8	54,5	5,9
6	47,7	5,9	53,2	5,9	50,4	5,9	43,0	4,3	47,2	4,7	45,1	4,5	48,2	5,3
7	31,1	3,8	37,3	4,1	34,1	4,0	38,6	3,9	43,3	4,4	40,9	4,1	36,9	4,0
8	33,0	3,9	29,9	3,1	31,5	3,5	28,5	2,9	26,7	2,7	27,6	2,8	29,9	3,2
9	23,3	2,6	26,8	2,7	25,0	2,6	30,8	3,0	28,2	2,8	29,5	2,9	27,0	2,7
10-14	21,0	10,1	22,4	9,7	21,7	9,9	23,4	10,9	25,9	12,0	22,4	11,4	23,0	10,6
15-19	7,5	3,5	9,2	3,9	8,3	3,7	9,9	4,4	11,8	5,1	10,8	4,8	9,4	4,2
20-24	3,2	1,9	6,2	3,4	4,7	2,7	8,8	4,1	11,4	4,7	10,0	4,4	6,7	3,4
25-29	4,8	3,3	6,8	4,6	5,8	4,0	9,9	4,9	9,8	4,3	9,8	4,6	7,2	4,2
30-34	4,8	3,2	5,4	3,5	5,0	3,4	9,2	3,9	9,3	3,6	9,3	3,8	6,5	3,6
35-39	3,3	1,6	5,6	2,6	4,5	2,1	7,9	2,3	7,0	2,0	7,4	2,1	5,4	2,1
40-44	3,0	1,2	3,5	1,3	3,2	1,2	8,2	2,1	6,5	1,7	7,4	1,9	4,7	1,6
45-49	4,0	1,6	4,4	1,8	4,2	1,7	4,8	1,4	4,2	1,4	4,5	1,4	4,3	1,6
50-54	2,3	0,9	3,8	1,5	3,0	1,2	4,9	1,6	3,7	1,4	4,3	1,5	3,6	1,3
55-59	2,6	0,8	2,6	1,0	2,6	0,9	2,4	0,7	5,1	1,8	3,9	1,2	3,2	1,1
60-64	1,4	0,4	1,3	0,4	1,5	0,4	3,7	0,8	2,7	0,8	3,2	0,8	2,3	0,6
65-74	1,4	0,4	2,2	0,9	1,9	0,7	3,7	1,2	2,4	1,1	2,9	1,2	2,4	0,9
75 +	1,4	0,2	1,2	0,4	1,2	0,3	2,1	0,4	3,9	1,3	3,2	0,8	2,2	0,5
Ogółem	15,8	100,0	14,6	100,0	14,7	100,0	18,0	100,0	17,1	100,0	17,6	100,0	15,8	100,0

PZH 1/83, 60 egz.

z/ zapadalność na 100 tys.

1173

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na czerwonkę.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba	Zapadalność
		zachorowań	
MIASTO	Ogółem w tys:	3198	<u>14,8</u> <sup>7</sup> ✓
	<20 tys.	1457	32,6
	20-50 tys.	890	24,7
	50-100 tys.	66	2,3
	>100 tys.	785	7,2
WIEŚ		2591	17,6 ✓
OGÓLEM		5789	15,8

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
czerwonkę.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	56	44	1,0	0,8
II	49	49	0,8	0,8
III	47	65	0,8	1,1
IV	21	19	0,4	0,3
V	1796	1697	31,2	29,3
VI	934	919	16,2	15,9
VII	148	201	2,6	3,5
VIII	1085	385	18,9	6,6
IX	1000	549	17,4	9,5
X	322	1303	5,6	22,5
XI	238	403	4,1	7,0
XII	56	155	1,0	2,7
Razem	5752	5789	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania  
\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na różniczkę ..... w/g wieku, płci i środowiska.

Miejscowość	Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
		Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
3859	0-4	3166 ✓	2771	5937	693 ✓	690	1383	7320
670	0	532 ✓	467	999	138 ✓	120	258	1257
1006	1	835	725	1560	171	176	347	1907
731	2	596	478	1074	135	127	262	1336
725	3	601	553	1154	124	131	255	1409
727	4	602	548	1150	125	136	261	1411
3695	5-9	3041	2992	6033	654	777	1431	7464
750	5	615 ✓	569	1184	135	153	288	1472
823	6	684	703	1387	139	160	299	1686
845	7	699	681	1380	146	170	316	1689
693	8	570	564	1134	123	151	274	1408
584	9	473	475	948	111	143	254	1202
1559	10-14	1187	1149	2336	372	431	803	3139
161	15-19	99	123	222	62	67	129	351
38	20-24	26	60	86	12	22	34	120
34	25-29	26	37	63	8	11	19	82
19	30-34	11	21	32	8	6	14	46
10	35-39	8	15	23	2	5	7	30
7	40-44	5	14	19	2	3	5	24
5	45-49	4	1	5	1	3	4	9
3	50-54	3	3	6	-	-	-	6
2	55-59	1	2	3	1	1	2	5
1	60-64	-	1	1	1	-	1	2
1	65-74	1	-	1	-	-	-	1
2	75 +	1	-	1	1	1	2	3
9396	Ogółem	7579	7189	14768	1817	2017	3834	18602





Tabela 3 b. Liczba zachorowań i zapadalność na różniczkę wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	7579	72,2	7189	63,4	14768	67,7
	<20 tys.	1291		1328		2619	58,7
	20-50 tys.	1366		1251		2617	72,8
	50-100 tys.	996		873		1869	64,7
	>100 tys.	3926		3737		7663	70,5
WIEŚ		1817	24,7	2017	27,2	3834	26,0
OGÓLEM		9396	52,7	9206	49,1	18602	50,9

x/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
różniczkę

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	1573	1442	8,5	7,8
II	1557	1532	8,4	8,2
III	2005	2021	10,8	10,9
IV	2163	2262	11,8	12,2
V	2013	2146	10,9	11,5
VI	1287	1290	6,9	6,9
VII	946	1033	5,1	5,5
VIII	920	946	5,0	5,1
IX	1060	987	5,7	5,3
X	1396	1216	7,5	6,5
XI	1850	1762	10,0	9,5
XII	1732	1965	9,4	10,6
Razem	18502	18602	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na państw. zap. przyuszczy w/g wieku, pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	16502	14023	30525	3988	3315	7303	37828
0	221	174	395	97	106	203	598
1	728	608	1336	248	201	449	1785
2	2333	1908	4241	642	519	1161	5402
3	5408	4727	10135	1232	1020	2252	12387
4	7812	6606	14418	1769	1469	3238	17656
5-9	28751	26307	55058	12592	11216	23808	78866
5	7521	6562	14083	2003	1747	3750	17833
6	7689	6781	14470	2783	2425	5208	19678
7	6378	5843	12221	3021	2760	5781	18002
8	4156	4055	8211	2647	2385	5032	13243
9	3007	3066	6073	2138	1899	4037	10110
10-14	6190	6088	12278	5701	5231	10932	23210
15-19	628	644	1272	804	782	1586	2358
20-24	227	391	618	175	306	481	1099
25-29	222	424	646	158	277	435	1091
30-34	221	273	494	117	161	278	772
35-39	91	117	208	57	69	126	334
40-44	37	49	86	34	25	59	145
45-49	24	42	66	24	25	49	115
50-54	20	37	57	13	10	23	80
55-59	9	16	25	14	18	32	57
60-64	5	7	12	6	9	15	27
65-74	9	8	17	5	7	12	29
75 +	-	5	5	1	4	5	10
Ogółem	52936	48431	101367	23689	21455	45144	146511

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

## Najcięższe zapalenie przyusznicy.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	1666,3	31,2	1488,5	28,9	1579,6	30,1	538,0	16,8	469,7	15,4	504,7	16,2	1119,4	25,8
0	109,9	0,4	91,1	0,4	100,8	0,4	60,6	0,4	69,4	0,5	69,9	0,4	84,8	0,4
1	372,4	1,4	372,6	1,2	350,6	1,3	164,2	1,0	140,0	0,9	152,4	1,0	264,2	1,2
2	1187,0	4,4	1016,9	3,9	1103,9	4,2	438,8	2,7	372,7	2,4	406,6	2,6	806,6	3,7
3	2700,0	10,2	2481,4	9,8	2593,4	10,0	850,0	5,2	740,2	4,8	796,5	5,0	1839,1	8,4
4	3966,5	14,8	3255,2	13,6	3751,3	14,2	1274,3	7,5	1110,3	6,8	1194,3	7,2	2693,6	12,1
5-9	3109,7	54,3	2974,7	54,3	3043,7	54,3	1900,3	59,2	1768,2	52,3	1835,7	52,7	2539,3	53,8
5	3947,0	14,2	3609,4	13,5	3782,2	13,9	1516,7	8,5	1379,0	8,1	1449,3	8,3	2825,7	12,2
6	4028,2	14,5	3719,4	14,0	3877,4	14,3	2101,2	11,7	1907,9	11,3	2006,5	11,5	3110,0	13,4
7	3358,0	12,0	3207,5	12,1	3284,3	12,0	2241,0	12,8	2134,6	12,9	2189,0	12,8	2829,6	12,3
8	2288,0	7,9	2333,6	8,4	2310,3	8,1	1986,5	11,2	1874,5	11,1	1931,8	11,2	2150,2	9,0
9	1752,9	5,7	1865,9	6,3	1808,2	6,0	1643,8	9,0	1531,5	8,9	1589,0	8,9	1713,8	6,9
10-14	828,2	11,7	851,6	12,6	839,9	12,1	926,7	24,1	890,6	24,4	909,1	24,2	871,0	15,9
15-19	87,4	1,2	92,6	1,3	89,9	1,3	136,9	3,4	141,7	3,7	139,2	3,5	111,9	2,0
20-24	24,7	0,4	42,4	0,8	33,6	0,6	28,4	0,7	58,3	1,4	42,2	1,1	36,9	0,8
25-29	20,8	0,4	37,9	0,9	29,6	0,6	24,0	0,7	50,2	1,3	35,9	1,0	31,8	0,7
30-34	21,1	0,4	25,2	0,6	23,2	0,5	20,8	0,5	32,7	0,8	26,4	0,6	24,2	0,5
35-39	12,1	0,2	15,2	0,3	13,7	0,2	15,0	0,2	19,2	0,3	17,0	0,3	14,8	0,2
40-44	6,1	0,1	7,7	0,1	6,9	0,1	10,0	0,1	7,4	0,1	8,7	0,1	7,5	0,1
45-49	3,8	0,1	6,3	0,1	5,1	0,1	6,1	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1	5,5	0,1
50-54	3,2	-	5,6	0,1	4,5	0,1	3,1	0,1	2,2	0,1	2,6	0,1	3,7	0,1
55-59	1,8	-	2,6	-	2,3	-	3,7	0,1	4,0	0,1	3,9	0,1	3,0	-
60-64	1,5	-	1,6	-	1,5	-	2,0	-	2,4	-	2,3	-	1,9	-
65-74	2,1	-	1,2	-	1,5	-	1,1	-	1,2	-	1,2	-	1,4	-
75 +	-	-	1,0	-	0,7	-	0,4	-	1,0	-	0,8	-	0,7	-
Ogółem	504,6	100,0	427,4	100,0	464,5	100,0	322,9	100,0	289,4	100,0	306,0	100,0	400,6	100,0

\*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na Paęm.zap.przysznicy według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	101357	464,5
	<20 tys.	21488	481,3
	20-50 tys.	17600	489,4
	50-100 tys.	16874	584,2
	>100 tys.	45395	417,5
WIEŚ		45154	306,1
OGÓLEM		146511	480,6

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
nagminne zapalenie przyusznicy

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	9965	10778	6,8	7,3
II	9454	9146	6,4	6,2
III	10151	10264	6,9	7,0
IV	11399	11541	7,8	7,8
V	14076	14934	9,6	10,2
VI	15298	14963	10,4	10,2
VII	10903	10022	7,5	6,8
VIII	6035	5556	4,1	3,8
IX	5099	5437	3,5	3,7
X	11217	13509	7,7	9,2
XI	19267	20194	13,2	13,8
XII	23647	20493	16,1	14,0
Razem	146511	146837	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na ..pioniceę..... w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2376	2047	4423	455	443	898	5321
0	40	45	85	18	13	31	116
1	166	144	310	42	31	73	383
2	406	336	742	85	98	183	925
3	751	679	1430	132	138	270	1700
4	1013	843	1856	178	163	341	2197
5-9	2773	2658	5431	583	630	1213	6644
5	873	771	1644	154	157	311	1955
6	755	685	1440	151	166	317	1757
7	557	556	1113	117	147	264	1377
8	349	364	713	90	82	172	855
9	239	282	521	71	78	149	670
10-14	539	539	1078	206	194	400	1478
15-19	55	43	98	35	41	76	174
20-24	24	19	43	7	10	17	60
25-29	5	11	16	5	6	11	27
30-34	4	4	8	2	9	11	19
35-39	5	4	9	-	1	1	10
40-44	1	2	3	-	-	-	3
45-49	-	3	3	-	1	1	4
50-54	2	-	2	-	-	-	2
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	1	-	1	-	-	-	1
Ogółem	5786	5330	11116	1293	1335	2628	13744

Tabela 2. Zapadalność<sup>\*/</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... na płonice .....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	239,9	41,0	208,0	38,4	228,9	39,8	61,4	35,2	62,8	33,2	62,1	34,3	157,5	38,7
0	19,9	0,7	23,6	0,8	21,7	0,8	11,2	1,4	11,8	1,0	9,9	1,2	16,5	0,8
1	84,9	2,8	77,6	2,7	81,3	2,8	27,8	3,2	21,6	2,3	24,8	2,8	56,7	2,8
2	206,6	7,0	179,1	6,3	193,1	6,7	58,1	6,6	70,4	7,4	64,1	7,0	138,1	6,7
3	374,9	13,0	356,4	12,8	365,9	12,8	91,1	10,2	100,1	10,3	95,5	10,3	252,4	12,4
4	514,3	17,5	449,9	15,8	482,9	16,7	128,2	13,8	123,2	12,2	125,8	13,0	335,2	16,0
5-9	299,9	48,0	300,6	49,9	300,2	48,9	88,0	45,1	99,3	47,2	93,5	46,2	213,9	48,3
5	458,1	15,0	424,1	14,5	441,5	14,8	116,6	11,9	123,9	11,8	120,2	11,8	309,8	14,2
6	395,5	13,3	375,7	12,9	385,9	13,0	114,0	11,7	130,6	12,4	122,1	12,1	277,7	12,8
7	293,2	9,6	305,2	10,4	299,1	10,0	86,8	9,0	113,7	11,0	100,0	10,0	216,4	10,0
8	192,1	6,0	209,5	6,8	200,6	6,4	67,5	7,0	64,4	6,2	66,0	6,6	143,7	6,4
9	139,3	4,1	171,6	5,3	155,1	4,7	54,6	5,5	62,9	5,8	58,6	5,7	113,6	4,9
10-14	72,1	9,3	75,4	10,1	73,7	9,7	33,5	15,9	33,5	15,9	33,5	15,2	55,5	10,8
15-19	7,7	1,0	6,2	0,8	6,9	0,9	6,0	2,7	7,4	3,1	6,7	2,9	6,8	1,3
20-24	2,6	0,4	2,1	0,3	2,3	0,4	1,1	0,5	1,9	0,7	1,5	0,6	2,0	0,5
25-29	0,5	0,1	1,0	0,2	0,7	0,1	0,8	0,4	1,1	0,4	0,9	0,4	0,8	0,2
30-34	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2	1,8	0,7	1,0	0,4	0,6	0,1
35-39	0,7	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1
40-44	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
45-49	-	-	0,5	0,1	0,2	0,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
50-54	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	55,2	100,0	47,0	100,0	50,9	100,0	17,6	100,0	18,0	100,0	17,8	100,0	37,6	100,0

\*/ zapadalność na 100 tys.

15



Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na .płonice.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	11119	50,9
	<20 tys.	1868	41,8
	20-50 tys.	1766	49,1
	50-100 tys.	1356	46,9
	>100 tys.	6129	56,4
WIEŚ		2625	17,3
OGÓLEM		13744	37,6

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
... błonicy .....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	1589	1708	12,7	12,4
II	1259	1379	10,0	10,0
III	1125	1285	9,0	9,4
IV	1124	1193	9,0	8,7
V	994	1092	8,0	8,0
VI	820	940	6,6	6,8
VII	510	645	4,0	4,7
VIII	494	509	4,0	3,7
IX	852	804	6,8	5,8
X	1288	1281	10,3	9,3
XI	1286	1485	10,3	10,8
XII	1158	1423	9,3	10,4
Razem	12499	13744	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania  
\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na .świerzb..... w/g wieku,  
pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1165	1157	2322	841	804	1645	3967
0	109	100	209	83	73	156	365
1	244	218	462	184	178	362	824
2	230	250	480	192	161	353	833
3	283	288	571	194	189	383	954
4	299	301	600	198	193	391	991
5-9	1568	1625	3193	1239	1318	2557	5750
5	304	305	609	208	232	440	1049
6	323	304	627	236	243	479	1106
7	320	348	668	263	273	536	1204
8	324	320	645	266	292	558	1202
9	296	348	644	266	278	544	1188
10-14	1295	1603	2898	1473	1513	2986	5884
15-19	954	1350	2304	815	1096	1911	4215
20-24	913	773	1686	496	569	1065	2751
25-29	735	680	1415	452	352	804	2219
30-34	580	593	1173	289	283	572	1745
35-39	360	442	802	220	275	495	1297
40-44	241	312	553	193	198	391	944
45-49	216	247	463	186	221	407	870
50-54	167	195	362	176	205	381	743
55-59	100	147	247	113	119	232	479
60-64	87	96	183	80	105	185	368
65-74	73	113	186	94	113	207	393
75 +	34	58	92	78	84	162	254
Ogółem	8487	9391	17879	6746	7255	14000	31879

Tabela 2. Zapadalność<sup>z</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..Świerzb.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	117,6	13,7	122,8	12,3	120,2	13,0	113,5	12,4	113,9	11,1	113,7	11,7	117,4	12,4
0	54,2	1,3	52,4	1,0	53,3	1,2	45,6	1,1	54,3	1,1	49,8	1,1	51,8	1,1
1	124,8	2,9	117,5	2,3	121,2	2,6	121,8	2,7	123,9	2,5	122,9	2,6	121,9	2,6
2	117,0	2,7	133,2	2,7	124,9	2,7	131,2	2,8	115,6	2,2	123,6	2,5	124,4	2,6
3	141,3	3,3	151,2	3,1	146,1	3,2	133,8	2,9	137,2	2,6	135,5	2,7	141,6	3,0
4	151,8	3,5	160,6	3,2	156,1	3,3	142,6	2,9	145,9	2,7	144,2	2,8	151,2	3,1
5-9	169,6	18,5	183,7	17,3	176,5	17,8	187,0	18,3	207,8	18,2	197,2	18,2	185,1	18,0
5	159,5	3,6	167,8	3,3	163,6	3,4	157,5	3,1	183,1	3,2	170,0	3,1	166,2	3,3
6	169,2	3,8	166,7	3,2	168,0	3,5	178,2	3,5	191,2	3,4	184,6	3,4	174,8	3,5
7	168,5	3,8	191,0	3,7	179,5	3,7	195,1	3,9	211,1	3,8	203,0	3,8	189,2	3,8
8	178,4	3,8	184,2	3,4	181,5	3,6	199,6	3,9	229,5	4,0	214,2	4,0	195,2	3,7
9	172,6	3,5	211,8	3,7	191,7	3,6	204,5	3,9	224,2	3,8	214,1	3,9	201,4	3,7
10-14	173,3	15,3	224,2	17,1	198,2	16,2	239,4	21,8	257,6	20,9	248,3	21,3	220,8	18,5
15-19	132,7	11,2	194,0	14,4	162,9	12,9	138,7	12,1	198,6	15,1	167,7	13,7	165,0	13,2
20-24	99,5	10,8	83,7	8,2	91,6	9,4	80,6	7,3	108,4	7,8	93,4	7,6	92,3	8,6
25-29	68,8	8,7	60,8	7,3	64,7	7,9	68,7	6,7	63,7	4,9	66,4	5,7	65,3	7,0
30-34	55,3	6,8	54,7	6,3	55,0	6,3	51,4	4,3	57,5	3,9	54,2	4,1	54,8	5,5
35-39	47,9	4,2	57,4	4,7	52,7	4,7	59,0	3,3	76,5	3,8	67,0	3,5	57,4	4,1
40-44	39,6	2,8	49,2	3,3	44,5	3,1	56,6	2,9	58,6	2,7	57,6	2,9	49,1	3,0
45-49	34,4	2,5	37,1	2,6	35,8	2,6	47,1	2,8	55,1	3,0	51,1	2,9	41,6	2,7
50-54	27,1	2,0	29,7	2,1	28,4	2,0	41,4	2,6	45,0	2,8	43,2	2,7	34,5	2,3
55-59	20,3	1,2	24,3	1,6	22,5	1,4	30,1	1,7	26,2	1,6	27,9	1,7	24,9	1,5
60-64	26,0	1,0	21,4	1,0	23,4	1,0	26,9	1,2	28,5	1,4	27,8	1,3	25,4	1,2
65-74	17,2	0,9	16,4	1,2	16,7	1,1	21,5	1,4	19,5	1,6	20,4	1,5	18,5	1,2
75 +	15,5	0,4	11,6	0,6	12,8	0,5	32,2	1,2	20,5	1,2	24,8	1,2	18,5	0,8
Ogółem	80,9	100,0	82,9	100,0	81,9	100,0	92,0	100,0	97,8	100,0	94,9	100,0	87,2	100,0

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>\*/</sup> na ..świerzb.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem w tym:	17879
	<20 tys.	3683	82,5
	20-50 tys.	2660	74,0
	50-100 tys.	2837	98,2
	>100 tys.	8699	80,0
WIEŚ		14000	94,9
OGÓLEM		31879	87,2

\*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
świerzb. . . . .

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	4143	3821	13,2	12,0
II	3252	3266	10,3	10,2
III	3004	3138	9,6	9,8
IV	2768	2940	8,8	9,2
V	1885	2138	6,0	6,7
VI	1352	1427	4,3	4,5
VII	1058	1107	3,3	3,5
VIII	1696	1553	5,4	4,9
IX	2794	2267	8,9	7,1
X	3851	3751	12,3	11,8
XI	3532	3715	11,3	11,7
XII	2087	2756	6,6	8,6
Razem	31322	31879	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na ..... odrę..... w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	888	838	1726	549	532	1081	2807
0	177	174	351	130	142	272	623
1	268	239	507	173	161	334	841
2	153	147	300	85	102	187	487
3	140	143	283	78	75	153	436
4	150	135	285	83	52	135	420
5-9	995	999	1994	747	719	1466	3460
5	168	150	318	94	83	177	495
6	157	160	317	91	103	194	511
7	204	190	394	150	150	300	694
8	204	239	443	183	161	344	787
9	262	260	522	229	222	451	973
10-14	1139	1114	2253	1155	1089	2244	4497
15-19	80	76	156	161	125	286	442
20-24	10	9	19	7	9	16	35
25-29	2	7	9	4	1	5	14
30-34	2	2	4	2	1	3	7
35-39	-	1	1	1	2	3	4
40-44	1	1	2	-	-	-	2
45-49	-	1	1	1	-	1	2
50-54	1	-	1	-	-	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3118	3048	6166	2627	2478	5105	11271

Tabela 2. Zapadalność<sup>z</sup> i podział procentowy w/g pici, wieku i środowiska.

1183

....Odra.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	89,7	28,5	89,0	27,5	89,3	28,0	74,1	20,9	75,4	21,5	74,7	21,2	83,1	24,9
0	88,1	5,7	91,1	5,7	89,6	5,7	81,2	4,9	92,9	5,8	86,9	5,3	88,4	5,5
1	137,1	8,6	128,8	7,9	133,0	8,2	114,6	6,6	112,1	6,5	113,4	6,5	124,5	7,5
2	77,8	4,9	78,3	4,8	78,1	4,9	58,1	3,2	73,3	4,1	65,5	3,7	72,7	4,3
3	69,9	4,5	75,1	4,7	72,4	4,6	53,8	3,0	54,4	3,0	54,1	3,0	64,7	3,9
4	76,2	4,8	72,0	4,4	74,1	4,6	59,8	3,2	39,3	2,1	49,8	2,7	64,1	3,7
5-9	107,6	32,0	113,0	32,8	110,2	32,3	112,7	28,4	113,4	29,0	113,0	28,7	111,4	30,7
5	88,2	5,4	82,5	4,9	85,4	5,2	71,2	3,6	65,5	3,3	68,4	3,5	78,4	4,4
6	82,3	5,0	87,8	5,3	84,9	5,1	68,7	3,4	81,0	4,2	74,7	3,8	80,7	4,5
7	107,4	6,6	104,3	6,2	105,9	6,4	111,3	5,7	116,0	6,0	113,6	5,9	109,1	6,2
8	112,3	6,6	137,5	7,9	124,6	7,2	137,3	7,0	126,5	6,5	132,1	6,7	127,8	7,0
9	152,7	8,4	158,2	8,5	155,4	8,4	176,1	8,7	179,0	9,0	177,5	8,8	164,9	8,6
10-14	152,4	36,4	155,8	36,6	154,1	36,5	187,7	44,0	189,4	44,0	186,6	44,0	168,8	39,9
15-19	11,1	2,6	10,9	2,5	11,0	2,6	27,4	6,1	22,7	5,0	25,1	5,6	17,3	3,9
20-24	1,1	0,3	1,0	0,3	1,0	0,3	1,1	0,3	1,7	0,4	1,4	0,3	1,2	0,3
25-29	0,2	0,1	0,6	0,2	0,4	0,2	0,6	0,2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	0,1
30-34	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1
35-39	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	-	0,1	0,4	0,0	0,2	0,1
40-44	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
45-49	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
50-54	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	29,7	100,0	26,9	100,0	28,3	100,0	35,8	100,0	33,4	100,0	34,6	100,0	30,8	100,0

z/ zapadalność na 100 tys.

6.2.104  
2.674.509  
2.184  
84.7

23



Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na ..90r<sup>z</sup>.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem w tym:	6166
	<20 tys.	1393	31,2
	20-50 tys.	1688	46,9
	50-100 tys.	673	23,3
	>100 tys.	2412	22,2
WIEŚ		5105	34,6
OGÓLEM		11271	30,8

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
odre.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	583	496	5,1	4,4
II	654	579	5,7	5,1
III	919	900	8,0	8,0
IV	1031	1029	9,0	9,1
V	1597	1537	14,0	13,7
VI	1127	1101	9,9	9,8
VII	741	863	6,5	7,7
VIII	291	398	2,6	3,5
IX	328	284	2,9	2,5
X	899	781	7,9	6,9
XI	1714	1526	15,0	13,5
XII	1528	1777	13,4	15,8
Razem	11412	11271	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszczepionych	brak danych o szczepieniu	
0	47	549	27	623
1	169	582	90	841
2	149	270	68	487
3	171	209	56	436
4	156	212	52	420
0-4	692	1822	293	2807
5	168	249	78	495
6	157	297	57	511
7	202	395	97	694
8	191	506	90	787
9	179	660	134	973
5-9	897	2107	456	3460
10-14	337	3780	380	4497
Razem	1926	7709	1129	10764

Tabela 1. Liczba zachorowań na zatr.pokar.-ogółem. w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	273	261	534	176	162	338	872
0	28	17	45	29	23	52	97
1	42	23	65	29	30	59	124
2	42	50	92	34	33	67	159
3	67	83	150	44	34	78	228
4	94	88	182	40	42	82	264
5-9	334	360	694	270	268	538	1232
5	88	76	164	46	37	83	247
6	66	81	147	67	40	107	254
7	58	56	114	61	72	133	247
8	62	68	130	46	53	99	229
9	60	79	139	50	66	116	255
10-14	266	378	644	273	289	562	1206
15-19	258	398	656	219	266	485	1141
20-24	370	261	631	202	205	407	1038
25-29	419	282	701	215	214	429	1130
30-34	371	274	645	179	177	356	1001
35-39	265	230	495	116	128	244	739
40-44	173	151	324	108	93	201	525
45-49	158	157	315	98	105	203	518
50-54	118	138	256	78	105	183	439
55-59	92	96	188	83	97	180	368
60-64	44	68	112	53	73	126	238
65-74	52	55	107	50	83	133	240
75 +	34	56	90	29	64	93	183
Ogółem	3227	3165	6392	2149	2329	4478	10870

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

... zatrucia pokarmowa ogółem .....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapat.	%
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%		
0-4	27,6	8,5	27,7	8,2	27,6	8,3	23,7	8,1	22,9	7,0	23,3	7,5	25,8	8,0
0	13,9	0,9	8,9	0,5	11,5	0,7	18,1	1,3	15,0	1,0	16,6	1,2	13,8	0,9
1	21,5	1,3	12,4	0,7	17,1	1,0	19,2	1,3	20,9	1,3	20,0	1,3	18,3	1,1
2	21,4	1,3	26,6	1,6	23,9	1,4	23,2	1,6	23,7	1,4	23,5	1,5	23,7	1,5
3	33,4	2,1	43,6	2,6	38,4	2,4	30,3	2,0	24,7	1,5	27,6	1,7	33,8	2,1
4	47,7	2,9	46,9	2,8	47,3	2,8	28,8	1,9	31,7	1,8	30,2	1,8	40,3	2,4
5-9	36,1	10,4	40,7	11,4	38,4	10,9	40,7	12,6	42,2	11,5	41,5	12,5	39,7	11,3
5	46,2	2,7	41,8	2,4	44,0	2,6	34,8	2,2	29,2	1,6	32,1	1,8	39,1	2,3
6	34,6	2,1	44,4	2,6	39,4	2,3	50,6	3,1	31,5	1,7	41,2	2,4	40,1	2,3
7	30,5	1,8	30,7	1,8	30,6	1,8	45,3	2,8	55,7	3,1	50,3	3,0	38,8	2,3
8	34,1	1,9	39,1	2,1	36,6	2,0	34,5	2,2	41,6	2,3	38,0	2,2	37,2	2,1
9	35,0	1,9	48,1	2,5	41,4	2,2	38,4	2,3	53,2	2,8	45,6	2,6	43,2	2,3
10-14	35,6	8,2	52,9	11,9	44,0	10,1	44,4	12,7	49,2	12,5	46,7	12,6	45,3	11,1
15-19	35,9	8,0	57,2	12,6	46,4	10,3	37,3	10,1	48,2	11,4	42,6	10,8	44,6	10,5
20-24	40,3	11,5	28,3	8,2	34,3	9,9	32,8	9,5	39,1	8,8	35,7	9,1	34,8	9,6
25-29	39,2	13,0	25,2	8,9	32,1	11,0	32,7	10,0	38,7	9,2	35,4	9,6	33,2	10,4
30-34	35,4	11,5	25,3	8,7	30,2	10,1	31,8	8,3	35,9	7,6	33,8	8,0	31,4	9,2
35-39	35,2	8,2	29,9	7,3	32,5	7,7	30,6	5,5	35,6	5,5	33,0	5,4	32,7	6,8
40-44	28,4	5,4	23,8	4,8	26,1	5,1	31,7	5,0	27,5	4,0	29,6	4,5	27,3	4,8
45-49	25,1	4,9	23,6	5,0	24,3	4,9	24,8	4,6	26,2	4,5	25,5	4,5	24,8	4,8
50-54	19,1	3,7	21,0	4,4	20,1	4,0	18,3	3,6	23,1	4,5	20,8	4,1	20,4	4,0
55-59	18,7	2,8	15,9	3,0	17,1	2,9	22,1	3,0	21,3	4,2	21,7	4,0	19,1	3,4
60-64	13,1	1,3	15,1	2,1	14,3	1,7	17,8	2,5	19,8	3,1	18,9	2,8	16,4	2,2
65-74	12,2	1,6	8,0	1,7	9,6	1,7	11,4	2,3	14,3	3,5	13,1	3,0	11,3	2,2
75 +	15,5	1,0	11,2	1,8	12,5	1,4	12,0	1,3	15,6	2,7	14,3	2,1	13,3	1,7
Ogółem	30,7	100,0	27,9	100,0	29,3	100,0	29,3	100,0	31,4	100,0	30,4	100,0	29,7	100,0

\*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na zatrucia pokarmowe ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	6392	29,3
	<20 tys.	2203	49,3
	20-50 tys.	1419	39,4
	50-100 tys.	789	27,3
	>100 tys.	1981	18,3
WIEŚ		4478	30,4
OGÓLEM		10870	29,7

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na

zatrucia pokarmowe ogółem

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	704	548	6,6	5,0
II	163	448	1,5	4,1
III	304	176	2,9	1,6
IV	581	409	5,5	3,8
V	1381	1032	13,0	9,5
VI	1106	1257	10,4	11,6
VII	1585	897	14,9	8,2
VIII	1781	1897	16,8	17,5
IX	1443	1857	13,6	17,1
X	673	650	6,3	6,0
XI	683	1136	6,4	10,4
XII	219	563	2,1	5,2
Razem	10626	10870	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe w/w wieku, pałeczkami Salmonella płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	185	185	370	130	109	239	609
0	22	13	35	21	12	33	68
1	34	20	54	24	24	48	102
2	31	37	68	23	22	45	113
3	45	62	107	30	20	50	157
4	53	53	106	32	32	63	169
5-9	225	226	451	185	173	358	809
5	55	51	106	29	26	55	161
6	48	52	100	47	32	79	179
7	36	39	75	51	52	103	178
8	45	42	87	26	30	56	143
9	41	42	83	32	33	65	148
10-14	133	194	327	193	160	353	680
15-19	112	196	308	126	129	255	563
20-24	216	188	404	114	135	249	653
25-29	178	193	371	132	147	279	650
30-34	187	185	372	94	109	203	575
35-39	136	163	299	53	75	128	427
40-44	83	99	182	55	56	111	293
45-49	68	94	162	42	67	109	271
50-54	64	84	148	40	72	112	260
55-59	44	57	101	41	49	90	191
60-64	26	32	58	24	40	64	122
65-74	26	34	60	24	34	58	118
75 +	23	38	61	9	21	30	91
Ogółem	1706	1968	3674	1262	1376	2638	6312



Tabela 2. Zapadalność\*1 i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

zatrucia pokarmowe pałeczkami Salmonella

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	18,6	10,8	19,6	9,4	19,1	10,1	17,5	10,3	15,4	7,9	16,5	9,1	18,0	9,7
0	10,9	1,3	6,8	0,7	8,9	0,9	13,1	1,7	7,9	0,9	10,5	1,3	9,6	1,1
1	17,4	2,0	10,8	1,0	14,2	1,4	15,9	1,9	16,7	1,7	16,3	1,8	15,1	1,6
2	15,8	1,8	19,7	1,9	17,7	1,9	15,7	1,8	15,8	1,6	15,8	1,7	16,9	1,8
3	22,5	2,6	32,5	3,1	27,4	2,9	20,7	2,4	14,5	1,5	17,7	1,9	23,3	2,5
4	26,9	3,1	28,3	2,7	27,6	2,9	23,1	2,5	23,4	2,2	23,2	2,4	25,8	2,7
5-9	24,3	13,2	25,6	11,5	24,9	12,7	27,9	14,7	27,3	12,6	27,6	13,6	26,0	12,8
5	28,9	3,2	28,1	2,6	28,5	2,9	22,0	2,3	20,5	1,9	21,3	2,1	25,5	2,6
6	25,1	2,8	28,5	2,7	26,8	2,7	35,5	3,7	25,2	2,3	30,4	3,0	28,3	2,8
7	19,0	2,1	21,4	2,0	20,2	2,0	37,8	4,1	40,2	3,8	39,0	3,9	28,0	2,8
8	24,8	2,7	24,2	2,1	24,5	2,4	19,5	2,1	23,6	2,2	21,5	2,1	23,2	2,3
9	23,9	2,4	25,6	2,1	24,7	2,3	24,6	2,5	26,6	2,4	25,6	2,5	25,1	2,3
10-14	17,8	7,8	27,1	9,9	22,4	8,9	31,4	15,3	27,2	11,6	29,4	13,4	25,5	10,8
15-19	15,8	6,6	28,2	10,0	21,8	8,4	21,5	10,0	23,4	9,4	22,4	9,7	22,0	8,9
20-24	23,5	12,7	20,4	9,6	22,0	11,0	18,5	9,0	25,7	9,8	21,8	9,4	21,9	10,3
25-29	16,7	10,4	17,3	9,8	17,0	10,1	20,1	10,5	26,6	10,7	23,1	10,6	19,1	10,3
30-34	17,8	11,0	17,1	9,4	17,4	10,1	16,7	7,4	22,1	7,9	19,3	7,7	18,0	9,1
35-39	18,1	8,0	21,2	8,3	19,6	8,1	14,0	4,2	20,9	5,4	17,3	4,9	18,9	6,8
40-44	13,7	4,9	15,6	5,0	14,7	5,0	16,1	4,4	16,6	4,1	16,3	4,2	15,3	4,6
45-49	10,8	4,0	14,1	4,8	12,5	4,4	10,6	3,3	16,7	4,9	13,7	4,1	13,0	4,3
50-54	10,4	3,7	12,8	4,2	11,6	4,0	9,4	3,2	15,8	5,2	12,7	4,2	12,1	4,1
55-59	8,9	2,6	9,4	2,9	9,2	2,7	10,9	3,2	10,8	3,6	10,8	3,4	9,9	3,0
60-64	7,8	1,5	7,1	1,6	5,3	1,6	8,1	1,9	10,8	2,9	9,6	2,4	8,4	1,9
65-74	6,1	1,5	4,9	1,7	7,7	1,6	5,5	1,9	5,9	2,5	5,7	2,2	5,5	1,9
75 +	10,5	1,3	7,6	1,9	5,5	1,7	3,7	0,7	5,1	1,5	4,6	1,1	6,6	1,5
Ogółem	16,3	100,0	17,4	100,0	16,8	100,0	17,2	100,0	18,6	100,0	17,9	100,0	17,3	100,0

\*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>×</sup> na zatrucia pokarmowe pałeczkami Salmonella według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		2638	17,9
OGÓLEM		6312	17,3

×/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	441	179	7,0	2,8
II	34	276	0,5	4,4
III	195	49	3,1	0,8
IV	290	226	4,6	3,6
V	867	631	13,8	10,0
VI	830	823	13,2	13,0
VII	737	583	11,7	9,2
VIII	978	900	15,5	14,2
IX	1295	1373	20,6	21,8
X	346	483	5,5	7,7
XI	234	533	3,7	8,4
XII	50	256	0,8	4,1
Razem	6297	6312	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na enterowirusowe i surowicze zapalenie opon m-r. w/5 wieku, pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	417	225	642	161	103	264	906
0	56	44	100	57	31	88	188
1	28	23	51	28	17	45	96
2	60	27	87	17	14	31	118
3	110	55	165	25	20	45	210
4	163	76	239	34	21	55	294
5-9	730	331	1061	248	129	377	1438
5	187	87	274	51	31	82	356
6	174	83	257	52	12	64	321
7	168	78	246	51	25	76	322
8	110	42	152	53	32	85	237
9	91	41	132	41	29	70	202
10-14	295	169	464	202	93	295	759
15-19	144	112	256	110	82	192	448
20-24	97	111	208	74	63	137	345
25-29	102	123	225	73	53	126	351
30-34	45	72	117	33	28	61	178
35-39	29	31	60	12	23	35	95
40-44	14	14	28	13	9	22	50
45-49	13	15	28	10	12	22	50
50-54	7	15	22	8	8	16	38
55-59	9	6	15	7	7	14	29
60-64	3	4	7	5	4	9	16
65-74	1	7	8	3	1	4	12
75 +	-	2	2	2	4	6	8
Ogółem	1906	1237	3143	961	619	1580	4723

Tabela 2. Zapadalność<sup>§</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

enterowirusowe, i. surowicze, zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	42,1	21,8	23,9	18,2	33,2	20,4	21,7	16,7	14,6	16,6	18,2	16,7	26,8	19,2
0	27,9	2,9	23,0	3,6	25,5	3,2	35,6	5,9	20,3	5,0	28,1	5,6	26,7	4,0
1	14,3	1,5	12,4	1,9	13,4	1,6	18,5	2,9	11,8	2,7	15,3	2,8	14,2	2,0
2	30,5	3,1	8,3	2,2	22,6	2,8	11,6	1,8	10,1	2,3	10,9	2,0	17,6	2,5
3	54,9	5,8	28,9	4,4	42,2	5,2	17,2	2,6	14,5	3,2	15,9	2,8	31,2	4,5
4	82,8	8,5	40,6	6,1	62,2	7,6	24,5	3,5	15,9	3,4	20,3	3,5	44,9	6,2
5-9	78,9	38,3	37,4	26,7	58,7	33,7	37,4	25,8	20,3	20,8	29,1	23,9	46,3	30,4
5	98,1	9,8	47,9	7,0	73,6	8,7	38,6	5,3	24,5	5,0	31,7	5,2	56,4	7,5
6	91,2	9,1	45,5	6,7	68,9	8,2	39,3	5,4	9,4	1,9	24,7	4,1	50,7	6,8
7	88,5	8,8	42,8	6,3	66,1	7,8	37,8	5,3	19,3	4,0	28,8	4,8	50,6	6,8
8	60,6	5,8	24,2	3,4	42,8	4,8	39,8	5,5	25,1	5,2	32,6	5,4	38,5	5,0
9	53,0	4,8	25,0	3,3	39,3	4,2	31,5	4,3	23,4	4,7	27,6	4,4	34,2	4,3
10-14	39,5	15,5	23,6	13,7	31,7	14,8	32,8	21,0	15,8	15,0	24,5	18,7	28,5	6,1
15-19	20,0	7,6	16,1	9,1	18,1	8,1	18,7	11,5	14,9	13,3	16,9	12,1	17,5	9,5
20-24	10,6	5,1	12,0	9,0	11,3	6,6	12,0	7,8	12,0	10,2	12,0	8,7	11,6	7,3
25-29	9,6	5,4	11,0	9,9	10,3	7,2	11,1	7,6	9,6	8,6	10,4	7,9	10,3	7,4
30-34	4,3	2,4	6,6	5,8	5,5	3,7	5,9	3,4	5,7	4,5	5,8	3,9	5,6	3,7
35-39	3,9	1,5	4,0	2,5	3,9	3,9	3,2	1,3	5,7	3,8	4,7	3,2	4,2	2,0
40-44	2,3	0,7	2,2	1,1	2,2	0,9	3,8	1,4	2,7	1,5	3,2	1,4	2,6	1,1
45-49	2,1	0,7	2,2	1,2	2,2	0,9	2,5	1,0	3,0	1,9	2,8	1,4	2,4	1,1
50-54	1,1	0,4	2,3	1,2	1,7	0,7	1,9	0,8	1,8	1,3	1,8	1,0	1,8	0,8
55-59	1,8	0,5	1,0	0,5	1,4	0,5	1,9	0,7	1,5	1,1	1,7	0,9	1,5	0,6
60-64	0,9	0,1	0,9	0,3	0,9	0,2	1,7	0,5	1,1	0,6	1,4	0,6	1,1	0,3
65-74	0,2	-	1,0	0,6	0,7	0,3	0,7	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2	0,6	0,3
75 +	-	-	0,4	0,2	0,3	0,1	0,8	0,2	1,0	0,6	0,9	0,4	0,6	0,2
Ogółem	18,2	100,0	10,9	100,0	14,4	100,0	13,1	100,0	8,3	100,0	10,7	100,0	12,9	100,0

§/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>x</sup> na zapalenie. opr. W-R. enterowirusowe i surowicze według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	3143	14,4
	<20 tys.	553	12,4
	20-50 tys.	420	11,7
	50-100 tys.	401	13,9
	>100 tys.	1769	16,3
WIEŚ		1580	10,7
OGÓLEM		4723	12,9

x/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
enterowirusowe i surowicze zapalenie opon m-r

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	206	410	4,8	8,7
II	114	198	2,6	4,2
III	95	164	2,2	3,5
IV	128	131	3,0	2,8
V	226	139	5,2	2,9
VI	495	359	11,5	7,6
VII	758	503	17,7	10,7
VIII	907	720	21,1	15,2
IX	698	893	16,2	18,9
X	389	535	9,0	11,3
XI	201	442	4,7	9,4
XII	88	229	2,0	4,8
Razem	4305	4723	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

meningokokowe i inne bakteryjne  
Tabela 1. Liczba zachorowań na zapalenie opon m-r. w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem-	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	349	282	631	359	238	597	1228
0	143	134	277	178	99	277	554
1	90	62	152	102	70	172	324
2	43	32	75	42	43	85	160
3	41	28	69	23	16	39	108
4	32	26	58	14	10	24	82
5-9	111	69	180	69	34	103	283
5	28	21	49	11	8	19	68
6	29	19	48	14	8	22	70
7	21	14	35	14	5	19	54
8	22	10	32	19	8	27	59
9	11	5	16	11	5	16	32
10-14	42	24	66	48	25	73	139
15-19	27	12	39	47	18	65	104
20-24	36	17	53	38	13	51	104
25-29	35	15	50	42	5	47	97
30-34	35	20	55	20	8	28	83
35-39	24	8	32	24	9	33	65
40-44	24	5	29	8	8	16	45
45-49	17	5	22	26	7	33	55
50-54	25	10	35	21	9	30	65
55-59	19	11	30	26	7	33	63
60-64	10	6	16	9	13	22	38
65-74	10	14	24	21	6	27	51
75 +	11	9	20	8	8	16	36
Ogółem	775	507	1282	766	408	1174	2456



Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

meningokokowa i inne bakteryjne zapalenia opon m-r

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
	0-4	35,2	45,0	29,9	55,6	32,6	49,2	48,4	46,9	33,7	58,3	41,2	50,8	36,3
0	71,1	18,4	20,3	26,5	70,7	21,6	111,1	23,3	64,8	24,3	88,5	23,6	78,6	22,6
1	46,0	11,6	33,4	12,2	39,9	11,9	67,5	13,3	48,7	17,2	58,4	14,7	47,9	13,2
2	21,9	5,6	17,0	6,3	19,5	5,8	28,7	5,5	30,9	10,5	29,8	7,2	23,9	6,5
3	20,5	5,3	14,7	5,5	17,6	5,4	15,9	3,0	11,6	3,9	13,8	3,3	16,0	4,4
4	16,3	4,1	13,9	5,1	15,1	4,5	10,1	1,8	7,6	2,4	8,8	2,0	12,5	3,3
5-9	12,0	14,3	7,8	13,6	9,9	14,0	10,4	9,0	5,4	8,3	7,9	8,8	9,1	11,5
5	14,7	3,6	11,6	4,1	13,1	3,8	8,3	1,4	6,3	2,0	7,3	1,6	10,8	2,8
6	15,3	3,8	10,5	3,7	12,9	3,7	10,6	1,8	6,3	2,0	8,5	1,9	11,1	2,8
7	11,1	2,7	7,7	2,8	9,5	2,7	10,4	1,8	3,9	1,2	7,2	1,6	8,5	2,2
8	12,1	2,8	5,8	2,0	9,0	2,5	14,3	2,5	6,3	2,0	10,4	2,3	9,6	2,4
9	6,4	1,4	3,0	1,0	4,8	1,3	8,5	1,5	4,0	1,1	6,3	1,4	5,4	1,3
10-14	5,6	5,4	3,4	4,7	4,5	5,2	7,8	6,3	4,3	6,1	6,1	6,2	5,2	5,7
15-19	3,8	3,5	1,7	2,4	2,7	3,0	8,0	6,2	3,2	4,4	5,7	5,5	4,1	4,2
20-24	3,9	4,7	1,8	3,2	2,9	4,1	6,2	5,0	2,5	3,2	4,5	4,3	3,5	4,2
25-29	3,3	4,5	1,3	3,0	2,3	3,9	6,4	5,5	0,9	1,2	3,9	4,0	2,8	4,0
30-34	3,3	4,5	1,8	3,9	2,6	4,3	3,5	2,6	1,6	2,0	2,6	2,4	2,6	3,4
35-39	3,2	3,1	1,0	1,6	2,1	2,5	6,3	3,1	2,5	2,2	4,5	2,8	2,9	2,6
40-44	3,9	3,1	0,8	1,0	2,3	2,3	2,3	1,0	2,4	2,0	2,4	1,4	2,3	1,8
45-49	2,7	2,2	0,8	1,0	1,7	1,7	6,6	3,4	1,7	1,7	4,1	2,8	2,6	2,2
50-54	4,1	3,2	1,5	2,0	2,7	2,7	4,9	2,7	2,0	2,2	3,4	2,6	3,0	2,6
55-59	3,9	2,5	1,8	2,1	2,7	2,3	6,9	3,4	1,5	1,7	4,0	2,8	3,3	2,6
60-64	3,0	1,3	1,3	1,2	2,0	1,2	3,0	1,2	3,5	3,2	3,3	1,9	2,6	1,6
65-74	2,4	1,3	2,0	2,8	2,1	1,9	4,8	2,7	1,0	1,5	2,7	2,3	2,4	2,1
75 +	5,0	1,4	1,8	1,8	2,8	1,7	3,3	1,0	1,4	2,0	2,4	1,4	2,6	1,5
Ogółem	7,4	100,0	4,5	100,0	5,8	100,0	10,4	100,0	5,5	100,0	7,9	100,0	6,7	100,0

\*/ zapadalność na 100 tys.

40

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na zapalenie opon m. r. meningokokowe i inne bakt. według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	1282	5,9
	<20 tys.	305	6,8
	20-50 tys.	241	6,7
	50-100 tys.	168	5,8
	>100 tys.	568	5,2
WIEŚ		1174	7,9
OGÓLEM		2456	6,7

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	221	193	9,3	7,9
II	216	172	9,1	7,0
III	222	217	9,3	8,8
IV	204	204	8,6	8,3
V	210	207	8,8	8,4
VI	200	209	8,4	8,5
VII	221	202	9,3	8,2
VIII	225	219	9,4	8,9
IX	193	217	8,1	8,9
X	184	182	7,7	7,4
XI	174	234	7,3	9,5
XII	113	200	4,7	8,2
Razem	2383	2456	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na . WZM. w ogółem ..... w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	629	551	1180	577	508	1085	2265
0	58	20	78	34	21	55	133
1	43	37	80	31	20	51	131
2	75	78	153	88	57	145	298
3	164	142	306	144	149	293	599
4	289	274	563	280	261	541	1104
5-9	2415	2414	4829	2897	3121	6018	10847
5	409	398	807	417	396	813	1620
6	412	444	856	522	565	1087	1943
7	529	473	1002	620	660	1280	2282
8	523	557	1080	672	743	1415	2495
9	542	542	1084	666	757	1423	2507
10-14	2311	2029	4340	3323	3302	6625	10965
15-19	1824	1344	3168	2551	2051	4602	7770
20-24	1572	1761	3333	1505	1493	2998	6331
25-29	1400	1684	3084	1263	1184	2447	5531
30-34	1095	1136	2231	850	756	1606	3837
35-39	696	709	1405	450	351	801	2206
40-44	550	609	1159	292	270	562	1721
45-49	619	612	1231	335	288	623	1854
50-54	659	648	1307	382	373	755	2062
55-59	567	612	1179	368	383	751	1930
60-64	390	458	848	292	307	599	1447
65-74	484	620	1104	452	433	885	1989
75 +	217	360	577	194	203	397	974
Ogółem	15428	15547	30975	15731	15023	30754	61729

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

... WZW... ogółem .....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	63,5	4,1	58,5	3,5	61,1	3,8	77,8	3,7	72,0	3,4	75,0	3,5	67,0	3,7
0	28,9	0,4	10,5	0,1	19,9	0,2	21,2	0,2	13,7	0,1	17,6	0,2	18,9	0,2
1	22,0	0,3	19,9	0,2	21,0	0,3	20,5	0,2	13,9	0,1	17,3	0,2	19,4	0,2
2	38,2	0,5	41,6	0,5	39,8	0,5	60,1	0,6	40,9	0,4	50,8	0,5	44,5	0,5
3	81,9	1,0	74,5	0,9	78,3	1,0	99,3	0,9	108,1	1,0	103,6	0,9	88,9	1,0
4	146,8	1,9	146,2	1,8	146,5	1,8	201,7	1,8	197,3	1,8	199,5	1,7	168,4	1,8
5-9	261,2	15,6	273,0	15,5	267,0	15,6	437,2	18,4	492,0	20,8	464,0	19,6	349,2	17,5
5	214,6	2,6	218,9	2,6	216,7	2,6	315,8	2,7	312,6	2,7	314,2	2,6	256,7	2,6
6	215,8	2,7	243,5	2,8	229,4	2,8	394,1	3,3	444,5	3,8	418,8	3,5	307,1	3,1
7	278,5	3,4	259,7	3,0	269,3	3,2	459,3	3,9	510,5	4,4	484,7	4,2	358,7	3,7
8	287,9	3,4	320,5	3,6	303,9	3,5	504,3	4,3	583,9	4,9	543,2	4,6	405,1	4,0
9	316,0	3,5	329,8	3,5	322,8	3,5	512,1	4,2	610,5	5,0	560,1	4,7	425,0	4,1
10-14	309,2	15,0	283,8	13,1	296,8	14,0	540,1	21,1	562,2	22,0	550,9	21,5	411,5	17,8
15-19	253,7	11,8	193,2	8,7	223,9	10,2	434,3	16,2	371,6	13,7	403,9	15,0	304,2	12,6
20-24	171,4	10,2	190,8	11,3	181,1	10,8	244,7	9,6	284,5	9,9	263,0	9,8	212,4	10,3
25-29	131,1	9,1	150,7	10,8	141,1	10,0	191,9	8,0	214,4	7,9	202,2	8,0	162,9	9,0
30-34	104,5	7,1	104,8	7,3	104,6	7,2	151,2	5,4	153,6	5,0	152,3	5,2	120,4	6,2
35-39	92,6	4,5	92,1	4,6	92,3	4,5	118,7	2,9	97,6	2,3	108,4	2,6	97,6	3,6
40-44	90,5	3,6	96,1	3,9	93,3	3,7	85,6	1,9	79,9	1,8	82,7	1,8	89,6	2,8
45-49	98,5	4,0	92,0	3,9	95,1	4,0	84,8	2,1	71,8	1,9	78,3	2,0	88,7	3,0
50-54	106,8	4,2	98,6	4,2	102,6	4,2	89,8	2,4	81,9	2,5	85,7	2,5	95,7	3,3
55-59	115,1	3,7	101,3	3,9	107,5	3,8	97,9	2,3	84,3	2,5	90,4	2,4	100,2	3,1
60-64	116,5	2,5	102,1	3,0	108,2	2,7	98,1	2,7	83,3	2,0	89,9	1,9	99,8	2,3
65-74	114,0	3,1	90,1	4,0	99,2	3,6	103,4	2,9	74,8	2,9	87,1	2,9	93,5	3,2
75 +	98,7	1,4	71,9	2,3	80,1	1,9	80,1	1,2	49,5	1,4	60,9	1,3	71,0	1,6
Ogółem	147,1	100,0	137,2	100,0	141,9	100,0	214,4	100,0	202,6	100,0	208,5	100,0	168,8	100,0

±/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność na <sup>z/</sup> . . . . .  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		30754	208,5
OGÓLEM		61729	168,8

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
.WZW.r. ogólnem.

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	6445	5663	10,8	9,2
II	4835	5240	8,1	8,5
III	4385	5151	7,3	8,3
IV	3606	3932	6,0	6,4
V	3249	3529	5,4	5,7
VI	3135	3210	5,3	5,2
VII	3497	3156	5,9	5,1
VIII	4985	4217	8,4	6,8
IX	6926	5416	11,6	8,8
X	7771	7130	13,0	11,6
XI	6706	7934	11,2	12,8
XII	4152	7151	7,0	11,6
Razem	59692	61729	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na .WZW.....HBs+/..... w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	√ 128	• 83	211	√ 70	• 56	126	337 192
0	19	13	32	13	13	26	58
1	16	20	36	14	8	22	58
2	29	16	45	17	7	24	69
3	27	17	44	16	10	27	71
4	37	17	54	10	18	27	81
5-9	√ 204	• 167	371	√ 139	• 129	268	639 343
5	35	29	64	16	13	29	93
6	30	37	67	38	29	67	134
7	43	29	72	29	22	51	123
8	46	29	75	28	41	69	144
9	50	43	93	28	24	52	145
10-14	√ 210	• 153	363	√ 156	• 119	275	638 366
15-19	√ 309	• 210	519	√ 158	• 138	296	815 467
20-24	√ 445	• 672	1117	√ 205	• 296	501	1618 650
25-29	√ 550	• 703	1253	√ 250	• 276	526	1779 800
30-34	√ 498	• 543	1041	√ 227	• 229	456	1497 725
35-39	√ 350	• 387	737	√ 171	• 110	281	1018 521
40-44	√ 333	• 373	706	√ 144	• 124	268	974 477
45-49	√ 361	• 341	702	√ 181	• 147	328	1030 542
50-54	√ 399	• 409	808	√ 214	• 202	416	1224 613
55-59	√ 347	• 378	725	√ 222	• 195	417	1142 560
60-64	√ 246	• 285	531	√ 157	• 178	335	866
65-74	√ 294	• 399	693	√ 267	• 257	524	1217
75 +	√ 136	• 216	352	√ 109	• 123	232	584
Ogółem	4810	5319	10129	2670	2579	5249	15378

607

626

533

607 2667

M 1200

K 1158

Dz 15378

Dz M 2480

Dz K 2898

900

538



Tabela 2. Zapadalność<sup>x/</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

WZM.....HBs/+/.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	12,9	2,7	8,8	1,5	10,9	2,0	9,4	2,6	7,9	2,2	8,7	2,4	10,0	2,2
0	9,4	0,4	6,8	0,2	8,1	0,3	8,1	0,5	8,5	0,5	8,3	0,5	8,2	0,4
1	8,2	0,3	10,8	0,4	9,4	0,4	9,3	0,5	5,6	0,3	7,5	0,4	8,6	0,4
2	14,8	0,6	8,5	0,3	17,7	0,4	11,6	0,6	5,0	0,3	8,4	0,5	10,3	0,4
3	14,5	0,6	8,9	0,3	11,3	0,4	11,0	0,6	7,2	0,4	9,6	0,5	10,5	0,5
4	18,8	0,8	9,1	0,3	14,0	0,5	7,2	0,4	13,6	0,7	10,0	0,5	12,4	0,5
5-9	22,1	4,2	18,9	3,1	20,5	3,6	21,0	5,2	20,3	5,0	20,7	5,1	20,6	4,1
5	18,4	0,7	16,0	0,6	17,2	0,6	12,1	0,6	10,3	0,5	11,2	0,5	14,7	0,6
6	15,7	0,6	20,3	0,7	18,0	0,7	28,7	1,4	22,8	1,1	25,8	1,3	21,2	0,9
7	22,6	0,9	15,9	0,5	19,4	0,7	21,5	1,1	17,0	0,9	19,3	1,0	19,3	0,8
8	25,3	1,0	16,7	0,5	21,1	0,7	21,1	1,1	32,2	1,6	26,5	1,3	23,4	0,9
9	29,1	1,0	26,1	0,8	27,7	0,9	21,5	1,0	19,4	0,9	20,5	1,0	24,6	0,9
10-14	28,1	4,4	21,4	2,9	24,8	3,6	25,4	5,8	20,3	4,6	22,9	5,3	23,9	4,2
15-19	43,0	6,4	30,2	4,0	36,7	5,1	26,9	5,9	25,0	5,3	26,0	5,6	31,9	5,3
20-24	48,5	9,3	72,8	12,6	60,7	11,0	33,3	7,7	56,4	1,5	44,0	9,5	54,3	10,6
25-29	51,5	11,4	62,9	13,2	57,3	12,4	38,0	9,4	50,0	10,7	43,5	10,0	52,4	11,6
30-34	47,5	10,4	50,1	10,2	48,8	10,3	40,4	8,5	46,5	8,9	43,2	8,7	47,0	9,7
35-39	46,6	7,3	50,2	7,3	48,4	7,3	45,1	6,4	30,6	4,3	38,0	5,4	45,0	6,6
40-44	54,8	6,9	58,9	7,0	56,9	7,0	42,2	5,4	36,7	4,8	39,4	5,1	50,7	6,3
45-49	57,4	7,5	51,3	6,4	54,3	7,0	45,8	6,8	36,7	5,7	41,2	6,3	49,3	6,7
50-54	64,7	8,3	62,2	7,7	63,4	8,0	50,3	8,0	44,4	7,8	47,2	7,9	56,8	8,0
55-59	70,5	7,2	62,6	7,1	66,1	7,2	59,1	8,3	42,9	7,5	50,2	7,9	59,3	7,4
60-64	73,5	5,1	63,5	5,4	67,8	5,2	52,8	5,9	48,3	6,9	50,3	6,4	59,7	5,6
65-74	69,2	6,1	58,0	7,5	62,3	6,8	61,1	0,0	44,4	10,0	51,6	10,0	57,2	7,9
75 +	61,9	2,8	43,1	4,1	48,9	3,5	45,0	4,1	30,0	4,8	35,6	4,4	42,5	3,8
Ogółem	45,8	100,0	46,9	100,0	46,4	100,0	36,4	100,0	34,8	100,0	35,6	100,0	42,0	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>z</sup> na WZW. HBs/+/.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem w tym:	10129
MIASTO	<20 tys.	1967	44,1
	20-50 tys.	1375	58,2
	50-100 tys.	963	33,3
	>100 tys.	5824	53,6
WIEŚ		5249	35,6
OGÓLEM		15378	42,0

z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na

• ~~WZ~~ • • HBe/+/•

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	1497	1349	10,1	8,8
II	1170	1184	7,8	7,7
III	1247	1353	8,4	8,8
IV	1145	1115	7,7	7,2
V	1217	1192	8,2	7,7
VI	1194	1162	8,0	7,6
VII	1174	1167	7,9	7,6
VIII	1337	1310	9,0	8,5
IX	1394	1318	9,4	8,6
X	1407	1304	9,5	8,5
XI	1255	1543	8,4	10,0
XII	825	1381	5,6	9,0
Razem	14862	15378	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na inne salmonelozę w/c wieku, /z wyj. zatr. pokarm/ pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2747	2174	4921	2043	1551	3594	8515
0	1846	1461	3307	1411	1088	2499	5806
1	554	430	984	474	330	804	1788
2	186	131	317	83	80	163	480
3	90	85	175	46	29	75	250
4	71	67	138	29	24	53	191
5-9	193	154	347	99	93	192	539
5	55	47	102	26	19	45	147
6	45	31	76	17	19	36	112
7	38	25	63	19	16	35	98
8	32	25	57	22	22	44	101
9	23	26	49	15	17	32	81
10-14	113	78	191	58	64	122	313
15-19	62	90	152	41	66	107	259
20-24	66	126	192	38	74	112	304
25-29	81	121	202	50	61	111	313
30-34	82	126	208	39	39	78	286
35-39	74	84	158	35	36	71	229
40-44	52	74	126	24	30	54	180
45-49	52	75	127	26	26	54	179
50-54	43	63	106	31	46	77	183
55-59	28	52	80	29	38	67	147
60-64	22	29	51	27	31	58	109
65-74	17	42	59	29	30	59	118
75 +	11	30	41	13	16	29	70
Ogółem	3643	3318	6961	2582	2201	4783	11744

o 373 p.p.  
miej. w/c  
135-4

Tabela 2. Zapadalność<sup>z</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.  
 ..inne salmonelozy../z. wyj. zatr. pokarm./

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	277,4	75,4	230,8	65,5	254,7	70,7	275,6	79,1	219,8	70,4	248,4	75,2	252,0	72,5
0	918,3	50,7	765,2	44,0	843,7	47,5	881,0	54,6	712,2	49,4	798,6	52,3	823,7	49,5
1	283,4	15,2	231,7	13,0	258,2	14,1	313,9	18,4	229,8	15,0	272,9	16,8	264,6	15,2
2	94,6	5,1	69,8	3,9	82,5	4,6	56,7	3,2	57,4	3,6	57,1	3,4	71,7	4,1
3	44,9	2,5	44,6	2,6	44,8	2,5	31,7	1,8	21,0	1,3	26,5	1,6	37,1	2,1
4	36,0	1,9	35,8	2,0	35,9	2,0	20,9	1,1	18,1	1,1	19,5	1,1	29,1	1,6
5-9	20,9	5,3	17,4	4,6	19,2	5,0	14,9	3,8	14,7	4,2	14,8	4,0	17,4	4,6
5	28,9	1,5	25,9	1,5	27,4	1,5	19,7	1,0	15,0	0,9	17,4	0,9	23,3	1,2
6	23,6	1,2	17,0	0,9	20,4	1,1	12,8	0,7	14,9	0,9	13,9	0,8	17,7	1,0
7	20,0	1,0	13,7	0,7	16,9	0,9	14,1	0,7	12,4	0,7	13,2	0,7	15,4	0,8
8	17,6	0,9	14,4	0,7	16,0	0,8	16,5	0,8	17,3	1,0	16,9	0,9	16,4	0,9
9	13,4	0,6	15,8	0,8	14,6	0,7	11,5	0,6	13,7	0,7	12,6	0,7	13,7	0,7
10-14	15,1	3,1	10,9	2,4	13,1	2,7	9,4	2,3	10,9	2,9	10,1	2,6	11,7	2,7
15-19	8,6	1,7	12,9	2,7	10,7	2,2	7,0	1,6	11,9	3,0	9,4	2,2	10,1	2,2
20-24	7,2	1,8	13,7	3,8	10,4	2,8	6,2	1,5	14,1	3,4	9,8	2,4	10,2	2,6
25-29	7,6	2,2	10,8	3,6	9,2	2,9	7,6	1,9	11,0	2,8	9,2	2,3	9,2	2,7
30-34	7,8	2,3	11,6	3,8	9,8	3,0	6,9	1,5	7,9	1,8	7,4	1,6	9,0	2,4
35-39	9,8	2,0	10,9	2,5	10,4	2,3	9,2	1,4	10,0	1,6	9,6	1,5	10,1	1,9
40-44	8,6	1,4	11,7	2,2	10,1	1,8	7,0	0,9	8,9	1,4	7,9	1,1	9,4	1,5
45-49	8,3	1,4	11,3	2,3	9,8	1,8	6,6	1,0	6,5	1,2	6,5	1,1	8,6	1,5
50-54	6,9	1,2	9,6	1,9	8,3	1,5	7,3	1,2	10,1	2,1	8,7	1,6	8,5	1,6
55-59	5,7	0,8	8,6	1,6	7,3	1,2	7,7	1,1	8,4	1,7	8,1	1,4	7,6	1,3
60-64	6,6	0,6	6,5	0,9	6,5	0,7	9,1	1,1	8,4	1,4	8,7	1,2	7,5	0,9
65-74	4,0	0,5	6,1	1,3	5,3	0,8	6,6	1,1	5,2	1,4	5,8	1,2	5,5	1,0
75 +	5,0	0,3	6,0	0,9	5,7	0,6	5,4	0,5	3,9	0,7	4,4	0,6	5,1	0,6
Ogółem	34,72	100,0	29,3	100,0	31,9	100,0	35,2	100,0	29,7	100,0	32,4	100,0	32,1	100,0

PZH 1/83, 60 egz.    z/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność<sup>±</sup> na salmonelozę... pokarm./  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym:
	<20 tys.	1434	32,1
	20-50 tys.	1012	28,1
	50-100 tys.	851	29,5
	>100 tys.	3664	337,0
WIEŚ		4783	32,4
OGÓLEM		11744	32,1

±/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na  
inne salmonelozy./z wyjąz. zatr.pokarm./

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	828	560	7,1	4,8
II	961	756	8,3	6,4
III	1126	1049	9,7	8,9
IV	1124	1095	9,7	9,3
V	1212	1275	10,4	11,0
VI	1123	1182	9,7	10,1
VII	1064	1052	9,2	8,9
VIII	1051	1069	9,0	9,1
IX	994	1083	8,5	9,2
X	887	934	7,6	7,9
XI	701	787	6,0	6,7
XII	558	902	4,8	7,7
Razem	11629	11744	100,0	100,0

\* wg daty zachorowania

\*\* wg daty rejestracji